

sero lactis decocta, in scorbuto etiam si cum febris conjuncto, laudabantur. Sic & succus expressus ad unciam duarum quantitatem bis terve de die eodem in morbo ordinabatur. A multis succus ille cum lactis sero commistus in medicamentum vernale ad emendandam humorum massam, quali cum effectu ignoro, adhibetur. Conserua cochleatim a scorbuticis nec non herba recens in acetariis ingeri potest, salubri sæpe cum eventu.

Tab. XXXI.

BELLIS MINOR. *Officin.*Bellis perennis. *Botanic.*

Bellis pratensis, bellus flos, herba margarita. Gallis, Panquerette vivace, Marguerites, Pasquettes. Anglis, Daïfies.

Classis XIX. Syngenesia. Ordo II. Polygamia superflua.

Genus. Receptaculum nudum, conicum. Pappus nullus. Calyx hemisphæricus: squamis æqualibus. Semina obovata.

Species. Bellis scapo nudo.

Ornat aprica elevataque prata Austriæ, ac maximæ partis Europæ flore a primo vere ad hyemem usque suo.

Pharmacopolæ flores foliaque in usum asservant.

Folia oblonge ovata, in margine crenata ac pilosa insident petiolo e radice exsurgente foliaceo. Florum, quorum singulus cauli assidet separato duos pol-

Mollen abgekocht, rühmte man sehr im Skorbut, auch wenn er von einem Fieber begleitet würde. So wurde auch der ausgepreßte Saft der Blätter zu zwey Unzen zwey oder drey mahl des Tages in der nehmlichen Krankheit verordnet. Viele gebrauchen den Saft mit Mollen vermisch als Frühlingskur um die Säfte zu reinigen, mit welchem Erfolge aber, weiß ich nicht zu entscheiden. Skorbutische können die Conserve löffelweis, oder auch das frische Kraut unter dem Salate, und zwar oft mit Nutzen nehmen.

Ein und dreyßigste Tafel.

Das Gänseblümchen.

Die Maßliebe, das Margarethenblümchen, Tausendschönchen, Monathblümchen, Osterblümchen, Frühblümchen. Franz. Panquerette vivace, Marguerites, Pasquettes. Engl. Daïfies.

19. Klasse. Mitbuhler. 2. Ordnung. Ueberflüssige Vielweiberer.

Gattung. Der Fruchtboden nackt, kegelförmig. Haarkrone keine. Der Kelch halbkugelförmig, mit gleichen Schuppen. Die Saamen verkehrt eiförmig.

Art. Maßliebe mit nakedem Schafte.

Sie zieret mit ihren Blümchen die an der Sonne gelegenen und erhabenen Wiesen Oesterreichs, und des größten Theiles von Europa vom Anfange des Frühlings, bis gegen den Winter zu.


Zum Gebrauche liefern uns die Apotheken die Blätter und Blüthen.

Die Blätter sind länglicht eiförmig, am Rande eingekerbt und haarig, sie sitzen auf einem krautartigen Blattstiel, welcher unmittelbar aus der Wurzel entspringt. Die



BELLIS MINOR. off.
Bellis perennis. Bot.
Das Gänseblümchen.

[Faint, illegible text in two columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.]





BENZOE. Off.
Styrax Benzoe. Bot.
Der Benzoe.

lices longo, nudo, color in hermaphroditis flavus, in foemineis albus, externe ad petalorum apicem rubicundus. Sapor totius plantae subacris; sed omni omnino caret odore.

Vires, nisi paucas refrigerantes, fere nullas occupat.

Existimatur florum infusum infantibus purgans; sed etiam olim bellis minoris usus in tabe, pulmonum affectione magnis. efferebatur laudibus, tamen virtutis expers reperta hodie plane negligitur.

Tab. XXXII.

BENZOE. *Officin.*

Styrax Benzoë. Botanic.

Affa odorata, affa dulcis. Gallis, Benzoin. Anglis, Benjamin, Benzoin. Classis X. Decandria. Ordo I. Monogynia.

Genus. Calyx inferus. Corolla infundibuliformis. Drupa disperma.

Species. *Styrax Benzoë.*

Syria, Judæa, Insula Sumatra & Italia patria hujus arboris agnoscitur.

Servatur in officinis resina, ac inde flores, oleum empyreumaticum & tinctura parantur.

Adfertur succus hic resinofus ex insula Sumatra in magnis massis concretis, quæ vel canna tectæ, vel saltem ejus

Blüthen, deren jede einzeln auf einem eigenen Stengel aufsteht, haben, wenn sie weiblich sind, eine weisse, wenn sie aber beyde Geschlechter in sich begreifen, eine gelbe Farbe, die Spitzen der weissen Blumenblätter aber sind an ihrer äussern Fläche roth. Die ganze Pflanze besitzt einen etwas scharfen Geschmack, aber gar keinen Geruch.

Heilkräfte hat sie fast keine, ausser vielleicht etwas kühlende.

Der Aufguss der Blüthen wird für ein Abführungsmittel für Kinder gehalten; aber ob schon der Gebrauch der Mafsliebe vorhin in der Schwindsucht und andern Lungenkrankheiten sehr gelobet wurde, so kommt sie doch heutzutage wegen Mangel an Heilkräften ganz ausser Gebrauch.

Zwey und dreyßigste Tafel.

Der Benzoe.

Wohlriechender Asand. Franz. Benzoin. Engl. Benjamin, Benzoin.

10. Klasse. Zehnmannige. 1. Ordnung. Einweibige.

Gattung. Der Kelch unten. Die Blumenkrone trichterförmig. Die Steinfrucht zweysaamig.

Art. Der Benzoe.

Syrien, Palestina, die Insel Sumatra und Italien nimmt man als das Vaterland dieses Baumes an.

Das Harz hält man in den Apotheken auf, und bereitet daraus, die Blumen, das empyreumatische Oehl und die Tinktur.

Dieser harzige Saft wird aus der Insel Sumatra in grossen und dichten Massen, welche mit Rohr bedeckt, oder wenigstens