

SYLLABVS
MATERIAE MEDICAE
SELECTIORIS
CVM
DESIGNATIONE PONDERIS
QVO
SIMPLICIA ET COMPOSITA
IN OMNIS GENERIS FORMVLIS
PRAESCRIBVNTVR,
ITEMQVE DOSEOS,
IN QVA SOLITARIE INTERDVm EXHIBENTVR.

SECTIO I.

CAPVT I.

DE

EMETICIS.

In pulueribus et potionibus.

☿us emeticus Myn	} puer. X—XV. ann.
fichti	
☿ius vitae	} adulto gr. ij—iiij.
Crocus metallorum	gr. ij—iv—vj.
⚱ ☉atum	℥ii gr. iiij—vj.
☉ ☉-li vomitorium	℥j—3℥.
▽ benedicta Rulandi	3℥—j.
Hh	5

Oxy-

Oxyfaccharum emet. Ludouici ℥j—℥iij—℥℥.
Turpethum minerale gr. ij—iv.

In puluere, bolo et linciu.

Radix Afari tenerrime ⚥ifata ℥℥—j.
Ipecacuanhae ℥i—℥℥.
Gummi guttae gr. v—℥℥.

In infuso.

Vitrum ⚥ii
Crocus metallorum } gr. iv—viii.
Herba Nicotiana ℥ij—iij.
Extractum Nicotianae primae coctionis gr.
iij—iv.
Arilli sambuci ℥j.—i℥.

Pro infantibus.

Conserua aut syrupus florum }
Perficorum } ℥℥.—j.
de Iacea }

Oxymel squilliticum ℥ij—iv.

⚥ium diaphoreticum cum duabus partibus
⊙tri detonatum et leuiter calcinatum,
gr. ij—v.

⚥eum Amygdal. dulc. recenter expressum
℥℥—j.

AN-

ANTEMETICA.

In essentiis et tincturis.

Aromata omnia fragrantiora.

Radix Gentianae rubr.

Galangae.

Zedoariae.

Cortices Aurantium et Citri.

Essentiae amarae et stomachicae, gtt. xxx—xl.

In cataplasmatibus et linimentis.

Species carminatiuae.

Aromata et semina aromatica, horumque $\mathcal{Q}$ ea
destillata.Species pro cataplasmate de fermento Myn-
sichti.

In puluere.

Corallia rubra ppt. $\mathfrak{z}$ i— $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.Species de Hyacintho $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ —j. $\mathcal{M}$ Pilularum de cynoglossa gr. j.—i $\mathfrak{ss}$. $\mathcal{O}$ depuratum $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Cortex Cascarillae gr. vj — viij.

In potionibus

∇ Cinnamomi vinosa,	} $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$
cydoniata	

Menthae $\mathfrak{z}$ i—ij. ∇ Ve.

▽ Veronicae vinosa ℥j.

Theriaca simplex ℥j.

Syrupus de canella

corticum aurant.

myrtinus

cydoniorum

℥ij. — iij.

papaueris rhoead. ℥iij. — ℥℥.

In emplastris.

Emplastrum de crusta panis

Tacamahaca

Ladano

baccis Lauri

Mastiche

Oxyroceum

q. p.

Ceratum de Galbano

Santalinum.

CAPVT II.

DE

EVACVANTIBVS PER ALVVM.

I. LAXANTIA.

In clysteribus.

Rob passularum laxativ.

Cassia pro clysteribus

Diacassia cum manna

Electuarium diaprunorum

Pulpa Tamarindorum

℥℥. — j.

℥j.

Mel

Mel anthosatum, ℥℥. — j.

Sapo Venetus ℥ij — ℥℥.

In pulueribus et potionibus.

Omnia ex ꝑo parata, v. g.

Cremor et Cryſtalli ꝑi ℥℥

ꝑrus ꝑiſatus.

Arcanum ꝑi.

ꝑa foliata ꝑi.

ꝑrus ⊕ latus amarus.

Ⓞtrum ꝑiatum.

depuratum.

Lapis prunellae.

Manna, *infantibus* ℥℥ — ij.

adultis ℥i℥ — ℥iiij.

Manna ꝑiſata, *adultis* ℥j — i℥.

Manna liquida, *infantibus* ℥j — i℥.

Syrupus de manna ℥j.

domesticus

de ſpina ceruina } ℥℥ — ℥vj.

de cichoreo cum rhabbaro ℥℥ — ij.

roſarum ſolutius ℥℥ — ℥vj.

In decoctis.

Succus Caſſiae *infantibus* ℥ij — iiij.

adultis ℥j — ij.

Tamarindi, *infantibus* No. vi — x.

Pulpa tamarindorum ℥j — i℥.

Paſſulae

Passulae laxatiuae, *infantibus* ℥j — ij.

adultis ℥℥ — ℥j.

Passulae Corinthicae ℥j.

Pulpa passularum, *adultis* ℥ij — iij.

II. PURGANTIA.

In pulueribus, linctibus et electuariis.

Radix Ialappae, *infantibus* gr. iv — viij.

adultis ℥℥ — j.

robustioribus ℥℥ — ℥ij.

Afari ⚥ifata, *adultis et robustioribus*

℥℥ — ℥ij.

Scammonium ⚥ratum } gr. ij — vj.

Resina scammonii

Iris Florentina *adultis* ℥℥.

infantibus gr. iij — vj.

nostras, *infantibus* gr. iv. — vj.

adultis ℥j.

Gummi guttae, *adultis* gr. v — ℥℥.

Magisterium gummi guttae gr. ij — iij.

Ξius dulcis *infantibus* gr. ij — iv.

adultis gr. viij.

⊙ fulminans *infantibus* gr. ℥ — i℥.

adultis gr. ij — iv.

Magnesia alba *infantibus* ℥℥ — j.

adultis ℥iij — ℥℥.

In

In Emulsionibus.

Resina Ialappae-simplex, *adultis* gr. iij. — vj.
 praeparata, *infantibus* gr. j — iij.
adultis gr. vj — ʒʒ.

Scammonii }
 Scammonium $\triangle$ rat. } gr. ij — v.

In bolis et pilulis.

Aloë correcta, gr. vi. — xv.

Extractum hellebori nigr. gr. vj — viij.

agarici gr. iij — vj.

colocynthidis, gr. j — iij.

esulae gr. ij — v.

rhabarbari ʒj — ʒʒ.

panchymagogum Crollii ʒʒ —
 gr. xv.

Trochisci colocynthidis gr. j — iij.

Agaricus trochiscatus gr. iij — vj.

Mpilularum Hierae cum agarico ʒʒ — gr. xv.

de Succino Cratonis ?

ʒearum

de ammoniaco

} gr. xv. ʒj.

ʒius dulcis, *infantibus* gr. ij — iv.

adultis gr. vj — viij.

In morfulis pro infantibus.

Radix Ialappae, gr. vj — ʒʒ.

Spe-

Species diaturbith. cum rhabarb. *infantibus*
gr. vj— $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

adultis $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.
Scammonium $\mathfrak{A}$ rat. gr. ij—v.

In decoctis et infusis.

Radix bryoniae $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ —j.

Cassia fistular. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Radix ebuli $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

Fibrae hellebori nigri $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ —vj.

Polypodium quernum $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ —i $\mathfrak{ss}$.

Radix hermodactylorum $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ —vj.

mechoacannae albae $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Myrobalani $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ —j.

Rhabarbarum orientale $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

monachorum $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ —j.

Folia Sennae f. stipit. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Tamarindi $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ —ij.

Agaricus trochiscatus $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ —ij.

Flores acaciae $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ —ij.

Summitates fumariae

centaurii minoris } m $\mathfrak{ss}$.

In essentiis.

Essentia Ialappae }
Ra Rhabarbari } $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ —iij.

Succus radices bryoniae, *adultis* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

In

In clysteribus.

- Semen carthami ʒij.
 Pulpa colocynthidis in petia ligata ʒj—ij.
 Agaricus in petia ligatus } ʒiʒ.
 Fel tauri
 Electuarium Hierae cum agarico ʒij—iij.
 Summitates centaurii minoris, pug. ij—iij.

CAPVT III.

DE

DIAPHORETICIS.

In pulueribus, essentiis simplicibus,
 decoctis et infusis.

Aromata omnia calidiora,

- | | |
|------------------|--------------|
| Radix angelicae | in ʒibus ʒj. |
| anthorae | essent. gtt. |
| ari | xx—xxx. |
| gentianae rubrae | decoctis |
| carlinae | ʒij—ʒʒ. |
| contrayervae | |
| galangae | |
| imperatoriae | |
| petalididis | |
| valerianae | |
| zedoariae. | |

(Pars II. de form. in specie.) Ii Radix

Alotta Radix bardanae

caryophyllatae

Spina uindst chinae

ur: dyctamn dictamni albi

Bilant. enulae / *helenium*

Leibstodrl leuistici

orefruy, Hiltz oelinitii / *Hiffelini*

brutau. pimpinellae albae

ut: Pimper fars. parillae

Carthagen scorzonerae, *terrapogon*

Eschalmun vincetoxici.

cardobardul Herba cardui benedicti

Epithym epithymi, *caputo minor*

galegae / *galegae*

Hippoc piperitidis, *raphan* / *syph*

Rutae rutae

Salvia salviae

Scabiosa scabiosae

Scolopendria scolopendrii

Scordium scordii

Serpilli serpilli

Verbenae verbenae

antiscorbuticae omnes.

Robur Flores anthos

Calendula calendulae

Centaurium centaurii minoris

Galegae galegae

Sambuci sambuci

Vlmariae vlmariae

Arnicae verae / *ptarmica*

Montana / *latifolia*

Semen

in fibus , 3j — 3ss .
essentiis, gutt.

xxx—xl.

decoctis, 3j — ij .

in essentiis gutt.

xl.

succo c. vino

3j .

decoctis mj.

simili ratione
cum herbis.

Semen rutae, in ꝯibus ℥j.
decoctis ℥ij.

Baccae iuniperi }
lauri } in decoctis ℥iiij—℥℞. *Musculus*
sambuci. } *Leobers.*

Lignum sassafras }
fantalinum citrinum } in decoct. ℥℞. *Cassia*
iuniperi } *fructus*
guaiacum. }
fraxinum } *fraxinus folia*

In bolis et electuariis.

Praedictae radices et semina in citata dosi.

Rob iuniperi }
sambuci. } ℥ij—℥℞.

Theriaca simplex }
Diascordium Fracastorii } infantibus, ℥j.
Mithridatium. } adultis, ℥j—i℞.

Theriaca coelestis, infantibus gr. ℞—j.

In pulueribus compositis.

ꝯ diaphoreticum non elixiniatum adultis ℥℞—
gr xv.

elutriatum infantibus gr. vi ℥℞.

adultis ℥j—℥℞.

Bezoardicum minerale gr. xv—℥j. *mineralis*

Abforbentia omnia ℥j

⊖ volatile C. C.

succini

viperinum

Anglicanum.

} gr. j—iiij.

Camphora, *adultis* gr. ℥—j.

Myrrha

Crocus Orientalis. } gr. iiij—iv.

Lapis bezoardicus orient. gr. ij—iv.

occident. gr. vj—viij.

de Goa gr. iiij—vj.

C. C. philosophice ppt.

Unicornu verum

fossile.

} ℥℥—℥j.

Cinnabaris nativa

℥ii.

} gr. iiij—vj.

⊕ Ⓞatum ℥ii secundae vel tertiae praecipitationis et bene edulcoratum, gr. j—iiij.

Flores Ⓞris

Ⓞis

℥ci. } gr. iiij—vj.

Magisterium C. C.

Trochisci de viperis. } gr. vj—℥℥.

℥ius diaphoreticus gr. ij—iiij.

⊖ absynthii

cardi benedicti

centaurii minoris.

} gr. viij—℥℥.

In

In essentiis et mixturis compositis.

Essentia alexipharmaca Stahlī

Ra bezoardica Michaëlis

Wedellī

Mixture simplex cum camphora

fine camphora

gutt xx-

Liquor C. C. succinatus

xxx.

tus eboris

C. C.

¶i

omnes volatiles.

Essentia lignorum gutt. xxx — L.

In potionibus et iulapiis.

Vae 3tae, cardui benedicti

galegae

plantaginis

scabiosae

scordii

vlmariae

florum acaciae

sambuci

fumariae. *ad vng.*

3j — iß.

Acetum bezoardicum 3j.

tus ceraforum nigrorum

cochleariae

liliorum conuallium

rorismarini

rosarum

sambuci

serpilli.

3ß — j.

acidi minerales, ad gratam aciditatem.

li 3

in

In emulsionibus.

▽ae diapnoicae praedictae

Semen citri	}	3ij.
aurantiorum		
aquilegiae	}	3ß—j.
napi		
raparum.		

Decocta lignorum 3iv—vj.

CAPVT IV.

DE

DIVRETICIS.

I. RESOLVENDO OPERANTVR.

In essentiis, infusis, extractis
et pulueribus.*Radix* Radix apii

- ari
- bardanae
- carlinae
- caryophyllatae

Herba helenii

- imperatoriae
- leuistici
- pimpinellae albae
- rubiae tinctorum
- valerianae

*fructus**Rubus, Mercurius* rusci

- gentianae rubrae
- vincetoxici

}	in essentiis gtt. xl.
	infusis, 3ij- 3ß.
	extracto, gr. v. pulueribus, 3j.

Herb.

Herb. absynthii

- capillorum ♀is
- cardui benedicti
- centaurii minoris
- cochleariae
- fumariae
- piperitidis
- nasturtii
- scordii
- scolopendrii
- fedi muratii
- trifolii fibrini.

in decoctis et
infusis, mss. — j.
essentiis, gtt. xl.
extracto, gr. iv.

Flores genistae in infusis et decoctis pug. ij — iij.

Semen carui,

- cumini
- petroselini
- apii
- dauci
- bardanae
- faleris montani

in pulv. ʒj — ij.
decoct. et
infus. ʒj — iij.

- Baccae iuniperi.

In emulsionibus.

Uae Ōtae herbarum praedictarum ʒj — ij.

Nuclei persicorum
 cerasorum

- Semen citri

- Cantiorum

Amygdalae amarae.

Succus radicis raphani ʒʒ — iʒ.

li 4

In

In essentiis et Ris compositis.

Ra ζ ii acris, *infantibus* gtt. vj—xij.*adultis* gtt. xx—xxxvj.

Essentia succini, in simili dosi

-tus Θ is χ ci

-eboris

-C. C.

fuliginis.

} gtt. xx—xxx.

lumbricorum ∇ estrium, gtt. xxx—xl.

In pilulis.

Extracta praedictarum radicum et herbarum,
nec non reliquarum specierum antiscor-
buticarum in praedicta dosi.

Gummi galbanum

ammoniacum

sagapenum

bdellii

iuniperi

succini

} Θ — gr. xv.

Terebinthina cocta.

II. ABSTERGENDO OPERANTVR.

In pulueribus.

 Θ ia omnia, praeprimis fixa, acida et alca-
lina, v. g.

①. de-

Ⓞ. depuratum

giatum

Lapis prunellae

Ⓞia omnia digestiua et
ex ꝛo parata

Absorbentia cum acido saturata

Lumbrici Vesires ꝛisati

Testae ouorum cum acido sa-
turatae.

℞—j.

In Ris et essentiis.

Ra ꝛii

ꝛi

gtt. xx—xxxvj.

Liquor Vae foliatae ꝛi

rus ꝛi

Ⓞtri dulcis

Ⓞis dulcis.

gtt. xxx—xl.

In potionibus et iulapiis.

Vae Ⓞtae, cardui benedicti

fumariae,

ononidis,

petroselini,

urticae.

℥j—ij.

Syrupi acidiusculi, v. g.

acetositis citri

acetosae

cydoniorum

berberum

ceraforum nigrorum

granatorum

rubi idaei.

℥iij—℥ss.

li s

atus

tus minerales acidit

Succus citri } ad gratam aciditatem.
cydoniorum. }

III. STIMVLANDO OPERANTVR.

In substantia.

Fructus cynosbati }
fragorum } ʒß—j.
alkekengi }Succus allii }
ceparum } ʒij—iij.
raphani ʒß.

In pulueribus et potionibus.

⊖ stipitum fabarum }
ononidis }
cardui fullonum } gr. vj—ʒß.
imperatoriae }
genistae }
iuniperi. }

Lapides percarum ʒi—ʒß.

Fructus cynosbati }
alkekengi } ab acinis liberati ʒj—iij.

Millepedes gr. vj—ʒß.

Crytalli ʒnae gr. iij—vj.

Lapis lyncis }
Iudaicus } gr. vj—xij.
nephriticus. }

Tro-

Trochisci alkekengi, *iunioribus*, ℥ss.
adultis, ℥j—ij.

Cineres bufonum }
 scorpionum. } gr. vj—℥ss.

⊖ fixum exinde paratum, gr. iij—vj.

Cantharides gr ij—iv. in dilutionibus potio-
 nibus, sed raro.

∇ae Ωtae praedictae ℥j—ij.

In Ris et mixturis.

℞tus aperitiuus Penoti }
 terebinthinae }
 ℞a nephritica Amelungii } gtt. xv—xx.
 Mynsichti }

℞a cantharidum Bartholiniana, cochlear j.

CAPVT V.

DE

REMEDIIIS HAEMORRHA- GIAS NATVRALES PROMOVENTIBVS.

I. DE EMMENAGOGIS.

In essentia simplici, decoctis, infusis,
 balneis et infessibus.

Radices in Capite de diaphoreticis allegatae.
 Herba

Herba artemisiae }
 calaminthae }
 melissae }
 matricariae }
 marrubii albi } in essentiis, gtt. xxx.
 pulegii } reliquis formulis mss. — j.
 rorismarini }
 rutae }
 sabinae }
 serpilli. }

Flores calendulae }
 cheiri } in infusis et
 chamomillae Romanae } reliquis for-
 schoenanthos. } mulis p. iij-
 mj.

Baccae lauri 3j — ij.

Aromata omnia, praecipue

Caryophylli aromatici }
 Anthophylli } 3j — ij.

In pulueribus.

Myrrha gr. iij — vj.

Borrax }
 Succinum } ʒss — gr. xv.

Flores ʒris gr. vj — ʒss.

⊖ia fixa praedictarum herbarum gr. vj — xij.

⊖ volatile succini gr. ss — ij.

⊖ea ʒta aromatum et }
 praedictarum haerbarum } gtt. iij.
 Succini gtt j — ij.

In

In pilulis.

Extracta praedictarum herbarum }
radicum } gr. vj. - viij.
hellebori nigri.

Aloë correcta gr. iv — vj.

Gummi ammoniacum }
Myrrha } gr. vj — ʒß.
Terebinthina cocta. }

Quæ antea citata in dicta dosi.

Pilulae Becherianae }
balsamicae Stahlianæ } ʒj — gr.
Hoffmannianæ. } xxv.

In Ris et essentiis.

Ra ʒris gtt. xv — xx.

Balsamus ʒris anisatus gtt. vj — x.
succinatus }
terebinthinatus. } gtt. iv — viij.

Resina fuliginis }
C. C simplex. }
succinatus }
Essentia myrrhae } gtt. xv — xx.
succini }
croci Orientalis. }

Elixirium proprietatis simplex } gtt. xx —
Paracelsi. } xxx.

II. HAE.

II. HAEMORRHOIDVM FLVXVM
PROMOVENTIA.

In pilulis.

Extracta ante citata.

Aloë succotrina depurata gr. vj — ℥ss.

In Ris.

Essentia croci }
myrrhae } gtt. xxx — xl.
succini. }

Elixirium propr. Paracelsi }
Ra 3tis helleborata. } gtt. xx — xxxvj.

Sub diaeta.

Allium, cepae, porrum, piper, zingiber,
finapi et vinum generosum.

III. LOCHIORVM FLVXVM
EXCITANTIA.

Praeter iam allegata,

Essentia alexipharmaca }
Pilulae balsamicae } Stahlü in consueta
Hoffmannianae } dosi.

Borrax ℥ss — gr. xv.

CAPVT

CAPVT VI.
DE
SALIVANTIBVS

In puluere, pilulis et vnguentis.

Gialia omnia, minus corrosiua, in specie
interne

Gius dulcis gr. iij — vj et vltra.

Arcanum corallinum Hartmanni gr. ij — vj.

Externe.

Gius crudus depuratus ℥j — i℥.

Pertinent huic vltterius

I. DECOCTA LIGNOSA,
quae constant ex

Radicibus chinae	}	℥j — i℥.
tarfaeparillae		
helenii		
pimpinellae albae		
bardanae		
liquiritiae.		

Herbis saponariae	}	mj.
scordii		
fumariae		
centaurii minoris.		

Lignis sassafras	}	℥j — ij
guaiaci		
iuniperi		

Se-

Seminibus anisi }
foeniculi } ʒß.

Corticibus citri }
 ⊙antiorum } ʒj—ij.
Passulis maioribus.

II. GARGARISMATA, quorum ingredientia sunt:

Radices caryophyllatae }
vincetoxici }
iridis Florentinae } ʒj—iß.
sigilli Salomonis }
althaeae }
bardanae.

Herbae chaerefolii }
hyslopi }
pyrolae }
scordii }
salviae } mß.
faniculae }
veronicae }
uvulariae.

Semina carui }
foenu graeci. } ʒß.

Hordeum excorticatum ʒvj—ʒj.

Passulae maiores ʒj.

Caricae pingues No. iv — vj.

III. NI-

III. NIMIAM SALIVATIONEM TEMPERANTIA.

Flores ex absorbentibus ppt. $\mathfrak{zj}$ — $3\mathfrak{ss}$.
 Flores $\hat{\text{c}}$ ris, gr. vj—xij.
 Gum diaphoreticum $\mathfrak{ss}$ —j.
 Diapnoica et diaphoretica leniora.
 Essentia alexipharmaca Stahlī gtr. xxx—xl.
 Laxantia diuersae speciei, inprimis ex $\hat{\text{c}}$ io
 dulci parata.

CAPVT VII.

DE

APOPHLEGMATIZANTIBVS.

I. ERRHINA.

tus Θ is χ ci
 rorismarini
 volatilis Anglicanus.

} gtr. paucae.
 }

Euphorbium ppt. gr. $\mathfrak{ss}$ —j.

Gum album cum ∇ ae maioranae vel rosa-
 farum $\mathfrak{zj}$. remiscendum, $\mathfrak{ss}$ —gr. xv— $\mathfrak{zj}$.

II. ERRHINA ET PTARMICA.

Radix hellebori albi
 nigri } gr. iij—vj.

iridis Florentinae
 ari. } $\mathfrak{ss}$ —j.

(Pars II. de form. in specie.) Kk Her-

Herba nicotianae

maioranae

betonicae

ferpilli

thymi

rorismarini,

Flores liliorum conuallium

anthos

spicae nardi

lauendulae.

} ʒi — ij.

Semen rutae

nigellae

erucac

finapios.

} ʒi — ʒʒ.

Cubebae

Caryophylli aromatici

Piper.

} ʒʒ — gr. xij.

Olea ʒta praedictarum herbarum, nec non

rosarum

fatureiae

corticum ʘantio-
rum

sassafras

ligni Rhodii

de cedro

caryophyllorum

cinnamomi.

} gtt. iij — yj.

Species de maiorana Mynsichti

dia - tabaci.

} ʒʒ — j.

Am-

Ambra }
 Moschus. } gr. iij — vj.

Species sternutatoriae Rulandi }
 Wedelii } q. p.

III. MASTICATORIA.

Radix pyrethri ℥ss.

Folia tabaci ℥j — 3℥.

Mastix 3℥ — j.

Radix angelicae

ari

acori

carlinae

cyperi

galangae

gentianae rubrae

helenii

imperatoriae

leuistici

perasitidis

pimpinellae albae

zedoariae

zingiberis.

} ℥ss — 3℥.

Allium }
 Cepae. } q. p.

Costus albus

Cubebae

Caryophylli aromatici

Piper

Cardamomum.

} ℥ss — gr. XV.

Kk 2

Semen

Semen erucæ
 sinapios. } gr. viij — ʒß.

Grana paradisi ʒß.

Herba recens mari veri
 piperitidis
 maioranae
 origani
 rorismarini
 satureiae. } in substantia q.p.
 in extracto ʒß.

CAPVT VIII.

DE

EXPECTORANTIBVS.

I. MATERIAM VISCIDAM TENACEM EVACVANTIA.

In pulueribus, essentiis, infusis
 et decoctis.

Radices omnes in Cap. III. allegatae, in specie

ari
 helenii
 gentianae rubrae
 albae
 costi dulcis
 cyperi rotundi
 squillae
 iridis Florentinae
 liquiritiae. } in consueta dosi.

Her-

Herbae capillorum ♀ris
 rutae murariae
 scolopendrii
 hyssopi
 erysimi
 marrubii albi
 scordii
 chaerefolii
 vrticae minoris
 veronicae.

} in iam allegata
 dosi.

Flores Stoechados Arabicae
 sambuci
 ruffilaginis
 saluiae
 anthos.

} in infusis et de-
 coctis p. ij - iij.

Semina anisi
 foeniculi
 apii
 petroselini
 carui.

} 3ij — iij.

Lignum Rhodium
 saffraas
 iuniperinum
 santalinum citrinum.

} 3iij — 3ß.

Extractum de peto gr. iij — vj.

Looch de farfara
 ad asthma
 sanum et expertum
 conseruae scordii.

} 3ij — iij.

Kk 3

Mel

Mel despumatum }
 passulatum } 3j — 3℥.
 rosatum }
 violatum }

Gummi ammoniacum }
 benzoës } 3℥ — 3℥.
 Succinum }

Infantibus in substantia.

Œcum oliuarum }
 amygdalarum dulcium. } 3j — ij.
 Oxymel squilliticum 3ij — iij.
 Sperma ceti 3℥ — j.

II. MATERIAM NIMIS ACREM ET TENVEM EXPECTORANTIA.

In potionibus et emulsionibus.

Omnia ante recensita inuoluentia et mucila-
 ginosa, in consueta dosi.

Gummi Arabicum }
 ceraforum } 3j — iij.
 tragacanthae. }

In pulueribus.

Œia digestiua }
 Absorbentia pura. } 3℥ — j.
 Flores ʒis gr. iv — vj.
 benzoës gr. iij — vj.

Radix

Radix ari } $\mathfrak{z}\mathfrak{s}$ —j.
 Faecula ari. }
 Succinum ppt. gr. vj — $\mathfrak{z}\mathfrak{s}$.

In essentiis et Ris.

Praeter ante citatas

Ra $\mathfrak{A}$ is gtt. x — xv.

Balsamus $\mathfrak{A}$ ris anisatus, gtt. iij — vj.

mus Θ is $\mathfrak{X}$ ci anisatus, gtt. x — xv.

Essentia gummi ammoniaci }
 succini. } gtt. xv — xx.

In potionibus.

∇ ae per fermentationem paratae, videlicet

scordii }
 veronicae } $\mathfrak{z}\mathfrak{s}$ —j.
 hyssopi. }
 asthmatica $\mathfrak{z}\mathfrak{s}$.

Potio pectoralis Stahliana $\mathfrak{z}$ j — ij.

Syrupi antea recensiti in consueta dosi.

In pulueribus, essentiis, decoctis
 et infusis.

Omnia sub No. I. allegata discutientia.

III. MOTVM TVSSICVLOSVM EXCITANTIA.

In potionibus.

Praeter ∇ as et Syrupos sub No. I. et II. allegatos, etiam

us minerales acidi, nempe

$\ominus$ is

$\ominus$ li

$\ominus$ tri

Δ ris per campanam

Clyssus $\ominus$ ii Δ ratus.

} paucis gtt. ad
gratam acidi-
tatem.

In Ris.

$\mathcal{R}$ a papaveris rhoeados

rosarum $\ominus$ -lata

florum bellidis.

} gtt. xxx—xl.

In puluere.

Omnia $\ominus$ ia digestiua, inprimis

$\ominus$ trum, $\mathfrak{D}$ ß — gr xv.

Species vegetabiles, inferius allegandae.

In decoctis.

Caricae pingues

Dactyli.

Passulae minores

Iuinbae

Sebesten.

} No. iv—viij.

} $\mathfrak{z}$ ij— $\mathfrak{z}$ ß.

Sili-

Siliquae ceratoniae $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ — $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$.

Ichtyocolla, $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{ij}$.

In potionibus et emulsionibus.

Mucilagines, feminum psyllii
cydoniorum } $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{ij}$.
lini.

Gummi Arabicum } simili dosi.
ceraforum.

Amygdalae dulces $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ — $\mathfrak{iv}$.

Pineae
Pistaceae } $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ — $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.
Semen cardui Mariae.

Syrupi de betonica
capillorum $\mathfrak{q}\mathfrak{is}$
de erysimo Lobelii
hederae ∇ estris
de hyssopo
liquiritia } $\mathfrak{z}\mathfrak{iiij}$ — $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.
iuiubis
tussilaginis
violarum
pomorum.

Oxymel squilliticum simplex
compositum. } $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ — $\mathfrak{iiij}$.

∇ ae Ω tae praedictarum herbarum.

In substantia, cataplasmatibus, lini-
mentis et vnguentis.

Species emollientes

Quae lenientia, videlicet

oliuarum

liliorum alborum

sesaminum

anethinum

capparum.

iunioribus

3ij.

Axungiae, pinguedines et me-
dullae diuerforum anima-
lium, nimirum,

Pinguedo anatum

anserum

apri

canis

caponis

gallinae

hominis

lucii piscis

taxi

vrsae.

adultioribus

3℥—j.

Cataplasmata, praepreparata ex Quibus praeparata.

Vnguentum rubrum potabile

pectorale

resumtium.

3ij—3℥.

Medullae ossium cerui

hirci

tauri

vituli.

simili cum pingue-
dine dosi.

Bu-

Butyrum non Situm.

In essentiis et Ris.

Elixir pectorale Michaelis } gtt. xxx — xl.
 hyssopi }
 Wedelii. }

Essentia helenii
gummi ꝯci } gtt. xx — xxxvj.

In elaeofaccharis.

Œcum amygdalarum dulcium recenter ex-
pressum, ℥ij.

Sperma ceti, adultis 3ß—j.

Trochisci bechici albi } ʒi—ij.
rubri }

Saccharum candifatum, ℥iij—℥℞.

In electuariis.

Praeter superius recensita gummata,

Gummi tragacanthae }
elemi } 3j—iſſ.
maſſiches }
thuris. }

CAPVT

CAPVT IX.

DE

RVBEFACIENTIBVS, VESICA-
TORIIS, CAUSTICIS ET
CATHAERETICIS.

I. RVBEFACIENTIA.

In cataplasmatibus et emplastris.

Allium	} recens, ʒß.
Radix raphani	
Rad. ranunculi	} sylvestris, ʒiij — ʒß.
Folia ranunculi	
Semen sinapios	} ʒij — ʒß.
ammios.	
Euphorbium	} ʒß — j.
Radix pyrethri	
Fermentum panis, q. p.	
+ vini, vel †; itemque squilliticum, q. f.	

II. VESICATORIA.

In cataplasmate,

Cantharides ʒj — ʒß.

In emplastris.

Emplastrum vesicatorium Zwelfferi	} q. p.
Augustanum	
Can-	

Cantharides, in dosi consueta, cum emplastri
diaphoret. Mynsichti ℥℥ remixti.

Huc etiam pertinent,

a) *remedia adfluxum materiae
conseruantia.*

Folia brassicae.

Emplastrum citrinum
de spermate ranarum } q. s.
℞eum irinum.

b) *Inflammationem praeoccupantia.*

Emplastrum diaphoreticum Mynsichti
de spermate ceti
ranarum
meliloto. } q. p.
℞eum liliorum alborum
amygdalarum dulcium.

c) *Consolidantia.*

Emplastrum sticticum Crollii
de baccis lauri } q. p.
Norimbergense.

III. CAVSTICA ET CORROSIVA.

Butyrum ōii depuratum }
lapis infernalis } magnitudine pisi.
℞tus.

Huc

Huc pertinent
Remedia contra diuersa fonticulo-
rum accidentia, qualia sunt

a) *Escharam remouentia.*

Butyrum non Eitum

Vnguentum digestium Chirurgorum. } q. f.

b) *Fluxum materiae promouentia.*

Globuli parati ex radice

gentianae rubrae }
helenii } oeo intincti.
iridis Florentinae. }

Globulus ex simplici ligno, cum puluere colo-
cynthidis, cantharidum, vel cum eu-
phorbio, post intinctionem in oeo, in
parcissima dosi conspersus.

Globulus ex ligno buxi, cum vnguento Ae-
gyptiaco illinendus.

Globulus ex cera, cum pauxillo ☿ris canthari-
dum conspersus.

☿res radicum hellebori nigri }
mechoacannae } moderata dosi
jalappae. } inspergendi

c) *Inflammationem tollentia.*

Emplastrum diaphoreticum Mynsichti.

de cera viridi }
spermate ceti } camphorata
meliloto. }

Vini

Vini camphoratus } in ambitu fonticulo-
crocatu. } rum applicandi.

Species discutientes et neruinae, in forma fac-
culorum vinosorum.

d) *Carnem luxuriantem tollentia.*

○ ustum	} modica quan- titate insper- genda.
Cinere erinacei talpae	
Radix aristolochiae rotundae.	
℞eum philosophorum papyri	} desuper illinen- da.
Vnguentum Aegyptiacum.	

e) *Dolores et pruritus mitigantia.*

In linimentis.

℞ea lenientia, videlicet liliorum alborum chamomillae ouorum.	} 3j. — ij.
--	-------------

Camphora ʒi — ʒss.

Cerussa alba ppt. ʒj — ij.

f) *Haemorrhagias refraenantia.*

Vini rectificatissimus. Essentia florum hyperici aloës.	} externe.
℞res leniter styptici.	

g) *Foe-*

g) Foetorem remouentia.

Laxantia.

Globulus ex radice Irid Florentinae.

Repurgatio fonticuli cum vino calido.

IV. CATHAERETICA.

In pulueribus et vnguentis.

Os sepiae

Pompholyx

Aes vstum

○ vstum

Cinis tabaci

⚔is erinacei

calpae

aristolochiae rotundae.

⚔ius praecipitatus ruber.

Lapis medicamentosus. ⚔—j.

Vnguentum Aegyptiacum simplex

compositum

fuscum Würtzii.

} ⚔i—3℥.

} 3j—ij.

Per se et in epithematibus.

▽a ⚔ialis

Essentia ⚔ti.

} q. f.

⚔ ⚔ (○) ⚔ ⚔

SECTIO

SECTIO II.

DE

ALTERANTIBVS.

CAPVT I.

DE

RESOLVENTIBVS ET AB-
STERGENTIBVS.

I. RESOLVENTIA INTERNE

ADHIBENDA,

ex quibus

a) *Sanguinem resoluunt.*

In pulueribus, essentiis, electuariis,
decoctis et infusis.

Radices omnes priores in Cap. III. Sect. I. al-
legatae, sub praedicta dosi.

Herbae harum radicum, nec non

abrotani

absynthii vulgaris

Romani

betonicae

calaminthae

ceterach

hepaticae nobilis

chelidonii maioris

bellidis hortenſis

fuccisae

marrubii albi

origani

pulegii

satureiae

serpilli.

in allegata
dosi.

(Pars II. de form. in specie.)

Li

Flo.

Flores praedicti in Cap. III. Sect. I. nec non

stoechados Arabicae

chamomillae

cheiri.

} in consueta dosi.

Summitates origani

salviae.

Semina praedicta

foeniculi

dauci

faleris montani

carui.

} 3j — iſſ.

Cubebae.

Cardamomum.

Caryophylli aromatici.

} 3ſ — j.

In pulueribus compositis.

Omnia in Cap. III. Sect. I. sub hoc titulo allegata, et porro

Mumia 3ſ — j.

In Ris.

Cum superius recensitis etiam

Essentia Mumiae, gtt. xxx — xl.

In potionibus et emulsionibus.

Vae 3tae praedictarum herbarum

diapnoicae consuetae

Syrupi officinales harum herbarum

Semina citri

○ anteriorum

Amygdalae dulces

et reliqua.

} in consueta dosi.

b) Lym.

b) *Lympham resoluunt.*

In pulueribus, electuariis, essentiis,
decoctis et infusis.

Radix ari

acori

aristolochiae vtrius-
que

asparagi

cichorei

costi dulcis

cyper

dictamni albi

valerianae

taraxaci

rubiae tinctorum

pimpinellae albae

rusci

bardanae

iridis Florentinae

gentianae albae

raphani

petroselini

zingiberis.

in Fere et
electuar. ʒj-3ʒ.
essentia gtt.
xxx. xl.
decocto et
infuso ʒij iij.

Herbae omnes antiscorbuticae,

item

abrotani
 capillorum φ is
 chelidonii maioris
 cochleariae
 cuscutae
 marrubii albi
 mari veri
 matricariae
 menthae
 melissae
 rorismarini
 pulegii
 rutae
 salviae
 scolopendrii
 tanaceti
 thymi.

in essentia
 gtt XL L.
 decocto et
 infuso mss
 — j.

Folia lauri, $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ — j.

Flores matricariae

anthos
 tanaceti
 lauendulae
 centaurii minoris
 thymi.

in decocto et
 infuso p. ij — iiij.

Semina anisi

apii
 petroselinii
 fileris montani
 nigellae
 cumini.

3j — i $\mathfrak{ss}$.

Costus

Costus verus	}	in decocto, infuso et electuario, ʒj. ij.
Cinnamomum		
Piper		
Galanga		
Cortex Winteranus		
Squilla.	}	ʒiij—ʒss.
Lignum iuniperi		
sassafras		
guaiaci.		

In pilulis et electuariis.

Extracta officinalia praedictarum herbarum
ʒss—gr. xv.

Gummi galbani	}	gr. vj—ʒss.
sagapeni		
bdellii		
ammoniacy.		
Opopanax		
Mastix	}	gtt. xv—xxx.
Olibanum		
Succinum		
Gummi Sandaracae		
guaiacy.	}	
Liquor C. C. succinatus		
—tus C. C.		
fuliginis		
℞ ʒii simplex	}	
Fisaa.		

Ll ;

c) Ma-

c) *Materiam mucidam, viscosam et
Œeam resoluunt.*

In decoctis.

Radices omnes, cum herbis et reliquis in
Cap. IV. Sect. I. sub No. I. allegatis
speciebus.

In pilulis et electuariis.

Extracta herbarum antiscorbuticarum ʒss —
gr. xv.

Conseruae et syrapi harum herbarum ʒij-ʒss.

Gummi hederæ	}	gr. viij — ʒss.
myrrhæ		
sandaracæ.		

Œius dulcis.

In pulueribus.

△ in substantia ʒss — gr. xv.

Flores △ris gr. iij — vj.

**II. RESOLVENTIA EXTERNE
ADHIBENDA.**

In sacculis, cataplasmatibus, fomen-
tis, epithematibus et suffimijs.

Radix angelicæ	}	ʒij — ʒss.
caryophyllatæ		
vincetoxici		
ireos Florentinæ		
sigilli Salomonis carlinæ.		

Herba

Herba anethi

betonicae
calaminthae
chaerefolii
hyssopi
lauendulae
maioranae
melissae
rorismarini
pulegii
salviae
serpilli
menthae.

} mss—j.

Flores harum herbarum, nec
non

chamomillae
fambuci
spicae
schoenanthos
cheiri
cyani
calcatrippae
aquilegiae.

} mss—p. iij.

Semina omnia haecenus recensita 3j—ij.

Camphora, 3j—iij.

Ll 4

In

In emplastris et ceratis.

Gummi ammoniacum

bdellium

galbanum

tacamahaca

fuccinum

mastiches

myrrhae

Olibani, siue

thuris

anime

elemi

opopanax.

} 3℥ — ij.

Emplastrum diaphoreticum Mynsichti

diachylon cum gummati-
bus

de spermate ceti

galbano crocatum

betonica.

} q. p.

III. ABSTERGENTIA INTERNA.

In pulueribus.

⊖ia digestiua, videlicet

Frus ⊖-latus amarus

Arcanum duplicatum

Lapis prunellae

⊖ digestiuium Glaſeri

Syluii

mirabile Glauberi.

⊖trum ♂iatum

depuratum.

} ℥i — 3℥.

Omnia

Omnia ex ꝑro parata, Cap. II. Sect. I. allegata
gr. xv — ꝑj.

Abforbentia omnia, nempe	}	ꝑj — j.
Mater perlarum		
Oculi et chelae ☉.		
Ostracodermata reliqua		
Cryftallus montana ppt.		

In clysteribus.

⊖ commune 3j — ij.

Ꝭcum	}	3j — iſſ.
marinum.		

Mel anthofatum	}	3iij — vj.
rofatum		
ꝑiale.		

Terebinthina Veneta 3j — ij.

Vitelli ouorum No. j — ij.

Vrina pueri fani	}	q. p.
Serum lactis.		

Species omnes praedictae.

In decoctis.

Gummi Arabicum	}	3ij — iij.
tragacanthae.		

Radix ari	}	3ij — iij.
altheae		
chinae		
ſcorzomerae		
ſarſaparillae.		

Ll s

Herba

Herba fumariae	}	mß — j.
cardui benedicti		
saponariae		
absynthii		
hyssopi		
mercurialis		
centaurii minoris,	}	

Decoctum caulium	}	3j. — 3iij. vel iv.
raparum		
hordei		
C. C.		

Mel	}	3i — ij.
Cassia extracta		
Manna.		

Pruna Damascena No. vj — xij.

Tamarindi	}	3ß — j.
Iuiubae.		

IV. ABSTERGENTIA EXTERNA.

*In vulneribus et vlceribus.**In decoctis et iniectionibus.*

Radix ari	}	3ij — 3ß.
aristolochiae rotundae		
chinae		
dictamni albi		
gentianae rubrae		
rubiae tinctorum.	}	

Her-

Herba agrimoniae	}	mß — j.	
alchimillae			
hyperici			
hyssopi			
millefolii			
scordii			
faniculæ			
prunellæ			
hederae			℥℥stris
pyrolæ			
veronicae			
nicotianae.			

Aloë	}	3j — ij.
Thus		
Succinum		
Myrrha		
Gummi elemi		
Sarcocolla		
Opopanax.		

℞ eum ouorum	}	3℞.
hyperici.		

Balsamus de Peru	}	gtt. vj — x.
Tolutanus		
de Copaiua.		

Virelli ouorum q. s.	}	3j — ij.
Liquamen myrrhae		
Terebinthina communis		
Veneta.		

Essentia vulneraria Stahlī q. s.

CAPVT

CAPVT II.

DE

INCRASSANTIBVS.

In pulueribus, essentiis, decoctis
et infusis.

Species omnes vegetabiles emollientes, in
Cap. V. huius Sectionis recensitae.

Caricae pingues, No. iv—vj.

Dactyli, No. iv—x.

Hordeum et

Auena excorticata.

} mss—j.

Oryza 3j—ij.

Fructus et Syrupi Cap. VI. huius Sect. de ad-
stringentibus recensiti, in consueta dosi.

Gummi tragacanthum

Arabicum

ceraforum

Ichtyocolla.

} 3j—iij.

In pilulis et electuariis.

Gummi ammoniacum

iuniperinum

colophoniae

massichis

laccæ

tacamahacæ

thuris.

Terebinthina cocta,

} in pilulis 3ss.
electuar. 3j—ij.

Rob

Rob diamorum }
 dianucum. } ʒiij—ʒß

Praedicti syrapi adstringentes, ʒij—iij.

In emulsionibus.

Omnia ea, quae Cap. VIII. Sect. I. No. I. sunt
 allegata.

In pulueribus.

Absorbentia omnia, nec non }
 C. C. philosophice ppt. }
 Ebur rasum } ʒi—ʒß.
 Vnicorum verum }
 fossile. }

In potionibus et Ris.

Omnia, quae in allegato Cap. VIII. No. III.
 sub hoc titulo continentur, nec non
 MRa simplex paullo largius acidulata, in si-
 mili dosi.

In pulueribus.

CrySTALLUS montana }
 Absorbentia omnia } ʒj.

Otrum et

Œia omnia, in praecedenti Capite allegata, sub
 titulo abstergentium.

CAPVT

CAPVT III.

DE

EDVLCORANTIBVS.

Huc referenda sunt in genere mitiora diaphoretica, laxantia, et diuresin per resolutionem promouentia.

In decoctis, infusis et electuariis.

Omnia in proxime praecedenti capite allegata,
nec non

Succus liquiritiae } 3ij — iij.
iuiubarum.

In pulueribus.

Praeter absorbentia illa in Cap. I. sub abster-
gentibus allegata, porro

Creta ppt.

Testae ouorum

Medulla saxorum, vel marga

Cornu alcis

C. C. philosophice ppt.

Bolus alba

Ebur rasum

Vnicornu fossile

Cochleae ppt.

Corallia rubra et

alba ppt.

Mandibula lucii piscis

Rasura dentis apri

Crystallus montana ppt.

3℞ — 3℞.

Θia

Θia digestiua consueta }
 Ξifata } in allegata dosi.

CAPVT IV.

DE

TEMPERANTIBVS.

In pulueribus, potionibus et emul-
 sionibus.

Οtrum depuratum et tabulatum gr. viij—℥ss.

Lumbrici Ξestres puluerisati gr. viij—xij.

Cinnabaris natia }
 ℥ij. } gr. ij—iij.

∇a diapnoicae et analepticae, in consueta
 dosi.

Semina pingua in Cap. VIII. Sect. I. No. I.
 sub emulsionibus allegata.

...tus Οtri dulcis

Θis dulcis

minerales acidi reliqui, ad grat. acidit.

In essentiis.

MRa simplex sine camphora.

Reliqua, quae in Cap. II. huius Sect. sunt al-
 legata.

CAPVT

CAPVT V.

DE

EMOLLIENTIBVS.

In decoctis, facculis, fomentis,
clysteribus, balneis et cata-
plasmatis.

Radix altheae

liliorum alborum

maluae

liquiritiae.

} 3℥—j.

Cepae assatae q. p.

Herba altheae

maluae

gialis

parietariae

violariae

atriplicis

brancae vrsinae

chamomillae

meliloti

verbasci

betae.

} mj—ij.

Flores chamomillae vulgaris

Romanae

liliorum alborum

meliloti

maluae

verbasci

violarum.

} m℥—j.

Semen

Semen lini
 psyllii
 sesami
 foenugraeci.

} ʒʒ — i.

Farina fabarum.

Mucilagines horum feminum, ʒij — iij.

Caricae pingues, No. iv — vj.

Pruna damascena, No. x — xv.

Mica panis triticei, q. p.

Album graecum, ʒij — ʒʒ.

Sapo Venerus, ʒj — ʒʒ.

Lac q. p.

Œlea expressa amygdalarum dulc.

chamomillae

liliorum alborum

oliuarum

lini

sesami

raparum

irinum

ouorum.

} ʒij ʒʒ.

Pinguedines, axungiae et medullae animalium,
 quae Cap. VIII. Sect. I. No. I. allega-
 tae sunt.

In linimentis, vnguentis et
 emplastris.

Vnguentum dialtheae

Butyrum non Œitum

Cera,

Mel,

Pinguedines iam allegatae.

} ʒiij — ʒʒ.

(Pars II. de form. in specie.) Mm Œlea

Quæ ante recensita 3j — iij.

Gummi ammoniacum	}	3j — ij.
galbanum		
Terebinthina		
Thus.		

Emplastrum de cicuta
 diachylon simplex
 de ammoniaco Foresti
 meliloto
 galbano crocatum
 spermate ceti
 tripharmacum
 filii Zachariae.

CAPVT VI.
 DE
 ANODYNIS ET NARCOTICIS.

I. ANODYNA EXTERNA.

In facculis, cataplasmatibus, balneis
 et clysteribus.

Herba linaria	}	mj — ij.
hyoscyami		
chamomillae		
nicotianae.		

Flores chamomillae	}	mss — j.
papaueris rheados		
meliloti		
verbasci.		

Furfures tritici, q. p.

Semen

Semen lini	}	3ij—3℥.
hyoscyami		
anisi		
carui		
foeniculi		
cumini.		

Vitelli ouorum No. j—ij.

Lac et panis similagineus, q. p.

℞eum expressum hyoscyami	}	3ij—3℥.
nucistae		
ouorum		
coctum anethi		
chamomillae		
verbasci		
lumbricorum		
terrestrium.		

In epithematibus.

▽a hypnotica Dorncreilii	}	q. f.
solani		
rosarum		
▽ini camphoratus.		

In linimentis, vnguentis et
emplastris.

Vnguentum dialtheae	}	3ij—3℥.
anodynum		
alabastrinum		
populneum.		

M m 2

Re-

Requies Nicolai
 Theriaca
 Mithridatium
 Philonium Romanum. } 3j—ij.

Quæ ante recensita eadem dosi.

Emplastrum de baccis lauri
 hyoscyamo
 meliloto
 cicuta
 diapalmae. } q. p.

II. ANODYNA ET NARCOTICA INTERNA.

In emulsionibus.

Syr. Scilla: 3ij ∇ a hypnotica Dorncreilii 3ij—3℥.
Laud. Sy. Scilla: 3ij florum sambuci } 3j—ij.
 papaueris rhoeados. }
 Semen papaueris rhoeados, } 3ij—3℥.
 simplicis. }

In pulueribus et pilulis.

Cinnabaris nativa } gr. ij—vj.
 ♂ii. }
 Pilularum de cynoglossa, gr. j—ij.
 Pilulae Wildegansianae } gr. j—ij.
 Starckeyanae }
 Matthei. }
 Laudanum opiatum, grani pars quarta—j.
 The-

Theriaca coelestis gr. j — ij.

simplex. ℥ss — 3℥.

Pilulae de styrace, gr iv — vi.

In essentiis.

Rae et essentiae anodynae.

Liquor mineralis anodynus Hoffmanni, gtt.

xx — xxx.

CAPVT VII.

DE

ADSTRINGENTIBVS ET TONICIS.

I. ADSTRINGENTIA.

In pulueribus stypticis, decoctis, gar-
garismatibus et cataplasmatibus.

Radix bistortae

tormentillae

pseudo acori

filipendulae

pentaphylli

plantaginis

symphyti.

in ℥ibus ℥ss — j.

in reliquis formulis

3ij — 3℥.

Herba consolidae Saracenicae

herniariae

auriculae muris

uvulariae

cervicariae

nummulariae

lunariae.

℥ss — j.

Mm 3

Flores

Flores balaustiorum	}	mß.
rosarum rubrarum		
hyperici.		
Semen acetosae	}	3j—ij.
lapathi acuti		
hyperici		
sophiae chirurgorum.		
Oryza tosta, 3iij—3ß.		
Cortex granatorum	}	3iij—3ß.
tamarisci		
fraxini		
quercus		
castanearum.		
chinae chinae, in 3ibus interne 3j—3ß.		
Glandes	}	3ß—3vj.
Gallae		
Cupulae glandium		
Fructus myrtillorum		
Mala granata		
Mespila		
Sorba		
Ribesia		
Acaciae		
Pruna sylvestria.		
Vsnea cranii humani	}	in 3ibus stypticis
Musci ossibus ac craniis anima		
lium accrescentes.		
Sanguis draconis, 3j—ij.		
Lapis haematites	}	3ß—3ij.
¶ catechu.		

 flo.

 florum tis et lap. haematitis }
 cum $\odot$ $\times$ co parat. } $\mathfrak{D}\mathfrak{S}$ —gr. xv.
 ∇ a $\odot$ -li dulcis.

tis stypticus Crollii,
 Heurnii
 Wedelii albus } q. p.
 ruber.

Mastix
 Ichtyocolla } $3\mathfrak{S}$ —j.
 $\bigcirc$ crudum.

In pulueribus compositis.

Crocus tis adstringens Zwelfferi, gr. vj— $\mathfrak{D}\mathfrak{S}$.
 cum alcali paratus, gr. ij—iv.
 ex minera Hassiaca, gr. j—ij.

Trochisci de carabe, $\mathfrak{D}\mathfrak{S}$ —gr. xv.
 ∇ a figillata, $\mathfrak{D}\mathfrak{S}$ —j.

∇ a catechu gr. iij—vj.
 figillata
 Lemnia } $\mathfrak{D}\mathfrak{S}$ —j.
 Bolus Armena.

∇ a $\odot$ -li dulcis, gr. iij—vj.

Vnicornu fossile
 C. C. }
 Ebur } vsum. } $\mathfrak{D}\mathfrak{S}$ —j.

Dens hippopotami }
 Lapis manati. } gr. vj— $\mathfrak{D}\mathfrak{S}$.

Mm 4

In

In Ris.

Raex flor. Θ Xci et Θ lo β tis
 parata cum ∇ ini
 ∇ ae catechu
 lapidis haematitis. } gtt. xv—xx.

In potionibus et iulapiis.

∇ a Ω ta plantaginis
 polygoni
 foliorum quercus
 burfae pastoris
 tormentillae
 cinnamomi cydoniata
 veronicae vinosa. } $\mathfrak{zj}$ —ij.

Syrupus de rosis ficcis
 granatorum
 cydoniorum
 berberum
 myrtillorum
 ribium
 de symphyto Fernelii
 coralliorum
 tormentillae. } $\mathfrak{zj}$ — $\mathfrak{z}\beta$.

Theriaca simplex, $\mathfrak{z}\beta$ —j.

tus minerales acidi et
 Rae acidulatae, Cap. VIII. No. III. Sect. I. recensitae. } ad gratam
 aciditatem.

In bolis, electuariis et pilulis.

Conserua rosarum antiqua
 symphyti. } $\mathfrak{zj}$ —ij.

Suc-

Succus vtricae minoris, ℥iij—℥ss.

acaciae

hypocistidis.

} ℥i—℥ss.

Extractum tormentillae

bistortae.

} gr. vj—℥ss.

In emplastris.

Emplastrum contra rupturas

sticticum Crollii.

} q. p.

II. TONICA.

In decoctis, sacculis, cataplas-
matibus.

Radix bryoniae

sigilli Salomonis.

} ℥iij—vj.

Herba alchimillae

bellidis minoris

burfae pastoris

equiseti

bugulae

millefolii

polygoni

pyrolae

vtricae minoris

pentaphylli

faniculae

virgae ☉eae Gesneri

vincae peruincae

hederae ☿estris.

} m℥—j.

Mm s

☿ae

¶ *Œtae* praedictae in consueta doſi.

Corallia rubra ℥j — 3℔.

Lapides V. pretiosi, uidelicet

Iaspis

Saphirus

Smaragdus

Hyacinthus

Rubinus.

Species de hyacintho

gemmis

} gr. viij — 3℔.
 } ℥j — ij.

In *Ris.*

Liquor minerae ℥tis *Haſſiaca*e, gtt xx — xxx.

Ra ♂ li ℥tis *Fiſata Ludouici*

℥tis *Fiſata*

coralliorum

♂ii *acris*

♀i

Effentia millefolii.

} gtt. xxx —
 } xl.

In *emplastris.*

Emplaſtrum de cruſta panis

Ceratum Santalinum.

} q. p.

CAPVT VIII.

DE

APERIENTIBVS.

*Talia sunt omnia remedia reſoluentia interna,
 et abſtergentia in Cap. I. huius Sect.
 iam recensita.*

CAPVT

CAPVT IX.

DE

ANALEPTICIS ET NERVINIS.

I. ANALEPTICA.

In pulueribus, essentiis, decoctis et
electuariis.

Radices omnes in Cap. III. Sect. I. allegatae,
in dicta dosi, nec non radices alexiphar-
macae, videlicet

Radix angelicae	}	3℥—3vj. in decoct. et infus.
imperatoriae		
pimpinellae albae	}	3℥—j.
valerianae		
caryophyllatae.		

Herba melissae	}	m℥—j.
maioranae		
menthae		
rorismarini		
calaminthae		
orellae		
ocymi		
rutae		
spicae		
scordii		
serpilli	}	
thymi.		

Semen anisi	}	3℥—j.
foeniculi		

Co.

Costus Arabicus } 3j — iij.
Cinnamomum. }

Conserua florum acaciae
lauendulae
rosarum
tiliae
tunicae
betonicae
anthos.
herbae chamedryos } 3ij — iij.
melissae
menthae
maioranae
primulae veris
rutae
salviae. }

Pulpa citri } 3ij — iij.
cydoniorum }

Confectio Alkermes cum cinnamomo.

In potionibus, emulsionibus et
iulapiis.

∇a Ωta cinnamomi } simplex et
borraginata et } vinosa.
cydoniata }
rosarum } 3j — ij.
cerasorum nigrorum
florum acaciae
tiliae.
liliorum conuallium }

∇a

▽a Ω ta Corticum $\odot$ antiorum

naphae

scabiosae

melissae

pulegii

verbenae

melissae

anthos.

} 3j ij.

▽ae ω tuosae, vti sunt

Anhaltina

epileptica Langii

carbunculi

cordialis

apoplectica.

} cochlearss-j.

ω tus rosarum

liliorum convallium

ceraforum nigrorum

melissae

menthae.

} gtt. xl—l.

ω tus minerales acidi, Cap. VIII. Sect. I. allegati, ad gratam aciditatem.

Syrupus de canella

corricum $\odot$ antiorum

citri

acetositatis citri

rubi idaei

gemmarum Volckameri

corallorum Quercetani.

} 3vj—3℥.

Amygdalae dulces

Pineae

Pistaciae.

} 3vj—vj. vel 3j.

Con-

Confectio alkermes completa } 3j—iſſ.
 incompleta }

Corallia rubra ppt.

Mater perlarum ppt. itemque

absorbentia reliqua cum acidis saturata, et
 Cap. I. huius Sect. sub abstergentibus
 allegata.

⚥ nativa } ʒſſ—gr. xv.
 ⚥ii. }

Margaritae Orientales, gr. vj—xij.

Lapis bezoar Orientalis, gr. ij—iiij.

Occidentalis } gr. iiij—vj.
 de Goa. }

Saccharum perlatum. } q. p. ad grtatam dul-
 Manus Christi perlatae. } cedinem.

In puluere.

Omnia illa sub priori titulo, a coralliis vsque
 ad lapidem de Goa, enumerata.

In Tris.

Essentia ligni aloës } gtt. xxx.
 ambrae } XL.
 cinnamomi cum croco. }

In substantia.

Condita omnia, inprimis

Con-

Cortex	⊙antiorum	}	q. p.
	citri		
cerasa	acida		
ribesia			
nuces moschatae	in India		
	conditae		
	iuglandes.		

Confectio alkermes completa	}	℥j—ij.
incompleta		
cinnamomi.		

In Elaeosaccharo.

℞ea ℞ta aromatum, inprimis	}	gtt. iij—vj.
cinnamomi		
Balsamus vitae Hoffmanni.		

II. NERVINA.

In sacculis, cucuphis, cataplasma-
tibus, balneis, infusibus
et fomentis.

Praeter radices No. I. huius Sect. allegatas,
porro

Radix iridis Florentinae ℥iij—℥j.

Herbae

Herbae praedictae, et cum his

lauendulae	}	mj—ij.
mari veri		
pulegii		
origani		
polii montani		
teucrii		
basilici		
chamaedryos		
betonicae	}	
chamaeipydis.		

Flores rosarum

liliorum conuallium	}	mß—j.
cheiri		
calendulae		
lauendulae		
anthos		
salviae		
tunicae		
violarum		
tiliae.	}	

Crocus Orientalis, 3ß—j.

Lignum aloës

fantalinum citrinum	}	3ß—j.
sassafras		
Rhodium,		

Camphora 3i—iiij

Vinum q. s.

In

In linimentis et balsamis.

Balsamum apoplecticum
Balsama reliqua aromatum
Opobalsamum. } ʒi — ij.

Linimentum cordiale
Vnguentum neruinum. } 3℥. — j.

Œta prædictarum herbarum, gtt. iv - vj.

ligni Rhodii
de cedro
iasmini
reliqua suaueolentia } gtt. vj — x.

Balsamus vitæ Hoffmanni.

Ambra
Moschus
Zibethum. } gr. iij — vj.

Castoreum, ʒj — 3℥.

In suffimigiis et emplastris.

Olibanum
Styrax
Succinum
Mastix
Gummi elemi
benzoës
animæ. } ʒj — ij.

In epithematibus.

omnes sub potionibus recensiti, q. s.

(Pars II. de form. in specie.) Nn CA.

CAPVT X.
DE
REMEDIIS LAC AVGENTIBVS
ET MINVENTIBVS.

I. LAC AVGENTIA.

In decoctis cum lacte.

Flores sambuci, mß — j.

In pulueribus et potionibus.

√ae et semina carminatiua in consueta dosi.

CrySTALLUS montana ppt.

Lumbrici √estres ppt.

Species CrySTALLORUM

Lac √nae.

} 3j — ij.

√aea √ta carminatiua, gtt. j — ij.

Rotulae lac prouocantes Mynsichti, 3ß — j.

Emulsiones largius amygdalatae, in consueta dosi.

II. LAC MINVENTIA.

In emplastris.

Emplastrum diachylon simplex

cum gummatibus

diaphoreticum Mynsichti

de spermate ceti

ranarum

oxycroceum

album coctum.

} q. s.

In

In facculis, cataplasmatibus et
epithematibus.

Species omnes resoluentes vegetabiles, circa
finem Cap. I. huius Sect. allegatae.

Crocus Orientalis, 3ß — 3j.

⊖ commune tostum

Herba chaerefolii

petroselini

Decoctum carui cum aceto

Vini camphoratus crocatus.

} q. p.

CAPVT XII.

DE

APHRODISIACIS ET ANT-
APHRODISIACIS.

I. APHRODISIACA.

In electuariis, pulueribus, mor-
fulis et per se.

Boletus ceruinus

tauri

Scincus marinus

Borax Veneta

Aromata omnia.

Radix eryngii condita

Zingiber in India et Europa con-
ditum

Succolata Indica

Electuarium diasatyriionis.

} 3j — 3ß.

} 3ij — 3ß.

Nn 2

Rotu-

Rotulae stimulantēs Mynsichti }
 Confectio alkermes completa. } 3j — ij.
 Ambra, gr. vj — ʒß.

In essentiis.

Essentia radicis satyrionis simplex } gtt. XL-
 composita. } L.
 aphrodisiaca Wedelii, gtt. xxx — XL.
 ambrae, gtt. xx — xxx.

II. ANTAPHRODISIACA.

In emulsionibus.

Semina et ∇ae refrigerantes ac temperantes
 in consueta dosi.

Œtrum depuratum }
 crystallifatum. } ʒj — ij.

Saccharum ʒni, gr. iv — vj.

Œtrum ʒninum, ʒß — gr. xv.

In essentiis.

Essentia castitatis, gtt. xxx — XL.

CAPVT XII.

DE

CARMINATIVIS.

In pulueribus, electuariis, essentiis,
 infusis et decoctis.

Praeter radices in Cap. III. Sect. I. allegatas,
 porro

Radix

Radix acori

helenii

costi dulcis

cyperi rotundi

gentianae rubrae

galangae

mei

zedoariae

zingiberis.

Herba absynthii

abrotani

cardui benedicti

maioranae

menthae

melissae

rorismarini

origani

tanaceri

thymi

serpilli

calaminthae.

Flores laeundulae

anthos

fchoenanthos

spicae

liliorum conuallium

anethi

Comae absynthii

Summitates origani

centaurii mino-
ris.eadem dosi cum
praecedentibus.

in essentiis gtt.

XL—L.

infusis et deco-
ctis, mss—j.in infusis et de-
coctis, p. ij—iij.

Nn 3

Semen

Semen anifi
foeniculi
carui
cumini
dauci
apii
petroselini
faleris montani
anethi
nigellae
sinapios.

in puluere $\mathfrak{ss}$ - j.
reliquis formu-
lis, $3\mathfrak{ss}$ - j.

Baccae lauri
iuniperi.

Caryophylli aromatici

Nuces moschatae

Macis.

Cortex citri

⊙antiorum
cinnamomi
Winteranus.

in essentiis gtt. xxx - xl.
⊕ibus, $\mathfrak{ss}$ - $3\mathfrak{ss}$.
infusis, $3\mathfrak{ij}$ - $3\mathfrak{ss}$.

Flauedo corticis citri

⊙antiorum.

$3\mathfrak{ss}$ - i.

In electuariis.

Rob iuniperi $3\mathfrak{ss}$.

Electuarium de baccis lauri
diacori.

$3\mathfrak{ij}$ - $\mathfrak{ij}$.

Conserua rosarum ⊕lata
menthae
acetosae.

$3\mathfrak{j}$ - $\mathfrak{ij}$.

Extractum zedoariae, gr. v — $\mathfrak{ss}$.

Per

Per se et in trageis.

Pulvis stomachicus Birckmanni } 3℥—3j.
 Quercetani. }

℞ li coagulatus, gr. iij—vj.

⊖ absynthii } gr. v—℥ss.
 centaurii minoris. }

Absorbentia omnia in consueta dosi.

℞ ea ℞ ta inferius sub linimentis allegata, gtt.
 aliquot.

Per se et in morsulis.

Species aromaticae rosatae }
 caryophyllatae }
 stomachicae Mynsichti } ℥j—3j.
 pro morsulis Imperatoris }
 diagalangae }
 diacymini. }

Cortex ♂antiorum
 citri

Acorus

Zingiber

Radix cichorei

pimpinellae

Caryophylli aromatici

Nuces iuglandes conditae

moschatae

Indicae

Zingiber in India conditum.

3℥—j.

N n 4

In

In potionibus et mixturis.

Va Ω ta menthae

melissae

absynthii

calaminthae

salviae

maioranae

rorismarini

zedoariae

corticum citri

⊙antiorum

anisi

foeniculi

carui.

cinnamomi cydoniata

borraginata.

tuosae carminatiuae

carminatiua Dorncreilii.

MRa carminatiua Syluii

Essentia carminatiua Wedelii

tus ⊙antiorum

citri

absynthii

anisi

cochleariae

juniperi

menthae

rorismarini

zedoariae.

⊙tri

tus $\odot$ ri }
 sis } dulcis, gtt. xv — xx.

Syrupi praedictarum herbarum }
 de canella }
 acetositatis citri } 3ij — 3ß.
 coralliorum Quercetani }

In essentiis et Ris.

Ra proprietatis Mynsichti. }
 rosarum } $\odot$ -lata.
 violarum }
 florum } $\odot$ -antiorum.
 corticum. }

Elixirium proprietatis sine acido
 cum acido }
 $\odot$ -li Mynsichti } gtt. xxx — lx.
 vitae Matthioli }
 stomachicum Michaelis }
 Essentiae et MRae carminativae
 Syluii
 Wedelii

tus mastiches }
 menthae } essentificatus
 Essentia cinnamomi cum croco. }

In cataplasmatibus, facculis et
clysteribus.

Species omnes praedictae vegetabiles, in ea
dosi, vti allegatae sunt in infusis.

N n 5

Flores

Flores chamomillae Romanae } mß.
vulgaris. }

Panis biscoctus, in cataplasma. q. p.

Œeum coctum absynthii }
menthae }
melissae }
maioranae } 3ij—3ß.
rutae }
chamomillae }
lauri }
anethi. }

In vnguentis, linimentis et
emplastris.

Vnguentum neruinum, 3j—ij.

Olibanum }
Styrax calamita } 3ß—j.
Mastix. }

Œea antecitatarum herbarum cocta, 3ß.

Œta, nec non }
Œta caryophyllorum }
cinnamomi }
anisi } gtt. iij—x.
carui }
corticum citri }
◉antiorum }
nucis moschatae. }

expressum nucis moschatae, 3j—3iij.

Castoreum, 3ß—j.

Em-

Emplastrum de baccis lauri
 crusta panis
 tacamahaca
 diaphoenicon
 Ceratum santalinum.

} q. p.

CAPVT XIII.
 DE
 ANTHELMINTICIS.

In pulueribus, essentiis, infusis et
 decoctis.

Radices acres et amarae, videlicet

angelicae

ari

aristolochiae rotundae

carlinae

caryophyllatae

galangae

gentianae rubrae

helenii

imperatoriae

pimpinellae albae

zedoariae

zingiberis.

in pulu. gr.

xij—ij.

essent. gtt.

xx—xxx.

infus. 3j—ij.

squillae, adultis *in substantia*, ʒj.

infusis, ʒij.

rhabarbari Orientalis, eadem dosi.

Her-

Herba absynthii

abrotani

cochleariae

cardui benedicti

centaurii minoris

fumariae

rutae

tanacetii.

in infus mss-j.
electuariis
et bolis, ex-
tracta ʒss—
gr. xv.

Semen citri

Cantiorum

erucæ

nasturtii

hyperici

sinapios.

cynae, ʒss—j.

in pulu. et bolo
ʒss—j.
in electuar. ʒss.

Myrrha } in essent. gtt. xv—xxx. in pulu.

Aloë. } bolo et electuario ʒss—j.

Sia digestiva, gr. vj—ʒss.

Corallina, ʒss—gr. xv.

Piper, gr. ij—vj.

Ialappa { in pulu. gr. iv—ʒss.
electuar. ʒj—ʒss.

Pulis contra vermes Augustanorum ʒss-ʒss.

Syrupi sub potionibus nominati, in eadem
dosi.

In potionibus.

ʒa ʒta tanacetii
graminis
hyperici
scordii. } ʒss—j.

Herba

Syrupus de cichoreo cum rhabbaro, ℥℥—
3vj.

absynthio	}	℥iij—℥℥.
fumaria		
carduo benedicto		
florum persicorum.		

Oxymel squilliticum, ℥j—iij.

Species diaturbith cum rhabbaro, ℥j—iij.

Decoctum Scirri currentis cum ∇a simplici vel

Scita quadam paratum, ℥j—iv.

In pilulis.

Extracta praedictarum herbarum, ℥℥.

Aloë	}	gr. vj—℥℥
Myrrha.		

Extractum hellebori nigri	}	gr. iij. vj.
panchymagogum Crollii.		

Scirus dulcis.

Trochisci alhandal, gr. j—iij.

In morfulis.

Species diaturbith cum rhabbaro, ℥℥—j.

Amygdalae amarae, No. vj—x.

Omnia, quae in pilulis praescribuntur, eadem
dosi.

In clysteribus.

Praeter radices et herbas superius allegatas,

Herba nicotianae	}	m℥.
sabinae.		

In

In vnguentis et emplastris.

Fel tauri

Vnguentum populeum

de arthanita

contra vermes Augusta-
norum

} 3j-ij.

Scum Qum absynthii

tanacetii

colocynthis

zedoariae

heraclinum

laurinum.

} gtt. vj—x.

Aloë

Myrrha

Pulpa colocynthis

semen staphidisagriae.

} ʒß—j.

In essentiis et Ris.

Essentiae praedictarum herbarum in allegata
dosi.

Elixirium proprietatis cum acido

sine acido.

} gtt. xx-

} xxx.

ntus C. C. essentialicatus, gtt. xx.

li philosophicus, gtt. vj—x.

minerales acidi, gtt. iij—vj.

CAPVT

CAPVT XIV.

DE

ANTISCORBVTICIS.

In essentiis, electuariis, decoctis et
infusis.

Radix ari	}	in essent. gtt.
cichorei		xxx — xl.
lapathi acuti		electuar. ʒʒ — j.
pimpinellae albae		decoct. et infus.
trifolii fibrini,	}	ʒʒ — j.

Herba absynthii	}	
abrotani		
cochleariae		
beccabungae		
chelidonii minoris		in essent. gtt. xl.
cardui benedicti		l.
centaurii minoris		decoct. et infus.
fumariae		mʒ. — j.
nasturtii vtriusque		
piperitidis		
fedi minoris		
scolopendrii		
thlaspi.		

Flores harum herbarum, eadem quantitate.
Summitates pini, in decoctis et infusis, ʒʒ — ʒvj.

Conserua cochleariae	}	in electuario, ʒij — iij.
fumariae.		

In

In pilulis.

Extracta omnia praedictarum herbarum, gr.
viiij—xij.

Gummi ammoniacum in + to squillitico
solutum } ʒss.

Succinum album ppt.

M Pilularum Fearum, ʒi—3ʒ.

In Ris.

ustus cochleariae simplex } gtt. xx—xxx.
vinosus }

Elixirium antiscorbuticum Wedelii, gtt. xxx—
XL.

In potionibus.

ʒa ʒta chelidonii minoris }
nasturtii ʒtici } ʒʒ—iʒ.
cochleariae }
raphani rusticani. }

offici expurg. becca
tung. et cochlea.
risum pro. Syrupus sceleratibicis Foresti }
Syrupi reliquarum herbarum officinales. } ʒʒ—i.

Succi praedictarum herbarum ʒʒ—3vi.

F I N I S.

Corrigenda.

Pag. 193. lin. 13. pro bolus lege boli No. VIII.
- 206. - 17. - §. 348 - §. 378.
- 272. - 13. - ʒiij. - ʒiij.
- 306. - 17. mensura - mensurae duae.



