

Azot, Stickstoff, Stickgas, *Nitrogenium* (v. *ζωή* [zōē], Leben). — Azotana, *Chlorstickstoff*, Verbindung des *Chlors* mit *Stickstoff*, ein flüssiger, sehr flüchtiger Körper. — Azotchlorid, Chlorstickstoff, eine Verbindung, die entsteht, wenn man Chlorgas auf eine Lösung des Salmiaks od. eines andern Ammoniaksalzes wirken lässt.

Azoth, azothum, i, n., das Azoth; das rothe Quecksilberoxyd.

Azoticus, a, um, *adj.*, azotisch, zum Azot gehörig, dasselbe betreffend, dadurch entstanden, damit gefüllt. — Azotide sind die *Stickstoffverbindungen*. — Azotprotoxyd ist *Stickstoffoxydul*, sonst nur als Gas bekannt, jetzt aber im festen Zustande dargestellt. — Azotulmicus, a, um, *adj.*, azotulminsauer (v. *azotum*, der Stickstoff, u. *Ulmus*, die Ulme). — Azötum, i, n., der sogen. Stickstoff, das sogen. Nitrogen, Azot, eigentlich *Zoogenium* (v. *α* [a] *priv.* u. *ζῶον* [zōōn], das Thier; weil Thiere in diesem Gase schnell ersticken). — Azulmicus, a, um, *adj.*, azulminsauer; z. B. *acidum azulmicum*, Azulminsäure, (nach Polydore Boullay) das Sediment der verdorbenen Blausäure.

Azureus, a, um, *adj.*, azurblau.

Azygos, azygos, azygus, a, um, *adj.*, ungepaart; jochlos (v. *α* [a] *priv.* u. *ζυγός* [zygos], das Joch).

Azymia, ae, f., der Mangel an Gährung, der ungegohrne Zustand, der Zustand der Crudität. — Azymicus, a, um, *adj.*, durch Mangel an Gährung entstanden; ungegohren. — Azymopōla, ae, m., wer mit Ungegohrnem od. Ungesäuertem handelt, ein Oblatenhändler (v. *ἄζυμον* [azymon], etwas Ungegohrnes, u. *πῶλεω* [pōlēō], verkaufen). — Azymus, a, um, *adj.*, ungegohren; ungesäuert (v. *α* [a] *priv.* u. *ζύμη* [zymē], der Gährstoff, das Ferment). — Azymum, i, n., etwas Ungegohrnes, Ungesäuertes; ein ungesäuertes Brod, eine Oblate.

B.

Bablab, Bablah, Babulah, indischer, orientalischer Gallus.

Bacca, ae, f., die Beere, eine saftige, mehrere Samen enthaltende und nie aufspringende Frucht; sie enthält die Samen bisweilen ganz ohne Ordnung, oder ist durch eine dünne Haut in Fächer abgetheilt. *Bacca composita*, eine zusammengesetzte Beere (besteht aus vielen mit einander verwachsenen Beerchen [Acini], wie die Himbeere).

Baccæ Alkekengi, Judenkirschen, v. *Physalis Alkekengi* L., gemeine Schlute, Judenkirsche, Mönchskirsche, Winterkirsche, rother Nachtschatten (5. Cl. 1. Ordn. *Pentandria Monogynia*). Eine in Deutschland, Italien und in Japan wachsende, 1—2 Fuss hohe Pflanze, die sich durch den grossen blasenförmigen, fest geschlossenen, mennigrothen Kelch, welcher die säuerlich-süssen Beeren weit umhüllt, charakterisirt. Da die innere Fläche des Kelches mit einem äusserst bittern Pulver bedeckt ist, so dürfen beim Abpflücken die Beeren nicht mit dem Kelche in Berührung kommen, indem sie sonst bitter werden.

Baccæ Jujubæ, Brustbeeren, v. *Zizyphus vulgaris* Lam., gemeiner Judendorn (5. Cl. 1. O. [*Pentandria Monogynia*] L.; *Rhamni* Juss., *Rhamnæ* R. Br. nat. Fam.). In Syrien einheimischer, 15—20 Fuss hoher Strauch mit pflaumenartigen, rothen, fleischigen Steinfrüchten, die sonst unter dem Namen Brustbeeren od. Jujuben officinell waren.

Baccæ Juniperi, Wachholderbeeren, Kaddigbeeren, v. *Juniperus communis* (22. Cl. 12. O. [*Dioecia Monadelphia*] L.; *Coniferae*, Trib. *Cupressineae*). (Abbild. s. Winkler Taf. 228. *Juniperus* Linn., Wachholder. Zwei- oder [selten] einhäusig. — Männliche Kätzchen klein, achsel- oder endständig; Schuppen wirtelig-ziegeldachig, halbschildförmig, jede mit 4—6 Staubbeutel. — Weibliche Kätzchen achselständig, mit wenigen verwachsenen, fleischigen, einblüthigen Schuppen, welche am Grunde von einigen keine Blüthen tragenden Schuppen hüllartig umgeben werden. Zapfen beerenartig [Beerenzapfen, *Galbus*] mit einem bis drei Nüsschen. — *Juniperus communis* Linn. Gemeiner oder echter Wachholder. Zweihäusig; Blätter zu 3, wagrecht-abstehend, stechend-spitzig, länger als die Beerenzapfen.) — Der gewöhnlich 3—6 Fuss hohe Strauch blüht im April u. Mai, cultivirt und in wärmern Ländern erreicht er eine Höhe von 15—20 Fuss und eine Dicke von $\frac{1}{2}$ —1 Fuss. Er kommt an sandigen Stellen, in Bergwäldern, auf Bergen, Hügeln u. Triften durch ganz Deutschland vor. Die Beeren reifen erst im Herbste des folgenden Jahres und verdanken ihre Wirksamkeit dem in ihnen befindlichen äther. Oele, welches in zehn, unmittelbar auf dem Kerne liegenden Bläschen enthalten ist u. wovon 1—2 Loth aus 10—12 Pfd. Beeren durch die Destillation mit Wasser erhalten wird. Die Beeren enthalten in 1000 Th. (nach Trommsdorff) 129 Th. Wasser, 10 Th. äther. Oel, 40 Th. Wachs, 100 Th. Harz, 338 Th. Zucker, mit essigsaurem u. äpfelsaurem Kalke, 70 Th. Schleim od. Gummi mit Pflanzensalzen, 350 Th. Holzfaser. (Nach Aschoff sollen die Wachholderbeeren auch Ameisensäure enthalten.) Die blassen, durch das Trocknen sehr zusammengechrumpften Beeren sind auszuschneiden.

Baccæ Myrtillorum, Heidelbeeren, Blaubeeren, Bickbeeren, v. *Vaccinium Myrtillus* (8. Cl. 1. O. [*Octandria Monogynia*] L.; *Ericae Juss.*, *Vaccinieae* DeC. nat. F.). Der kleine perennirende Strauch wächst in Wäldern Deutschlands, Frankreichs u. Englands u. s. w. sehr häufig, blüht im Mai und Juni u. die Beeren reifen im Juli. Sie enthalten viel farbigen Extractivstoff, ausserdem Citronen- u. Aepfelsäure. Die Kerne sind ölhaltig.

Baccæ Rubi Idaei, Himbeeren, v. *Rubus Idaeus* L., gemeine Himbeere (12. Cl. 5. Ordn. [*Icosandria Polygynia*] L.; *Rosaceae-Dryadeae* n. Fam.). (Abbild. v. Winkler Taf. 64. *Rubus* Linn. Brom- u. Himbeerstrauch. Kelch 5theilig, ohne Deckblättchen. Blumenblätter 5. Staubgefässe u. Pistille zahlreich. Griffel fast endständig, abfallend. Steinfrüchtchen zahlreich, zu einer falschen Beere gehäuft und verrachsen, von dem saftlosen, kegelförmigen Fruchtboden gemeinschaftlich abfallend. — *Rubus Idaeus* L. Echter Himbeerstrauch. Stengel stielrund, schwach bereift, mit feinen Stacheln besetzt; Blätter unterseits weissfilzig, an den jungen noch unfruchtbaren Trieben 5—7zählig-fiederschnittig, an den zweijährigen fruchtbaren 3zählig-geschnitten; Bluthentiele doldentraubig, filzig; Blumenblätter fast keilförmig, aufrecht, hinfällig). Ein in Gebüsch u. Wäldern v. Europa u. Nordasien gemeiner Strauch, mit weit unter dem Boden hinkriechender Wurzel. Die zusammengesetzte rothe Beere besteht aus vielen, auf einem glatten, kegelf. Fruchtboden befestigten kleinen länglichen Samen, deren jeder mit einem weichen saftigen Marke umgeben. Als Arznei sind die wildwachsenden Früchte anzuwenden.

Baccæ Sambuci, Fliederbeeren, v. *Sambucus nigra* L., der gemeine

oder schwarze Flieder (5. Cl. 3. Ordn. [*Pentandria Trigynia*] *L. Caprifoliaceae* nat. Fam.). (Abbild. s. Winkler Taf. 199. *Sambucus Tournef.* Hollunder, Flieder. Kelchsaum 5zählig. Blumenkrone radförmig, 5spaltig. Staubgefäße 5. Narben 3, sitzend. Beere kaum mit dem Kelchsaume etwas gekrönt, einfächerig, 3samig. — *Sambucus nigra* Linn. Schwarzer oder gemeiner Hollunder oder Flieder, Schibbiken. Stamm fast baumartig; Blätter fiederig-zerschnitten, kahl: Abschnitte [Blättchen Autor.] eirund-länglich, gesägt [meist zu 7, an den obersten Blättern zu 5]; Nebenblätter warzenförmig oder fast fehlend; Trug- oder Astersolden 5strahlig.) Ein 6—8 Fuss hoher, fast überall wachsender Baum, der im Mai u. Juni blüht und dessen Früchte im September reifen. Es waren diese Beeren früher unter dem Namen *Grana Actes* gebräuchlich u. sie enthalten vorzüglich Aepfelsäure und nur wenig Citronensäure, aber viel Zucker, bei wenig Pflanzengallerte, welche Bestandteile in das Fliedermus übergehen. Es giebt mehrere Abarten, z. B. *Sambucus laciniata* Mill., bei dem die Blätter doppelt gefiedert sind.

Baccae Spinae cervinae, Kreuzdornbeeren, v. *Rhamnus catharticus* L. (5. Cl. 1. Ordn. [*Pentandria Monogynia*] *L.; Rhamnaceae* n. Fam.). (Abbild. v. Winkler Taf. 104.) Der dornige Strauch wird 8—10 Fuss hoch. Die Beeren des Faulbaumes, *Rhamnus Frangula* L., mit denen sie verwechselt werden können, enthalten nur 2 Samen, u. die des gem. Hartriegels, *Ligustrum vulgare* L., reifen erst im October u. Nov. und haben ein dunkel-violettes mehliges Mark und 4 längliche Samen, während die Kreuzbeeren unreif ein dunkelgrünes, reif ein rothes Mark haben.

Baccatus, a, um, *adj.*, beerenartig, beerentragend; z. B. *fructus baccatus*, eine beerenartige Frucht, wie die Wacholderbeere; *capsula baccata*, die beerenartige Kapsel, wo die Haut fleischig u. weich ist. — *Bacciferae*, arum, *f. pl.* (16. Cl. des Morison), die beerentragenden Gewächse.

Bachbunge, *Veronica Beccabunga*.

Bacillus, i, m., auch *Bacillum*, i, n., ein Stängelchen, Stäbchen (Arznei in Form eines Kerzens, Stäbchens etc.) (*Dim.* v. *baculus*).

Bactriānus, a, um, *adj.*, bactrisch, von *Bactra* od. *Bactrum* (Stadt hinter Assyrien am Flusse *Bactrus*).

Bactyrilobium, i, n., die Kassie; z. B. *Bactyrilobium Fistula* Willd., die röhrenförmige Kassie.

Baculum, i, n., auch *baculus*, i, m., der Stock, die Stange, der Stab; z. B. in *baculis*, in Stangen.

Badiāna, ae, f., der Sternanis (v. *badius*, kastanienbraun). — *Badiana*, ital. Name des Sternanis. — *Badiansäure*, von Pessot durch Oxydation des Fenchel-, Anis- u. Sternanisöls durch Chromsäure dargestellt.

Badisis, is, f., *badismus*, i, m., das Einhergehen, das Schreiten (v. *βαδίζω* [*badizō*], *fut.* *βαδίσω* [*badisō*], einhergehen, schreiten).

Badius, a, um, *adj.*, kastanien- od. lederbraun.

Badschwamm, *Spongia*.

Baeomeconicus, a, um, *adj.*, schwachmekonsauer, kleinmekonsauer (v. *βαίος* [*baios*], klein, gering, wenig, u. *μηκωνικός* [*mekōnikos*], mekonsauer, Mekonsäure enthaltend).

Bärentraube, *Arbutus Uva ursi*.

Bärlapp, keulenförmiger, *Lycopodium clavatum*. — Bärlappssamen, *Semina Lycopodii*.

Baeus, a, um, *adj.*, klein, gering, wenig.

Bagasse, franz. Name des ausgepressten Zuckerrohrs.

Bahamensis, e, *adj.*, bahamisch; z. B. *insulae Bahamenses*, die Bahama-Inseln des westlichen Amerika, welche man nebst den Antillen gewöhnlich in dem Namen Westindien mit einbegreift.

Bajac war in der Alchemie *Cerussa*.

Baityx (bletys), eine gewisse Bluteigelart.

Balaena, ae, *f.*, ein Wallfisch. — *Balaenopterus*, i, *m.*, ein Balänopter, Flosswallfisch, ein Wallfisch mit einer Rückenflosse (v. *βάλαινα* [*balaina*], der Wallfisch, u. *πίτερυξ* [*pteryx*], der Flügel, die Flosse).

Balaneum, i, *n.*, das Bad. — *Balaneutria*, ae, *f.*, die Badefrau, Bademeisterin.

Balanus, i, *f.*, die Eichel, jeder eichelförmige Körper.

Balaustium, i, *n.*, die Blüthe des Granatbaumes, die Granatblüthe (verwand mit *balanus*, die Eichel, der Form wegen).

Baldrian, *Valeriana*. — Baldrian, gemeiner, *Valeriana officinalis*. — Baldrianamyläther, nach Balard durch Einwirkung von Baldriansäure auf Amylalkohol darstellbar. — Baldriansaures Amyloxyd (*Valerianaldehyd*), von Dumas u. Stass aus einem Gemenge von Schwefelsäure-Hydrat, Baldriansäure u. saurem chromsaurem Kali durch Abscheidung erhalten. — Baldriansaures Aethyloxyd (*Baldrianäther*), erhalten durch Destillation einer Auflösung von Baldriansäure in Alkohol mit Schwefelsäurehydrat.

Balenin, eigenthümlicher Bestandtheil des Fischbeins (v. *balaena*, der Wallfisch).

Ballōta, ae, *f.*, das Ballotenkraut (14. Cl. I. O. [*Didymia Gymnospermia*] L.; *Labiatae* nat. F.). (Das Wort soll abgeleitet sein von *βάλλειν* [*ballein*], werfen, legen, u. *ὄς, ὅτος* [*ūs, ōtos*], das Ohr, bedeutet daher so viel als: was ins Ohr gelegt od. gesteckt wird, insofern eine Species von *Ballōta* gegen Ohrenkrankheiten im Gebrauch war.) — *Ballotin*, der Bitterstoff der Blätter von *Diosma crenata*.

Balneator, ōris, *m.*, ein Bader. — *Balneatrix*, ōis, *f.*, eine Baderin. — *Balneographia*, ae, *f.*, die Beschreibung eines od. mehrerer Bäder (v. *balneum*, das Bad, u. *γραφή* [*graphē*], das Schreiben). — *Balneographus*, i, *m.*, der Balneograph, Bäderbeschreiber. — *Balneotechnice*, es, *f.*, die Badekunst (v. *balneum* u. *τέχνη* [*technē*], die Kunst). — *Balnotherapia*, ae, *f.*, die Badeheilkunde (v. *balneum* u. *therapia*, die Heilkunde). — *Balneum*, i, *n.* (*balaneum, balineum*), das Bad (höchst wahrseinh. v. *βάλλω* [*ballō*], werfen, *βάλλομαι* [*ballomai*], sich umher werfen, was die Alten beim Baden als Hauptsache ansahen); z. B. *balneum aquae* od. *vaporis*, das Wasser- oder Dampfbad (eine Vorrichtung zu Erhitzung von, durch eine den Siedepunkt des Wassers übersteigende Temperatur zersetzt werdenden Körpern); *balneum arenae*, das Sandbad.

Balsamatio, ōnis, *f.*, das Einbalsamiren.

Balsambaum, peruvianischer, *Myroxylon peruiferum*.

Balsāmica, ōrum, *n.* (*remedia*), die balsamischen Mittel. — *Balsāmice*, *adv.*, balsamisch. — *Balsāmico-amārus*, a, um, *adj.*, bitter-balsamisch. — *Balsāmico-aromaticus*, a, um, *adj.*, gewürzhaft-balsamisch. — *Balsāmico-camphorātus*, a, um, *adj.*, kampherartig-balsamisch. —

Balsâmico-cereus, a, um, *adj.*, balsamisch-wachsaartig. — **Balsâmico-dulciusculus**, a, um, *adj.*, süßlich-balsamisch. — **Balsâmico-empyreumaticus**, a, um, *adj.*, brenzlich-balsamisch. — **Balsâmico-pinguis**, a, *adj.*, fettig-balsamisch. — **Balsâmico-resinosus**, a, um, *adj.*, harzig-balsamisch. — **Balsâmico-stypticus**, a, um, zusammenziehend-balsamisch. — **Balsâmicus**, a, um, *adj.*, balsamisch, balsamhaltig. — **Balsamiflûus**, a, um, *adj.*, Balsam liefernd; z. B. *radix folliculis balsamifluis frequentibus*, eine Wurzel mit häufigen, Balsam liefernden Bläschen.

Balsamina, ae, f., die Balsamine.

Balsamo del Copaiba, ital. Name des Copaivabalsams. — **Balsamo del Peru**, ital. Name des peruvianischen Balsams. — **Balsamodendron**, i, n., ein Balsam liefernder Baum (10. Cl. 1. O. [*Decandria Monogynia*] L.; *Burseraceae* nat. F.) (v. *balsamum*, der Balsam, u. *δένδρον* [*dendron*], der Baum); z. B. *Balsamodendron gileadense* Kunth., welcher Baum den *Balsamum de Mecca* od. *Gileadense* liefert. — **Balsâmum**, i, n. (balsamus, i, m.), der Balsam. Hierunter wird im Allgemeinen eine aus harzigen, wohlriechenden, ätherischen Oelen bestehende Flüssigkeit verstanden, welche von der Consistenz eines frischen, noch nicht fest gewordenen Honigs oder dicken Syrups ist. (Das Wort ist eigentlich arabischen Ursprungs, *belsân*, *bêtêsân*, *balsan*.) *Balsamum fuliginis* nennt Paracelsus den Arsenik; *balsamum philosophorum* ist *aurum potabile*.

Balsamum Copaivae, Copaivabalsam (*Balsamum brasiliense*, brasilischer Balsam), v. *Copaifera Jacquin* Desf. (10. Cl. 1. O. [*Decandria Monogynia*] L.; *Leguminosae-Papilionaceae* nat. F.). (Abbild. s. Winkler Taf. 83). *Copaifera* Linn., *Copaivabäum*. Kelch 4theilig, absteehend; Zipfel fast gleich. Blumenkrone fehlend. Staubgefäße 10, fast gleich. Hülse gestielt, holzig-lederartig, einsamig. Samen halbbedeckt. — *Copaifera Jacquin* Desf., Jacquin's *Copaivabäum*. Blätter meist paarig-gefiedert; Blättchen 4—10, fast abwechselnd, gekrümmt eiförmig, ungleichseitig, stumpf-zugespitzt, durchscheinend punktiert. — Die zahlreichen, meist in Südamerika (besonders in Brasilien, Cajenne, Peru, Guiana, auf den Antillen) vorkommenden Arten von *Copaifera*, z. B. *Copaifera coriacea* Mart. (Abbild. s. Winkler Taf. 84.). — *C. guianensis* Desf. — *C. Martii*, *bijuga*, *multijuga*, *Jussieui*, *laxa*, *cordifolia*, *Sellowii*, *oblongifolia* Hayn. — *C. nitida* Mart. — *C. Langsdorffii* Desf. — liefern alle den Copaivabalsam, der durch tiefe in den Stamm gemachte Einschnitte durch Ausfließen gewonnen wird. Die verschiedenen *Copaifera*-Arten, von denen der Balsam gewonnen wird, bedingen auch das verschiedene äussere Ansehen des Balsams. Man unterscheidet jedoch gewöhnlich 2 Sorten. Der eigentliche *officinelle* Bals, kommt aus Brasilien (*B. Copaivae brasiliense* s. *album*), ist blassgelb, vollkommen klar, von eigenthümlichem, nicht unangenehmem Geruche u. ölig-mildem, schwach gewürzhaftem, hinterher etwas scharfem, bitterlichem Geschmacke. Er hat die Dicke eines dünnen Zuckersaftes u. ein spec. Gew. von 0,95, daher er auf dem Wasser schwimmt. Die andere Sorte, *Westindischer* od. *Antillischer B.* (*B. Copaivae Antillorum* s. *flavum*), hat eine dunkelweingelbe oder gar bräunliche Farbe; er ist dickflüssig, weniger durchsichtig und riecht und schmeckt terpeninartig. Er kommt wahrscheinlich von *Cop. Jacquin*. — Früher wurde der Copaivabalsam häufig mit fetten Oelen verfälscht, was sich, wenn man dem B. die 8fache Menge Weingeist von 90° Tralles zusetzt, ausscheidet, indem

dieser den Bals. auflöst. Eben so, wenn man einige Tropfen reinen Balsam auf Papier fallen lässt u. sie dann über der Spirituslampe vorsichtig erhitzt, so verflüchtigt sich das in dem Bals. enthaltene äther. Oel und der Rückstand ist ein durchsichtiger harter Flecken; der Flecken ist aber weich und umgibt sich mit einem Fettraude, sobald der Bals. mit fettem Oele vermischt ist. Die Verfälschung mit Terpentin verräth der Geruch bei Erwärmung des Bals. — Durch das Alter wird der Bals. zähe, dick, trübe, bräunlich, schwächer im Geruch u. Geschmack und sinkt im Wasser in kugelige Gestalt zu Boden. — Es kommt jetzt aus England das äther. Oel des Bals. unter dem Namen *Oleum Balsami Copaivae s. Copaivae aethereum* im Handel zum Arzneigebrauche vor.

Balsamum de Mecca s. Gileadense, Balsam von Mekka od. Gilead, v. *Balsamodendron Gileadense* Kunth. *Amyris Gileadensis* et *Opobalsamum* L. (8. Cl. 1. O. [*Octandria Monogynia*] L.; *Terebinthaceae* nat. F.). Ein Baum mittler Höhe Arabiens u. wohl auch Palästina's, liefert durch gemachte Einschnitte (u. zwar den nicht in den Handel kommenden besten), so wie durchs Auskochen der Zweige den gewöhnlichen Mekkabalsam. Die erstere Sorte ist dickflüssiger als Copiavabalsam, die zweite wie dieser. Er ist jedoch eben so wenig mehr officinell, als die Beeren, welche unter dem Namen Balsamkörner (*Carpobalsamum*), und das Holz, Balsamholz (*Xylobalsamum*), es sonst waren.

Balsamum Nucistae, Muskatbalsam.

Balsamum Peruvianum, Peruvianischer Balsam (*Balsamum Indicum nigrum*, Schwarzer Indischer Balsam), v. *Myrospermum* (*Myroxylon*) *peruiferum* Del., (Abbild. s. Winkler Taf. 86), u. *M. punctatum* Klotzsch. (10. Cl. 1. O. [*Decandria Monogynia*] L.; *Leguminosae-Papilionaceae* nat. F.) *Myrospermum*, Balsamholzbaum. Kelch 5zählig. Blumenblätter 5, sehr ungleich, das oberste am grössten, eine Fahne (Wimpel) bildend. Fruchtknoten gestielt, 2—6eig. Hülse geschlossen bleibend, 1—2samig, am Grunde häutig geflügelt. — *M. peruiferum*, Peruanischer Balsamholzbaum. Aestchen kahl, Blätter ausdauernd, kahl, unpaarig-gefiedert. Blättchen oval oder länglich, stumpf oder ausgerandet, lederartig; Hülseflügel auf einer Seite sehr dick. Ein Baum von 50—60 Fuss Höhe, wächst in den Urwäldern von Pozuzo, Muna u. Cuchero. Durch Einschnitte soll der weisse peruvianische Balsam, durchs Auskochen der Rinde, Zweige und anderer Theile der schwarze Perubalsam erhalten werden. Ersterer kommt fast nur eingetrocknet als *Opobalsamum*, *Balsamum Indicum siccum* s. *Opobalsamum siccum*, vor. Nach Einigen ist auch der Tolubalsam, *Balsamum Tolutanum* s. *Tolu*, derselbe Körper. Nach Plantamour enth. der Perubalsam keine Benzoesäure, sondern Zimmtsäure u. ausserdem mehrere Harze u. eine eigenthümliche ölartige Materie, das Cinnamein, welche Säuren sich häufig nach längerem Stehen aus dem Balsam absetzen. — Der echte, unverfälschte Perubalsam muss im Wasser vollkommen zu Boden fallen und es darf, mit demselben geschüttelt, keine oder eine nur unbedeutende Absonderung eines Häutchens erfolgen, sondern er darf nur Zimmtsäure an das Wasser abgeben. In 8 Theilen Weingeist muss er vollkommen, bis auf einen geringen Rückstand, sich auflösen und erhitzt keinen fremdartigen Geruch entwickeln.

Balsamum Tolutanum, Tolubalsam, v. *Myroxylon toluiferum* Rich. fl., (Abbild. s. Winkler Taf. 87).

Bálticus, a, um, *adj.*, baltisch; z. B. *mare balticum*, das baltische Meer, die Ostsee.

Baltra war in der Alchemie *Cerussa*.

Bambaceutria, ōrum, *n.*, giftige Arzneistoffe. — *Bambacia*, ae, *f.*, die Giftmischerei.

Bamma, ūtis, *n.*, die Tunke, Sauce.

Banausia, ae, *f.*, die Marktschreierei. — *Banausus*, i, *m.*, ein Marktschreiber.

Bancanensis, e, *adj.*, bancanensisch; von der Insel Banka (nördlich von Celebes liegend); z. B. *stannum bancanense*, Bancazinn.

Bandā, ae, *f.*, die Insel Banda, im asiatischen Archipelagus (ist niederländisch).

Baphorrhiza, ae, *f.*, die Färbewurzel (5. Cl. 1. O. [*Pentandria Monogynia*] L.; *Borragineae* nat. F.) (v. βαπτειν [*baptein*], färben, u. ῥίζα [*rhiza*], die Wurzel); z. B. *Baphorrhiza tinctoria* Link.; officinell davon ist die Wurzel als unechte *Alkanna*.

Baptas, eine animalische Arzneisubstanz bei den Alten, ein Bitumen.

Baptisma, ūtis, *n.*, die Taufe, das Eintauchen. — *Baptisterium*, i, *n.*, ein Gefäß od. ein Ort zum Eintauchen, die Badewanne, ein Bad.

Barac panis war in der Alchemie so viel als *nitrum*.

Barba, ae, *f.*, der Bart.

Barbadoes, is, *f.*, Barbados, die östlichste der westindischen Inseln, gehört den Engländern.

Barbaria, ae, *f.*, die Barberei in Nordafrika.

Barbāron, barbarum, i, *n.*, ein Klebpflaster aus Harzen (nach Scribonius Largus u. Galen).

Barbārus, a, um, *adj.*, ausländisch, eine fremde Sprache redend; wild, roh, barbarisch.

Barbasso, ital. Name des Wollkrautes oder der Königskerze.

Barbātus, a, um, *adj.*, mit einem Barte, bärtig, wollig.

Barbotine, franz. Name des Zittwer- od. Wurmsamens.

Bardāna, ae, *f.* (ἀρχεὶον [*arkeion*] *Diosc.*), die Spinnen- oder Wollklette (19. Cl. 1. O. [*Syngenesia aequalis*] L.; *Compositae-Cynareae* nat. F.) (v. *bardi*, Barden, Sänger, die sich, um von den Zuhörern nicht gekannt zu sein, mit den Blättern der Pflanze das Gesicht verhüllten); z. B. *Arctium Bardana* Willd. — *Bardana*, ital. Name der Klette. — *Bardane*, franz. Name der Klette.

Barillin, ein Alkaloid der Sassaparille.

Barite testacea, ital. Name des Schwerspathes.

Barium, Baryum, Barytium, i, *n.*, das Barium, Baryterde-Metall, gehört zur Reihe der erdenbildenden Metalle. Es ist weissgrau u. dehnbar, weniger glänzend als Gusseisen, schwerer als concentrirte Schwefelsäure und wird durch Hülfe der kräftigen Voltaischen Batterie aus befeuchtem Barythydrat mit Quecksilber am negativen Pole erhalten. — *Bariumcyanür* (*Cyanbarium*), durch Glühen von Cyaneisenbarium in einer Retorte darstellbar. — *Bariumfluorür* (*Fluorbarium*), durch Digestion von frisch gefälltem, noch feuchtem, kohlenurem Baryt mit einem Ueberschuss von Fluorwasserstoffsäure darstellbar. — *Bariumjodüre* (*Jodbarium*) wird erhalten durch Erhitzung von Baryterde in trockenem Jodwasserstoffgas. — *Bariumsulphür* (*Bariumsulphuret*, *Schwefelbarium*) wird gewonnen durch anhaltendes starkes Glühen eines Gemenges von geschlämtem Schwerspath mit Kohlenpulver, Roggenmehl od. Kolopho-

nium. — Bariumsuperoxyd wird erhalten durch Erhitzen von wasserfreiem Aetzbaryt in einer Porcellanröhre zum Glühen und Darüberleiten von trockenem Sauerstoffgas. — Bariumsuperoxydhydrat wird gewonnen durch Erhitzen von Baryt u. dann Zusetzen des Vierfachen des Gewichts chloresaures Kali.

Barkometer, ein Apparat zur Bestimmung der Stärke der Lohaufgüsse.

Bäro, ὄνις, *m.*, der Freiherr, der Panierherr.

Baromētrum, *i. n.*, 1) ein jeder Schwermesser, jede Wage; 2) das Barometer, das Wetterglas; ein Werkzeug zur Bestimmung der Schwere u. Dichtigkeit der Luft (v. βάρος [baros], die Schwere, u. μέτρον [metron], das Mass, Messinstrument). — Baroscopium, *i. n.*, das Baroskop, Luftschwer-Beobachter, ein hygrophermometrisches Werkzeug, bestehend aus einem Gemenge von 6 Th. Kampher, 1 Th. Salmiak u. 1 Th. Salpeter, mit Brauntwein übergossen (v. βάρος [baros], die Schwere, u. σκοπή [skopē], die Schau, die Umsicht, das Beschauen).

Barosma, Baryosma, *ae. f.*, die Barosme (5. Cl. 1. O. [Pentandria Monogynia] L.; Rutaceae nat. F.); z. B. *Barosma crenulata*, soll die Buckelblätter liefern.

Bartweizen, englischer (*Triticum turgidum*).

Barycoccālon, *i. n.*, so viel wie *Stramonium*, der Stechapfel (v. βαρύς [barys], schwer, u. κόκκαλος [kokkalos], ein Beerchen, ein Aepfelchen, also gleichsam schwere Aepfel habend).

Baryetica, *ae. f.* (baryeticē), die Baryetik, die Lehre von der Schwere. — Barymetria, *ae. f.*, das Messen der Schwere, das Wägen, bes. der Schwere od. Dichtigkeit der Luft (v. βαρύς [barys], schwer, u. μέτρον [metron], die Messung, das Mass).

Baryodmīa, *ae. f.* (baryodmiē), ein übler, lästiger, gleichsam schwerer Geruch (v. βαρύς [barys], schwer, u. ὀδμή [odmē], der Geruch, Gestank). — Baryodmus, *a. um, adj.*, sehr übel riechend, einen schweren, betäubenden Geruch habend.

Barypicon, *i. n.*, der breitblättrige Wermuth (v. βαρύς [barys], schwer, u. πικρός [pikros], bitter; also: was sehr bitter ist).

Barys, schwer.

Baryta, *ae. f.*, die Baryterde (Schwererde), eine der alkalischen, aus Barytium u. Sauerstoff bestehenden Erden (v. βαρύτης [barytēs], die Schwere, in Beziehung auf das beträchtliche specifische Gewicht dieser Erde).

Baryta sulphurica nativa, natürlicher schwefelsaurer Baryt (*Spathum ponderosum*, Schwerspath. *Terra ponderosa*, *Sulphas baryticus nativus*). Der Schwerspath kommt häufig fast in allen Ländern (Ungarn, Böhmen, Sachsen etc.), jedoch nur auf Gängen u. in Begleitung anderer Mineralien vor. Man unterscheidet in mineralogischer Hinsicht erdigen, dichten, körnigen, faserigen, strahligen, grad- u. krummschaligen u. stengligen Schwerspath. Der am häufigsten vorkommende u. daher auch am meisten benutzte ist der gradschalige, der aber wieder in vielen verschiedenen Krystallformen vorkommt. Zum pharmaceutischen Gebrauche muss derselbe vollkommen weiss, nicht mit Quarz, Gyps, Kalkspath od. Flussspath u. Metalltheilen verunreinigt sein u. an Säuren nichts Auflösliches abgeben. Er besteht aus 34,37 Th. Säure u. 65,63 Basis.

Baryte sulfatée testacé, franz. Name des Schwerspaths (nach Haüy).

Barytes, ae, m., 1) die Schwererde, der Schwerspath; 2) die Schwere, das Gewicht, die Last. — *Barytica*, örüm, n., die Baryterden. — *Baryticus*, a, um, adj., barythaltig; z. B. *Sulphas baryticus*, schwefelsaurer Baryt, ein aus Schwererde u. Schwefelsäure bestehendes Mineral von weisser Farbe. — *Barylin*, siehe *Jerrin*. — *Barytium*, i, n., Barytium, Baryum, die metallische Grundlage des Baryts.

Baryum chloratum, Chlorbaryum (*Baryta muriatica*, salzsaurer Baryt, *Terra ponderosa salita*, *Chlorum* [*Chloretum*] *Baryi cum Aqua*). Als sogen. bononischer Leuchtstein war die Baryterde in Verbindung mit Schwefel schon 1602 bekannt; 1774 jedoch wurde erst die Baryterde von Scheele als eigenthümlich nachgewiesen; 1775 wurde auch von demselben der salzsaurer Baryt durch Auflösen des kohlen. Baryts in Salzsäure dargestellt. Das Chlorbaryum bildet völlig weisse, durchsichtige, geschobene vierseitige Tafeln (vergl. Krystalle), oft mit abgestumpften Ecken; es schmeckt bitter u. scharf salzig, wirkt ekelerregend u. giftig. Die Luft verändert dasselbe nicht. Das krystall. Salz besteht aus 56,21 Th. Baryum, 29,03 Th. Chlor u. 14,76 Wasser. — In reinem Zustande muss es sich in 2 Th. kaltem Wasser auflösen u. die farblose Auflösung darf durch Aetzammoniak nicht gefällt werden. Eisen schlägt sich in braunen Flocken nieder, Kupfer theilt der Auflösung eine blaue Farbe mit, eben so wird Galläpfeltinctur, Blutlaugensalz und Schwefelwasserstoffwasser derartige metallische Beimischungen anzeigen. Die Krystalle dürfen nicht feucht werden (*Chlorcalcium*), ferner damit digerirter Alkohol angezündet purpurroth brennen (*Chlorstrontium*). Beigemengtes Kochsalz lässt sich schon durch die würdige Form der Krystalle, sicherer aber dadurch entdecken, dass, wenn man die Auflösung mit Schwefelsäure im Ueberschusse versetzt, nach dem Verdampfen u. Erhitzen der vom gebildeten Niederschlage abfiltrirten Flüssigkeit ein Rückstand bleibt, da doch das reine Chlorbaryum vollständig als Schwerspath dadurch gefällt wird. — Das Chlorbaryum ist das empfindlichste Reagens sowohl auf freie, als auch gebundene Schwefelsäure. — Die Verordnung desselben mit schwefelsauren, kohlen-sauren, phosphorsauren und bernsteinsauren Salzen ist zu vermeiden. — Bei Vergiftungen dient aufgelöstes schwefelsaures Natron.

Bäsanites, der Basanit, der Proberstein, eine zum Probiren taugliche Steinart, wie einige Thonschieferarten (v. *βάσανος* [*basanos*], die Probe). — **Basänus**, i, m., die Probe, genaue Prüfung, der Proberstein.

Bascanium, i, n. (*remedium*), ein Mittel gegen das Behexen (v. *βάσκανον* [*baskanon*], der Zauber, die Bezauberung).

Basēitas (*basicitas*), ätis, f., die Basicität, das Basenprincip; das Wesen der (chemischen sogen.) Basis.

Basenbilder (*Corpora amphigenia*), nach Berzelius Sauerstoff, Schwefel, Selen, Tellur, weil ihre Verbindungen mit Metallen als Basen oder Säuren in Salzverbindungen auftreten.

Basicus, a, um, adj., basisch, wird in der Chemie unter Anderm der Zustand eines Salzes genannt, in dem das Verhältniss der Grundlage (Basis) zu dem der Säure ein überwiegendes ist; z. B. *plumbum aceticum basicum*, basisch essigsaures Blei, in welchem daher die Basis, das Bleioxyd, im Vergleich zur Säure, der Essigsäure, vorherrscht. —

Basilaris, e, *adj.*, zu einer Basis gehörig, was sich auf den Grund bezieht, gründig, im Grunde.

Basilic, franz. Name des Basiliakrautes. — **Basilic commun**, franz. Name des gemeinen Basiliakrautes. — **Basilic petit**, franz. Name des kleinen Basiliakrautes.

Basilica (basilice), ae, *f.*, ein für sehr heilsam gehaltenes Salböl (nach Scribonius Largus).

Basilico, ital. Name des Basiliakrautes. — **Basilico grande**, ital. Name des grossen Basiliakrautes. — **Basilico pino**, ital. Name des kleinen Basiliakrautes.

Basilicon unguentum (*Basilicum unguentum*), die Königssalbe.

Basilicum, i, *n.*, das Basiliakraut (v. βασιλικός [*basilikos*], königlich, vortrefflich); z. B. *Ocymum Basilicum*.

Basilicus, a, um, *adj.*, königlich, herrlich, vortrefflich.

Basiliakraut, **gemeines**, *Ocymum Basilicum*. — **Basiliakraut**, kleines, *Ocymum minimum*.

Basiliiscus, i, *m.*, der Basilisk; 1) bei den Alten: verschiedene giftige Eidechsen- u. Schlangenarten, besonders solche, die schon durch den Blick vergiften sollten; vorzüglich auch eine fabelhafte Eidechse, die aus dem Hahnenei kommen und viel Unglück bringen sollte; 2) bei den neuern Physiologen: eine Gattung von Wassereidechsen mit vertical-plattem Schwanz u. einem Kamm mit Knochenstrahlen.

Basis, is, *f.*, Alles, worauf etwas ruht, der Grund, die Grundlage, die Grundlinie. 1) In der Botanik versteht man hierunter den Befruchtungsboden, den Ort, worauf die ganze Blume, und wenn diese verblüht, die Frucht sitzt. Es giebt 2 besondere Arten des Befruchtungsbodens, nämlich den Fruchtboden (*Receptaculum*) u. das Fruchtlager (*Thalamus*); *basis foliorum*, das Stengelende der Blätter, oder der Theil, womit das Blatt dem Stiel od. Stengel einverleibt ist. 2) In der Chemie werden gewöhnlich unter Basen (Salzbasen) positiv elektrische Körper begriffen, die sich mit negativen elektrischen (Säuren) zu Salzen verbinden können. Die Oxyde der Erdmetalle, die man auch Erden nennt, sind Basen. Sie haben geringere Affinität zu den Säuren, als die Alkalien, u. bilden damit erdige Mittelsalze. Man theilt die Basen ein in anorganische u. organische.

Bassorin (Traganthin), Pflanzenschleim, Traganthstoff, im Bassoragummi entdeckt.

Bätävus, i, *m.*, ein Holländer. — **Bätävus**, a, um, *adj.*, batavisch, holländisch; z. B. *batavi ducati*, holländische Ducaten.

Bathengel, *Teucrium Chamaedris*.

Bathmetall, eine Composition von Messing u. Zink.

Bathmis, Idis, *f.*, eine kleine Vertiefung, bes. eine treppenähnliche. — **Bathmödes**, is, *adj.*, stufenartig, treppenartig. — **Bathmos**, i, *m.*, Basis; eine Stufe, Stufenleiter, Treppe; eine stufen- od. treppenartige Vertiefung.

Bathometer, Meeressonde, eine Vorrichtung zur Messung der Meerestiefe. — **Bathos**, eos, *n.*, die Tiefe, die Höhe (v. βάω [*baō*], gehen, steigen).

Bathrum, i, *n.*, etwas, worauf man sicher geht, steht, sitzt oder ruht, daher eine Bank.

Baton, i, *n.*, die Brombeere. — **Batos**, *f.*, die Brombeerstaude.

Batrachium, i, *n.* (*Dimin.* v. *batrachus*), 1) ein kleiner Frosch;

2) Fröschleinkraut (*Ranunculus*). — Batracholeinsäure (Froschöl-säure), ein eigenthümlicher Stoff in dem Fette des Wasser-Salamanders. — *Batrachus*, i, m., der Frosch (v. *βαῖν* [*baîn*], schreien, quaken, u. *τραχύς* [*trachys*], rau, uneben). — *Batrachii*, ōrum, m., die Batracier oder Batrachier, die Classe der froschartigen Amphibien (v. *batrachus*, der Frosch).

Baume de Copahu, franz. Name des Copaiv-Balsams. — **Baume frisée**, franz. Name der Krausminze (*Mentha crispa* L.).

Baumflechte, gemeine gelbe, *Lichen parietinus*. — **Baumöl**, *Oleum olivare commune*.

Baunus, i, m., ein Ofen, Kamin (v. *βαῖν* [*baû*], brennen).

Baurack war in der Alchemie so viel als *nitrum*.

Bavaria, ae, f., Baiern. — *Bavaricus*, a, um, adj., bairisch.

Bdella, ae, f., der Bluteigel (v. *βδέλλω* [*bdellō*], saugen). — *Bdell-epithecium*, i, n., ein Bluteigelansetzer, wie man aus Kartenblättern, Holz, Glas, Silber etc. geformt hat. — *Bdellepithësis*, is, f., das Ansetzen der Bluteigel (v. *βδέλλα* [*bdella*], der Bluteigel, u. *ἐπιθεσις* [*epithesis*], das Auflegen, Ansetzen).

Bdellium, i, n., das Bdellium (wahrsch. v. *βδέλλος* [*bdellos*], widerlich, wegen seines widerlichen Ansehens u. Geruchs), v. *Heudelotia africana* Rich. (S. Cl. I. O. [*Octandria Monogynia*] L.; *Terebinthaceae* nat. F.), ein dorniger, 6—8 Fuss hoher Strauch, liefert das in gelben, röthlichgelben, braunen od. selbst schwarzbraunen Stücken von der Grösse einer Walnuss u. darüber vorkommende, spröde, wachsglänzende Gummiharz, das einen myrrhenartigen Geruch hat u. zuweilen mit Myrrhe oder auch mit arabischem Gummi vermischt vorkommt. Es besteht aus 59 Th. Harz, 9,2 Th. Gummi, 30,6 Th. Traganthstoff, 1,2 flüchtigem Oele u. Verlust.

Bdellometrum, i, n. (*le Bdellomètre*), ein von Sartiendièr erfundenes Saugwerkzeug, das als Surrogat der Bluteigel dienen soll (v. *βδέλλα* [*bdella*], der Bluteigel, u. *μέτρον* [*metron*], das Messinstrument).

Bdellus, i, m., jedes den Sinnen Widerliche. — *Bdelygmia*, ae, f., ein höchst ekelhafter Gestank; alles höchst Widerliche.

Beaumesianus, a, um, adj., Beaumesianisch, nach Beaumé (Ant. n.), nom. popr. eines Chemikers u. Apothekers in Paris, geb. 1728, gest. 1804.

Bebeerin, ein Alkaloid aus der Rinde des Bebeerenbaumes (eines noch unbekannten Gewächses des indischen Guiana, wahrscheinlich zu den *Laureaceen* gehörig). — **Bebeerinsäure**, eine in den Samen der Bebeerinfrucht enthaltene Säure.

Beccabongue, franz. Name der Bachbunge. — *Beccabunga*, ae, f., Bachbunge. — *Beccabungia*, ital. Name der Bachbunge.

Bechica, ōrum, n. (*remedia*), Mittel gegen den Husten. — *Bechicus*, a, um, adj., gegen den Husten wirkend oder dienlich (v. *βήξ* [*bêx*], der Husten); z. B. *trochisci bechici*, Hustenküchelchen.

Bechion, i, n. (nach Plinius) der Hufslattig.

Bedeguar, Bedeguar, der Rosenschwamm, die Siefe, der Siebenschläfer, Schlafapfel, ein durch den Stich der Rosengallwespe (*Cynips rosae*) entstandener, meist Larven dieses Insects enthaltender Auswuchs an der wilden Rose, der sonst, unter das Kopfkissen gelegt, als schlafferregend galt; auch empfahl man ihn innerlich in Nieren- u. andern Krankheiten, selbst gegen den Biss des tollen Hundes.

Beguin (Jean), *nom. propr.* eines franz. Arztes u. Chemikers zur Zeit Heinrichs IV.

Behemoth, das Vieh, das Nielpferd (v. arab. *bahama*, stumm, faul, träge sein).

Behensäure, in dem Behenöl enthalten. — Behensäureäther, aus der Behensäure bereitet.

Beifuss, *Artemisia vulgaris* L.

Belchon war in der Alchemie *Bdellium*.

Belemnites, ae, m., ein Belemnit, Wurfstein, ein sogenannter Donnerkeil.

Belgicus, a, um, *adj.*, belgisch, niederländisch. — Belgium, ii, n., Belgien.

Belladonna, ae, f., die Wolfskirsche, Tollkirsche, das Tollkraut (kommt aus dem Italienischen, bedeutet ein schönes Weib und ist von den Italienern so benannt worden, weil sich die italienischen Frauen von der Pflanze zum Schmucke bedienen); z. B. *Atropa Belladonna*. — Belladonna, italien. Name der Tollkirsche. — Belladonne, französ. Name der Tollkirsche. — Belladonnin (Belladonnin), eigenthümlicher Stoff des Krautes der Tollkirsche (*Atropa Belladonna*).

Bellis, Idis, f., das Gänseblümchen, die Massliebe (19. Cl. 2. O. [*Syngenesia superflua*] L.; *Compositae* nat. F.) (v. *bellus*, schön); z. B. *Bellis perennis*, welches sonst als Heilmittel gegen Schwindsucht gebraucht wurde.

Bellus, a, um, *adj.*, schön, geschmückt.

Belone, die Pfeilspitze, die Nadel. — Belonödes, belonoides, nadelförmig (v. *βελόνη* [*belonē*], die Nadel, Pfeilspitze, u. *εἶδος* [*eidos*], die Gestalt).

Belzuino, ital. Name des Benzoëharzes.

Bendar war in der Alchemie *sal gemmae*.

Bène, *adv.*, gut, wohl (v. allen *bonus* statt *bonus*); z. B. *vasis bene clausis serva*, bewahre es in wohl (gut) verschlossenen Gefäßen auf.

Benedicten-Flockenblume, *Cnicus Benedictus*. — Benedictenwurz, *Radix Caryophyllatae*.

Benedictus, a, um, *adj.*, gesegnet, geheiligt (v. *bene*, gut, u. *dico*, sagen, reden); z. B. *aqua benedicta* Ruland, Brechwein; *Carduus benedictus*, das Cardobenediktenkraut; *benedicta laxativa*, in der Alchemie der *lapis philosophorum*.

Benevölus, a, um, *adj.*, geneigt, gütig, wohlwollend.

Benjoia, ital. Name der Benzoë. — Benjoin, franz. Name der Benzoë.

Bentham (George, Esqu.), *nom. propr.* eines Botanikers in London.

Benvite, franz. Name des gemeinen Nelkenkrautes.

Benzamid (Bibenzamid) entsteht durch Kochen des ätherischen Bittermandelöls bei 200° u. nachherige Behandlung mit Alkohol. — Benzanilid, ein zu den Aniliden von Ch. Gerhardt gehöriger Körper. — Benzidam, ein Alkaloid, das man durch Behandlung des Nitrobenzids mit Schwefelwasserstoff erhält. — Benzidin, eine organische Base, dargestellt aus in ammoniakalischem Alkohol gelöstem Azobenzid u. Behandeln der Lösung mit Schwefelwasserstoff. — Benzilum wird durch die Einwirkung des trocknen Ammoniakgases auf Benzyl dargestellt. — Benzilim, ein Product der Einwirkung von Ammoniak auf

Benzyl. — Benzimid wird durch Unterwerfen des Bittermandelöls der Reaction der Blausäure und des Kali dargestellt. — **Benziminsäure** stellt man durch Behandlung des beim Behandeln einer weingeistigen Lösung des Bittermandelöls mit Aetzammoniak entstehenden Productes mit Salzsäure dar. — **Benzin** (**Benzon**, **Benzol**), eine durch Destillation der Benzoësäure hervorgebrachte flüchtige öartige Substanz. — **Benzenschwefelsäure**, eine Verbindung des Benzin mit wasserfreier Schwefelsäure.

Benzoë, oë, f., das Benzoëharz, Benjamingummi, auch *Asa dulcis*; v. *Benzoïn officinale* Hayn. od. *Styrax Benzoë Dryand.* (10. Cl. 1. O. [*Decandria Monogynia*] L.; *Styraceae* nat. Fam.). Abbild. s. Winkler Taf. 123. *Benzoïn Hayn.* Benzoëbaum: Kelch bleibend, undeutlich vier- oder fünfzählig. Blumenkrone trichterförmig, mit 4- oder 5theiligem Saum. Staubgefäße 10: Staubbeutel linealisch, einföhrig, an dem obern Theil der Staubfäden der Länge nach angewachsen. Steinfrucht mit einer nicht aufspringenden einsamigen (selten 2- oder 3samigen) Nuss. — *B. officinale* Hayn. **Echter Benzoëbaum.** Blätter eirund-länglich, lang zugespitzt, unterseits dünnweissfilzig; Trauben zusammengesetzt, ziemlich von der Länge der Blätter. — Der Baum, aus dem durch in die Rinde und das Holz gemachte Einschnitte das anfangs flüssige Benzoëharz gewonnen wird, wächst in Siam u. den Inseln Java u. Sumatra, erreicht eine mittlere Höhe u. der Stamm wird mannsdick. Die beste Benzoë wird aus jungen, etwa 5—6jährigen Stämmen (wovon einer etwa 3 Pfd. liefern kann) die geringere Sorte hingenommen von älteren, 8—10 Jahre alten Stämmen gesammelt. Es kommen 3 Sorten im Handel vor. Die *feinste* besteht aus grossen u. kleinen gelben u. weisslichen Körnern oder anderen Stücken, die auf dem Bruche milchweiss oder glänzend sind. Die *zweite* Sorte besteht aus zusammengebackenen Stücken und Körnern voriger Sorte, zwischen denen sich eine bräunliche oder röthlich-gelbe gestaltlose Masse befindet, und ist um so besser, je mehr sie weissliche, in Gestalt den Mandeln ähnliche Körner (*Mandelbenzoë*, *Benzoë amygdaloides*) eingesprengt enthält (spec. Gew. = 1,063). Die *dritte* Sorte (gemeine Benzoë, *Benzoë vulgaris* oder *in massis*) enthält nur wenige weisse Körner, dagegen aber die braune Masse in überwiegender Menge. Die Benzoë löst sich in Alkohol und Aether bis auf die fremdartigen Beimengungen gänzlich auf und es müssen 100 Th. in Alkohol gelöster guter Benzoë 24—26 Th. krystall. kohlensaures Natron sättigen. Sie besteht nach Kopp aus: *Benzoësäure* 14,0, in Aether lösliches *Alphaharz* (dies sind die weissen mandelartigen Stückchen mit 8—12 % Benzoësäure) 52,0, in Alkohol lösliches *Betaharz* 25,0, in kohlensaurem Natron lösliches *Gammaharz* 3,0, *braunes Harz* 0,8 (alle diese 3 Harze bilden die braunen Theile mit 15 % Säure), Unreinigkeit 5,2=100,0.

Benzoëbaum, *Styrax Benzoïn*. — Benzoëharz, *Resina Benzoës*. — Benzoë, ein aus dem Tolubalsam durch Destillation dargestelltes flüchtiges Oel. — Benzoë-Styrax, *Styrax Benzoïn*. — Benzoicus, a, um, adj., aus oder mit Benzoë bereitet oder angefertigt; z. B. *acidum benzoicum*, Benzoësäure. — Benzoïn, 1) eine Art des Styraxbaums; z. B. *Styrax Benzoïn*; 2) eine durch Wirkung des Kali auf Bittermandelöl od. Wasser erhaltene krystallinische Substanz. — Benzoïnarn, eine Substanz, die sich bildet, wenn man Benzoïn in absolutem Alkohol gelöst in eine Flasche bringt, einen Strom Ammoniakgas durchstreichen u.

das Ganze 4 bis 5 Monat in einem verschlossenen Gefäße stehen läßt.

— **Benzoinus**, a, um, *adj.*, benzoëartig; z. B. *odoris benzoini*, von benzoëartigem Geruch. — **Benzolin**, eine von Fownes dargestellte organische Salzbase. — **Benzolon**, ein Product der Einwirkung von Kalihydrat auf Hydrobenzamid in der Hitze. — **Benzon** bildet sich neben Benzin bei der trocknen Destillation des benzoësauren Kalks. — **Benzonitril** wird durch Behandlung des benzoësauren Ammoniaks in der Hitze dargestellt. — **Benzoresinsäure** (*acid benzorésique*) erhält man durch Behandlung der Benzoë mit Salpetersäure und Destillation. — **Benzostilbin**, ein Product der Einwirkung von Kalihydrat auf Hydrobenzamid in der Hitze (v. *benzoë* u. *stilβw* [*stilbō*], ich glänze, weil die Krystalle sehr glänzend sind). — **Benzoylc**, das Benzoyl, der Benzoëstoff, (nach Liebig u. Wöhler) ein eigenthümlicher im blausäurefreien Bittermandelöle und in der Benzoë enthaltener Stoff (v. *benzoë*, die Benzoë, u. *ύλη* [*hylē*], der Stoff, die Materie, Masse). — **Benzoylinwasserstoff** (*hydrure de benzoiline*) wird durch Behandlung des Azobenzoylinwasserstoffs mit Salzsäure dargestellt. — **Benzoylschwefelsäure** bildet sich beim Vermischen von Benzoëssäure u. wasserfreier Schwefelsäure. — **Benzoylwasserstoff** ist ätherisches Bittermandelöl.

Berbericus, a, um, *adj.*, berberisch. — **Berberides**, um, *m.* (Berberideae, arum, *f.*), die Berberiden, 78. natürliche Pflanzenfamilie nach Jussieu, 66. nach Sprengel, 72. nach De Candolle. — **Berberin**, Berberitzengelb, ein krystallisirbarer Bestandtheil der Wurzel des Berberitzenstrauchs (*Berberis vulgaris*). — **Berbëris**, idis, *m.*, die Berberitze, der Saurach (6. Cl. 1. O. [*Hexandria Monogynia*] L.; *Berberideae* nat. *f.*); z. B. *Berberis vulgaris* L., von dem die Beeren (*baccæ berberides*) officinell sind. Sie enthalten vorzüglich freie Aepfelsäure. — **Berberitze**, gemeine, *Berberis vulgaris*. — **Berbero**, ital. Name der Berberitze.

Berends (Karl Aug. Wilh.), *nom. propr.* eines Professors der Medicin zu Berlin; geb. 1759, gest. 1826.

Bergamo, ital. Name des gemeinen Dosten.

Bergamo, eine Provinz im Gouvernement Mailand des lombardisch-venetianischen Königreichs (Oestreich).

Bergamotta, ae, *f.*, die Bergamotte, die Frucht von *Citrus Limetta* Risso Dec. (*Citrus bergamia vulgaris*), eine Abart von *Citrus Aurantium*, die vorzugsweise auf das in ihr enthaltene, wohlriechende, ätherische Oel (*Oleum bergamottæ*) benutzt wird (abgeleitet nach Einigen vom türk. *Beg*, Fürst, u. *Armoud*, Birn, nach Andern von der Stadt *Bergamo* in Italien, od. *Bergamah* in Kleinasien).

Bergapten, der stearoptenartige Körper, welcher den im rohen Bergamottöl sich bildenden Bodensatz ausmacht.

Bergius (Peter Jonas), *nom. propr.* eines Professors der Naturgeschichte zu Stockholm; starb 1790.

Bergöl, rothes, *Oleum petrae rubrum*.

Bergsturmhut, blauer, *Aconitum tauricum*.

Bernhardi (Joh. Jac.), *nom. propr.* eines Botanikers, Professors in Erfurt; geb. 1774.

Bernstein, *Succinum*. — **Bernstein**, gelber, *Succinum citrinum seu flavum*. — **Bernstein-Kampher**, nach Gmelin die wachsartige Substanz, die man bei der trocknen Destillation des Bernsteins erhält. — **Bernsteinspäne**, *Rasura Succini*.

Beroaeus, a, um, *adj.*, beroäisch, von *Beroa* od. *Beria* (einer Stadt in Macedonien u. Syrien).

Beroëus, a, um, *adj.*, heroëisch (*Beroë*, alter Name der Stadt *Aleppo* oder *Haleb*).

Bertholimeter, ein Instrument zum Messen der Stärke der Chlorauflösung (dem franz. Chemiker Berthollet zu Ehren so genannt).

Bertram, *Pyrethrum*.

Beryllium, s. *Glycium*.

Berzelianus, a, um, *adj.*, berzelianisch, nach Berzelius (*Joh. Jac. v.*), *nom. propr.* eines ber. schwed. Chemikers; geb. 1779, gest. 1848.

Besser (*W. F. J. G. v.*), *nom. propr.* eines Botanikers, *Dr. med.* u. Professors; geb. 1784, gest. 1844 in Kiew.

Bestuscheff (*Michael Petrowitsch*), *nom. propr.* eines russ. Diplomaten, Erfinder der nach ihm benannten *tinctura tonica nervina*; geb. 1656, gest. 1760.

Beta, ae, *f.*, der Mangold (5. Cl. 2. O. [*Pentandria Digynia*] *L.*; *Chenopodeae* nat. F.); z. B. *Beta Cicla*, weisser östr. Mangold.

Beta-Resina, Betaharz, s. *Gamma-Resina*.

Betula, ae, *f.*, die Birke (21. Cl. 7. O. [*Monoecia Polyandria*] *L.*; *Amentaceae* nat. F.); man bereitet daraus das *Betulin*, den Birkenkampher, das Birkenöl u. a. m. — *Betulin*, *Betul*, *Betulin* kampher, eine eigne Substanz der Birke, von Lowitz durch Ausschwitzen aus bis zum Dämpfen erhitzter Birkenrinde erhalten.

Beudantit, ein von Levy entdecktes neues Mineral.

Beurre, franz. Name der Butter.

Bezantalem war in der Alchemie *sulphur vivum*.

Bezoar, das Gift, auch das Gegengift; der sogen. Bezoarstein, eine rundliche Congregation in dem Magen oder mehr in den Eingeweiden verschiedener Thiere. (Dieses Wort sucht man abzuleiten v. Arabischen *bādschā*, verändern, näher abzuleiten ist es aber wohl v. Arab. *baz*, der Adler, der Falke, des Auswerfens der Feder- u. Haargerülle halber.) — *Bezoardicum*, i, n. (*medicamen*), ein Gegengift; z. B. *Bezoardicum Joviale*, ein chem. Product aus Spießglanz, Zinn u. Salpeter. — *Bezoarsäure*, eine von Lipowitz in dem orient. Bezoar gefundene eigenenthümliche Säure.

Bia, ae, *f.*, die niedere, mechanische, blos körperliche materielle Kraft, Gewalt.

Bialatus, a, um, *adj.*, zweiflügelig.

Bianco di Balena, ital. Name des Wallrathes.

Biappendiculatus, a, um, *adj.*, doppeltgelappt, mit zwei Nebentheilen versehen.

Bibergeil, *Castoreum*.

Bibersteinus, i, m., Biberstein (*Friedr. Aug. Marschall v.*), *nom. propr.* eines russ. berühmten Botanikers; geb. 1766, gest. 1826.

Bibiolithus (*bibololithus*), i, m., versteinerte Pflanzen- od. Baumrinde (v. *βίβλος* [*biblos*], die Baumrinde, u. *λίθος* [*lithos*], der Stein).

Bibulum (*biblion*), i, n., ein Buch, Büchlein. — *Bibliotheca*, ae, *f.*, eine Bibliothek; eine zum Gebrauch aufgestellte Büchersammlung (v. *βίβλος* [*biblos*], das Buch, u. *θήκη* [*thēke*], ein Aufbewahrungsbehältniss).

Bibulus, i, m. (*biblos*), die Baumrinde, der Splint; das Buch.

Bibromindin, eine Verbindung des Indig mit Chrom. — *Bibromisatin*, s. *Bromisatin*. — *Bibromisatin-schwefligsaures Kali*, von

Laurent durch Streichenlassen eines Stromes von schwefligsaurem Gas in eine Lösung von bibromisatinsaurem Kali erhalten. — **Bibromsalicylsäure**, darstellbar aus dem Rückstande der Brom-Salicylmasse durch Behandlung mit Ammoniaksalz, und dann wieder mit Salzsäure.

Bibulus, a, um, *adj.*, Flüssigkeit einsaugend; z. B. *charta bibula*, Fliess- oder Löschpapier.

Bicarbonas, atis, m., Bicarbonat, ein zweifach oder doppelt kohlen-saures Salz, in welchem die Menge der Kohlensäure gegen die der Basis doppelt so gross ist, als in dem einfachen oder neutralen, in dem daher 2 At. Kohlensäure auf 1 At. der Basis kommen, während das einfache Salz auf 1 At. Basis 1 At. Kohlensäure enthält; z. B. *Bicarbonas kalicus*, doppelt kohlen-saures Kali. — *Bicarbonicus*, a, um, *adj.*, zweifach oder doppelt kohlen-sauer; z. B. *Natrum bicarbonicum*, doppelt kohlen-saures Natron.

Bichloratus, a, um, *adj.*, doppelt oder zweifach chlorhaltig, nämlich eine Chlorverbindung, in der sich doppelt so viel Chlor befindet (Chlorid), als in der einfachen (Chlorür); z. B. *Hydrargyrum bichloratum* (*Hydrarg. muriat. corros.*), doppelt oder zweifach Chlorquecksilber. — *Bichlorëtum*, i, n., eine jede Chlorverbindung, in der die Menge des Chlors gegen die der Basis doppelt so viel beträgt, als in der einfachen; z. B. *Bichlorëtum Hydrargyri*, zweifach Chlorquecksilber. — *Bichlorisatin*, ein durch Einwirkung des Chlors auf Indigblau entstandener neuer Körper. — *Bichlorisatinsäure* entsteht aus Bichlorisatin durch Behandlung mit Kali u. Mineralsäure. — *Bichlorisatyd* entsteht aus Bichlorisatin durch Behandlung mit Schwefelwasserstoff oder Schwefel.

Bicolorin, doppelfarbig.

Bidens, tis, *adj.*, zweizähmig, mit 2 Zähnen. — *Bidentatus*, a, um, *adj.*, zweizähmig; z. B. *perianthium bidentatum*, eine zweizählige Blüthendecke.

Biduum, i, n., zwei Tage (v. *bis*, zwei, u. *dies*, der Tag); z. B. *per biduum*, 2 Tage hindurch od. lang. — *Biduus*, a, um, *adj.*, zweitägig.

Biennis, e, *adj.*, zweijährig (v. *bis*, zwei, u. *annus*, das Jahr); z. B. *plantae biennes*, zweijährige Pflanzen, die im ersten Jahre Blätter, im andern aber Blumen und Samen bringen und alsdann absterben.

Bifariam, adv., in 2 Theilen, zweimal, zwiefach; an 2 Seiten, an Orten 2 Mal, auf doppelte Art; z. B. *folia bifariam imbricata*, zweihlig dachziegelförmige Blätter.

Bifido-dentatus, a, um, *adj.*, gezähnt-zweispaltig. — *Bifidus*, a, um, *adj.*, zweispaltig; z. B. *anthera bifida*, ein zweispaltiger Staubbeutel.

Biflorus, a, um, *adj.*, zweiblühthig; z. B. *caulis biflorus*, ein zweiblühthiger Stengel.

Bifolius, a, um, *adj.*, zweiblättrig.

Biforinen, nach Turpin angeblich neue Organe in den Blättern der *Ascoideen*.

Biforus, a, um, *adj.*, zweiklappig; z. B. *pericarpium biforum*, eine zweiklappige Fruchtkapsel.

Bigamia, ae, f., die Bigamie, doppelte Ehe (v. *bis*, zwei, u. *γάμος* [*gamos*], die Heirath, Verbindung).

Bigeminatus, a, um, *adj.*, doppelt-gezweit; z. B. *folium bigeminatum*, ein doppelt-gezweites Blatt.

Biglandulosus, a, um, *adj.*, zweidrüsig, mit 2 Drüsen versehen.

Bihörum, i, n., zwei Stunden; z. B. *per bihorium*, zwei Stunden hindurch.

Bijodatus, a, um, *adj.*, doppelt oder zweifach jodhaltig; nämlich eine Jodverbindung, in der sich doppelt so viel Jod (Jodid) befindet, als in der einfachen (Jodür); z. B. *Hydrargyrum bijodatum*, doppelt Jodquecksilber. — **Bijodetum**, i, n., eine Doppeltjodverbindung, in der noch einmal so viel Jod enthalten ist, als in der einfachen; z. B. *Bijodetum Hydrargyri*.

Bijugus, a, um, *adj.*, zwerspännig doppelt, doppelt gepaart; z. B. *folium bijugum pinnatum*, doppelt-gepaart gefiedertes Blatt.

Bilabiatus, a, um, *adj.*, zweilippig; z. B. *corolla bilabiata*, eine zweilippige Blumenkrone.

Bilaciniatus, a, um, *adj.*, doppelt eingeschnitten oder gelappt.

Bilifellinsäure, eine in der Galle vorhandene Verbindung der Fellinsäure mit Bilin. — **Bilifulvin**, ein rothgelber Farbestoff der Ochsen-galle (v. *bilis*, die Galle, u. *fulvus*, rothgelb). — **Bilin**, Gmelins Gal-lenzucker, der nicht krystallisirende Hauptstoff der Ochsen-galle. — **Biliphäin**, nach Simon der durch Salpetersäure in der Galle entstehende Farbenwechsel in Braun. — **Bilis**, is, f., die Galle. — **Bilverdin**, Gal-lengrün (v. *bilis*, die Galle, u. *verdire*, grün werden).

Bilobus, a, um, *adj.*, zweilappig; z. B. *folium bilobum*, ein zwei-lappiges Blatt.

Biloculäris, e, *adj.*, zweifächerig; bei den Pflanzen, wenn ein lin-nienförmiges, innerhalb hohles Blatt in seiner Höhlung durch eine Schei-dewand der Länge nach in zwei Fächer getheilt ist (v. *bis*, zwei, u. *locus*, das Fach, der Ort); z. B. *folium biloculare*, ein zweifächeriges Blatt.

Bilsenkraut, schwarzes, *Hyoscyamus niger*.

Binarie, *adv.*, was zwei enthält. — **Binäus**, a, um, *adj.*, gezweit; z. B. *folium binatum*, ein gezweites Blatt. — **Bini**, ae, a, *adj.*, je zwei zu zwei.

Binifobenzid, nach Zinin ein Product der Zersetzung mit Schwe-felammonium.

Binifronaphthalid, Peca-hexyloxyd, sa-petrigsaures, Nitronaph-thales, entsteht, wenn Naphthalin mit Salpetersäure bis zum Verschwin-den des obenaufschwimmenden öligen Körpers gekocht wird.

Binus, a, um, *adj.*, doppelt, zweifach.

Biöchymus, i, m., der Lebenssaft der Pflanzen (v. *βίος* [*bios*], das Leben, u. *χυμός* [*chymos*], der Saft, Speisebrei).

Biondella, ital. Name des gemeinen Seidelbastes od. Kellerhalses.

Bioxalas, atis, m., ein doppelt kleesäures Salz. mit 4 At. Kleesäure u. 1 At. Basis.

Bipartibilis, e, *adj.*, zweitheilig, zweifach theilbar. — **Bipartitus**, a, um, *adj.*, in zwei Theile getheilt, halb, doppelt; z. B. *perianthium bi-partitum*, eine zweitheilige Blüthendecke.

Bipinnatifidus, a, um, *adj.*, doppeltfiederspaltig; z. B. *folium bi-pinnatifidum*, ein doppeltfiederspaltiges Blatt, das wagerechte Einschnitte hat, die wiederum mit solchen wagerechten Einschnitten versehen sind, wie beim Wermuth (*Artemisia Absinthium*). — **Bipinnatus**, a, um, *adj.*, doppelt gefiedert; wenn ein Blattstiel in einer Fläche auf beiden Seiten eine Menge Blattstiele hervorbringt, von denen jeder ein gefiedertes Blatt trägt.

Bipollicäris, e, *adj.*, zwei Zoll breit, lang oder dick.

Biproteinchlorwasserstoffsäure und **Biproteinschwefelsäure** erhält man, wenn man in eine essigsäure Proteinauflösung verdünnte Salz- od. Schwefelsäure giesst u. den flockigen Niederschlag mit Alkohol auswäscht.

Bipyramidalododecaëder, eine zwölfseitige Doppelpyramide.

Bis, *adv.*, zweimal; *bis terre*, zwei bis drei Mal.

Bisam, Moschus.

Bischof (*Gottl. Witt.*), *nom. propr.* eines Botanikers u. Professors in Heidelberg.

Biserialis, *e*, *adj.*, zweireihig; z. B. *lamellae biserialis*, zweireihige Plättchen.

Bismuthicus, *a*, *um*, *adj.*, wismuthoxydhaltig; aus Wismuth bereitet; z. B. *Subnitrates bismuthicus*, basisch salpetersaures Wismuthoxyd. — **Bismuth pur**, *franz.* Name des reinen Wismuth.

Bismuthum, *i*, *n.*, das Wismuth, Markasit; ein röthlich-weisses, sehr sprödes unedles Metall, von blättrigem Gefüge und 9,85 spec. Gewicht. Es ist schon sehr lange bekannt (1520 schon führt Agricola die Erze desselben an), wurde jedoch von den Alten häufig mit Zinn u. Blei verwechselt, bis Stahl zuerst die Eigenthümlichkeit desselben darlegte. Es findet sich meist *gediegen*, selten mit *Schwefel*, u. sehr selten *oxydirt*. Häufig kommt es in Sachsen, Böhmen u. Siebenbürgen in Begleitung anderer Metalle (besond. mit Kobalterzen, auch Kupfer, Blei, Tellur etc. verbunden) vor und wird durch Erhitzung der Erze zwischen Kohlen oder Holz, wobei das Wismuth ausfließt, gewonnen. Das im Handel vorkommende Wismuth ist jedoch *nicht rein*, sondern enthält *Arsen*, *Eisen* u. zuweilen auch andere Metalle. Durch Auflösen des Wismuth in Salpetersäure u. Vermischung der Auflösung mit Wasser scheidet sich das Wismuth als basisch salpetersaures Oxyd ab und die verunreinigenden Metalle bleiben zurück. Der getrocknete Niederschlag mit etwas schwarzem Fluss vermischt und bei gelindem Feuer (da in hohen Hitzegraden das Wismuth flüchtig ist) in einem Tiegel reducirt, liefert dann auf dem Boden desselben das reine Metall. Hinsichtlich der Prüfung des Wismuth auf seine Reinheit, so muss dasselbe in Salpetersäure von 1,200 spec. Gewicht *ganz auflöslich* u. die Auflösung *ungefärbt* sein; *blausaures Kali* darf darin nur einen *weisen*, *Gallustinctur* einen *gelben* u. *Beguin's Liquor* einen *dunkelbraunen*, in Ammoniak *unlöslichen* Niederschlag hervorbringen. Die Verunreinigung mit *Blei* lässt sich durch den weissen Niederschlag, welchen verdünnte Schwefelsäure in der Auflösung hervorbringt, leicht entdecken. — Mit *Sauerstoff* geht das Wismuth *drei* Verbindungen ein: 1) *Oxydul*, durch Schmelzen des Wismuth bei gelinder Hitze in offenen Gefässen. 2) *Oxyd* bildet sich auf trockenem Wege beim Erhitzen des Wismuth bis zur Weissglüh-hitze, wobei es mit sehr kleiner blauer Flamme brennt und sich das Oxyd als ein gelbes Pulver sublimirt. Leichter wird es jedoch durchs Glühen des basisch salpeters. Wismuthoxyds erhalten. Es besteht aus 89,87 Wismuth u. 10,13 Sauerstoff. — 3) *Wismuthsäure* lässt sich schwer darstellen, bildet ein rothes Pulver u. besteht aus: 84,181 W. u. 15,819 Sauerst. Die leicht statfindende Verbindung des W. mit Metallen befördert besonders die Leichtflüssigkeit derselben. — Die Verbindungen des W. mit Säuren bilden *farblose* Salze, die durch Kupfer, Cadmium u. Zink metallisch gefällt u. durch Wasser meist in saure auf-

lösliche u. in basische unauflösliche (z. B. das officinelle bas. salpeters. Wismuthoxyd) geschieden werden.

Bismuthum hydrico-nitricum, Wasser-salpetersaures Wismuth (*Bismuthum nitricum praecipitatum*, niedergeschlagenes salpeters. W., *Subnitras bismuthicus*, basisch salpeters. W., *Magisterium Bismuthi*). Es muss ein sehr weisses, glänzendes, feines oder ganz kleine Schuppen enthaltendes Pulver darstellen u. weder durch Arsenik, noch durch Schwefelsäure verunreinigt sein. — Es wurde von Lémery zuerst gegen Ende des 17. Jahrh. dargestellt, als Geheimmittel verkauft u. die Bereitungsweise erst im 18. Jahrh. bekannt. Nach Vorschrift der Pr. Pharmacop. soll das dazu zu verwendende W. vorher durch Schmelzen mit kohlen. Natron u. etwas Schwefel vom Arsen u. andern Metallen gereinigt werden. Die zur Auflösung des W. bestimmte Salpetersäure muss frei von Chlorwasserstoffsäure sein, da sonst der Niederschlag durch Chlorwismuth verunreinigt wird. Prüfung: Der Wismuthniederschlag muss sich völlig in Salpetersäure auflösen u. es darf Schwefelsäure aus dieser Auflösung durchaus nichts fällen (Schwefels. Blei). Ist der Niederschlag blos Wismuthoxydhydrat, so wird durch Uebergiessen desselben keine, vermittelt Erhitzen durch ihre Dämpfe bemerkbare Salpetersäure frei.

Bismuthum sulphure mineralisatum, (nach Werner) Wismuthglanz. — *Bismuto puro*, ital. Name des reinen Wismuth.

Bistorta, ae, f., die Natterwurz. — *Bistorta*, ital. Name der Natterwurz.

Bisuccinamid bildet sich bei Durchleitung von Ammoniakgas durch bei 180° geschmolzene Bernsteinsäure.

Bisulcatus, a, um, adj., gespalten. — *Bisulcum*, i, n., Zweihufer, eine Abtheilung Wiederkäuer, deren Füsse aus zwei breiten Klauen bestehen, mit grossen, ziemlich flachen Nägeln; mehrentheils sind indess noch 2 Afterklauen vorhanden, wie z. B. beim Moschusthier. — *Bisulcus*, a, um, adj., in zwei Theile gespalten.

Bisulphas, atis, m., ein doppelt schwefelsaures Salz. — *Bisulphuretum*, i, n., eine Schwefelverbindung mit noch einmal so viel Schwefel, als die einfache; z. B. *Hydrargyrum bisulphuretum rubrum*, rothes Doppelschwefelquecksilber od. Zinnober. — *Bisulphuricus*, a, um, adj., doppelt oder zweifach schwefelsauer; nämlich ein schwefelsaures Salz, in dem die Menge der Schwefelsäure gegen die der Basis doppelt so gross ist, als in dem einfachen oder neutralen Salze; z. B. *Kali bisulphuricum*, doppelt od. saures schwefelsaures Kali.

Bitartras, atis, m., ein zweifach oder doppelt weinsteinsaures Salz mit doppelt so viel Säure, als in dem einfachen oder neutralen Salz, wie im Weinstein; z. B. *Bitartras kalicus*, doppelt weinsteinsaures Kali.

Biternatus, a, um, adj., doppelt-dreizählig; z. B. *folium biternatum*, ein doppelt-dreizähliges Blatt.

Bithynos, Name eines Pflasters gegen die Wassersucht.

Bitum ist in der Alchemie *Mercurius*.

Bitterholz, *Lignum Quassiae*. — Bitterklee, *Trifolium fibrinum*. — Bittersalz, *Sal amarum*. — Bittersüss, *Solanum Dulcamara*.

Bitume liquide brun et noiratre, franz. Name des rothen Berg- od. Steinöls (nach Hauy). — *Bitumen*, Yinis, n., das Erdharz, Erdpech; z. B. *bitumen liquidum*, ein flüssiges Erdharz; *bitumen Judaicum*,

das Judenpech, der Asphalt. — *Bituminösus*, a, um, *adj.*, erdharzig; z. B. *odore bituminoso*, von erdharzigem Geruch.

Bivalvis, e, *adj.*, zweiklappig, zweisechalig; z. B. *nux bivalvis*, eine zweiklappige Nuss, eine solche, die in zwei Klappen aufspringt, wie die von *Cannabis sativa*.

Bixa, ae, f., der Orleanbaum (13. Cl. 1. O. [*Polyandria Monogynia*] L.; *Bixaea* nat. F.); z. B. *Bixa orellana* L. — *Bixein*, nach Preiser der dunkelrothe Farbestoff des Orlean, durch den gemeinschaftlichen Einfluss der Luft und des Ammoniaks auf das Bixin gebildet. — *Bixin*, der eigenthümliche, gelbfärbende Stoff des Orlean.

Blamas ist in der Alchemie *Aerugo*.

Blanc de Baleine, franz. Name des Wallrathes. — **Blanc de Plomb**, franz. Name des Bleiweiss.

Blanchinin, ein Alkaloid der *Quina blanca* (*Cinchona ovalifolia*).

Blandissimus, a, um, *adj.*, (*superl.* v. *blandus*), höchst gelinde, sehr gelinde. — **Blandus**, a, um, *adj.*, angenehm, gelinde; z. B. *blando calore*, bei gelinder Wärme.

Blansiropmeter, ein Instrument zur Schätzung der entfärbenden Kraft der Kohle in Bezug auf Säfte etc.

Blastē, es, f., der Keim, der Spross (v. *βλάω* [*blaō*], Auswüchse verursachen). — **Blastēma**, ātis, n., der eigentliche Keim; das Flechtenlager, ein aus kugel- oder röhrenförmigen Zellen zusammengesetztes, organisch vorbereitete, brutfähige Körper entweder durch Beisteuer des mesogonisch-heteromerischen Aktes als Mittelschicht einschliessendes od. zur eigenen Gestaltung durchaus verwendendes Gefüge.

Blatta, ae, f., die Schabe, Motte; die Purpurblatlaus, Cochenille (v. *βλάω* [*blaō*], Schaden verursachen).

Blauöl, s. *Kyanol*. — **Blausalz**, das Blutlaugensalz, eisenblausaure Kali. — **Blauschillerstoff**, ein aus der zur Entfärbung des atropasaur. Kali angewandten Kohle mittelst Alkohol ausgezogener Stoff.

Blé, franz. Name des Weizens.

Blei, *Plumbum*. — **Bleiäthionid**, nach Moberg durch Erhitzen von Bleichlorid mit Zinkäthionid erhalten. — **Bleichlorid** erhält man durch Kochen von Bleioxyd mit Salzsäure, oder durch Fällung einer conc. Bleisalzlösung durch Salzsäure. — **Bleichromat** ist chromsaures Blei. — **Bleicyanür** erhält man durch Fällen von essigsaurem Bleioxyd mit Cyankalium. — **Bleiglätte**, *Lithargyrum*. — **Bleigummi**, nach Berzelius der durch essigs. Blei in der Gummilösung hervorgebrachte Niederschlag. — **Bleijodid** bildet sich beim Niederschlagen eines Bleioxydsalzes mit Jodkalium od. Natrium. — **Bleioxalonitrat**, ein aus einer Verbindung des oxalsauren Bleis mit salpeters. Blei bestehendes Doppelsalz. — **Bleiweiss**, *Cerussa alba* (*Carbonas plumbi*). — **Bleizucker**, *Saccharum Saturni*.

Bletys, eine gewisse Blutegelart.

Blüaden ist in der Alchemie *Chalybs*.

Blichōdes, is, *adj.*, fade, kraftlos.

Blitum, i, n., die Beermelde (1. Cl. 1. O. [*Monandria Monogynia*] L.; *Aizoideae* nat. F.) (v. *βλίτος* [*blitos*], fade, unschmackhaft, daher eigentlich ein fades, unschmackhaftes Kraut). — **Blitus**, a, um, *adj.*, fade, unschmackhaft.

Blume (*Carl Ludw.*), *nom. propr.* eines Botanikers, Direktors des Reichsherbariums in Leyden.

Blutegel (*Blutigel*), s. *Hirudo*

Bochetum, in der Alchemie ein verdünnter Holztrank.

Bocksborn, *Astragalus*.

Boerhaave (*Herm.*), *nom. propr.* eines Prof. der Medicin zu Leyden; geb. 1668, gest. 1738.

Bogbutter, eine sich in den Torfmooren Irlands findende Substanz (v. *Bog*, ein Sumpf, Morast).

Bohemia, ae, f., Böhmen.

Behnen, brasilianische, *Fabae Pichurim*.

Bois blanc, franz. Name des Weissbaums. — Bois de Cerf, franz. Name des Hirschhorns. — Bois de Quassie, franz. Name des Quassien- oder Bitterholzes. — Bois de Régisse, franz. Name des Süssholzes.

Bol, franz. Name des Bolus. — Bol, Bolus.

Bolbiton nennt Hippokrates eine Räucherung aus Kuhdünger gegen Mutterfluss.

Bolbödes, bolboïdes, is, *adj.*, zwiebel förmig.

Boletrin findet sich nicht nur in gewissen Torfarten, sondern auch in fossilem Fichtenholz und den Zellen der frischen Fichtennadeln.

Boletsäure findet sich mit Kali verbunden im *Boletus pseudo-igniarius*.

Bolētus, i, m., der Löcherschwamm eine Pilzgattung (24. Cl. 6. O. [*Cryptogamia Fungi*] L.; *Fungi* nat. F.); z. B. *Boletus igniarius*, der Feuerschwamm; *Bol. laricis*, Lärchenschwamm.

Boletus igniarius, Feuerschwamm (24. Cl. [*Cryptogamia*] L.; *Fungi* Juss., *Hymenini* Fr. nat. F.) (Abbild. s. Winkler Taf. 270). *Polyporus* Fries. Löcherpiltz: *Hut* zähe-fleischig, lederig od. korkig, meist strunklos (selten bestrunkt), aus flockiger, trockener Substanz bestehend, häufig unregelmässig gebildet. Schlauchschicht mit der Substanz des Hutes verschmolzen, mit rundlichen Löchern durchbohrt, in den dünnen Scheidewänden die Sporenschläuche tragend. — *Polyporus fomentarius* Fries. Zunderlöcherpiltz, Zunder-, Feuer- oder Wundschwamm: Strunklos; *Hut* gegen den Grund keilförmig, aussen hart, etwas holzig und nussbraun-grau, innen weich und gelbbraun, gegen den Rand hin ringstreifig; die sehr kleinen Löcher der Schlauchschicht anfangs bläulich-grau, später rostbraun. — Ausser obigen wird auch *Polyporus igniarius* angewendet. Der Schwamm wird durch Kochen in Lauge erweicht, in Salpeterauflösung eingeweicht, getrocknet und stark geklopft. Zum wundärztlichen Gebrauch muss der Schwamm jedoch völlig frei von Salpeter sein.

Boletus Laricis, *Agaricum*, Lärchenschwamm (Abbild. s. Winkler Taf. 269). *Polyporus officinalis* Fries. Gebräuchlicher Löcherpiltz, Lärchenschwamm. Strunklos: *Hut* korkig-fleischig, polsterförmig, sonst verschieden gestaltet, gelb und bräunlich gegürtelt, kahl, mit gelblichen Löchern. — In Asien, im südlichen Europa u. auf den Alpen auf den Stämmen und den alten Aesten der Lärchenfichte wachsend. Durch das Verwachsen der Hüte der Schwämme übereinander entstehen die verschiedenen Gestalten der Schwämme. Beim Einsammeln wird er von der farbigen Rinde befreit, an der Sonne gebleicht u. mit hölzernen Hämmern geschlagen. Je leichter er ist, um desto besser ist er. Der wirksame Bestandtheil ist besonders das in ihm befindliche Harz.

Bolo, ital. Name des Bolus — Bolo armeno, ital. Name des armen. Bolus.

Bolsaben ist in der Alchemie *sal*.

Bölus, i, m., ein Bissen.

Bölus, i, f., (*βῶλος* [*bōlos*]), der Bolus, ein Fossil, dessen Hauptbestandtheil Thonerde ist, das nächstdem aber noch Kieselerde, etwas Kalk und mehr oder weniger Eisenoxyd enthält (kommt offenbar von *βάλλω* [*ballō*], werfen). — Bolus, armenischer, *Bolus armena*.

Bolus alba, weisser Bolus. Er kommt sehr häufig vor und besteht aus Thon-, Kalk- u. Kieselerde, gewöhnlich auch etwas Eisenoxyd. Der reinste, weisseste ist der beste. — Bolus armena (*Argilla ferruginea rubra*), armenischer Bolus. Kam früher aus dem Orient, jetzt aus den Flötzgebirgen Frankreichs u. Deutschlands. Der armen. Bolus in Wasser geweicht, in scheibenförmige kleine Kuchen geformt und mit einem Stempel bezeichnet, giebt, so wie der weisse Bolus die *weisse*, die *rothe Siegelerde*.

Bombay, *Indeel.*, Bombay, Hauptstadt der Insel gleichen Namens im britischen Ostindien.

Bombycinus, a, um, *adj.*, aus Seide, seiden (v. *bombyx*, der Seidenwurm); z. B. *tela bombycina*, ein seidenes Gewebe, seidenes Zeug.

Bonpland (*Aimé*), *nom. propr.* eines franz. Botanikers, bekannt durch seine Reisen mit A. v. Humboldt, gest. 1846.

Bonplandia, ae, f., die Bonplandie (benannt nach dem berühmten Reisenden Bonpland); z. B. *Bonplandia trifoliata*, die dreiblättrige Bonplandie, von welchem Baume die Angusturarinde kommen soll.

Bönus, a, um, *adj.*, gut; z. B. *bonae indolis*, von oder in guter Beschaffenheit.

Bor, Boron, ein, mit Sauerstoff die Bor- od. Boraxsäure, u. als solche mit Natron den Borax bildender einfacher Stoff.

Bora, ein berauschendes, aus Hirse oder Weizen bereitetes Getränk des Orients.

Borace, ital. Name des Borax. — *Borace depurata*, ital. Name des gereinigten Borax. — *Borace nativo*, ital. Name des natürlichen Borax. — *Boracicus*, a, um, *adj.*, aus Borax bereitet, Boraxsäure enthaltend; z. B. *acidum boracicum*, die Boraxsäure; *Natrum boracicum*, boraxsaures Natron. — *Boräs*, älis, m., ein boraxsaures Salz; z. B. *boras natricus*, boraxsaures Natron, der Borax.

Börax, äcis, m., der Borax, ein vorzugsweise von Tibet aus in den Handel gebrachtes, im rohen Zustande Tinkal, im gereinigten aber Borax genanntes Salz. (Das Wort soll ursprünglich arabisch und allmählig von *Bauracon* od. *Baurach* zu Borax verdreht worden sein.)

Borax, Borax (*Natrum boracicum c. aqua, Boras sodae alcalescens, Subboras nitricus*). Vom Borax (welcher zuerst 1772 in einigen in Tibet gefundenen krystallinischen Exemplaren nach Europa kam) unterscheidet man im Handel vorzüglich drei Sorten: 1) den *indischen*, aus kleinen, mehr oder weniger unreinen Krystallen bestehend; 2) den *bengalischen* oder den Borax von Chandernagor, in grossen runden Krystallen, u. 3) den *chinesischen*, der halbrein ist u. aus 4—5 Centimeter dicken, dem Milchzucker ähnlichen Stücken besteht. In neueren Zeiten wird auch ein wohlfeilerer Borax in Frankreich durch Auslaugen der in der Nähe mehrerer warmen Quellen Toscana's sich findenden, Boraxsäure enthaltenden Erdarten, durch Sättigen mit kohlensaurem Natron, direct bereitet. Der gereinigte Borax bildet ziemlich grosse, weisse, feste, halbdurchsichtige Krystalle, die nur selten regu-

läre sechseckige Säulen (s. Krystalle) mit zwei breiten u. einer schmälern Seitenfläche darstellen, mit glänzendem, flachmuscheligen Bruch. Er besteht aus: 36,52 Boraxsäure, 16,37 Natron u. 47,11 Wasser. — Die Auflösung darf mit kohlens. Natron keinen Niederschlag geben, was *Alaun* anzeigt, eben so wenig darf die Auflösung, mit destill. Wasser sehr verdünnt u. mit reiner verdünnter Salpetersäure angesäuert, mit salpetersaurem Silber u. salpetersaurem Baryt keinen Niederschlag geben, da das erstere beigemengtes *Kochsalz*, das andere aber schwefelsaures Kali anzeigen würde.

Boraxatus, a, um, *adj.*, boraxhaltig; z. B. *tartarus boraxatus*, Borax-Weinstein. — **Borax cru**, franz. Name des rohen Borax. — **Borax depurè**, franz. Name des gereinigten Borax. — **Borax**, gereinigter, *Borax venèta*. — **Borax**, natürlicher, *Borax nativus*.

Böréalior, us, *adj.* (*comp.* v. *borealis*), nördlicher. — **Böréalis** e, *adj.*, nördlich, mittlernächtlich. — **Bóreatus**, a, um, *adj.*, nördlich, mittlernächtlich (v. *boreas*, der Nordwind).

Borfluorcalcium wird durch Auflösung von kohlensaurer Kalkerde in Borfluorwasserstoffsäure erhalten. — **Borfluorwasserstoffsäure** entsteht nach *Berzelius* durch Zersetzung des bis zur Sättigung in Wasser gelösten Borsuperfluorids.

Borneen, nach *Gerhardt* der Kohlenwasserstoff des *Baldrianöls*.

Bornéo, Borneo, eine der grössten sundischen Inseln Asiens, nördlich von Java.

Boroazotür, nach *Balmain* durch Aussetzen eines Gemenges von wasserfreier Borsäure mit Metalcyan dem Weissglühen gewonnen.

Borritus wird in der Alchemie auch der *Lap. philosophor.* genannt.

Borse di Muschio, ital. Name des Moschusbeutels.

Börüssia, ae, f., Preussen; eine Provinz im gleichnamigen Königreich, das davon den Namen führt. — **Börüssias**, älis, m., ein blausaures Salz. — **Börüssicus**, a, um, *adj.*, preussisch; z. B. *acidum borussicum*, die Cyanwasserstoffsäure; *ferrum borussicum* (*coeruleum Berlinense*), das Berlinerblau (weil es in Berlin entdeckt ist).

Bos, bövis, c., das Rind, der Ochse (v. *βοή* [*boë*], das Geblöke); z. B. *Bos Taurus*.

Boscas (boschas), ädis, f., die Ente (*Anas boschas* L.) (v. *βόσζω* [*boskō*], weiden).

Bostrychoides, bostrychthyodes, is, *adj.*, lockenförmig, lockenähnlich (v. *βόστρυξ* [*bostryx*], die Locke, u. *εἶδος* [*eidos*], die Gestalt). — **Bostrychthys**, Lockenfisch, eine Fischgattung mit lockigen Bartfäden (v. *βόστρυξ* [*bostryx*], die Locke, u. *ἰχθύς* [*ichthys*], der Fisch).

Bostrychus, i, m., der Borken- u. Rindenkäfer.

Bostryx, f., die Locke.

Boswellia, ae, f., die Boswellie (10. Cl. 1. O. [*Decandria Monogynia*] L.; *Burseraceae* nat. F.) (nach einem indischen Arzte *Boswell* so genannt); z. B. *Boswellia serrata* *Colebrooki*, von welchem Baume das *Olibanum* kommt.

Botäne, die Pflanze. — **Botanologia**, ae, f., die Pflanzenlehre, das Pflanzensammeln (v. *βοτάνη* [*botanē*], die Pflanze, u. *λέγω* [*legō*], lesen). — **Botanica**, ae, f., auch botanice, es, f. (*βοτανική* [*botanikē*], sc. *τέχνη* [*technē*]), die Kräuter- od. Pflanzenkunde. (Die Botanik im engern Sinne gelangt zur Kenntniss der Pflanzen durch mehrere Mittel,

welche eben so viel besondere Theile der Wissenschaft bilden. Ihr Hauptzweck ist, irgend eine Pflanze durch die Betrachtung ihrer Organe u. Charaktere zu erkennen und zu bezeichnen. Zweckentsprechend muss man diese Charaktere erst studiren, nach Namen u. Bedeutung kennen. Dieses macht die botanische Kunstsprache, Terminologie od. Glossologie aus). — **Botanicus**, i, m., ein Botaniker, Pflanzenkenner. — **Botanicus**, a, um, *adj.*, botanisch; z. B. *hortus botanicus* ein botanischer Garten.

Bothrium (bothron), i, n., eine kleine Grube, das Grübchen. — **Bothros**, m., die Grube, der Graben.

Botos, m., die Weide, das Futter.

Botris, franz. Name des mexikanischen Traubenkrautes.

Botrydion, i, n. (*Dimin.* v. *botrys*), eine kleine Traube, ein Träubchen. — **Botryites** (botryitis), *adj.*, traubenförmig, traubenartig. — **Botryoides** (botryoides), *adj.*, traubenförmig.

Botryogen, rother Vitriol.

Botryon (botryum), i, n., die Traube. — **Botrys**, ὄσος, f., 1) die Traube, 2) das Traubenkraut; z. B. *Botrys mexicana*, das mexikanische Traubenkraut v. *Chenopodium ambrosioides*. — **Botrytes**, der Blumenkohl.

Bötulus, i, m., eine Fleischwurst, Blutwurst.

Bouillon blanc, franz. Name der Königskerze.

Bousserole, franz. Name der Bärentraube.

Bovinus, a, um, *adj.*, das Rind, den Ochsen betreffend, davon herührend; z. B. *sebum bovinum*, Rindstalg.

Brabyla, ὄrum, n., Schlehen, schlechte saure Pflaumen. — **Brabylus** (brabylus), i, m., der Schlehenstrauch, wilder Pfirsichbaum.

Brachiatus, a, um, *adj.*, armförmig; z. B. *caulis brachiatus*, ein armförmiger Stengel. — **Brachium**, i, n., der Arm; die Elle.

Brachylogia, ae, f., die kurze Darstellung wissenschaftlicher Gründe, der bündige Vortrag, die Bündigkeit (v. βραχύς [brachys], kurz, u. λόγος [logos], die Rede). — **Brachynsis**, is, f., die Verkürzung. — **Brachynticus**, a, um, *adj.*, zum Verkürzen tauglich, dazu geschikt (v. βραχύνω [brachynō], verkürzen). — **Brachyotus**, a, um, *adj.*, kurzohrig (v. βραχύς [brachys], kurz, u. οὖς [ūs], das Ohr). — **Brachypterae**, ārum, f. (aves), Kurzflügel, Kurzflügler; die hühnerartigen Vögel mit kurzen Flügeln (v. βραχύς [brachys], kurz, u. πτέρυξ [pteryx], der Flügel). — **Brachys**, kurz. — **Brachytes**, is, f., die Kürze. — **Brachyticus**, a, um, *adj.*, durch Verkürzung entstanden.

Bractea, ae, f., 1) ein dünnes, metallenes Blech, das beim schnellen Biegen ein Geräusch macht (v. βράζω [brazō], rasseln, prasseln); 2) das Deckblatt, Afterblatt, Nebenblatt, ein blattartiger Pflanzentheil, der in der Nähe der Blume steht, sich von den übrigen Theilen durch eine andere Farbe unterscheidet, wie bei der Linde (*Tilia europaea*). — **Bracteaator**, ōris, m., der Goldschläger. — **Bracteatus**, a, um, *adj.*, mit Deckblättern versehen, deckblättrig; z. B. *racemus bracteatus*, eine nebenblättrige Traube. — **Bracteola**, ae, f. (*Dimin.* v. *bractea*), das Deckblättchen. — **Bracteam**, i, n., ein Deckblatt.

Bradypus, ōdis, m., das Faulthier (v. βραδύς [bradys], langsam, u. πούς [pūs], der Fuss).

Brat sec, franz. Name des Kolophoniums.

Branchia, ōrum, n., die Fischkiemen. — **Branchiobdella**, ae, f.,

der Schmarotzregel, eine an den Kiemen u. andern Theilen der Fische, Krebse u. s. w. vorkommende Egelart (v. *βράγχια* [*branchia*], die Kiemen, u. *βδέλλα* [*bdella*], der Blutegel). — Branchiodes, branchioides, *adj.*, kiemenartig (v. *βράγχιον* [*branchion*], die Flossfeder, u. *εἶδος* [*eidos*], die Gestalt). — Branchion, branchium, *i, n.*, die Flossfeder. — Branchios, branchius, *a, um, adj.*, mit Kiemen versehen. — Branchos, eos, *n.*, die Fischkieme.

Brasilein, der geröthete Farbstoff des Brasilienholzes — Brasília, *ae, f.*, Brasilien, südamerikanischer Kaiserstaat. — Brasiliensis, *e, adj.*, aus Brasilien, brasilianisch; z. B. *cortex adstringens brasiliensis*, brasilianische zusammenziehende Rinde, v. *Pithecollobium Auaremotomo*. — Brasilin, Fernambuckgelb, Farbstoff des Holzes der *Caesalpinia cristata*.

Brasma, *ätis, n.*, das Brausen oder Aufbrausen im Kochen (v. *βράζω* [*brazō*], brausend kochen, brauen).

Brassicä, *ae, f.*, der Kohl (15. Cl. 2. O. [*Tetradynamia Siliquosa*] L.; *Cruciferae* nat. F.) (v. *βράττειν* [*brattein*], verschlingen); z. B. *Brassica Napus*, der Rübsamen (Raps).

Braunit ist Manganhyperoxydul.

Braunstein, *Magnesia vitrariorum*.

Brean, nach Fr. Scribe das zweite krystallisirbare Harz, geschieden in *Storax de Cajenne* (gewonnen von einer Gattung *Icica*).

Brechkopfbeere, *Cephaelis Ipecacuanha*.

Breïn, ein im Harze des *Arbre de Brai* enthaltenes eigenthümliches Salz.

Brennkraut, *Clematis*. — Brennessel, *Urtica urens*.

Brenzcatechusäure, die bei trockner Destillation des Catechu erhaltenen nadelförmigen Prismen. — Brenzschleimsäure (*acid. pyromucicum*) erhält man durch trockne Destillation der Schleimsäure. — Brenztraubensäure, eine sich bei der Destillation der Traubensäure entwickelnde neue eigenthümliche Säure.

Brëvis, *e, adj.*, kurz, klein, wenig; z. B. *radix brevis*, eine kurze Wurzel. — **Brëvissime**, *adv.*, sehr kurz, geschwind. — Brëvissimus, *a, um, adj.* (*superl. v. brevis*), sehr kurz. — Brëvitas, *ätis, f.*, die Kürze, Kleinheit. — Brëviter, *adv.*, kurz.

Breyn (Jacob), *nom. propr.* eines Kaufmanns u. Botanikers in Danzig; starb 1697.

Brint, dänischer Name des Wasserstoffs.

Brionin, scharf bitterer Extractivstoff in der Zaurübe (*Bryonia alba* L.).

Brittanicus, *a, um, adj.*, englisch; z. B. *Inula brittanica*, der britische Alant.

Briza, *ae, f.*, 1) eine Getreideart der Thrakier u. Makedonier, wahrseheinl. unser Roggen (*Secale cereale*); 2) das Zittergras (3. Cl. 2. O. [*Triandria Digynia*] L.; *Gramineae Festucaceae* nat. F.).

Brizoceras, *ätis, n.*, das Mutterkorn (v. *βρίζα* [*briza*], der Roggen, u. *κέρας* [*keras*], das Horn).

Brochus, *i, m.*, die Schlinge.

Brodium, *i, n.*, die Brühe.

Bröma, *ätis, n.*, das Genossene, die Speise (v. *βρώω* [*broō*], annehmen, verzehren, essen).

Bröma, *ätis, bromum, i, n.*, das Brom, (nach Balard) der sehr

übelriechende eigenthümliche Stoff des Meer- u. Salinensalzes. — Bromätherid, siehe *Bromoform*. — Bromal, ein durch die Einwirkung des salpetersauren Aethers auf Brom entstandener neuer Stoff. — Bromaldehyd bildet sich bei Einwirken von Kali auf Bromkohlenwasserstoff, wenn beide in Alkohol gelöst sind. — Bromalhydrat bildet sich beim Aussetzen des Bromals an die Luft.

Bromameter (Bromatometer), der Speisemesser zum Auffinden der für den Körper passenden Menge der Nahrung (v. *βρώμα* [*brōma*], die Speise, u. *μέτρον* [*metron*], das Mass).

Bromanilin (Anabrophinese) entsteht durch Einwirkung des Anilins auf Brom. — Bromaniloid erhält man durch Zusatz von Bromwasser zu einer wässrigen Lösung eines Anilinsalzes. — Bromanisal, eine Verbindung des Broms mit Anisstearopten.

Bromatium, i, n., eine feine leichte Speise, eine kleine Mahlzeit. — Bromatödes, bromatöides, *adj.*, 1) einem Nahrungsmittel ähnlich; 2) stinkend, böckig. — Bromatographia, *ae, f.*, die Beschreibung der Nahrungsmittel (v. *βρώμα* [*brōma*], die Speise, u. *γράφω* [*graphō*], schreiben) — Bromatologia, *ae, f.*, die Nahrungsmittelkunde (v. *βρώμα* [*brōma*], die Speise, u. *λόγος* [*logos*], die Lehre). — Bromatologicus, a, um, *adj.*, zur Nahrungsmittelkunde gehörig, dieselbe betreibend.

Brombenzin, eine Verbindung des Broms mit Benzin unter Einwirkung des Sonnenlichts. — Brombenzoyl entsteht durch Einwirkung des Broms auf Benzoylwasserstoff. — Bromcyan bildet sich beim Vermischen des feuchten Cyanquecksilbers, oder wässriger Blausäure mit Brom. — Bromdraconesinsäure wird aus Brom u. Draconsäure unter Behandlung von Alkohol dargestellt. — Bromethionessile, eine Verbindung des Broms mit Thionessale. — Bromexanthion entsteht durch Vermischung der Brom- u. Chloreuxanthionsäure mit Wasser. — Bromindamit u. Bromindopten, zwei durch Einwirkung des Broms auf Indigblau entstehende Verbindungen. — Bromjodoform bildet sich bei Behandlung des Jodoforms mit Brom. — Bromisatin entsteht durch Auskochen des mit Brom behandelten Indigs, wobei auch Bibromisatin entsteht.

Brömödes, *adj.*, geräuschvoll.

Brömödes, *adj.*, übelriechend.

Bromoform (Bromätherid) bildet sich bei Einwirkung des Bromkalks auf Alkohol od. Essiggeist.

Bromographia, *ae, f.*, die Beschreibung der Bromusarten. — Brömus, i, m., 1) das Geräusch, der Lärm (v. *βρέμειν* [*bremein*], schreien); 2) der Hafer; die Trespe (3. Cl. 2. O. [*Triandria Dignia*] L.; *Gramineae-Festucaceae* nat. F.).

Bromohelicin bildet sich, wenn ein Gemisch von reinem Helicin u. Wasser in eine Flasche, worin Brom befindlich, gegossen u. dann geschüttelt wird. — Bromosalicylsäure, das sich bei Einwirkung des Broms auf Salicylsäure aus der harzigen, in siedendem Wasser gelösten Masse absetzende Pulver. — Bromoxaform, eine durch die Einwirkung des Broms auf citronsäures Kali entstehende Substanz. — Bromspyroyl bildet sich beim Vermischen des Spiräols mit Brom. — Bromspyroylsäure entsteht, wenn man Brom in Gasgestalt über Spiräure leitet.

Bromum, Brom (*Murid*). Es wurde 1826 von Balard entdeckt und aus der nach der Krystallisation des Kochsalzes übrigbleibenden Mutterlauge der Salinen zu Montpellier erhalten. Es findet sich

fast in allen Salzquellen Deutschlands, so wie auch im Meerwasser (besonders bedeutend in dem des todtten Meeres), in Seepflanzen u. Seethieren (Badeschwamm etc.), ferner in den schlechten Sodasorten neben Jod, im Kochsalze, als gewöhnlich mit Bittererde u. Natron verbundene *Hydrobromsäure*. Das Brom hat in Masse eine dunkelrothe, in dünnen Schichten eine hyacinthrothe Farbe, chlorähnlichen Geruch und scharfen zusammenschumpfenden Geschmack. Bei 20° R. erstarrt es zu einer harten, spröden, leicht pulverisirbaren Masse von fast metallisch glänzender bleigrauer Farbe. Uebrigens zeigt es sich in seinem chemischen Verhalten ganz dem Chlor ähnlich.

Brömus, i, m., der Gestank.

Bronchina, ae, f., bronchĭnum, i, n., das Bronchin (die Quellsäure?), nach v. Vesl ein vermeintlich in den Wässern der Alptäler gefundener Stoff, der den Kropf, Kretinismus u. s. w. veranlassen soll (v. *bronchia*, die Luftröhrenäste). — **Bronchinicus**, a, um, adj., bronchinsauer (quellsauer?). — **Bronchinosus**, a, um, adj., bronchinigsauer.

Bronchocèle, es, f., der Kropf (v. βρόγχος [*bronchos*], die Luftröhre, u. κήλη [*kēlē*], der Bruch). — **Bronchus**, i, m., die Keule, Luftröhre.

Brösis, is, f., das Fressen, Zerfressen (v. βιβρώσκω [*bibrōskō*], annagen).

Brotero (*Fel. Alavar*), nom. propr. eines Vorstehers des königlichen Gartens zu Lissabon, gest. 1829.

Brotes, sterblich.

Broux de Noix vert, franz. Name der grünen Nusschale.

Brown (*Rob.*), nom. propr. eines Botanikers in London.

Bruchweide, *Salix fragilis*.

Brucinum, **Brucium**, i, n., das Brucin, Caniramin, Carinamin, eine in den Samen von *Strychnos Nux vomica* (den Krähenaugen), neben Strychnin, befindliche organische Base, die auch in der Rinde der *Brucea ferruginea* enthalten u. die dem Botaniker James Bruce zu Ehren so benannt worden ist.

Bruma, ae, f., das Wintersolstitium, der kürzeste Tag; die dunklere u. kalte Zeit des Jahres, der raue Winter. — **Brumalis**, e, adj., das Wintersolstitium betreffend.

Brunnenkresse, *Sisymbrium Nasturtium*. — **Brunnenwasser**, *Aqua fontana*.

Brunneo-cinereascens, tis, adj., weissgelblich-äschgraubraun. — **Brunneo-flavens**, tis, adj., gelblich-braun. — **Brunneo-fuscus**, a, um, adj., kaffee-tiefbraun; dunkel tiefbraun. — **Brunneo-luteus**, a, um, adj., gelbbraun. — **Brunneo-niger**, a, um, adj., schwarzbraun. — **Brunneo-nigrescens**, tis, adj., schwärzlich-braun. — **Brunneo-nigricans**, tis, adj., schwärzlich-braun. — **Brunneo-olivaceus**, a, um, adj., olivengrün-braun. — **Brunneo-purpureus**, a, um, adj., purpurroth-braun. — **Brunneo-rubellus**, a, um, adj., röthlich-braun. — **Brunneo-rubens**, tis, adj., röthlich-braun. — **Brunneo-ruber**, a, um, adj., rothbraun. — **Brunneo-virens**, tis, adj., grünlich-braun. — **Brunneo-viridis**, e, adj., grünbraun. — **Brunnescens**, tis, adj., bräunlich. — **Brunnesco**, ere, braun werden, sich bräunen. — **Brunneus**, a, um, adj., braun; z. B. *lucide brunneus*, hellbraun.

Brunolsäure, eine aus dem über Kupferoxyd rectificirten Steinkohlölenöl abgeschiedene Säure.

Brunozar ist in der Alchemie *aurum*.

Brunus, a, um, *adj.*, braun.

Brunsvicensis, e, *adj.*, braunschweigisch, braunschweiger, von Braunschweig.

Brustbeerbaum, rother, *Rhamnus Zizyphus*.

Brutol, s. *Chronizoide*.

Bryasparägi, örüm, *m.*, die Hopfensprossen (v. βρύον [bryon], der Hopfen, u. ἀσπαράγος [asparagos], was viel sprosst).

Brygma, ätis, *n.*, das Abgebissene, Abgenagte.

Bryologia, ae, *f.*, die Lehre von den Laubmoosen, die Laubmooskunde (v. βρύον [bryon], das Laubmoos, u. λόγος [logos], die Lehre).

Bryon, i, *n.*, der Hopfen.

Bryonia, ae, *f.*, die Zaurübe, Gichrübe (21. Cl. 8. O. [Monoecia Monadelphica] L.; Cucurbitaceae nat. F.) (v. βρύω [bryō], umher wuchern).

Bryoplasta, örüm, *n.*, die Keimungen, Parasiten (v. βρύω [bryō], strotzen, überquellen, umherwuchern, u. πλάσσω [plasso], bilden, formen).

Bryolatūra, örüm, *n.*, (nach B é r a l) die Bierauszüge, Arzneibiere, aus Wurzeln u. s. w. durch Maceration mit Bier bereitet. — **Brytolēa**, örüm, *n.*, (nach B é r a l) die Bierauflösungen zu arzneilichem Gebrauch. — **Brytolica**, örüm, *n.*, (nach B é r a l) die Bierverbindungen zum arzneilichen Gebrauch. — **Brytolotiva**, örüm, *n.*, (nach B é r a l) die Bierlösungen zu arzneil. Waschungen, Klystieren u. s. w. (v. βρύτον [bryton], das Bier). — **Brytum**, i, *n.*, od. brytus, i, *m.*, ein moussirendes, sprühendes Gerstenbier, ein Bier aus gekeimter Gerste (v. βρύω [bryō], keimen).

Bryum, i, *n.*, ein Moos; das Laubmoos (v. βρύω [bryō], sprossen).

Bubälis, Idis, *f.*, eine afrikanische Gazellenart.

Bubälus, i, *m.*, der Büffelochs, Büffel (v. βοῦς [būs], der Ochse).

Bubon, Bubon (5. Cl. 2. O. [Pentandria Digynia] L.; Umbelliferae nat. F.); z. B. *Bubon Galbanum*.

Bubonium, i, *n.*, ein Mittel gegen Bubonen od. Leistenbeulen.

Bubälus, a, um, *adj.*, von Rindern, das Rind betreffend.

Bucca, ae, *f.*, der Backen.

Bucco, auch buccu, buchu od. buku, der Hottentottenthe, die Blätter von *Barosma crenulata* Willd. (*Diosma crenulata* L.) (5. Cl. 1. O. [Pentandria Monogynia] L.; Rutaceae nat. F.) (Das Wort ist die Bezeichnung der Pflanze in der Sprache der Hottentotten.)

Bucēras, ätis, *n.*, griechisch Heu, *Trigonella Foenum graecum*, Bockshorn (v. βοῦς [būs], der Ochse, u. κέρας [keras], das Horn).

Bucēros, ötis, *m.*, ein Hornvogel, eine Vogelart mit sehr langem u. mit einem hornartigen Helm besetzten Schnabel (v. βοῦς [būs], der Ochse, u. κέρας [keras], das Horn).

Buchanin, ein eigenthümlicher Stoff der Pflanze *Luffa purgans* [Monardica Buchna] in Brasilien.

Buchārus, i, *m.*, ein Buchar (tartarischer Völkerstamm in Mittelasien).

Buenin, eine bittere, geruchlose Substanz in der Rinde von *Buena hexandra*.

Buettneriaceae, ärum, *f.*, eine Pflanzenfamilie mit wechselnden Blättern, einblättrigem Kelche, vor dem Blühen zusammengewickelten

Blumenblättern, Staubfäden, die alle oder in Haufen verwachsen sind, fünf getrennten u. in eins verwachsenen Früchtchen, blattartigen Samenhüllen oder albumenlosen, sehr dicken Samen. (Den Namen hat sie dem Botaniker u. Prof. zu Göttingen, Buettner, zu Ehren).

Buglossum (buglösson), i, n., die Ochsenzunge (v. βοῦς [būs], der Ochs, u. γλῶσσα [glōssa], die Zunge).

Bulatrīca, ae, f., die Rindviehheilkunde (v. βοῦς [būs], das Rind, u. ἱατρική [iatrikē], die Heilkunde).

Bulapāthum, i, n., eine Art Sauerampfer, eine Art grosser Rüben (v. βοῦ [bū], gross, od. βοῦς [būs], der Ochs, u. λάπαθον [lapathon], eine Ampferart).

Bulbiceps, cipītis, adj., zwiebelköpfig. — **Bulbiferus**, a, um, adj., zwiebeltragend. — **Bulbilli**, ōrum, m., Nebenzwiebeln, Zehen des Knoblauchs.

Bulbocastānum, i, n., die Erdnuss (v. βολβός [bolbos], die Knolle, u. κάστανον [kastanon], die Kastanie, ihrer kastanienähnlich schmecken sollenden Wurzelknollen halber).

Bulbōsus, a, um, adj., zwiebelartig, zwiebelig, knollig, mit Zwiebeln od. Knollen versehen; z. B. *Chaerophyllum bulbosum*, der knollige Kälberkropf. — **Bulbūlus**, i, m., (Dimin. v. *bulbus*), eine kleine Zwiebel, eine kleine Knolle. — **Bulbus**, i, m., die Knolle, Zwiebel (eine Wurzel, die aus fleischigen Häuten besteht, die einen festen Grundkörper den Keim, umschliessen).

Bulōsis, is, f., das Wollen, das Willensvermögen, der Wille.

Bulla, ae, f., die Blase, Wasserblase (die Erscheinung nämlich, welche das Kochen der Flüssigkeit begleitet) (v. βύλλω [byllō], schwellen oder quellen machen). — **Bullātus**, a, um, adj., blasig; z. B. *folium bullātum*, ein blasiges Blatt. — **Bulliēns**, tis, adj., siedend, kochend, blasenwerfend; z. B. *solve in aqua bulliente*, löse es in kochendem Wasser auf. — **Bullio**, ūvi, itum, ūre, Blasen werfen, kochen, siedend, sprudeln. — **Bullitio**, ōnis, f., das Kochen.

Bundsalat, *Lactuca sativa*.

Bunium, i, n., 1) bei den alten Griechen die Wurzelknollen verschiedener Pflanzen; 2) eine Pflanzengattung (5. Cl. 2. O. [*Pentandria Digynia*] L.; *Umbelliferae* nat. F.); z. B. *Bunium Bulbocastanum*, die Erdnuss.

Bupleurum, i, n., das Hasenöhrchen, die Ochsenrippe (5. Cl. 2. O. [*Pentandria Digynia*] L.; *Umbelliferae* nat. F.) (v. βοῦ [bū], gross, od. βοῦς [būs], der Ochs, u. πλευρά [pleura], die Rippe).

Buprestis, ūdis, f., der Prachtkäfer (v. βοῦ [bū], gross, oder βοῦς [būs], das Rind, u. πρήστις [prēstis], die Säge).

Bur, nach Helmont ein mineralischer Saft.

Burcolaccas, atis, m., der Vampyr.

Burgūdicus, a, um, adj., burgundisch; z. B. *resina burgundica*, burgundisches Harz.

Burro, ital. Name der Butter.

Bursa, ae, f., der Beutel, die Börse, ein abgezogenes Fell. — **Bursālis**, e, adj., zu einem Beutel gehörig.

Burseracēae, ārum, f., eine Pflanzenfamilie mit Zwitterblüthen, fünftheiligem, bleibendem Kelche, fünf Blumenblättern, zehn Staubfäden auf einem gekerbten Perigyn, einem Griffel, einer dreikantigen, dreiklappigen, dreifächerigen Kapsel. Hierher gehört *Icica Icariba* Dec., von

der das Elemi kommen soll. — Burserin, das Unterharz des Balsams von *Hedvigia balsamifera*.

Buscatina, ae, f., *buscatinum*, i, n., die Buscatine, das Buscatin, der wahrscheinlich besonders darstellbare eigenthümliche Rindskothstoff, der den Rindviehställen ihren eigenthümlichen Geruch giebt (v. βοῦς [būs], das Rind, u. οὐρ [shūr], der Koth).

Buscorina, ae, f., *buscorinum*, i, n., die Buscorine, das Buscorin, = *Buscatina*.

Butiro, ital Name der Butter.

Butōmus, i, m., die Igelknospe, Igelkolbe, eine Sumpfpflanze (9. Cl. 3. O. [*Enneandria Trigynia*] L.; *Hydrocharideae* nat. F.) (v. βοῦς [būs], das Rind, u. τῶμα, τέμνω [tomō, temnō], schneiden, weil sich wahrscheinlich das Vieh zuweilen daran verletzt).

Butter, *Butyrum*. — *Būtyraceus*, a, um, adj., butterartig, v. butterartiger Consistenz; z. B. *oleum butyraceum*, ein butterartiges Oel. — *Butyral*, nach Chancel eine durch Behandlung grösserer Quantitäten buttersauren Kalks u. fractionirte Destillationen erhaltene Flüssigkeit. — *Butyramid*, v. Chancel erhalten durch Vermischung von Buttersäureäther mit Ammoniak u. Eindampfen nach achtstündigem Stehen auf ein Drittheil. — *Butyrine*, *Butyryn*, eine die Buttersäure enthaltende Substanz in der Butter. — *Butyron*, eine aus buttersaurem Kalk durch Destillation erhaltene Flüssigkeit. — *Butyron-Salpetersäure*, von Chevreult durch Einwirkung der Salpetersäure auf Butyron dargestellt. — *Būtyrum*, i, n., die Butter. (Das Wort kommt aus dem Griechischen v. *βοῦτυρον* [būtyron], vielleicht entstanden aus βοῦς [būs], Rindvieh, u. τυρός [tyros], wenn man letztes nicht gerade Küse übersetzt, sondern es von τυρῶ [tyrō], reiben, rühren, ableitet, also etwas Gerührtes, durch Rühren entstandenes; *βοῦτυρον* [būtyron] aber ein zunächst durch Rühren entstandenes Product vom Rind). — *Butyrum Antimonii*, Spiessglanzbutter, eine Verbindung von Chlor mit Antimon, die im wasserfreien Zustande von dicklicher Consistenz ist.

Buxina, ae, f., *buxinum*, i, n., das Buxin, ein eigenthümlicher (v. Faure) in allen Theilen v. *Buxus sempervirens* gefundener kaloëdischer Stoff. — *Buxus*, i, f., der Buchsbaum (21. Cl. 4. O. [*Monoecia Tetrandria*] L.; *Tricocceae* nat. F.); z. B. *Buxus sempervirens*.

Buyn, ein Kauprodukt in Persien, aus Areca-Nuss bestehend, die mit Betelblättern u. etwas Kalkpulver zusammengerollt wird.

Byrsodepsicus, a, um, adj., zum Gerben gehörig; z. B. *principium byrsodepsicum*, der Gerbstoff, das Tannin. — *Byrsodepsis*, is, f., das Gerben (v. βύρσα [byrsa], ein abgezogenes Fell, u. δέψις [depsis], das Gerben).

Bysma, ālis, m., das Verstopfende, der Stöpsel, das Ausstopfende.

Byssacēus, a, um, adj., schimmelartig; z. B. *radix byssacea*, eine schimmelartige Wurzel. — *Byssus*, i, f., 1) die Baumwolle; feiner Flachs; die feine Seide der Seidenmuschel; 2) die aus dergleichen Materialien verfertigten feinen u. daher auch dichten Zeuge, wie seine Leinwand u. dergl.; Wundfäden, sog. Charpie. — *Byssi*, ōrum, f., der Schimmel.