

IOHANNIS

PRÆVOTII.

MEDICINA PAV.

PER V M.

Sivè

DE REMEDIIS

Facile Parabilibus.

Tractatus.



D E

MEDICINA PAUPERVM

Sivè,

DE MEDICAMENTIS
Facile parabilibus.

Q Vicumq; medendi arte clau-
ruerunt, atq; ex humana
salutis custodia magnam
sibi apud omnes gratiam
compararunt; prima exi-
stimationis suae fundamenta in pauperum
tabernis iecisse videntur. Cum enim me-
dicum duo precipue commendent, curandi
peritia & eximia in agros charitas sine qua
vix esse potest aliena calamitatis tanta com-
miseratio, quae ad ferendum auxilium an-
xiè quemquam sollicitè: utrumque est e-
iusmodi, ut divitibus atque Principibus fa-
cile probari non possit medicum, nisi frequen-
ti pauper-

pauperum medicatione se talem esse prius ostenderit. Nam quibus res illa omnes affluunt, quarum penuria vitam reddit alius minus caram: suspecta est mederi incipientium peritia, qua multis experimentis ac praeclaris curationibus popularium hominum testimonio evulgatis non innotuerit: isque solus non agere persuadebit divitibus, ad quos accersitus fuerit, se morbi, & non propriis commodi, lucrique causam serio suscepisse, qui multis egestate pressis strenuam operam aliquando navaverit, atque illorum consuetudine humaniter cum agris agere didicerit. Qua causa est, cur medicam artem addiscentibus, atque ex eius professione famam, commodaque ingentia quarentibus illud in primis curae esse debeat, ut bene medendi praecepta acriter studio cognita infirmis fortis hominibus agrotantibus applicare sciunt, indeque primas artis exercitationes feliciter auspicentur. Quae in re non parum obstat medici conatibus fortuna tenuitas, qua non modo idonea ad tuendum agri robur alimenta, sed etiam accommodata ad sedationem medicamentis comparari saepe vo-

tat; adeo ut ex pharmacopolarum officinis
 nihil peti possit, ne levi sumptu grave pau-
 pertati vulnus infligatur. novaque miseria,
 ad priorem morbum fiat accessio. Providit
 tamen natura liberalitas pauperum neces-
 sitatibus, multas medicamentorum materi-
 as, quæ, & ubique locorum obvia sunt, &
 levi artificio preparata ad omnem usum a-
 ptari possunt, in quibus non minus exercita-
 tum debere esse medicum ac in iis, quæ divi-
 titibus conveniunt, scribit Galenus 6. de com-
 pos. medic. per loca c. 1. præsertim cum ob-
 via illa remedia non tam utilia sint pauper-
 culis, quam necessaria divitibus iter facien-
 tibus si fortè procul ab urbibus, & Pharma-
 coporum frequentia, atque presidio in mor-
 bum inciderint.

De his ergo remediis, quæ Latinis, facile
 parabilia. Græci *συνόπιστα* dicuntur præsens
 erit hæc tractatio in duas divisa partes, qua-
 rum altera materiam obviorum medica-
 mentorum omni agnitudinum generi conse-
 rentium exhibebit: Altera modum ostendet
 singula expedire. absque labore, & sumptu
 preparandi, quando sincera usui esse non po-
 terunt.

MA-

M A T E R I A

*Medicamentorum facillè præ-
parabilem.*

IN recensendis medicamen-
tis facillè parabilibus, cōue-
nientissimus est ordo exe-
cutionis, remediorum me-
thodo inventorum, ut sciat
unusquisque expeditè proferre ma-
teriam, principio, aut progressu cu-
rationis eligendam. Cum igitur re-
medium à causa morbi indicatum,
inventione quidem ultimum, sed e-
xecutione sit primum, atque ante o-
mnia causa tolli debeat, ut tandem
morbus expugnari valeat. 7. meth.
cap. 12. Primum sibi locum jure me-
ritò vendicabunt medicamenta ad-
versantia causæ morbificæ, quæ va-
ria sunt pro varietate causæ. Alia e-
nim materiam copia peccantē mi-
nuunt, vacuantque: alia deficientem
augent; alia pravam ejusdem
qua-

qualitatem corrigunt : alia intempestivum motum, inhibent : aut viciosam quietem ad naturalem motum revocant : alia denique causas toto genere præter naturam, & substantiam, ut ajunt, peccantes extirpant.

A *Vacuantiis* exordiendum, eoque magis, quòd pauperes ob victus pravitatem pluribus abundant excrementis, quam divites : ac proinde ex cacoehymia frequentius morbos incurrunt, quam ex plenitudine.

Vacuantia porro alia materiam sensibilibiter evocant per aluum, vomitum, urinas, sudorem, sputum, palatum, nares : alia insensibilibiter digerunt, & in halicum vertunt ; quibus in curatione locus est, post sensibilem evacuationem.

VACVANTIA PER.

ALVVM.

Horum alia respiciunt impuritatem primarum Viarum, neque ultra

ultra mesenterii vicinam regionem vires suas exserunt, & lenientia dicuntur: Alia secundam, & tertiam regionem corporis expurgant, purgantiaque, & cathartica appellantur.

Alui lenitio fit assumptis per os, injectis per clysteres, & suppositis glandibus.

Quæ assumuntur duplicis sunt generis; alia enim ventrem strenuè laxant, indeque excrementa educunt: Alia debilius agunt, quibus præcipuè utendum est ad lubricam aluū detinendam, ne excrementa naturalia primæ coctionis nimis diu detineantur.

STRENVE LAXANT IN CAUSA biliosa.

Serum lactis depuratum bibitum à ℥b. iij. ad viij. intervallo unius horæ: Fit efficacius dissoluta in primo cyatho salis communis ℥i.

Aqua

Aqua hordei non decorticati, præfertim decocta cum passulis, & prunis à lb. ij. ad vj. pota spatio semihoræ.

Viola purpurea recens succus ab ℥j. ad ℥ij. cum cyatho aquæ hordeaceæ, vel fontanæ.

Rosarum pallidarum succus eodem modo haustus.

Cucurbita sativa succus leviter coctus cum quarta parte mellis, & pauxillo salis ab ℥iij. ad ℥v.

Hæc omnia corrigantur maceratione absynthii, si debilem ventriculum contingat bile repleti.

Succus cichorei depuratus ab ℥iij. ad v. & vj.

Oleum commune bene maturum cū triplo aquæ fontanæ coctum ad humiditatis consumptionem: ab ℥iij. ad ℥vj. per se bibitum.

Cerasi, aut Persici flores recentes P. j. in acerario sumpti

Rose Moschettæ Num. iij. in acerario sumptæ, maximè si rose adhuc madrant.

Pru-

Pruna dulcia Num. xij. leviter co-
cta ex aqua mellis.

Potest ex prunis parari rob instar
sapæ, exigui sumptus, & admodum
gratum.

℞. *Prunor. dulcissim.* ℥i.

Siliquar. dulc. minutim incis,
℥iij.

Aq. font. vel. Vin. alb. subdulc.

℥iiij.

F. decoctio lento igne, donec ma-
teria utcumque inspissetur, tum per
seta ceum traiciatur, rursusque bul-
liat ad consistentiam sapæ, cuius ex-
hibeatur pro iusta purgatione ℥jss.
circiter, vel sola, vel cum aquæ cya-
tho: potest ulteriori decoctione in-
spissari in formam electuarii, pro il-
lis, qui tantum bolos assumunt, sed
addenda est quarta pars mellis, ut a-
liquamdiu servetur incorruptum
& datur ab ℥j. ad

℥xij.

IN

IN CAUSA PITUITOSA.

Sacchari rubri ℥i. ex jure pulli, aut
Aq. coriandror.

Sacchari fini ℥ss. usque ad ℥ij. eodē
modo propinati.

Mulsa Plena non cocta ab ℥viii. cir-
citer ad lb i. Corrigenda est eius fla-
tulencia sem. fenicul. Anis. aut Co-
riand.

Vinum dulce cum 3. parte mellis
crudi ab ℥iiij. ad ℥viii. addiris quoq;
semin. odoratis, ne ventrē distendar.

Fanugraci decoctum cum melle.

Mercurialis olerum more esa, præ-
cipuè condita oleo, & sale.

Eius decoctum ab ℥iiij. ad vj. ad-
dito sale.

Hyssopi, vel pulvis à ℥ii. ad iiii. cum
oxymelite; vel decoctio m. i. circiter
data cum oxymelite.

Tartari crudi pulvis à ℥ss. ad ℥ii.
ex iure galli, vel mulsa, vel decocto
hyssopi, aut polii.

Rosina laricina illota à zi. ad ℥v.
in bolo, vel pillulis.

In

In hunc finem parari potest oxymell laxativum efficax hunc in modum.

R. Mercurial. spicat. seu farina M. ij.

Absinth. communis M. i.

Mellis lb. i.

Aq. fontan. lb. iii.

Bulliant lento igne ad perfectam despumationem mellis, dein adde

Hysopi

Folii an. M. i.

Acet. opt. lb. ss.

Iterum bulliant ad consistentiam oxymelitis, & F. Colatura, cuius dentur ℥iij. ad ℥vi. per se, vel cum iure.

Sunt quoque obvia, & exigui sumptus pillulæ de aloë lota, dantur à ℥i. ad ℥ii. circiter. Scribit Garzias ab orro, si folia aloës concisa coquantur cum modico salis, eorum decocto ad ℥viii. circiter alvum quater, aut quinquies innoxie subduci.

IN CAUSA MELANCH.

T Artarum modo iam dicto usurpatum

Eius

Eius cremor à ℥j. ad ℥iij. cum jure
Extartato, cum momento senæ
gratia stimuli fiet pulvis efficax, hac
ratione.

℞. Tartari crud. el. ℥. j.

Fol. senæ ℥j.

Sem. Anis. vel fœnic. aut Cinam.

℥℔.

Sachar. ff. ℥℔.

M. pro j. Dosi.

Fumaria in umbra siccata pulvis
ad ℥iij. circiter ex mellicrato.

Eiusdem succus recens ab ℥i℔. ad
℥iij circiter. per se, vel cum sero de-
purato.

Eiusdem decoctio ex M. j. præser-
tim additis passulis.

ALVVM MOLLIENTIA.

QVibus utendum est potius ad
impediendam retentionem na-
turalium excrementorum primæ
coctionis, quam ad alias necessarias
evacuaciones: Quæ valentius laxan-
tia postulant, sunt huiusmodi.

IN

IN CAUSA BILIOSA.

Sequentes herbæ oletum more co-
ctæ, & earum decoctiones, scilicet
Acetosa, Atriplex, Bitum, Lactuca,
Lapathi omne genus, Malua, eius-
que cauliculi, Spinacia.

Hæ herbæ magis emolliunt de-
coctæ cum passulis in jure pingui,
vel conditæ multo oleo, & tantillo
salis.

Cerasa dulcia cocta maxime cum
jute, & conspersa saccharo.

Cerasorum succus cum melle in-
spissatus ad j. vel ij. cochlearia, vel
per se sumptus, vel cum iure.

Mala persica cocta, & saccharo con-
spersa.

Poma dulcia cocta.

Passula corynthis i. sine acinis,
vel per se sumptæ, vel maceratæ in
lacte. donec turgeant, vel decoctæ,
aut ex iure vino albo, & saccharo co-
nspersæ ab ʒj. ad ʒij. pro vice.

Pruna dulcia cruda, vel cocta ex
vino, & saccharo conspersa.

Ptisana

Prisana dilutior.

Panis hordeaceus.

Oleum bene maturum copiosum in ferculis.

Horum omnium, quemadmodum & sequentium præcipuus usus est in prima mensa, aut ieiuno adhuc stomacho, duabus circiter horis ante cibi sumptionem.

IN CAUSA PITUITOSA.

A *Sparagi* maximè petræi germen: coctum, conditum oleo, & sale.

Avena farina in ferculis, ac pulmentis.

Brassica sativa, magis autem crispa, leviter decocta, condita oleo, & sale,

Eiusdem benè cocta primum ius dicta ratione conditum.

Eiusdem succus expressus ab ℥ii. ad ℥iiii. ex iure bibitus.

Beta eodem modo usurpata; candida censetur efficacior nigra, & rubra.

Cyperus.

Cayendula folia decocta, oleo-
que, & sale condita.

Cicerum, atque *lentium* primum
ius-cum oleo, & sale.

Ius *piscium* salicorum.

Ficus recentes benè maturæ.

Ficus passæ num. iiii. aut vi. ma-
ceratæ in lacte aut vino dulci donec
turgeant.

Alii verno tempore caricas ster-
nunt rosis pallidis recentibus, quas
frequenter mutant spatio 14. dierum,
arque in dolio compressas recondunt
ad usum: dantur duæ, aut tres in pri-
ma mensa.

Inglandes recentes, vel siccæ præ-
maceratæ in aqua, donec mollescant
comesæ cum sale,

Panis furfuraceus, aut simila-
gineus, sic efficacior additis passulis,
& senna.

Furfur ipsum cum iure co-
ctum.

Siliquarum decoctum.

IN

IN CAUSA MELANCH.

Capparis fructus sale conditus,
leviter coctus, comeditur in a-
cetariis cum Oleo, & aceto.

Lepuli turiones elixi, conditi oleo,
& sale; solvunt efficacius; si super-
bibatur eorum decoctio.

Vua dulcis recens quæcumque sed
magis rore adhuc madens pensilis
est inefficacior.

Vinum dulce pro potu.

Condimenta ex sapa, & defruto.

Huc referuntur etiam pruna, &
passulæ, maxime in melancholia a-
ducta.

CLYSTERES LENIENTES.

Extemporanei, & vilissimi clyste-
res intestina expurgantes paran-
tur, ex juris carniū lb. j. ol. oliuar.
vel sem. lini, recrementi Sacchari
an: ℥iij. salis communis ℥j. M.

Vilior & magis abstergens fiet ex
aquæ salinæ naturalis marinæ, aut
thermalis lb. j. & ol. communis
℥iij.

Vel

Vel *Re. Decoct. Mercurial. malu. betæ*

Furfur. lb. j.

Suc. brasica, vel mellis, vel betæ. ℥ij.

Salis communis ℥j. M.

Si opus sit emolitione insigni,
vel augeatur quantitas olei vel oleo
omisso augeatur quantitas deco-
ctionis factæ cū multa malua, alch.
branc. Vrs. & fortiter expressæ.

Refrigerandi vim, si ea sit opus, tribu-
ent folia violæ purpureæ parietaria
& hordeum addita decoctioni.

Si languida sit expultrix, duplice-
tur quantitas salis.

GLANDES LENIENTES.

Irritant leniter aluum ad excreti-
onē suppositoria ex ℥j. mellis, aut
recrementi sacchari ad duritiem co-
cti addito salis tantillo, si langueat
expultrix.

Pariter ex radice betæ, aut rapha-
ni in debitam formam redacta, oleo-
que, aut butyro illita, cum, vel sine
sale.

Idem.

Idemque præstat truncus brassicæ.
Ex ficu inverso oleo illita, & sale
asperla.

Ex *sapone*, candela, lardo, in glan-
disformam concinnatis, oleoque,
aurburyro illisis.

PVRG. PER ALVVM.

QUæ excrementa trahunt ad vē-
trem ex remotioribus partibus
cathartica, & purgantia dicta, licet
sinceros humores vix evocent, sed
magis permixtos: sumunt tamen
denominationem ab excremento,
quod efficacius movent: Qua rati-
one reduci possunt ad quatuor clas-
ses, pro varietate humorum, qui pur-
gatione educuntur: nempe ad pur-
gantia bilem; pituitam, melancho-
liam, & aquositates.

Horum singula rursus partiiri lubet
in *Benigna*, quæ clementer absque
corminibus, & à locis jecori circum-
jacentibus expurgant: in *Strenua*,
quæ à locis remotioribus, & vena
cava

cava, non sine labore vacuant: in *Va-*
lentissima, seu *furētia*, quæ à remo-
 tissimis partibus trahunt, ac nisi pro-
 bē corrigantur maximo cum cona-
 tu, viriumq; dispendio opus suum
 peragunt. Cum hac enim distin-
 ctione facile erit unicuique deligere
 purgantia, pro diversitate situs, loci
 affecti maiori, aut minori resistan-
 tia, humoris vacuandi, viriumque
 fortiorum, aut debiliorum tole-
 rantia.

Ergò,

Bile Prædominante conveniunt
 pro benigna vacuatione *dulcam-*
ræ Lignum decoctum ab $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. c.
 anis.

Frangula cortex flavus in umbra
 siccatus, & potissimum ineunte ve-
 re delibratus. Dil. & ser. D. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. ad $\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.
 S. $\mathfrak{d}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. ad $\mathfrak{d}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. Corrig. semen. arom.
 vel exter. cortex niger, ideo simul
 exsiccatur, decoquitur, & teritur.

Rhabarbari Monachor. bil. & pit.
 rad. siccata pulv. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{ss}$. ex jur.
 cal. cum zinz. aut Hysso.

X

Viola

Viola Purpurea in umbra siccatæ pulvis a ʒi. ad ʒii. cum iure ciccorum, aut pisorum, modice coctorum

Convolvulus maior Matthioli D. ʒiiii. aut vi. Corrigitur stomach. adstring. maxime myrtho, rosmarino, & cypero.

STRENVE PURGAT.

CEntanrum minus bil. & pit. crass. D ad ʒii. in ʒviii. aq; ad conf. mediet. addito aliquo dulci ad corrigend. amarorem pulv. Dat. ad ʒi. ex decoct. prun. aut pass.

Gratiola, bil. & pit. Dat. siccatæ pulv. ad ʒi. ex vino, aut iure alterato stomachicis.

Recens D. a ʒi ad iii.

Peplipulvis, ad ʒiiii. ex mulla, in stillato modico aceto.

VALENTER.

Periplocarecentis succus in umbra siccatatus. Idem præstat & Scammoneum; corrig. coton. aut fumo sulph. a gr. v. ad xv. circiter, datur ex liquore

re

re convenienti; vel formatur in bolos, aut pilulas.

Ex dictis varia componi possunt, de quibus illud notandum, faciliorem reddi purgationem si purgantia misceantur cum lenientibus sui generis, quod de omnibus aliis purgantibus proportionaliter est intelligendum E. g.

Potio cholagoga ex tempore sic parabitur.

Passular. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Prunor. dulc. par. iiii.

Gratiola vel centauri minor.

$\mathfrak{z}\mathfrak{ii}$. Sem. fenicul. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Aq. Horde. vel Com. $\mathfrak{z}\mathfrak{x}$.

F. Decoctio lento igne ad consumptionem medietatis, & fiat colatura pro potu.

Si bolus eligatur,

$\mathfrak{R}$. Rad. Hippolapath. pul. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.

Centaur. min. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Rob. prunor. inspissati $\mathfrak{z}\mathfrak{vi}$.
vel pulp. passul.

Zingib. gr. x. vi. M.

F. boli.

X₂

Si

Si in stomachum ab omni medicamento abhorentem incidas, efficies pruna solutiva vel passulas aut caticas, si in propositis decoctionibus bilem trahentibus macerentur dicti fructus, donec turgidi evadant unde pro evacuatione sufficient pruna vj. caricæ iij. aut iij. passular. ℥ß. usque ad ℥j.

Eodem pacto præparabuntur hi fructus ad aliorum humorum expurgationes, mutata liquorum purgantiorum quibus infundendi sunt materia.

PITVITA PRÆDOMIN.

benignè vacuabunt.

Agaricus infusus per noctem in vino, in quo præmaceratum sit zingiber, vethystopus, Thymus, aut alia similis herba calida, & acris, deinde siccatus, uti vulgo fit in agarico trochiscato, purg. pii. & utramque bil. sumitur à ℥ij. ad ℥ij. in pilulis, bolo, & potu ex oxymelite maceratur a. ℥iij. ad ℥iij. circiter, præsertim in multa.

Aseri.

Asarina Matthioli. pit. crass. & mel;
Radix est efficacior. S. ʒj. ad ʒij. cū
oximel.

Carthami seminis pulpa à ʒij. ad v.
circiter: datur emulsiō ex mulsa, vi-
no potenti, aut jure, corrigitur cale-
facientibus, & subastringentibus sto-
machum, uti spica, cypero, rosmari-
no &c.

Rhamni cathartici, baccarum suc-
cus, quo Bibliopolæ librorum reg-
mina luteo colore tingunt. sumitur
à ʒiij. ad vj. corrigitur odoratis her-
bis, seminibus, aut aromatibus.

Ulini crassior cortex: in pulverem
tritatus ad ʒʒ. circiter: ex vino, vel
mulsa, vel decoctione hyssopi.

Radix cava, sive fumarizæ bulbosæ
radix S. ʒj. ex liquore convenienti.

Planta maxima sem. decortica-
ta: devorantur Num. x. ad xx. cir-
citer, instar nucleorum pini, vel bi-
bitureorum cremor ex vino.

Ex Rhamno dupliciter componi-

X 3

tur

syrupus gratus, & pro pauper-
culis asservandus: hoc pacto.

℞. Succ. bacc. spin. infecto. despumat.
℔ ii.

Mellis despumat. ℔ ii. ℥.

DEcoque lento igne ad syrupi
crassitudinem, & rariore linte-
olo percolentur, postmodum adhuc
calentibus immisceantur,

Cinnam. ℥iii.

Zing. ℥i℥.

Seru. ad usum.

Vel.

℞. Dicti succi percolati. & per se de-
cocti ad 4. partis consump-
tionem ℔ i.

Mellis despumati ℥viii.

Coq. una ad consistentiam sy-
rupi. Coctis verò. & iam auferendis
ab igne iniicito Cinam. ℥ii.

Uterque datur ab ℥i. ad ℥i℥.
dissolutus vino, aut iure Carnium,
vel decoctione hyssopi, aut
polii.

STRE-

STRENVE PVRGANT.

E *Sula maioris & minoris radix*, quæ aliquanto est efficacior maiori : aq. & utramque bil. Vsurpatur cortex maceratus in aceto rosato, vel cydoniato, & siccatus ad usum : Si desint hæc acera alteretur acetum vulgare aliquo stomachico frigido astringente, uti rosis, fructibus berberis, balauftio, cydoneo, capreolis vitis, flor. labruscæ, myrtho & datur in substantia a gr. vi. ad xx. Maceratur a ℥j. ad v. circiter, ex vino, vel Mulla, &c.

Esula Veneta radicis cortex eadem præstat, eodem modo præparatus, & exhibitus.

Genista hortensis, quam Hispanicam vocant, folio, & semina S. a ℥i. ad ℥ii. Mac. aut Decoq. a ℥ii. ad ℥iii. Corrigitur vino aromatico, vel aliis stomachicis odoratis.

Genista angulosa omnes partes eadē præstant eodem modo exhibitæ.

Hermodactylus vulgaris, seu Colchici

X4

Diosco-

Dioscoridis radix, eruta, priusquam floreat, & præcipuè post exortum foliorum, non patitur infusionem, aut decoctionem. Datur pulvis à ℥ij. ad ʒij. in pill. Tabell. bolo, vel per se in potu. Acui debet vis illius iners aliquo acri, ut zingibere, hyssopo, thymo, Si placeat etiam addere alexipharmacum corrigent ventositatem, tutior erit purgatio.

Pseudonarcissi lutei sylvestris radix pit. & aq. D. à ʒij. ad ʒʒ. corrigitur stomachicis odoratis.

Vvataminia seu vitis nigræ Matthioli radix siccata pit. aq. sumitur & bil. datur in decocto ʒʒ. ad iiij. S. ʒʒ. circiter ad ʒʒ. corrigitur cortice, aut sem. citri, vel Arantior spica, &c.

VALENTER PURGANT

B*rionia* (quæ purgat pit. aq. & bil.)
Asparagi ad M. s. olerum modo cocti, & sumpti.

Succus germinum à ʒj. ad ii. ex vino, vel jure, aut decocto hyssopi, origani, calamenti, &c.

Pla-

Placenta absinthii frixæ in oleo per destillationem factæ ex bryoniæ germinibus.

Eiusdem radix decocta à ʒj. ad ʒiij. circiter; substantia à ʒi. circiter ad ʒi. ex vino, jure, aut decocti arom. stomachicor. &c.

Colocynthis pulpa pit. crass. & bil. Macerat. à gr. v. ad xx. Decoquitur à gr. x. circiter ad ʒj. corrigitur aliquo stomachico Emplastico, quodque sua lubricitate citiorem faciat deiectionem, uti malua, fœnugræco, & sem. citri, vel cinam. &c.

Dat etiam vinum generosum (maximè Absynthite) quod per noctem in excavata colocynthide intabuerit.

Colocynthis pyriformis eadem præstat, sed aliquantò inefficacius, ac propterea in dosi ferè dupla.

Chamalæa pit. ser. & bil. folia decoq. à ʒß. ad ʒi. In substantia à gr. x. ad ʒi. corrigitur absinthio, & hordeo.

Thymelæa idē præstat eadē ratione.

X ʒ

Laureola

Laureola mas, quæ *Matthiolo* *Chamædaphne*, & *fœmina*, quæ eidem *Daphnoides* appellatur, idem faciunt, sed inefficacius. Decoq. a $\mathfrak{z}$ i. ad $\mathfrak{z}$ ii. In substantia a $\mathfrak{z}$ i. aur gr. xv. ad $\mathfrak{z}$ ii. corrigitur eadem ratione.

Tithymalus quicumque, excepto latifolio, pit. utrumq; & bil. Dat. lac. agut. v. ad xii. Ramuli, & folia in substantia a $\mathfrak{z}$ ß. ad $\mathfrak{z}$ iiii. Correx radicis in substantia a $\mathfrak{z}$ i ad $\mathfrak{z}$ i. Maccarus a $\mathfrak{z}$ iiii. ad $\mathfrak{z}$ iii. circiter.

Ex his varia componi possunt,
& vel ex tempore usurpari. vel in usum reservari. Exempli gratia. In portione.

R. Agarici prepar. $\mathfrak{z}$ iii

F. infusio in decoct. hyssopi, $\mathfrak{z}$ iii. per horas x. Facta colatura adde oxymel. $\mathfrak{z}$ i. Misc. pro potu.

Vel, R. Rad. Esulæ præp. $\mathfrak{z}$ ii.

Fol. Laureol. recent. $\mathfrak{z}$ i.

Fol. Myrth.

Hyssopi a. M. i.

Vini alb. lbß.

Mell.

Purgantia.

49r

Mell. despum. lb. i.

Coq. lento igne ad mediocrem
consistentiam, postea adde

Sem. Anis. zi.

Coriand. preparat. 3ß.

Cinamom. zi.

Bulliant iterum ad syrupicon-
sistentiam, F. Colatura, seruetur ad
usum. Cuius dosis erunt zii. ad liii.

IN PVLVERE.

*℞. Hermodactyl. à superior. corz.
mundat. zi.*

Tartar. crud. vel prap. ℥i.

Zingib. gr. vi.

Saccb. ʒß.

Misc. F. pulvis exhibendus ex vi-
no, aut iure.

IN BOLO.

℞. Agar. prepar. ℥ii.

Tartar. 3ß.

Cinam. gr. v.

*Pulpæ caricar. vel passul. ab-
acin. purgat. 3ß.*

Misc. F. Bolus.

IN

IN PIL VL.

℞ Hermodact.

Agaric. preparat. an. ℥i℥.

Zingib. gr. vi.

Trita in pul. subigantur oximelite, vel mell. & formentur pil.

Melancholia prædominante benigne vacuabunt Cuscuta & c. à ʒvi. ad ʒi℥. prouna vice recipitur inter aperiencia infra ʒ℥. decocta, corrigitur absinthio in hunc modum.

℞. Herb. Cuscuta. ʒi.

Absinthii com. Comas ii.

vel ʒii.

Aq. Comm. ʒx.

Bulliant ad consumption. mediet. addendo sub finem.

Sem. fœnic. aut Anis. ruditer contrus. ʒ℥.

Coletur pro uno potu.

Epithymi usus esse potest, Græciam, ubi oritur, incolentibus in substantia ad ʒ℥. ex sero depurato, vel lacte, aut simili refrigerante, in decoctione à ʒvi. ad ʒi℥. sed moderate

ratè coquendum est; tarda eius vis
deiciendi, corrigitur acribus, uti pi-
pere, zingibere. Eius loco alibi usur-
petur thymus, cui facultas eadem in-
est, idem præparationis modus, præ-
stat tamen eius decocto diluere alia
melancholiam, purgantia, quàm eo
solo uti.

Polipodii radix in substantia à
ʒi. ad iiiii. ex iure galli, aut cremore
ptisanæ. Decoquitur autem à ʒvi. ad
x. Corrigitur discutientibus flatus,
& subadstringentibus ventriculum,
uti sem. citri, arant. spica Ital. &c.

Sena folia, & folliculi Mel. pit. &
aq. substantia à ʒi. ad ʒii. maceran-
tur à ʒii. ad ʒvi. corriguntur sem.
odoratis, aliisque flatus discutienti-
bus: fit maceratione Vinum Sena-
rum, cuius datur semicyathus, vel ad
iustam purgationem servata prædi-
cta dosi, vel ad simplicem alui leni-
tionem, si singulæ doses non plus
contineant quàm ʒi. senæ per no-
ctem infusæ.

Strenue

Strenue purgant Consiligo Matthiol, quam Tragus Elleborum nigrum esse censet, Dodonæus Buphtalmum, easdem habet vires, sed paulo invalidiores, ac elleborus niger officinarum, eademque ratione præparatur.

Sanicula femina Fuchsii radix, easdem habet facultates, easdemque præparationes.

Valenter purgant: Antimonium deiectorium, tale autem redditur terna calcinatione cum duplo talis nitri igne non admodum vehementi, materiamque bacillo ferreo continue agitando. Datur substantia a gr. iij. ad xij. xliii. & xvi. in iis, quæ difficillimè purgantur. Datur ex quocunque liquore, item cum cochleari panatellæ, aut ptisanæ; facilius operatur additis aliquot gr. cremoris tartar.

Ellebori nigri radix præparata. Variæ autem sunt præparationes, quibus reddi potest hoc medicamentum

rum æque benignum, ac Sena. Vulgo infunditur radicis cortex aceto generoso, deinde in umbra siccatur ad usum. Datur in substantia a ℥i. ad ii. circiter in decocto ad ℥ij. circiter. Maceratur ℥ss. ad ℥iij. Corrigitur sem. odoratis, præcipuè dauci, & nymphæ. Si placidum purgans reddere cupias, eoq; uti loco benignorum, antequam exicetur ad usum, bulliat aliquantū in aceto, sic enim multum virium deperdet, vel cum decoquitur, aut maceratur vulgariter præparatum, abiiciatur primum decoctum, aut infusum; & eidem radici novus liquor addatur pro secunda infusione, aut decoctione exhibenda.

Præterea ex elleboro duplex præparatur rude extractum, alterum altero efficacius.

Primum R. Rad. Elleb. nig. vino
ablut. & a terra purgat.

℔b. i.

Concidantur, & infundantur
per horas xxiiii. in

In Vini alb. lb. iiij. addendo Fl.

Nymph. M. i. Sem. Dauc.

3ij. vel rad. dausi 3ß.

F. circa finem levis ebullitio, ut radices mollescant, atq; turgescant tum prælo exprimantur, succus percoletur, & depuretur, lenisimque inspissetur lento calore, cumq; mellis crassitudinem acquisierit, adde Mastiches 4. partem. Datur à ʒß, ad ʒi. in pil aut bolo.

*Secundum & Rad. elleb. su. recent.
five siccæ. q. v.*

Coque in Octuplo aquæ, donec remaneat tertia pars, tum Radices fortissimè exprime, expressionem, & decoct. per duplicatum colum traiectum simul inspissa ad consistentiam mellis, addendo mastiches octavam partem, succo jam crasse facto. Datur à gr. xvi. circiter ad 3ß. in pilulis, aut bolo.

Fitetiam ex Elleboro pomum solutivum, si radicula exiccata, & præparata pomoinfigantur, pomumque coctum

coctum exhibeatur extractis radiculis; vel, si spatium dici naturalis sinantur radices pomum infixæ, tumque abiectis radicibus pomum crudum edatur.

Denique fit ex Elleboro oxymel, aut quicumque syrupus solutivus, si radices una coquantur, maximam enim decoctionem sustinent; Inest autem vis cathartica æqualiter ferè elleboro nigro officinarum, quem Matthiolus ellebor. nigrum flore purpureo vocat, & elleboro nigro herbaceum florem gerenti, qui Matthiolo est pseudoellebor. niger. Verum prior cum minori molestia purgat, quam posterior, qui propterea maiori indiget præparatione, & minori dosi.

Ex dictis componi poterit syrupus utilissimus, & gratissimus pro pauperibus asservandus hac ratione.

℞. Rad. elleb. nig. prepar. ℥iij.

Borrag.

Lupulor.

Fumar.

Cus-

*Euscut. an. M. i.**Malum citrium semi lib.
ponderās, in frustula dissectū**Aq. com. lb. v.*

Bulliant lento igne ad consumpt. lb. iiii. deinde abiectis herbis adde.

Suc. pomor. dulc. lb. s.

Bulliant iterum ad consumptionem medietatis, facta omnium forti expressione, colatura, & clarificatione, adde

℞. Mellis despumat. lb. i.

Bulliant ad syrupi consistentiam, Cuius dosis erit ℥i. ad ℥ii.

Ex tempore verò talia Propectu. E. G. componentur.

*℞. Fol. senæ ℥iiii.**Sem. fœnic. vel anis. ℥i.*

F. Infusio per horas xii. in ℥iiii. decoctionis Lupui. aur passular. & facta unica ebullitione, & colat. adde oxymel. simpl. (nempe ad viarū apertionem, & crassorum humor. deterfionem.) ℥i. Misc. F. potus.

IN

Purgantia.

499

IN BOLO

℞. Folior. sen. pulveris. ʒi.

Tartari

Sem. Anisi vel Cin. an ʒi.

Pulpapassul. ʒi.

Misc. F. Bolus.

IN PILVLIS.

℞. Fol. sena ʒii.

Rad. Elleb. nig. ʒss.

Sem. Dauci.

Cinam. an. gr. vi.

Pulverisata subigantur cum
oxymelite, & F. Pipulæ.

PVLVIS.

℞. Antimon. deiectorii gr. viii.

Cremor tart. ʒi.

Cinam. ʒ.

Sacch. an. ʒss.

Misc. F. pulvis.

Vel, ℞. Fol. Sena. ʒi.

Tartar.

Sacch. ff.

Cinam. an. ʒi. Misc. F.

pulvis pro una vice.

Serositate prædominante be-
nigne purgabunt.

Cat.

Carlina radix, vel in pulverem trita ad $\mathfrak{z}\text{i}$. ex vino absynthite, aut oxymelite, vel decocta à $\mathfrak{z}\text{ij}$. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. corrigitur sem. odoratis.

Herba mirabilis Hispanorum variegatum florem gerentis radix ad $\mathfrak{z}\text{ij}$. quomodolibet sumpta.

Mercurialis Sylvestris, vel decocta ad $\mathfrak{M}$. iß. vel olerum more cocta, oleoque, & sale condita.

Iridis domestica purpureum florem gerentis radicis succus recens extractus, & depuratus ab $\mathfrak{z}\text{ij}$. ad $\mathfrak{z}\text{iiij}$. Condensatus à $\mathfrak{z}\text{ij}$. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. potissimum ex vino absinthite.

Strenue vacuant Anthoræ radix detersa à $\mathfrak{z}\text{ij}$. ad $\mathfrak{z}\text{ij}$. ex iusculo, aut, vino sumpta, non eget corrigente.

Cucumeris asinini radix siccata, in substantia à gr. xv. circiter ad $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. maceratur a $\mathfrak{z}\text{ij}$. circiter ad $\mathfrak{z}\text{iiij}$. Decoquitur a $\mathfrak{z}\text{ij}$. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. corrigitur stomachicis, sed utilissimè omnium exhibetur infusa per noctem in vino generoso absinthite.

Ebulis

Ebuli quatuor germina, quatuor foliolis constantia, in vino, aut iure cocta, olerumque modo sumpta.

Eiusdem radix macerata in vino à ʒii. ad iij

Eiusdem succus, fol. aut fructuum ad ʒi. ex vino potenti, vel iure correcto absynthio.

Eiusdem sem. pulvis a ʒß. circiter ad ʒi. ex eodem liquore.

Succus cum melle inspissatus ad consistentiam sapæ ab ʒß. ad ʒi. per se, vel ex vino, aut iure.

Sambucus idem præstat, iisdem modis præparatus; nisi quod radicis cortici maior inest vis purgandi, quàm aliis partibus.

Lactuce sylvestris succus a ʒiij. circiter ad vj, cū melle, aut oxymelice.

Ricini vulgaris semen decortictum: datur emulsiō a ʒi. ad ʒiij. cum vino, aut iure pingui correcto aliquo aromatico: maceratum leviter contusum a ʒiij. ad vj.

Soldanella, seu brassica marina
in

in decoctione ex iure pingui a M. i. ad ii. eduntur quoque cymæ, ut ait Plinius. i. teneriora germina oleorum more cocta, corrigantur stomachicis,

Ex hac planta fieri potest rude extractum ad usum asservandum, & gratum; si foliorum succus exprimatur; depuretur; condensetur cum macis, & mastichis quarta parte in pillularum massam formetur; vel si inspissetur cum quarta parte mellis, & octava parte succi absinthii. Cuius, dosis erit ℥i. ad ℥ii. circiter.

Vitis alba (quæ Matthiolo est tertia clematis) radix decocta ad ℥ss. circiter in vino pari aqua diluto, corrigitur stomachicis temperatis uti sem, coriandror.

Valenter purgant: Ricinus Americanus gr. ss. ad integrum granum, seu semen; maceratur per noctem in vino, vel bibitur sem, emulsio ex jure

Granum Dendæ Avicennæ, quod circumforanei passim vendunt pro Rici-

Ricini Americani semine, eadem præstat, ac Ricinus Americanus.

Cataputia semina si maiora sint, a gr. vi. ad x. Si minora, ab viij. ad xv. vel redacta in pil. aut bolos, cum caricis, vel emulsa ex hydromelite. Ventriculo valde sunt infesta, ideo superbibendum ius alteratum ab-lynthio, & sem. citri, vel Arantiorū.

Tythimalus Platyphyllos, secundum omnes sui partes exhibitus modo & quantitate dicta de aliis Tythimalis valenter expurgantibus pituitam.

Ex dictis potest præparari iucundus, ac vilis syrupus ad usum reservandus.

R. Rad. irid. domest. recent. ℥iij.

Cucum. asin. in umbra siccac. ℥ij.

Absinth. pontic.

Origan. an. M. i

Vini alb. ℔ij. β.

F. Maceratio per horas v. bulliant lentissimo igne ad consumpt. tertie partis. F. Colaturæ adde.

Med.

Mellis despumari ibi.

Bulliat ad consistentiam dilutioris
syropi, addendo sub finem.

Cinam. vel Anis. ʒii.

Huius dosis erit ʒi. ad ʒii. ad sum-
mum.

*Extemporanea Compositiones fie-
ri poterunt hac ratione:*

V. G. pro potu.

℞. Rad. cucum. asini crasso modo
trita ʒi.

Comar. Absynth. pontic. Nucis
i.

Sem. fenic. vel Anis. aut cinam.
ʒi.

Vini generos. ʒiii.

F. infusio per noctem, F. colatu-
ra, adde Oxytel ʒi. Misc. pro potu
(potest etiam omitti oxytel.)

Pro bolo.

℞. Succ. Irid. condens. ʒiii.

Absynth. pulveris. ʒss.

Sem. Anis. ℞ss.

Pulpa Caricar. ʒss. Misc. F. boli.

Pro pilulis.

℞. Sem.

℞ Sem. Ebuli. ℥ij. vel

Rad. Cucum. asinin. ℥i.

Cinamo. ℥℥.

Trita subigantur cum succo Absynth. F. pilulæ.

PULVIS GRATUS.

℞ Rad. cucum. asin. ℥i.

Crem. Tart.

Cinnam. an. ℥℥.

Sacc. fin. ℥℥. M.

Fiat pul. exhib. cum iure, aut vino odorato. Atq; hæc sunt purg. tantum per alvum, assumpta per os.

CLYSTERES PURG.

QUæ injiciuntur per clysteres purgantia duplici fine usurpantur, nempe, vel irritandi expultricæ valdè sopitam, ut sit in affectib⁹ soporosis, paralyti, & deliriis, undè clysteres acres appellantur, vel trahendi excrementa à longinquis partib. vacationis, aut etiam revulsionis gratia. Ut irritent, parantur modo, & quantitate jam dictis in clysterib.

Y

leni-

leuientib. addendo tantū decoctio-
 ni pro clystere communi herbas ali-
 quas purgantes, nempe centaurum
 minus, gratiolam; in causa biliosa;
 semina Cartha. genista folia, pulpā
 colocynthidis rariori linteolo illi-
 gatā, rad. Esulae aut cy. lam. in causa
 pituitosa; Rad. elleb. nigr. in causa
 melancholica; Folia Ebuli, & sam-
 buci in causa terosa. Verum ut pur-
 gent, & suppleant vi ē medicamenti
 per os assumpti; non debent injici
 ultra Mensurā ℥iij. ea nimirū quan-
 titate, quæ etiā per os assumi posset,
 & præcedere debet clyster intestina
 expurgans, quia sic retinetur plurib.
 horis clyster purgans. commodèq;
 actuat a calore intestino, ū, quan-
 titas tamen purgantium per os assu-
 mendorū duplicari debet in paran-
 dis clysterib⁹, quia non ita probè a-
 ctuantur in intestinis, ac in ventri-
 culo v. g. ad purgandā, & reuellendā
 pituitam, fiet clyster huiusmodi.

℞ Fol.

R. Fol. malu.

Beta

Origan.

Chamomeli an. M. S.

Pulp Colocynth. in pet. ligat. ʒ℥.

Sem. Carthami ʒij.

Aq. communis ℔b. i.

F. decoctio ad consumpt. medicat. Colaturæ adde

Recrem. Sacchar. vel

Mellis ʒij. aut ij. Misc. pro clystere.

GLANDES ACRES.

Purgantia supposita nullam videntur habere per se vim purgandi; h. e. facultate tractoria humores è longinquis partib. ad intestina ducendi; sed tantum irritandi pigram alvum ad excretionem, quo irritamēto aliquando per accidens idem evenit, quod in purgantibus excrementa sc. è venis, & distantib. membris per alvum exturbati, verum nō pharmaci trahentis, sed irritatæ ex-

Y 2

pul-

pultriciis robore; Quam ob causam glandes acriores interdum suppleant vicem medicamenti purgantis, & debilibus quibuscunque tutius administrantur, quàm clysteres.

Fiunt a. glandes acriores ex melle, aut recremento sacchari ad duritiem cocto, addendo pro singulis unciis suppositoriis gr. v. usq; ad x. vel colocynthid. scam. velell. bor. utriusque, lactis tithymal. Esulæ, & salis' nitri.

VACUANTIA PER VOMITUM.

Horum quoq; duplex est genus, alia ventriculū tantū purgant, omnis trahendi virtutis expertia, & ad lenientiū medicamentorū ordinē pertinent; alia superfluitates aliunde ad ventriculū tractase vacuāt, suntq; cathartica; illa per se vomitum vix provocant, nisi ventriculū offendant valdē nauseabundum, sed externo indigent irritamento, gutturis

turis nimirum irritatione, immisso digito, aut penna, hæc per se excitât vomitum absq; externo auxilio.

LENIENTIA PER

Vomitum.

In causa calida aq. tepida, aq. hord. ius pingue, hydrelæum, dantur omnia tepida à lb. i. ad ij. adultis, pueris ab ℥ viij. ad lb. j.

In causa frigida tenui. decoctum sem. citrii, vel arantior. ex jure ad lb. j. cum oxymel. ℥. ij.

Lauri foliorum decoctum tepidum ad lb. j.

Narcissi radix cocta esa, vel ejus decoctum dicta quantitate bibitum.

Pulvis rad. beton. à ℥j. ad iij. cum jure, & oxymel.

Pulvis rad. peponis à ℥j. ad ℥j. ex eodem liquore.

Decoctum testudinum veprium ex aqua, vel jure.

In causa frigida crassa. Raphani succus ab ℥j. ad ij. cum jure, & oxymel.

r 3

Ni-

Nitrum à ℥j. ad ʒj. cum mulla, aut jure.

Jus cum oxymel. simp. aut mel. cui admixtus sit ℥j. zingib. vel hyssopi, vel piperis.

VOMITORIA PURGANTIA.

QUæ per vomitum purgant omnia quoq; alvum movêt, ideòq; tunc eligenda in purgationib; movendiis, quando natura magis inclinat ad superna. Triplex. statui potest illorum ordo, uti & per alvum purgantium. *Alia* sunt benigna, quæ à partib. ventriculo circumjacentibus trahunt, minimaq; molestia ventriculum subvertunt. *Alia* strenua, quæ à longinquiore partib. efficacius trahunt, cum aliquo ventriculi labore. *Alia* valentia quæ fortissimè trahunt, & materiam valdè crassam, aut in remotissimis partib. contentam, magnoq; cum conatu ventriculi vomitum cient. Benigna erunt.

Bile prædominante. Frangulæ cortex

tex flavus recens, decoctus à ℥ij. ad
iiij.

Nasturtii hortensis semen in pul-
verem tritum à ℥. iiij. ad vj. bibitum
ex aqua.

Strenua. Atriplicis semen s. à ℥j.
ad ℥ij. ex jure pingui alterato coma
ablynthii.

Chamaecerasus montana. Gesneri,
quam Tragus halimum facit à v. ad
viij. circiter cerasa devorata.

Asari radix, æqualiter fere trahit
bilem, & pituitam, maceratur à ℥ij.
ad v. in substantia à ℥j. ad ℥ij.

Valentia : *Mandragoræ* rad. cis
succus à ℥ss. ad ℥i. ex vino mullo.

Pituita prædominante benignè vacu-
ant : *Agrius* non præparatus à
℥j. ad ℥ij. ex jure, & oxymel.

Colutea Vesicaria semen substantia
℥j. ad ij. Maceratur à ℥ij. ad ℥ss. cor-
rigitur vino aromatico.

Colutea scorpioidis semen idem præ-
stat.

512 *Medicina Pauperum*

Genista hortensis flores, & ramuli vi-
rentes mac. aut decoct. à ʒij. ad ʒʒ.

Spergula semen. ſ. à ʒij. ad iij. ex ox.

Strenue; *Staphidis agriz* semen ad
ʒʒ. circiter tritum ex copiosa mul-
ſa, ſuperbibendum eſt juſ pingue,
donec vomitus ſequatur, ne ex ni-
mia medicamento mora ventricu-
lus inflammetur.

Tithymali cujuſcunque recentia
fo'ia coct. cum mulſa à ʒʒ. ad ʒʒ.

Tabaci folior. ſuccus à ʒi. ad iij.
cum jure alterato ſem. citri, vel a-
rantiorum.

Vitriolum album à ʒʒ. ad ʒj. ex jure.

Valenter, *Anagyris* ſemen à ʒ. ſ. ad
ʒj. ejusdem cortex ſiccatus, & in
pulverem tritus idem præſtat, ſed
paulò inefficiuſ.

Quæ ex his componuntur ejusdē
ferè ſunt formulæ, verbi gratia,

Probilis vomitione.

℞. *Aque bordei* ℔. j.

℥. benè matur. ʒij.

Rad.

Rad. Asari pulveris. ℥i. Mis.

Propituitæ vomitione.

Rx. Iuris alterati sem. Arant. ℔. j.

Oximel. ℥ij.

Suc. Raphan. ℥i.

Agar. crud. ℥ij. Misc.

Si placet syrupum vomitivum
componere ad us^u: talis esse poterit.

Rx. Ramulorum virid. Genista hor-
tens. ℥i℔.

Fol. Lauri.

Tabaci. an. M. j.

Sem. citri, vel arantior. crass. mod.
contus. ℥ij.

Aq. commun. ℔. ij.

Bulliant ad consumptionem me-
dietatis. F. Colatura. infunde per
horas xij.

Rad. Asari.

Agaric. crud. ana. ℥iij.

F. rursus colatura, & clarificat.
adde

Mellis despum. ℔. i.

Coque lento igne ad consisten-

Y s

tiam

514 *Medicina Pauperum*

tiam syrupi, cujus dosis sit $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.
ex jure, aut aqua tepida.

Hujus generis erit hoc Ele&ua-
rium ad annum efficax.

Rx. Rad. Asari.

Agaric. crud. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Rad. beton.

Pepon. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

Cinamo. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.

Sem. Anis. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Trita in subtilissimum pulverem
excipiantur

Mellis de spum. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. & F. Ele&uar.

Cujus dosis erit $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. cir-
citer ex jure, vino, aut aqua.

*Melancolia, & atra bile predomi-
nante: Strenua tantum, & valentia
conveniunt, quia humor suapte
natur a gravissimus paulò & gravior ad
superna trahitur, quàm alii humores.*

*Strenue a. vacuat: Antimonium
preparatum. Facillimè prepa-
antur flores, calx, & vitrum, paulò diffi-
lius tinctura, & oleum, quod si frigi-*
dam

gidam præcipitarum ab it in candi-
 dum pulverem florinō abſimilem.
 Dantur in ſubſtantia à gr. iij. ad vj.
 ex panatella, ptifana, conſerva ſto-
 machica, cochleari vini & Cor. vino
 Arom. abſinth. roſemarino, aliisq;
 ſtomachicis ſubadſtringentib. Ma-
 cerantur à gr. iij. aut v. ad x. potiſſi-
 mum in vino generoſo, aut abſynti-
 te. Ex hoc fit præſtantiffimus ſyrup-
 us omnium antimoniatorum me-
 dicamentorum placidiſſimè vacu-
 ans per ſuperna, & inferna.

R. Flor. aut vitri Antim. ʒiſſ.

Vini albi generoſ. lb. i.

F. infuſio per dies duos natura-
 les, facta colatura adde

Mellus deſpumat. ʒx.

Coquantur ad ſyrupi conſiſten-
 tiam: cujus deſiſerit ʒiſſ. ad ʒiſſ. cir-
 citer poſe, vel ex quocunq; liquore
 graviori.

*Valenter purgat: Ellebori albi ra-
 dix præparata, id eſt emedullata, at-*

Y 6

que

que per diem in aceto rosato mace-
rata, rursusque in umbra siccata ad
usum. loco aceti rosati, substituatur
acetum cydoniatum, quod melius
est, vel aliud alteratum aliquo sto-
machico frigido, & astringente,
datur à ℥ss. ad ℥i. non in substan-
tia, sed in infusione, quæ fit duplici-
ter. Prima est veterum, qui radicu-
las ellebori raphano infixas per no-
ctem servabant, postridie rapha-
num exprimebant, succiq; ℥i. por-
rigebant cum ptisana, cujus loco
sumi potest panatella, liquidior ad
humectationem oris ventriculi, nè
convellatur.

Secunda priori melior, & gratior
est; ut ℥ss. rad. infigantur frustulo
mali cydonii, & in eodẽ coquantur,
postmodum extractis radicibus da-
tur comedendus ille bolus, ve ex-
pressus ex eo succus diluatur vino,
aut jure pingui alterato sem. citri,
deturque hauriendus: Redditur
elle-

elleborus albus longè mitior, si radix
em edullata, post debitā infusionē,
sinatur aliquandiu bullire in aceto,
deinde v. siccata servetur ad usus.

Serositate prædominante benigna
censebuntur: succus rad. ebulli à
Ziſs. ad iij. cum jure pingui alterato
coma absynthii.

Succus corticis rad. sambuci idem
præstat eadem dosi.

Sambuci aquatica bacca sum. ad Ziſs.
supbibedū jus pingue modò dictū.

Strenua: Cataputix folia sursum
evulsa dantur à Zi. ad Ziſs. ex eodem
jure.

Valentia: Elaterium ob insuavi-
tatem in pilulis, vel bolo sumptum.
Vulgò miscetur pilulis aromaticis.
Misceri potest pulpæ caricæ cum
portione absynthii, quod fit per ex-
pressionem. *Fructus cucum. Asinini*,
datur à gr. iij. ad x., quod extillat ex
fructu tantummodo puncto à gr. ij.
advj.

Y 7

VA

VACANTIA PER

Urinas.

Vacuatio per urinas, quā nō solum vię renū, & vesicę, sed etiam totum corpus venarū, & artēriarū beneficio expargatur, fit medicamētis diureticis, quorū aliqua propriē sunt talia calida, & sicca, acriaque, & tenuium partiū, alia impropriē sunt talia, remissum habētia calorem, aut etiam ad frigidum vergētia, partium tamen tenuium, quibus utendū est magis in febris, renibusq; calidioribus, nisi fortasse præsētia corruptæ, & venenatæ materiæ in venis citissimam urgeat vacationem, quæ melius, citiusq; perficitur diureticis propriis, & calidioribus: præcipua, magisq; obvia in utroq; genere sunt ista;

Propriē diuretica: Asparagus uterque, præcipuē radix, Apis seu Selini vulgaris, radix & semen, Cardui, cucumerumq; radix, & sem. *Cum inf sem.,*

sem., Eryngii cujuscūq; radix, Fœ-
 niculi radix, & semē. Irionis utrius-
 que sem., Laurifolia, bacca, rad.
 cortex, Menta sylvestris, Napi sem.,
 Ononidis aculeata radix, Pulgiū,
 Petroselini cōmunis omnes partes,
 Raphani utriusque cortex, Rubiæ
 radix, Rusci turiones, & radices, Sa-
 tureia, Serpillum. Semina dantur in
 pulverem trita à ℥℥ ad ℥i (idem in-
 telligit de improprie diureticis.) a-
 lia v. decoquantur ex aqua, vino, &
 omnium commodissimè ex jure Ci-
 cerum, datur tamen etiam radicū
 pulvis, præcipuè lignosarum, ut O-
 nonid s. Ex his aliqua ex tempore
 componi possunt.

Efficacissimus est hic pulvis.

℞. Rad. Ononid. ℥ij.

Sem. Irion.

Bac. Laur. an. ℥i.

Cinamom. ℥℥.

Misc. Si pulvis; datur ad ℥i. ex vi-
 no, aut jure ciccrū calido: vel si in-
 fun-

520 *Medicina Pauperum*

fundatur per noctē, tum facta unica ebullitione, colatura sumatur, abjecta pulveris facce; reddetur medicamentū adhuc efficacius additis aliquot guttulis liquoris, quē præbet sal in excavato raphano detentus in loco humido, donec solvatur.

Pro illitione pubis tale oleum parato. R. *Fol. Lauri.*

Mentastri.

Serpil.

Puleg. an. M. i.

Chamomill. M. i.ß.

Cort. Rad. Raphan. ʒß.

sem. Cumini. ʒij.

Ol. communis lb. i.ß.

Vini alb. lb. i.

Facta per 4. horas maceratione coquantur ad humiditatis consumptionē, & F. expressio cum colatura.

Fit quoq; Emplastrū ex dissecto raphano decocto cum foliis petroselinii, apii, & pulgii, deinde simul confuso, & admoto pubi.

Im-

Improprie diuretica: Sem. cucurb.
cucum. citrul. melon. (inde fiunt e-
mulsiones.) Malvæ, Milii solis, Fru-
ctus Alkekengi, Nuclei cerasorum,
officula Mespilor. Avellanar. lōgio-
rum cortex, Limonum maturorum
aciditas, Folia, & caulis fragariæ, ca-
pil. Q., parietar. tribuli, radices grā.
maximē arundinei, liquiritiæ, quin-
quefolii, raphani, datur utiliter jus
cicerū rubeor. cum $\frac{1}{4}$. succilimonis.
Habetur pro secreto hic potus.

Rx. Succi parietar. ℥iij.

Jus cicer. ℥iij. Misc. pro potu.
Ejus generis censetur & iste.

Rx. Rad. liquirit. ℥ss.

Aque communis ℔ss.

Bulliant lento igne ad cōsumpti-
onem medietatis. Colaturæ adde:

Succi Limonum. ℥i. Misc.

Dantur quoq; utiliter, succi ra-
phani ℥ij. ex vino generoso calido.

Extrinfecus, ad movetur vulgare,
& optimū Emplastrū ex fol. parietar.
folis,

solis, vel cum raphano trito, frixis
in sartagine cū butyro, aut oleo, &
calidum pubi admotum. Si anethi-
num ol. aut chamomæli præsto sit,
preferendum communi.

VACUANTIA

per sudorem.

ETHæc duplicis sunt gene is: A-
lia propriè sudorifica, quæ ma-
teriam fundunt, in què halitum ver-
tūt: alia impropriè talia, quæ mate-
riam faciliè convertibilem in halitū
præbendo, per accidens provocant
sudorem, valdè cōsentanea variolis
incipiēt b^o calidioribusq; affectio-
nibus cutaneis, & febribus putridis
inclinante naturæ motu ad cutem.

Propriè sudorifica: Decoctum alli,
signi buxi (quo lues gallica curatur
nō secus, ac Guajaco) Chamædrios,
Chelidonii majoris, Card ben. lign.
Junip. laurin. & Myrrhidis. dātur ab
ʒiij. ad viij. circiter, fiuntq; effica-
ciora decocta ex mulla, & vino al-
bo.

Ea-

Eadem decocta depurata, & lento calore inspissata præbent rudia extracta, danda ad ℥i. circiter, vel diluta vino generoso, aut decocto improprie sudorificorum calidiorum, vel formata in bolam, aut pilulas quibus ℥iij. circiter decocti superbibant. G.E.

In affectibus articulorum & nervorum à frigido catarrhotale fiat decoctum.

R. Ligni Laurin.

Buxi. an. ℥i. B.

Concidantur minutim, & infundantur per diem in Aq. communis ℔.v. deinde adde

Fol. Betonic.

Chamad. r.

Iue an. M. j.

Bulliant. lento igne ad consumptionem tertiae partis, & F. colatura pro vicibus.

Improprie sudorifica: Decoctum chamæmeli, cærefol., fumar., hor. non decorticat. milii, lentium leviter

ter coctar. rad. lupulor. quinq; foliij, tormentil. fol. pimpinel. vulgar. scabiosæ, & violæ matronalis.

Huc pertinet syrupus Sancti Ambrosii vocatus, ex una parte vini, & duabus, decocti milii.

Horum omnium decocta dari debent majori quantitate ab ℥viij. circiter ad ℔. i. E. G. in affectu cutaneo tale fit decoctum.

Rx. Fol. Scabios.

Fumar. sicca. an. M. i.

Rad. Lupulor. ℥℔.

Aq. hordei ℔. i. ℔.

Coq; lento igne ad consumptionem fere dimidii, & F. Colatura pro potu uno. *Apparentibus variolis.*

Rx. Fol. pimpinel. M. i.

Scabios. M. ℔.

Prima decoct. lentium ℔. i.

Coq; ad consumptionem 3. partis, & F. colatura pro uno haustu.

Sciendum v. est, vix provocari sudorem jam dictorū medicamentorū

opc-

opera, nisi illorum vis ad cutim per-
trahatur remediis trahētibz, quo-
rum etiā beneficio laxātur pori cu-
tis, & ad sudorem præparātur: Itaq;
sesqui horæ spatio circiter à sumpto
sudorifico, vel collocādum est cor-
pus in laconico, vel balneo calido
naturali, aut artificiali, vel stragulis
benè regendum, vel admovēdæ te-
gulæ calentes, aut vasa aqua calente
plenā, vel fricanda etiam leniter cu-
tis, aut variis partib⁹ admovēdæ cu-
curbitulæ nō scarificatæ, pro ut ne-
cessitas magis postulare videbitur.

VACUANTIA PECTUS

per Sputum.

QUæ viarum spiritaliū infarctū
expediūt, ab officio expecto-
rantia dicuntur, quæ omnia triplici
differentia comprehendi possunt.

Alia enim cōveniunt sputo cras-
so, incidentia nimirū, & detergen-
tia. Alia sputo tenui, ac insipido sic-
cantia nempè, & quadantenus in-
cras-

726 *Medicina Pauperum*

crassantia. Alia demum lputo falso
contemperantia scilicet, vel etiam
erosionem impredientia.

*Conveniunt ergò pro Lambitivo in
spu mediocriter crasso* Aqua multa,
Oxymel, Mel crudū, Decoctio ca-
ricarū, liquirit. Sil. quar. passular. ad-
dita portione farfaræ, pulmon. aut
Scabios. Harum etiam herbarū pul-
veres misceri possunt oxymeliti ad
consistentiam eclegmatis, seu mol-
lioris electuarii, qua forma utiliter
etiam usurpabitur pulv. rad. ireos
cum oxymelite mixta.

Sputo admodum crasso conveniunt
Decocta Botryos, Enulæ, Hedysari,
Hyslop. Prassii, Satureiæ, Thymi, A-
ristol. long. Harum pulveres utiliter
miscetur oxymeliti pro lambitivo,
vel excipiuntur melle in forma ele-
ctuarii. vel Componitur mulsa vel
oxymel dictarū herbarū incoctio-
ne, quemadmodū maceratione ea-
rundem preparari quoq; solet vinū.

Hys-

Huopites, & Enulatum veteribus familiare. Vulgus utile parat Elect. ex rad. Enulæ cocta in aqua (præstaret accipere mulsam aut vinum dulce) & per setaceū transmissa, deindè excepta duplo mellis despumati, & cocta ad debitam c. assitiem.

Præter hæc singulariter profunt sulphuris pollen, vel flos mixt⁹ eclegmati, vel ex ovo sorbili sumptus. Urticæ sem. mixtū lambitivis: Aqua vitæ cū tertia parte sacch. fini quasfata, vel mixta oxymeliti. Pulvis pulmonis vulpis à ℥ss. ad ℥. cx vino, vel mulla potui, vel eclegmati in xtus.

Crocus à ℥ss. ad ℥. cū vino bibitus.

Millepedes vino abluti, & ad ℥i. infusi per noctem in vino albo, deinde expressi, & hausti abjecta fce.

R. sina laticina, & abietina devorata in bolo, vel delincta, pro delinctu solvenda est melle despumato, nam optimè miscetur melli.

Præstantissimum verò parari potest balsamum in hunc finem. R.

528 *Medicina Pauperum*

*R. Ol. bene matur. pro divitibus
sumendum est*

*Oleum amygd. dulc. nō excedentis
unum, aut alterum annū ſb. ſ.*

Vini albi dulcis ꝯiiij.

*Bulliant ad consumptionem hu-
miditatis: deinde adde*

Flor. Sulphur. ꝯiiij.

*Agitantur continuē; & leniter ad
lentissimum ignem, floribusq; jam
dissolutis adde*

*Resin. Laricinae, vel Abiet. aut si ha-
beri possit,*

Lachrym. Abietin. ꝯij ſb.

*Misc. usq; ad perfectam unionē.
Potest misceri lambitivis, & internē
sumi cum dictis decoctionibus, aut
vino albo.*

*Cæterum, ut facilius procedat
sputum, neq; usu dictorū medica-
mentorū nimium exiccetur crassus
humor, consultū est, semper permi-
scere aliqua emollientia, & laxātia,
qualia sunt pro lambitivis, & usibus
in-*

internis, liquirit. rad. & succus, paf-
fulæ, rad. Malvæ, & Althææ.

Extrinfecus juvat illitio ad pe-
ctus butyri maximè rancidi.

Deprædicatur fomentum ex fo-
lio brassicæ butyro probè illito, &
pulvere cumini consperso, calido-
que admoto pectori.

Sputo tenui, & insipido conveniunt
decoct. Aristoloch. rot. jujub. pru-
nor. subausterorum, virgæ aureæ,
numular. Veronicæ; Eclegmata ex
amylo, gummi Arabico, Tragacan-
ta; terra quæcunque medicata cum
melle, vel oxymelite admixta por-
tione sulphuris, vel myrrhæ, vel A-
ristol. rot. Cremor. ptisanæ cum
portione amyli.

Sputo salso cōveniunt Decoct. hor-
dei, jujubar. liquir. portulacæ, pru-
nor. dulc. maximè ex jure pedum, &
capitum vituli, hædi, agni, item co-
chlear. & testudinis nemoral.

Emulsio amygd. dulc. & sem. fri-
gid.

Z

gid.

§ 30 *Medicina Pauperum*

gid. majorum, præcipuè addita farina amyli: ptisana, vel panatella cum iisdem emulsionibus, addita etiam emulsione seminis papaveris albi urgente fædine; succus prunorum dulcium delinctus. Butyrum recēs, tūm delinctum, tūm ferculis additum, tūm pectori illitum.

Si placet Syrupum componere ad hunc usum.

R. Succi pomorum dulc.

Suc. vel decoct. portulac. an. ℥ss.

Depuratis adde.

Mellis despumat. ℥x.

Bulliant ad syrupi consistentiam.

Cujus usus erit pro Eclegmate, & cum syrupis.

VACUANTIA PER
Palatum.

CAput triplici ratione vacuatur per os mediantibus palati ductibus, nempe masticatione, gargarismo, & palati illitione.

Pro masticatione, in causa calida cō-
ue-

veniunt charta , præsertim bibula,
caricæ, amygd. amar. vel nucl. persi-
cor. uva passa, mali citrii frustum
integrum, Arantii cortex.

In causa frigida cyperi radix, aco-
ri, Angelicæ utriusque radix, Vale-
rian. sativ. Imperat. radix, sem. fenic.
anis. sesel. siler. mont. gran. Junip.
Lauri baccæ, & folia.

His valentiora sunt, atq; intensæ
frigiditati cōveniunt folia Iberidis,
hydropiper: Lepidij, nastur. satu-
reæ, hyssopi montan. puleg. sylvest.
rutæ sylvest. rad. pyreth., sem. thlas-
pios, sinapi, staphid. agriæ, quæ ut
facilius terantur dentibus, excipi
debent cera flava, & in orbiculos,
vel morsellos formari.

Pro gargarismo, cuius est loc^o tan-
tum in causa frigida, cōveniunt de-
coctiones calamenti, chamædrios,
hyssop., fol. lauri., lavendul major.,
puleg., serpil, spicæ Italicæ, quæ par-
tim gargarizantur, partim calidæ
ore detinentur.

Z 2

Va-

Valentissimi gargarismi fiunt ex decoctione herbar. pro valentioribus masticatoriis propositar., maximè si addatur portio aquæ vitæ, vel vulgaris diasinapi, quod Mostardam vocant.

Pro palati illitione, quæ etiam locum tantum habet in causa frigida, conveniunt jam dictæ decoctiones cum melle ad syrupi consistentiam inspissatæ.

Præterea Aq. vitæ, mostarda vulgaris, vel Electuarium aliquod molle ex dictis paratum. v.g.

℞ Baccar. Laur.

Iunip. an. ℥. j.

Hyssopi.

Satureiæ an. M. j.

Sem. Anis.

Fenicul. an. ℥. j.

Rad. Acor.

Imperat. an. ℥. ij.

Trita, & cribrata excipiantur Mellis despum. lb. ij. F. El.

VA-

VACUANTIA

per Nares.

Purgantiū caput per nares: quædam sua acrimonia sternutamentum excitant, convenientia humori valdè crasso, & impacto, nec nō sopitæ expultrici. Quædā sine sternutamento humorem provocāt: inter quæ alia tutò adhibentur, etiam capiti ad calidum inclinanti, alia conveniūt tantum humori & capiti frigidiōri. Sternutamentū excitāt insufflati pulveres omniū propositōrū pro valentiori masticatorio, ac præterea attractum naribus decoctum nigellæ, & ellebor. nigr., succus rad. cyclaminis, bryoniæ, & elaterium aliis liquidis nasalibus dissolutum: idem præstat, sed paulò mitius radix cyclaminis turundæ forma indita naribus, & cortex Arantii inditus.

Sine sternutamento caput etiam calidiꝰ vacuabitur decoctio, vel succo Malvar., bliti, præcipuè albi, fol.

Z 3

betæ,

§ 34 *Medicina Pauperum*

betæ, & brassicæ, aq. hordei, rad. betæ. turunda modo indita, maximè si prius contabuerit in aq. tepida, illitione narium butyro recenti.

In causa frigida conveniet, decoctio, vel succus anagallidis, betonicæ, rad. betæ cand. chelidon. mai. hederæ mural. hyssop. rad. iridis recent. majoran. salviæ, tabaci.

Indi solent quoq; naribus turunda rad. cyclam., & Iridis oleo, vel butyro perunctæ, vel aqua præmaceratæ, quando sternutamento non est opus.

Præterea convenit fumus herbarum dictarum exiccatarum, præcipuè Majoranæ Hyssopi, thymi, cotubulo haustus, quo excipi solet fumus Tabaci Indici; Ex his componi possunt aliqua Errhina, v. g.

In causa frigida:

R. Succ. Rad. ireos in spiß.

Succ. fol. hederæ in spiß. an. ʒij.

Pulv. major. vel Thym. ʒi.

Bu-

Butyr. recent. ℥ss. Misc. F. Linimentum.

Quo illinatur turunda ex gossypio indenda naribus; vel,

& Succ. bliti per filtrum, aut multis percolationibus per crassiorem pannum optimè depurati ℥iiij.

Agarici crasse triti ℥i.

F. infusio per noctem. Postridie

F. colatura, quæ tepida naribus hauriatur, vacuat caput ad stuporem absq; insigni agitatione.

VACUANTIA

Insensibiliter.

HOrum materia latissimè patet. Omne enim calidum rarefaciendo, & in halitum vertendo insensibiliter vacuat, immo omnia sicca humiditatem cohibendo, omniaq; astringentia, eandem exprimendo, hoc genere vacuatum censeripotunt. Propriè tamen hoc nomen merentur digerentia, quæ humorem in halitum lentè vertunt: Discutièntia, quæ

Z 4

quæ

quæ cōfertim id agunt, & flatus etiam crassos dissipant. Rubificantia, quæ validissimè id præstāt, valdè quoque calore materiam intus latentem etiam non probè attenuatam dimovent, & ad cutem trahunt.

DIGERENTIA.

MAgis obvia sunt; Absinthium, Anethum, Apii omne genus, Chamæmel. Cotula foetid. Fenu-græca. rundinis radix, Liliū albū, Lini semen. Mel, melilotus, Rosmarin. verbascum, vinum potens maximè vetus, quæ dari possunt forma decoctioni- syrupi, Ele&uarii.

Ex iisdem parari possunt per decoctionem olea, & fomenta pro usibus externis, quibus etiā addi possunt sequentia internè nō exhibenda, videlicet rad. ciclam. cucum. asin., asphodeli, fol. ebuli, sambuci, alumen, nitrum, vitriolum, sal marinus. Per se quoque admoventur externè pro illitionib⁹, butyrum rancidum,

cidum, maximè salitum, oleum vetus salitum.

Pro fomentis: Aq. calcis viva, aq. theriacalis calida, aq. dulcis bene calida; Lixivium forte, vinacea calida, luta thermarum calidarum, & earum foveæ, arena fervens, cinis calens cum vel sine furfure, & sale sacculo inclusus.

Pro Emplastris: Cochleæ trita cum putamine.

Caseus antiquus cum decoctione carnis salitæ, præcipuè suillæ, contusus in formam Emplastri.

Farina fabarum vino excepta, vel decoctione jam dictorum, addito si placet oleo & oxy-melite, vel melle.

Privatim ad absumendum lac cito, & absq; periculo, nè grumescat in mammis, habentibus p'io secretis mulieres, quæ lactare nolunt, vel non possunt; folia viridia nucis juglandis in sinu gestata.

Linimentum ex aqua portione

Z 5

mel-

mellis, & resinæ linteolo continuè admotum.

Cataplasma ex farina fabar. cum ozymelite, & decoctione petroselini, vel decoctione Malvarum ex Aceto. Fomentum ex æqua portione decoctionis petroselini & aceti, addito croci momento.

DISCUTIENTIA.

PAratu faciliora sunt, agni casti semen, & flores, (quorum maceratione fit, oleum colico dolori appropriatum) allium, angelicæ utriusq; radix, & sem. Anis. sem. Arantii, & Citrii semen, & cortex, calamētū quodcumq; præcipuè montanū, semina cumin., carvum, daucus, fæniculum, hyssopus, imperatorie radix, juniperi bacce, & lignū, lavendula, lauri folia, & baccæ, colicis, & uterinis dolorib. appropriatæ, lupini, major. mentasicea, ocimum, origanum, polium, pulegiū, ruta, satureia, serpillum, spica Itali-

ca,

ca, thymum, quæ omnia dantur sola, vel mixta forma decoctionis, syrupi, Electuarii, vel eorum pulveres ad ℥i. bibuntur ex vino, aut cibus asperguntur.

Huc pertinent aq. vitæ, & vinum vetus, quod veteres dare solebant cum pipere, crasso modo trito.

Parari potest vili pretio tinctura efficacissima, cujus una aut altera guttula ex jure bibita, vel vino, potenter discutit flatus, & cavo denti dolenti indita, illicò dolorem sedat.

℞ Piperis nigr. crasso modo triti
℥ij.

Aq. vitæ opt. ℥viij.

Inde phialæ angustioris colli, & probè obturatam seiva per octiduum in loco calido. F. Tinctura rubicundissima servanda in vitro optimè clauso.

Si placet vinum Hippocratico simile conficere,

℥ 6

℞ Sem.

340 *Medicina Pauperum*

Rx Sem. Anis.

Fenic. an. ℥ij.

Rad. Angel.

Acori.

Imperat. an. ℥℥.

Fol. Calament. mont.

Lavend.

Major.

Mentha sicca an. M. i.

Bacc. Lauri ℥i.

Omnia crasso modo trita indantur colo, per quem transcolatur vinum album generosum, toties iterata colatura, donec materia odorem & acrimoniam perdidisse videatur. Hujus vini sumatur ℥i. aut ij. per se, vel cum alio vino potenti.

Extrinsècùs fieri possunt fomenta ex dictarum herbarum decoctionib⁹, sed efficacissima sunt suffumigia procurata extincto lapide pyrite, vel molari iisdem decoctionib⁹.
Fiunt. a. efficaciores decoctiones

ex

ex vino potenti, lixivio forti, & aquis sulphureis naturalibus.

Est etiam efficax sacculus ex milio torrefacto, flor. chamomeli, & sem. cumin. vel rutæ foliis.

Sunt, qui extollant colocyntidis pulpam cum absynthii tertia parte sacculo inclutam.

Pro secrete habetur ad siccandum ventrem aqua turgida, Emplastrum ex qua portione fol. rutæ, & absynthii contusorum cum melle ad formam cataplasmati.

Optimum est etiam fomentum ex aq. calcis vivæ extinctæ aq; sulphurea Thermalis.

Pro illitionibus extemporanea parabuntur olea ex dictis herbis parata per decoctionem. E.g.

Rx. Baccar. laur. ℥i.

Fol. rutæ. M. i.

Ol. commu. ℞. B.

Vini generos. ℥iij.

Baccis crassè tritis, foliis vero

Z 7

con-

conciſis, F. infuſio per hor. iij, deinde bulliant ad conſumptionem humiditatis & F. colatura.

His omnibus adde cucurbitulam magnam cum multa flamma, inflata parti admotam, cui in diſcutiendo flatu vim incantamento ſimilem tribuit Galenus.

Aliquando etiam abſq; diſcuſſione extrahuntur è corpore flatus quibusdam instrumentis chirurgicis, citiſſimè agentib. ſic flatus craſſa in teſtina diſtendentes extrahunt immiſſo (poſt redditum clyſterem fæces educentem) ſyphone ſicco.

Hippocrates ſollem fabrilẽ uſurpavit.

Eadem ratione flatus uterum replentes, beneficio ſyphonis, ſubtile, & oblongum collum habentis, facilè extrahi poſſunt.

RUBIFICANTIA.

Sic dicta, quod inſignem ruborem cuti adferunt, digerentibus,

&

& discutientibus frustra tentatis,
tandem usurpantur, ut in antiqua
Ischiade, & dolore capitis gravati-
vo, contumaci, sæpè usu venit: ap-
plicantur a. cuti forma cataplasma-
tis trita, vel per se, vel cum aceto ca-
lido, suntq; sequentia magis vulga-
ria. Allium, arum, dentillaria, hy-
dropiper, iberis, lepidiū, pulegium
silvestre, sinapi, staphisagria, ranun-
culus vulgaris, fit etiam cataplasma
per se ex fimo columbino, vel anse-
rino, vel ex pice arida liquata ex
quarta parte olei alicujus calidi,
puta laurini, vel rutacei, parti sæpius
admota, & vicissim avulsa, donec
pars primò rubescat, deinde leviter
intumescat, & rursus subsideat: nam
si ad ruborem usq; partis tantum si-
netur, habet potius rationem re-
medii calefacientis, & renutritio-
nem membri adjuvantis, quam in-
sensibiliter evacuantis. Ideo in ven-
triculo frigido, & sicco, membrisq;
pa-

paralyticis, & extenuatis habet singularem usum post debitas corporis evacuationes.

Hæc de medicamentis materiam copia peccantem respicientibus.

AUGENTIA MATERIAM

Necessariam deficientem.

Deficiunt aliquando humores boni, & quædam ex illis orta, quæ omnia per se augentur opera naturæ probum alimentum immutantis, per accidens a. producuntur beneficio medicamentorum impedimentarè moventium. Itaque omnia calorem roborantia, & æquantia intemperies humorum, & viscerum per accidens augent sanguinē, quorum enumeratio petenda est inter alterantia, eadem ratione generantia lac, & semen, quorum alterum ad fætus editi in lucem nutritionem, alterum ad generationem est necessarium, propriè ad alimenta pertinent, cum utrumque ex sanguine

OF-

ortum trahat; Impropiè tamen illa quoq; medicamenta dici possunt, augere lac, & semen, quorum beneficio sanguis facilius, copiosiusque in utramq; naturam facessit.

LAC AUGENTIA.

LAc ergo augentia etiam dicuntur, quæ impurum sanguinem emendant, fluxilem reddunt, fundunt ad ubera, impellunt, & attrahunt.

Emendant, primò, purgantia humores pravyos, quib. contaminatur sanguis, deinde excedentes sanguinis qualitates & quantia, qualia sunt

In Habitu calido.

Aq. hordei ex jure, jus carnis boni succi, alteratum lactuca, malva, polygono virente, & soncho.

Præfertur lacteus sonchi, & Taraxaci succus juri mixtus.

Datur utiliter ex aliquo horum decoctorum pulvis crystalli naturalis à ℥ss. ad ℥i.

In

In Habitu frigido.

Decoctum præsertim ex jure
summitat. anethi siccati, sem. anis.
Erucae domesticæ, fœniculi, polii
recentis, porri ex aqua decocti.

Fundunt, & proprietate quadam
ad ubera impellunt jura alterata a-
netho, virente apio, & petroselino
virente, cicere, cytiso, polygala vul-
gari, & vinca pervinca.

Attrahitur sanguis ad ubera, fructi-
one frequēti, frictione molli, & fo-
mētis laxantib. inter quæ optimū sit
ex vino albo calido, itē decoctione
camomæli, & Anethi recentis; uti &
malvar. sem. lini, Alth. sive deco-
quantur ex vino, sive ex aqua.

His non proficientibus, admo-
venda sunt rubificantia usque ad
mammarum ruborem.

In hunc finem olim percuti, con-
tracta i solebant ubera fol. urticæ
recentibus cujus usu frequenti fa-
ma est, etiam masculina ubera ex-
cre-

crefcere confueviffe, ut lactationi idonea evaderent, apud Cretenfes.

Inter alimentâ viliora plurimum lactis generare creduntur, ova gallinarû, vinû album, oryza cum lacte cocta, pulmentû ex polline farinæ, & lacte, aut jure; pulmentum ex polline farinæ, & vino albo, additis ovîs, & butyro; gratius fit ferculum addito faccharo, & omiffa farina.

Semini augendo conveniunt imprimis illa alimenta, quæ vim habent medicamentofam, & calidos, tenuesq; flatus ad erectionem virgæ facientes movent.

Vilia sunt Caro Anatis, anferis, cerebra bubula, & fuilla, pipere, & fale condita, jus bubulæ coctû cum mentha viridi, aut eruca, succus expreffus ex pulmone arietis affati, ova cyprinorum fixa, pifces oſtracei pipere conditi, polypi, ſepiæ, & cancri eodem modo conditi. Tuberâ quæcumq; condita pipere, & fale.

Inter

Inter legumina cicer album, fabæ,
& phaseoli.

Inter fructus Avellana, castanea,
mala insana oleo, sale, & pipere con-
dita, poma dulcia, & uva pensilis.

Inter herbas allium virens adhuc
tenellum, cin. ra, asparagi.

Cep. tendra, Eruca, horminum,
napi, rapi, pastinaca, & selini vulga-
ris radix.

Hu efficacia ora consentur radix saty-
rii, genitale tauri, cervi, testes apri,
vulpis, & verris venerem experti vi-
no albo loti, & in furno siccati: Ho-
rum pulvis, vel mixtim, vel sigillatim
bibitur ex vino a bo ad 3.

Efficacissimus, & paratus facilis-
mus est h'c pulvis.

R. Gen. talis Tau. i.

Borac officin. an. ʒiij.

Rad. crassior. satyrion. ʒij.

Zingiber.

Cinamo an. ʒi.

Croci ʒß. Misc. F. pulvis subtilissi-
mus.

Cu-

Cujus exhibeatur mane, & post
cænam ʒi. ex tantillo vini generosi.

ALTERANTIA CAUSAM
morbificam.

CAusa morbifica multifariam
peccat, qualitate manifesta ni-
mirum & occulta, hæc postulat ale-
xipharmaca; illa, vel est prima, quæ
corrigunt medicamenta calida, fri-
gida, humida, sicca; vel ex primis o-
ritur, crassities nimirum, tenuitas,
lentor, durities, ex siccitate, & con-
cretionem, nec non acrimonia, quib.
opponuntur attenuantia, increas-
cantia, incidentia, detergentia, e-
mollientia, grumos dissolventia, &
demulcentia. Quæ primas qualita-
tes corrigunt, atq; inde ortam cras-
sitiem, tenuitatem, & lētozem, con-
coquentia, & preparantia dici con-
sueverunt, quia excedentiū qualita-
tum æquatione humores à naturali
calore facilius vincuntur, & si qui
ad cōcoctionem planè sunt inepti,
ad

ad expulsiōē minimē laboriosam idonei redduntur. Alia quæ tollunt acrimoniam, & duritiem non modo inserviunt humorum præparationi, sed etiam partib. exasperatis, & induratis, quemadmodum etiam lentorē detergentia conveniunt plurimis aliis usib. uti fæditatib. cutæcis, sordidisq; ulcerib. ideo se jūctim enumerāda sūt post præparātia hūores.

BILEM PRÆPARANTIA.

Sibilis tenuis sit, ac fervida conveniunt hordeum, lactuc. port. nymph. viol. purp. Horum decoctiones ab ℥vii. ad ℔i. circiter.

Efficaciora sunt succus fructuum berberis, granat. acid. ribes vulg. & omphacium benè depuratum, quæ addi possūt decoctionib. ab ℥i. ad ij.

Extremum remedium est serum depuratum cum emulsionis ℥i. circiter sem. papav. alb. vel solatrum hortenſe, & sempervivum majus additum decoctionibus.

A dulcioribus syrupis in hoc casu
planè abstinendum.

Si crassior sit, vel adustione, vel
crassorum humorum permixtione,
conveniunt attenuantia frigida, vel
temperata, acetosa, succ. citri. lim.
Arantior. maturor. chondrilla. ci-
choreum, cap. ven. endiv. fragaria,
hepatica, hieracium, laphatum
quodecunq; scariola, sonch^o. Tarax.
Trifol. acetos. sem. mel. citrul. cu-
curbit. cuc. unde fiunt emulsiones.

Ex herbis fiunt decocta ex jure
carnis, vel aq. quibus addi possunt
℥ij. circiter emulsionis dictorum se-
minum vel succorum citri, limo-
num & Arantiorum.

Dantur quoq; herbarum succi
depurati ab ℥i. ad iij. circiter ex jure,
presertim hyberno tempore, quan-
do defunt herbae recentes.

Ex his succis depuratis ex tēpore
fieri possunt syrupi, si addatur equa-
lis quantitas mellis despumati, &

co-

coquatur ad syropi consistentiam,
M. scentur decoctis ab ℥i. ad ij.

Oxymel quoq; simplex ad ℥i. ad-
ditum dictis decoct, utile est si ad sit
adustio, convenientissimum est se-
rum depuratū ad ℥b. i℥. circiter cum
emulsione dictorum seminum.

Pituitam præparantia.

HÆc omnia calefaciunt, & atte-
nuant, ac si pituita valde lenta
sit, & crassa, incidunt quoq;, & de-
tergent, eadem conveniunt pituitæ
saltæ, si temperentur jam enarratis
præparantibus bilem.

Ergo si pituita crassitie, & lento-
re non excedat, convenient:

Pro capite: beton, chama d, ruta
cæpar. major. rosm. salvia, stæchas,
Valerian. sylv.

Pro oculis. calend. euphrasia, fœ-
nic. verbenaca.

Pro nervis: chamæpyt. gran. junip.
peucedan. primula veris.

Pro articulis: eadem conveniunt.

Pro

Ioannis Prævotii. 555

Propectore: Caricæ, liquirit. pulmon. farfar. scabios.

Pro corde: Angel. Card. sanctus, Card. stellatus, Cariophyllata, Heder. terrest. Lavendul. pimp. l. cord. vincetoxici radix.

Pro ventriculo: absynthium, arant. & citri, cortex. & semen, mentha.

Pro jecore: Absynthium Ponticum, Agrimonia.

Pro liene: Ceterach, Epyth. Fumar. cortex, rad. capp. Tamarisc.

Pro utero: Arthemis. cap. q. calamenth. matricar. puleg. sabina.

Pro renibus, & vesica: Apium, Asparag. scenic. petros. ruscus.

Pro toto corpore: Quinquæfol. Tormentil. Oxymel. mulsa plenior.

Ex dictis fiunt syrupi, decoctiones, quibus utiliter additur oxymel ab ʒ. i. ad ij.

Ventriculo, & intestinis inutiles sunt decoctiones, quia nimis citò præterlabuntur partem affectam.

AA Con-

Conveniunt ergo solum Oxymel ad ℥ij. vel tyropus ex dictis herbis præparatus, cui addi potest emulsio sem. citri, vel Arantior. ex ℥ij. circiter juris carnis, vel datur oxymel, in quo per noctem contabuerit coma ab ynthii.

Si pituita sit admodum crassa, & lenta, nunquam omittendū oxym. additū decoctionib⁹ appropriatis, quib. incoquatur aliquæ ex his herbis magis incidentib. & detergentibus, nimirum hyssopus, prassium, polium, satirei. serpil. Thym. Tragoriganum.

Si placet extemporaneū aliquod Oxymel componere, q^{uo} vi detergenti, & incidendi oxymel scylliticum amuletur, tale esse poterit ad viscerum obstructions. R. Fol. beton.

Agrimon.

Absynth.

Fumar.

Pentaphyl. an. Mj.

Hyss.

Hyssop.

Præßij.

Thymi.an.M.i.℞.

Rad.asparag.

Fœnicul.

Petrosel.an.℥i.

Aq.communis.℔.vj.

Mellis.℔.ij.

Bulliant lentissimo igne ad per-
 ctam despumationem mellis. facta
 colatura, adde Aceti opt. ℔. i.

Sem. Anis. ℥ij.

Cinam.

Zingib.an.℥j.

Coq. lento igne ad consistentiam
 syrupi.

MELANCHOLIAM

præparantia.

Simelancholia non sit adusta, cō-
 veniunt borrago, buglos. cuscut.
 cetrach. capil. ♀. liquirit. lupul. me-
 liss. fumar. pruna dulc. quorū deco-
 ctionib. utiliter etiam additur oxy-
 mel. ratione aceti humoris crassi iē
 incidentis.

Aa 2

Si

Si humor sit adustus, conveniunt præparantia bilem crassam, & præterea succus pomorum redolentiū, qui peculiarem habet prærogativā; admisceri a. potest ab ʒi. ad ij. dictis decoctionib. herbarū, vel inde fieri potest syrupus, sumendounam partem mellis despumati, & duplū succi pomorum depurati, & coquendo ad liquidioris syrupi consistentiā, tum ad consumptionem tertiæ partis.

ACRIMONIAM DEMULCENTIA.

A Crimoniam demulcent quæcūq; vel suavi humiditate temperant, abluuntq; materiam acrem, vel oleositatem, & lentore oblinunt, quorum insignis est usus in cardialgia, & dysenteria sananda.

Abluunt temperantq; *aq. fontis, vel fluvialis amygd. dulc. emulsio. sem. 4. frig. maj. Emuls. Aq. horæ decorticat. & ex eo paratæ prunæ cremor, jujubæ, halicæ cremor, lactuca, lac omne, præ-*

præfertim bubulum, lactis serum, liquir. pruna dulcia, & poma dulcia. nymphaea, portul. sonchus, solani halicacabi fructus, semper vivum utrumq;, umbilicus veneris.

Ex herbis fiunt decoctiones aut syrupi, præfertim sumpta sapalo comellis, & cum equali portione succi herb. ad debitam consistentiam cocta.

Ex his quædam componuntur quibusdam partibus singularia.

Ad dolorē oculorum ex acri fluxione, valet cataplasma ex pomo dulci cocto in lacte, tepidū oculo admotū.

Ad urinæ ardorem decoctum liquirit. & fructuum alKaKengi; quotidie sumptum ad ℥vj. in prima mensa, vacuo adhuc stomacho.

Ad Tormina decoctum sempervi major. ex aq. pluviali.

His adde plumbum externis tantum illitionib. usurpandum, agitat. oleis in mortario plumbeo usq; ad crassitiem.

A a 3

Ob-

Oblinunt albumen ovi, & ejus aqua, amyllum feretilis additum, butyrum recens, cera pilularum forma deglutita, jus pingue intestinorum, capitis arietis, hædi, vituli, pedum pariter porci, ac vituli, oleum benè maturum, præsertim cum aq. fontana ad humiditatis consumptionem coctum. Inter herbas althæa, alcea, malva, rad. borrag. & consol. maj. harum enim herbarum decocta mucilaginea sunt.

Pro secreto habeatur ad urinæ ardorem aq. albuminis ovi l. cum pari succo Limonis hausta.

Ad dysenterias decoctum alceæ.

Huc pertinent pedes perdicis asfati quorum pulvis ad ℥j. exhibitus ex aq. Coriand. præsentē febre, ex vino rubro eadem absente, tridui spatio dysenteriam sanat.

Ad ulcera dolentia, & nubeculas, ophthalmias, vel rubori oculorum conjunctas: Balsamum sacchari soluti in albumi-

humine ovi ad duritiem cocti : sit
verò optimum hac ratione, indatur
saccharum pulverisatum vitro op-
timè prius loto ex aceto forti, tum
decoquatur super cineres usque ad
perfectam rubedinem, postea solve
per deliquium in ovo adduritiem
cocto exempto vitello.

Externis remediis utiliter addun-
tur sebum hircinum, & cervinum,
axungia ecens, pinguedo capellæ
(ex qua cum pomis fit pomata vul-
garis) medulla quadrupedum, ce-
ra, præsertim alba, & mucilagines
sem. lini, fenugræci, psyllii, coto-
neorum, nec nō rad althææ, & mal-
var. quamvis psyllii, & cotoneor.
mucilago addi etiam soleat medi-
camentis internis ad cardialgiā.

DETERGENTIA.

Detergentia contraria esse vi-
dentur epicerasticis, seu de-
mulcentib⁹, quandoquidem lentor-
em auferunt, & quod impactum est

Aa 4

par-

partibus, absterguunt, cujus generis sunt omnia salsa, nitrosa, acria, & amara, cutaneis scditatibus, fordidis ulceribus, & obstructionibus convenientia, sed quia horum multiplex est materia, ut omnis confusio vitetur in tanta varietate, proponentur hic detergentia potissimum conferentia cutaneis affectionibus, alia, quæ obstructiones tollunt, & ulcera purgantur, & sanantur sub titulo exolstruentium, & sarcoticorum, de quibus infra in censu medicamentorum morbos respicientium.

Cutem ergò detergunt amygd. amar. aciditas cirri, & limonum, butyrum maximè salitum, Entali, Dē-tali, Mater perlarum, fabarum flos, cortex, & farina, sarnugræcum, furfur, hordeum non decorticat. lilii albi flos, & radix, folia lauri, & bac-cæ, lappatum sylvestre, & acutum præsertim ejus radix, lac, & ejus serū, lythar-

lythargyrum, malva, polygonati radix, scabiola, balnea quæcumq; naturalia acida, & moderatè calida.

Ex herbis fiunt decoctiones pro lotionibus, & balneis.

Ex aliis varia componuntur tum ad faciei nitorem, & delendas maculas, tum ad scabiem, & pruritum.

Pro facie abluenda, & dealbandis manib. singulariter conferunt: amygd. amar. vel nuclei persicor. contusi, & cum lacte ad pulmenti formam redacti.

Item farina fabar. cum sero lactis subacta ad liquidi linimenti consistentiam.

Panis ex hordei farina cum lacte pistus mediocriter coctus, & calens, blande affrictus.

Celebratur quoq; lac virginis appellatum, quod fit ex una parte lythargyrii, & duplo aceti, miscentur, agitantur, per tres horas macerantur, postea filtrato aceto infunditur

A a s

aq.

§62 *Medicina Pauperum*

aq. pluvialis aut fontana, in qua parum salis solutum sit.

Omnium præstantissimum cosmeticum hujus generis est hoc.

Rx Entali.

Matris perlar. an. p. æ.

Terantur crasso modo, tum F.S. S.S. cum aciditate limonis, & repouantur in loco humido, donec liquescant, potest liquor per se usurpari, vel per filtrum, aut B.M. destillari.

Ad pruritus, & scabiem mitem optima sunt hæc unguenta.

Rx. Lychargir. auri trit. & cribrat. ℥iij.

Aq. Rosar.

Ol. Communis. (præstat rosac.) an. ℥iij.

Instilletur aqua prius sensim & sensim agitando continuè in mortario pistillo ligneo, donec pulvis totam aquam absorpserit, eique probè commixtus fuerit, tum adde oleum sensim, & sensim semper

per agitando usque ad probam mi-
xtionem, vel. *R. Butyri recent. ℥ij.*

*Rad. Oxilapathi cocta, & per se-
taceum transmissa.*

Ol. Communis.

Suc. Limonum an. ℥. i.

*Bacc. Lauri in tenuis. pollinem
trit. & cribr. ℥. ij.*

Misc. F. Linimentum S. A.

Potest omitti succus limonum, ni-
hilo imminuta compositi facultate.

Mediocriter dētergunt: pro lōtionib.
& balneis: Aqua marina, aq. Ther-
malis, salia, nitrosa, aluminosa, uri-
na, ros majalis, succus agrestis, sapo
albus, decoctum Agarici, Arundi-
nis radices, hederæ muralis, lupini,
vitis nigræ, Rhododendri.

Pro illitionib. resinae omnes maxi-
mè Laricina, & Therebinthina, la-
chryma abietina, myrrha, sambuci
cortex medianus, cornu capræ u-
stum, os sepiaeustum, Tabacum re-
cens, sal. comm. cinis.

Aa 6

Ex

564 *Medicina Pauperum*

Ex his aliqua parantur usu comprobata, cum ad scabiem tum ad faciei maculas.

Ad scabiem ;

Rx. Fol. oleand. pulv. & cribrat. ℥.ij.

Sal. commun. ℥i.

Butyr. ℥i℥. Misc. F. Linimentum.

Vel,

Rx. Fol. Tabac. M.℥.

Oleand.

Lauri. an. M.℥.

Butyr. ℥iij.

Contundantur in mortario, donec omnia probè misceantur, tum liquefiant super prunas, fiatque expressio fortis.

Vel. *Rx. Baccar. Laur.*

Ciner.

Salis. an. ℥. i.

Ol. communis ℥iij.

Cera ℥ij. Misc. F. linimentum.

Vel *Rx. Resin. Laricin. aut therebint. ℥ij.*

BH-

Butyr. recent. ℥i.

Ole. Laur.

Suc. Limon. an. ℥ß.

Sepia ust. vel

Ceruss. aut Litharg. præp. ℥i.

Sal. comm. ℥ij. Misc. F. lini-
mentum.

Vel. R. Cortic. median. sambuci.

Fol. Tabac. an. M.ß.

Ol. comm. ℥iiij.

Coquantur lento igne ad con-
sumpt. humiditat. (cujus signū est, si
folium igni injectum flammam illi-
co concipiat absque crepitu) facta
expressione, & colatura adde

Myrrhæ subtil. pulv. ℥ij.

Cera flav. ℥iß. Misc. F. Lini-
mentum.

Hic quoque lapis, si convenienti
liquore dissolvatur, & inde lavetur
locus affectus, scabiem, & impeti-
ginem tollit, &

R. Alum rup. ℥iß.

Lithargir. aur. ℥iiij.

Aa 7

Bo-

566 *Medicina Pauperum*

Borac. Officin.

Sal. marin.

Ceruf. an. ℥i.

Acet. opt. ℔. i.

Aq. pluvial. ℔. ℔.

Cerussa, & lythargirium, terantur, & cribrentur, tum coq. in olla nō vitreata ad lapideam consistentiam.

Ad faciei maculas.

R. Roris majal. per filtrum filtrat.

℔. ij

Succ. agreſtæ vel Limon. vel Arantior. acid. ℔. i.

Rad. lilior. alb.

Polygonat. an. ℥ij.

F. infusio per dies tres in fimo equino vase bene clauso, tum ejusdē fimi calore destillentur pro lotionē faciei.

Vel R. Saponis albi roris majal. aut acet. in spumam soluti ℥ij.

Farin. Lupinor. ℥℔.

Misc. agita diligenter, tum lento calore

calore, coque ad mediocrem consistentiam, postea adde.

Ol. è nucleis persicor. ℥iij.

Misc. fiat saponea; qua liniuntur manus, & facies ante decubitū, manē abluatur decoctione fursurum.

Valenter detergunt pro balneis, & lotionibus, thermæ sulphuræ, decoct. rad. bryoniæ, ellebor. nigr. centaur. minor. saponariæ. Enulæ, præsertim addito salis, & aluminis momento.

Pro Epithemate aqua calcis vivæ.

Pro Illitionibus, borax officinar. nitrum, sulphur. sapo niger, cinis samentitius, calx optime lota, pulpa rad. enulæ, ol. Tartari.

Ex his quædam componuntur utilissima, usuq; compertissima.

Ad scabiem crustosam, & leprosam incantamento simile esse, ait Amatus Lusitanus, hoc unguentum.

& Rad. Enula camp. viridis, lb. ℥.

Pingued. porc. ℥ij.

Tun-

568 *Medicina Pauperum*

Tundant. simul opt. mis. in mort.
lapideo, tūm ad lentum ign. parum
ebulliant. F.V.

Ejusdem efficaciz est istud;

℞ Rad. Enula in acet. acerr. coct. &
per setac. transmis. ℥ij.

Butyri saliti.

Resin. Laricin. aut therebint h. an
℥℞.

Salis comm. opt. trit. ℥ij.

Sulphuris ℥i. Misc. pro un-
guento.

Vel. ℞ Sulphuris vivi. ℥ij.

Ciner. Sarmeni.

Sal. comm. trit. an. ℥i.

Ligentur in lyndone rara, & bul-
liant in

Ol. comm. ℥iiij.

Acet. vel succ. limon. ℥i.

Usq; ad humid. consumpt. & hoc
globulo calido ungatur pars sca-
biofa.

Vel. ℞ Sulphur. vivi. ℥℞ in Ol. commu-
nis ℥iiij. dissolvatur, deinde
adde

Sal.

Sal. triti.

Ciner. optim. cribrat. an. ℥i.

Cera par. Misc. F. Linimentū.

Pro Lotione.

℞ Alum. rupei.

Sal. Communis.

Sulphur. trit. an. ℥j.

Sapon. nigr. ℥i℥.

Hord. M. i.

Acer. alb. ℔. ℥.

Aq. communis ℔. vi.

Bulliant ad consumpt. medietat.

& f. colatura.

Ad maculas cutis.

℞ Saponis nigri lixivio forti solut.

℥ij.

Borac. ℥ij.

Coque ad spissitudinem, deinde
adde

Cortis fabar. subtil. triti, & cribra-
ti. ℥℥.

Ol. è nucl. persicor. ℥iij.

Misc. diligenter usq; ad probam
unionem, & F. Saponca.

Loco

Loco dicti olei sumi possunt Ol. cōmunis ℥ij. Ol. Tart. ℥i. Misce, ungatur locus vesperi, mane ablatur aliqua ex dictis decoctionibus.

Antiqua macula, & vitilignes tolluntur aq. calcis vivæ facta ex sero lactis, qua locus defædatus sæpè attingatur, tū ablata pellicula restitatur unguent. de lythargirio, inter debiliter detergentia descripto.

Hoc remedio, tanquam summo secreto, usus quidam magni nominis vir, maximam inter nobiles matronas pecuniæ vim corasit.

Duritiem emollientia.

QUamvis induratus humor solae emolliatione emendari videatur, non tamen ejusdem generis remedia postulat; nam frigidi & sicci humores concretionem indurati, calefacientibus sine insigni siccitate funduntur, quæ propriæ emollientia dicuntur.

Lac verò, & sanguis quando ingru-

grumos vertuntur, & concreſcunt, cum id patiantur proprii caloris deſectu, utcuq; caleſcietia, inſigniter autem attenuantia, & incidentia poſtulant.

Denique lac caſeoſum effectum frigida, & humida requirit cum aliqua partium tenuitate, quia validus calor, ſerum à craſſiori parte ſeparans, lac in caſeum vertit.

Emollientia, proprięq; fundentia duplicis ſunt generis: alia cōveniūt tumoribus ſcyrroſis, quæ nonnihil validiora ſunt, fuſamque materiam diſcutiunt: Alia mitiora ſunt, convenientia humorib⁹ induratis abſque inſigni inſarctu, & copia materiæ, quorū uſus etiam in Scyrrhoſis affectibus præcedere debet fortia emollientia, ut, quod concretum eſt, facilius fundatur, tutiusq; diſcutiatur. *Mitia ſunt.*

Alth. borrag. bugloſſ. branc. urſ. ſænugr. liquir. ſem. lini. lil. alb. malva. melilot. paſſulæ.

Ex

Ex his fieri possunt decoctiones, syrupi, & electuaria pro usibus internis. Ingreduntur quoque externa fomenta, unguenta, & cataplasmata, quæ potissimum parantur ex butyro, adipe quocumque recenti sed maximè humano, & taxi, cera nova, medulla quadrupedum, Oesypo, oleo communi bene maturo, sevo, & mucilag. inibus althææ, malvæ, fœnugrææ ac sem. lini.

Fomentis peculiariter inserviunt lana succida, lanarum prima lotura, & hydrelæum tepidum.

Composita facile parabilia erunt hujusmodi.

Pro Illitione.

℞ Rad. lilior. alb.

Malva.

Althæ. an. ℥i.

Camomel. vel

Aneth. M. i.

Vini albi. ℥iv.

Ol. communis bene matur. ℥viiij.
Coq.

Coq. ad consumpt. humiditat. F.

Expressio cum colat.

Vel ꝛ Mucilag. sem. lin.

Rad. alth. an. ℥i.

Medul. bubul.

Butyr. recens. an. ℥℞.

Ol. communis ℥ij.

Cera novæ. ℥ij. Misc. F. Un-
guen.

Pro Cataplasmate.

ꝛ Rad. lilior. alb. ℥j.

fol. Malvæ. M. s.

Coq. leviter, deinde cum Butyr.
recent. ℥ij. tundantur, & fiat Cata-
plas.

Vel ꝛ Rad. alth. costæ & per setac.
transmiss. ℥ij.

Far. melilor.

Sem. Lini an. ℥℞.

Rad. lilior alb. ℥℞.

Medull. bubul. ℥j.

Ol. communis. ℥ij.

Cum decoct. Malvar. q. s. F. Ca-
taplasma.

Va-

Valentia omnia extrinsecus usurpantur, excepto croco, & rad. smilac. asperæ, quæ cum falsaparilla Indorum virtute, fortè etiam specie cõvenit; alia vix administratur sola, sed permixta mitiorib. emollientib.

Fomentis ergo addantur rad. bryon. cyclam. cucumeris asinini, & iridis recentis, horum decoct. paratur efficax suffumigium, extincto lapide pyrite, aut molari: Aq. Thermalis bituminosa per se inservit fomentis, & balneis.

Pro Illitionibus conferunt adeps anserinus, cervinus, oleum è nucibus expressum, amurca, petroleum.

Emplastris adduntur capæ, rad. hyacinthi, narcissi, fol. Tabaci recentis, & flores iridis.

Per se Emplastri vicem gerunt luta bituminosa, stercus bubulum, præcipue cum amurca subactum, caseus antiquus cum jure carnis salitæ subactus.

Cera-

Cerātis adduntur pix arida, resina, colophonia, bitumen; lapis gages, & ammoniacum, quod per se ceratum exhibet aceto forti dissolutum.

Ex his varia ex tempore componuntur ad scyrrhos efficacia. E. G.

Pro Illitione.

℞ Rad. cyclam.

Cucum. agrest. an. ℥ss.

Lilior. alb. ℥j.

Chamomeli.

Tabaci recent. an. M. i.

Fol. Laureola M. ss.

Ol. communis lb. j.

Vini alb. ℥iv.

Aceti ℥ij.

Coq; lento igne ad consumptio. humiditatis, & F. expressio cum colat.

Cataplasmata.

℞ Cape candida in aceto cocta ℥j.

Flor. irid. purpur. in vino alb. macer.

rad. P. i.

adip.

Adip.anser.℥℞.

Ex omnibus simul tussis F. Cata-
plasma.

Sunt qui ceratum ex sola pice al-
ba, quam Burgundicam vocant, pro
secreto habent, & ammoniaco præ-
ferunt.

Sanguinis grumum dissolvunt, &
impediunt, acetum, posca, oxymel
simplex, decoct. aristoloch. rot., ca-
lamenti, sature. thymi, Cortic. nu-
cum viridium, maximè ex posca.

Coagulum leporis ad ℥j. ex po-
sca bibitum.

Extemporaneum, optimumque
remedium fit ex lixivio, aceto, sale,
& melle hac ratione, ut:

℞ Lixivii ℥iij.

Aceti ℥i.

Mellis despumat. ℥℞.

Salis communis. ℥j.

Misce ad lentum calorem pro
potu.

Itaq; si Oxymel præparetur, co-
quæ-

quando mel cum lixivio usque ad
perfectam despumationem, fiet
gratum, & efficax remedium.

LACTI GRUMOSO

Conferunt mitia emolliētia mi-
xta, in fomentis quidem cum
apio sativo, apio montano, cumi-
no, mentha recenti, & ruta, addita
aliqua portione aceti.

In Cataplasmatibus verò cum fa-
rina fabarum, farinalentiū, oxyme-
lite, aut mulsæ cum tantil o aceti.

Expertum est hoc fomentum.

Rx Fol. Maly.

Althea cum rad.

Apii sativ.

Apii montan.

Fenic. an. M. i.

Fol. Lauri.

Flor. Chamomeli. an. P. i.

Aq. communis. lb. vj.

Bulliant ad cōsumpt. tertiæ par-
tis pro fotu, & ablutione mamma-
rū, ex residuo fit optimū Emplastrū.

Bb

Pro-

578 *Medicina Pauperum*

Probata sunt a. ista.

℞ *Therebinth. sapius lota ex vin. alb.*

℥iij.

Ova integra. N. iij.

Croc. ℥j.

Cera flav. ℥ij.

Misce F. Ceratum super lineum
pannum extendendum relicto fo-
ramine, ut papillæ promineant, su-
gig; possint.

Vel ℞. *Farin. Fabar. ℥iij.*

Ol. communis ℥ij.

Therebinthina ℥j.

Vitel. ovor. N. iij.

Croc. ℥j.

Cum decoctione Malvar. & pe-
trosel. facta ex aceto q. s. M. F. Cata-
plasma.

*Butyrum quoq; recens optimè lo-
tum in decoctione Malvarum, vel
mixtum pulveri rad. Malvar. vel Al-
thææ, ad unguenti consistentiam,
& super fol. brassicæ admotum, est
præsentaneum remedium ad dölē-
tes,*

tes, & induratas mammas ex cohibito lacte.

Est & hoc singulare.

& Ol. communis bene maturi.

Cera nova an. p. æ.

Misce, tum ter ablue diligenter Aq. ros. & extende super fol. brassicæ.

LACTI CASEOSO

E Adem conveniunt frigidis, & humidis temperata, & majori portione aceti.

Habet tamen aliquam prærogativam Emplastrum ex furfuribus, aut hordeo cum aceto coctis, addito tantillo croci.

Item Cataplasma ex farina fabarum cum decoctione solani vesicarii ex aceto facta, quod efficacissimum redditur addito coagulo leporino, & butyro recenti.

Haftenus de corrigentibus qualitatem manifestam causæ morbi-
ficæ; qualitas occulta, cum sit

Bb 2 vene-

venenata, & illis insit, quæ substantia peccant, postulat Alexipharmaca, infra recensenda inter remedia opposita causæ toto genere præter naturam.

MA TERIAM PRÆTER NATURAM quiescentem moventia.

DEfficiens motus eorum, quæ d. finito tempore moventur, à natura cōtingit potissimum remorantibus menstruis, partui difficili, recentis secundinis, retento fœtui mortuo nec non occæcatis hæmorrhoidibus innatis, quibus auxiliantur mentes provocantia, partum adjuvantia, secundinas pellentia, fœtum mortuum educantia, & provocantia hæmorrhoides obcæcatas.

MENSES MOVENTIA.

Quæ propriè menses movent sanguinem fundunt, venarūq; laxant orificia, quorū materia cum latè pateat, distinguitur à Galeno in tres classes. *Mitium*, nimirū quorum

rum usus est maxime in imminutis mensibus: *Mediocrium*, quæ magis conveniunt suppressis; & *Valentium*, quæ extremis casibus, & reliquis nihil proficientibus usurpantur, non quidem assumpta per os, sed addita pessariis, aut infusionibus uterinis.

Præcipua. & magis obvia sunt inter Mitia. Capil. Ven. Cicer. rub. primū jus, Juli Juglandium, flos K. in umbra siccatus, Liliæ alb. flos. Melis. polytrich. quinq; fol. Ex his fiunt decoctiones, & syrupi, potissimum ex vino albo aromatico.

Efficacissima sunt ista:

℞ Capil. ♀. vel polytrich. P. ℞.

Flor. Keiri siccatur. ℥i.

Vini alb. odor. ℥vi.

F. infusio per horas xij. deinde leviter bulliant ad consumption. 3. partis. Colaturæ adde Croci gr. iij. Misce pro potu calido.

Vel ℞ Nucum jugland. siccatur. non rancidar. ℥℞.

Bb 3

Iur.

582 *Medicina Pauperum*

Iur. Cicer. rubeor. ℥iij.

Vini albi. ℥ij.

Coq; ad tertiam partem. Colaturæ
adde

Croci gr. iij. vel

Cinamom. gr. vj. Misc. pro
potu.

Efus quoq; frequens juglandium
creditur à proprietate ciere men-
tes, unde mulieres faciunt utiles
placentas, & farturas ex nucibus,
fol. petrosel. virentis, & croco.

Extrinfecus pro unctione hypo-
gastrii fiet per insolationem, Oleū
keirinum, vel liliaceum, aut ex tem-
pore fia Oleum per decoctionem,
rad. lil. alb. & summitat. aneth. vel
Chamomeli.

Mediocris Aristol. rot. Arthem-
isia, Aromata omnia, inter quæ præ-
fertur Cinamom. & Crocus, Bellis
hortensis, Bilinguis, Calamethum,
Dictamus uterque, gladioli radix,
matricaria, majorana, mercurialis,
men-

mentastrum, nigella, ocymum, pul-
legium, sabina.

Ex quibus fiunt decoctiones, sy-
rupi, & Eleſtuaria, vel ꝑi. pulverum
datur ex vino albo odorato.

Aridis, uti pulveribus, bolis, &
pilulis adduntur utiliter borax offi-
cin. myrrha, sulphur, & sem. urticæ.

Pro secretis habentur, bellis
hortensis aridæ decoctum ex vino
albo.

Item Sem. Urticæ ꝑi. decoct. ex
vino albo.

Item decoct. fol. senecionis hor-
tensis deorsum avulſorum ex vino
albo, vel jure Cicer. rubr.

Item pleudodictamus Matthioli,
vel decoctus, vel in pulverem tritus,
& ex vino albo bibitus.

Item fermenti acerrimi ꝑi. circi-
ter dissoluta ex vino albo cum, vel
sine tantillo croci bibita.

Item sem. nigellæ ꝑi. cum Cina-
mom. ꝑi. ex vino.

Bb 4

Eff.

584 *Medicina Pauperum*

Efficacissimus est quoq; hic pulvis. *Rx Boracis officinar. ℥i.*

Cinam.

Rad. Aristol. rot.

Sabina.

Dictam. Cretic. vel

Sem. Nigel. an. ℥ss.

Sacchar. fin. ℥ij.

Misc. F. pulvis subtilissimus una vice sumendus ex jure Cicerum, vel vino albo.

Parari etiam potest vinum Medicatum cujus ℥iiij. calidè manè bibita aliquot diebus ante consuetum mensium circuitum illos potenter provocat. *Rx Artemisf.*

Calaminth. montan.

Fuleg.

Sabin. an. P. i.

Cinamo.

Sem. anisi an. ℥i.

Croci ℥i.

Herbæ incidantur, sem. tundantur, & per 24. horas macerentur in vini

vini albi generosi lb. ij. deinde parum bulliant, & colentur.

Externè conveniunt infusiones, thermarum sulphuratar. item decoctū herbarum dictar. ex quibus fiunt quoq; fomenta, & infusiones uterinæ; fiunt quoq; suffitus, qui in obnoxiiis hystericae passioni excitari debent, succensis materiis odoratis; in aliis indifferenter excitari possunt, & foetidis, & odoratis simul mixtis: nam odorata magis laxant uteri vias, fætida autem expultricē ad vacuationem stimulant.

Pro odorato suffitu conveniunt aromata, baccæ lauri, grana juniperi, majorana, myrrha, peucedani radix, satureia, thymus.

Fœtidiorem fumum præbent bitumen, gagates, ruta, sulphur, & obvia quædam gummata, maximè autem assa fœtida, & sagapenum.

Deniq; singulariter commendantur pesti ex allio trito cum oleo spicato,

Bb 5 item

§86. *Medicina Pauperum*

item ex succo Mercurialis, vel succo rad. Ebuli lana excepto.

Pro secreto habetur plantæ maximæ folia nudis pedum plantis supposita gestataque.

Valentia, quæ aliis seu pessis, seu infusionibus uterinis admiscuntur sunt Ari, & Serpētariæ radix, Bryoniæ radix, Colocynthis, Cyclamen, Elleb. uterque, fel, maximè bubulum, hydropiper, & staphis agria.

PARTUM ADJUVANTIA.

Partum faciunt etiam menses moventia, sed præter illa singulariter juvant stercus accipitris ad ℥i. ex vino potum.

Stercus falconis eadem dosi ex vino albo pariter potum.

Testiculorum equi castrati in taleolas sectorum, vino albo ablut. in furno exiccator. pulvis ad ℥i. ex vino aromatico sumptus.

Rad. bilinguis, cardiaca herba, & gallitricum ex vino albo, datureo-

rum

rum pulvis cochlearis mensura, vel
succus ex vino calido.

Secreti magni loco habetur à
Fallopio: boracis officinarum ʒj. ex
decoct. matricariæ, aut Sabinæ.

Redditur & partus facilius co-
chleis in cibo sumptis aliquot die-
bus ante partum.

Item turtur assata, cujus venter
fartus sit baccis lauri, juniperi, & ci-
namomo, comesa, alternis diebus,
aliquot ante partum.

Extrinsècus autem instante par-
tu, juvant lapis Ætites fæmori alli-
gatus, Jaspis item, & Corallum ibi-
dem alligatum, & magnes læva ma-
nu gestatus.

Secundinas Pellentia.

Secundinas pellunt jam propo-
sita adjuvantia partum, quæ in-
ternè sumuntur. At peculiariter cō-
ferunt, salviæ decoctum ex vino al-
bo, Lauri Alexandrinæ radix. Sem-
Matri. sylv. Seseleos Massiliensis

Bb 6

se-

femen, aut radix. Datur eorum pulvis ad ℥j. ex vino calido, vel salviæ decocto. Valet quoq; pulvis bacchar. lauri ad ℥j. ex vino, vel aq. aut decoctione lilior. alb.

Commendatur & hic pulvis.

℞ *Rad. Aristol. rot.*

Myrrha an. ℥℥.

Piperis ℥j.

F. pulvis sumendus ex æqua decocto. capil. ♀. polytrichi.

Efficacius redditur medicamentum addito tantillo croci.

Habentur quoque pro expertis, Dictamni pulvis bibitus ex convenienti liquore, & pulvis prædictus testiculorum Equi castrati.

HÆMORRHOIDES

aperientia.

SI occæcata hæmorrhoides tu-
meant, reserantur afflicta fol.
borrag. ficulneo, cucum. asin. &
bryon.; his non proficientibus ap-
plicandæ sunt hirudines.

FOE-

FOETUM MORTUUM

Educentia.

EXpellentia secundinas, foetum
quoque educunt mortuam.

Diætamno præcipua vis tribuitur,
tùm in potu, tùm in suffitu.

Peculiariter etiam juvant cani-
culæ primæ fæturæ lac potum.

Sium pro olere in cibo sumtum.

Scordii succus ad ʒß. cum croco
bibitus.

Suffitus stercoreis columbini, sul-
phuris, spoliis serpentis.

Non negligenda sunt etiam ad
hoc opus quæ femori alligata par-
tum facilitant.

Inter experientia celebratur hæc duo.

Rx Chrysocolle mineralis ʒj. vel

Boracis ʒj.

Cinamom.

Croci an. ʒj. Misc. F. pulvis.

Exhibendus ex vino albo, vel de-
cocto Arthemisiæ.

Item *Rx Chrysocolle mineralis vel boracis ʒß.*

Bb 7

Di-

Diſſamni. ℥j.

Succi Sabin. ℥j.

Tritis terendis miſceantur ℥iiij.
vini albi.

Vel præſente febre decoct.

Polyrich. aut Capil. q̃.

pro potu.

MATERIAM PRAVO

Motu agitatam ſedantia.

QUæ præter naturam moventur, ſiſtuntur reuellentibus ad partem oppoſitam; repellentibus à parte ſuſcipiente, intercipientibus materiam fluentem, & aſtringentibus vias, per quas fit fluxio.

Intercipiunt, quæ propoſita ſunt ad bilis tenuis præparationem, & quæ oblinendo acrimoniam demulcent.

Repellunt omnia illa, quæ vias etiam aſtringunt, de quibus paulo infra, & præterea omnia frigida, & humida, quæ increſſando intercipiunt jam propoſita.

℞.

Reuellunt cum rubificantia inter
insensibiliter evacuantia enumera-
ta, tum Vesicantia, quæ parantur ex
Cantharidibus, ad Cerati, vel Em-
plastri formam reductis, aut ex
flammula Iovis, vel rad. Ranunculi
minor. per se tritis, & Cataplasmatibus
forma admotis.

*Exemplum Cerati.**& Cantharid. integr. ℥ss.**Sem. ammeos ℥iiij.**Resina ℥v.**Cera ℥ij.*

Misce F. Ceratum pro 4. vesica-
toriis corpori adulto, convenienti-
bus, pueris, & mollioribus sufficit
pars dimidia.

Pro Emplastro ad quatuor vesicantia
*& Canthar. ℥iiij. vel iiij. (p densio-
ri, aut molliori habitu corporis)*

*Sinapi ℥iiij.**Sem. Ammeos ℥i.**Fermenti acerrimi. ℥ss.**Acet. acer. F. Emplastrum.**Acet.*

Acerrimum acetum est scylliticum, & quod ex tempore parari potest ex allii, ari, vel Cepæ decoctione, vel dictæ cantharides tundantur, & sub gantur cum mica panis recentis, aut cum caricis, subinde irrigando materiam aceto acerrimo, & F. Emplastrum.

Potest quoq; vesica celerrimè excitari affuso oleo, vel aqua fervēte, sed ea ratione, ut per cannulam latā materia aspergatur, ne latius diffundatur, quam expedit, vel Oleum immittatur parti minutæ Circulo cereo, aut similitam amplo, quā magnam cupias excitari vesicam.

CAUSAM SUBSTANTIA peccantem eradicantia.

PEccant substantia, sunt que toto genere præter naturam, corpora vulnerib. infixæ, vermes, calculi, venena, pus, quibus conveniunt extrahentia, vermes necantia, calculum frangentia, alexipharmaca, & pus moventia.

Ex-

Extrahentia quamvis proportionem habere debeant cum infixis corporib. ob quam alia alias materiasti abunt, ut magnes ferrum, succinum, & lapis Lyncurius, seu Belemnites paleam: quædam tamen indeterminatè cuicunq; corpori extrahendo è vulnerib. conferunt, nimirum anagallis, arundinis radix, aristol. rot. rad. dictamum, gladioli superior radix, lacertæ caput, propolis, cotulæ fetidæ radix, tiliæ cortex medianus, viscum, quæ omnia adduntur Emplastris, vel per se trita ex vino vulneri admoventur.

Admiranda vis attribuitur ad extrahenda omnia infixa, etiam è profundis partib. corporis, linguæ vulpis evulsæ mense Martio, & exiccata, atq; usus tempore macerata vino, donec mollescat, & calidè vulneri admotæ.

Sunt, qui eandem vim tribuant adipi, & pelli leporinæ, eodē mense con-

conquisitæ, sed operandi modo extrahentib. quodammodo adversatur, nam infixæ non trahit versus se, sed propellit à se, unde ad vulneris oras non admovetur, sed ad partem adversam ejusdem membri, ut si vulnere syncipiti inflicto aliquid inhaereat, propelli ajunt foras dictis materiis occipiti applicatis.

VERMIUM REMEDIA.

QUædam necant tantum, quædam necant, & ejiciunt. Necantium alia magis conveniunt lumbricis latis, alia teretibus, & ascaridibus: alia omni vermium generi adversantur, & ob eximiam vim, quæ vermes interimunt, veluti vermium venena statui possunt.

Necant lumbricū latū: Alliū, baccæ lauri, filicis fœminæ radix, heliotropiū majus, mali punicæ radix, mori radicis cortex, sem. nigell. nux juglās, Tabacū, Vitriolū, datur in substantia, vel decoctione, præsertim ex aceto, vel lixivio dulci.

Ne-

Necant teretes, & ascarides: Acetū,
Arntii succ^o, aciditas citri, & limo-
num, sem. brassicę, rad. bistortę, bo-
lus armena, cardiaca herba, crucia-
ta radix, carduus benedictus, gra-
minis rad x, omphacium, portulacę
succus, & sem. personatę radix, suc-
cisę radix, terrę quęcunq; sigil. tor-
ment. vincetoxici rad.

Necant & expellunt absynthium
quodcunq; abrotanū, amyg. amar.
aquę Thermales salis, Citri, & aran-
tii sem. chamæd. dictamus albus,
Gentianę cujuscunq; radix, lixivii,
lupini, myrrha, marrubium, persi-
corum nuclei, flores, & folia; ruta,
scordium, sulphur, urticę sem.

Ex his aliqua extemporanea
componuntur usu comperta.

Exempli gratia in potu.

℞ Emuls. ℥j. sem. Citri, vel Arantior.
ex ℥ij. Lixivii dulcis.

Addendo Vini dulcis, ℥ij. Misc.

Vel ℞ Absynthii pulverisat. ℥j. in-
datum

§96 *Medicina Pauperum*

datur malo arantio mediocriter excavato cum tantillo *sacchari & aceti*, coque super cineres calentes, tum F. expressio pro potu.

Pro secretis habentur summitates, vel Eupatorii Avicennæ, vel Absynthii marini gerent um semen data à ℞j. ad ℞j. c. reiter ex vino, lacte, aut simili liquore.

Extrinfecus parantur ex tempore tū epithemata ex aloe, myrrha, tritis ex aceto, aut exceptis felle bubulo, tū fomenta ex absinthio super calentem regulam ex calefacto, & aceto consperso, vel ex foliis perfici cum aceto calenti tritis.

Pro Illitione parabitur: Oleum efficax, hoc pacto.

℞ Herb Absynth. communis.

Card. bened.

Scord.

Tabaci an. M. i.

Rad. cyclam. ℞℞.

Colocynth. ℞ij.

Ol.

Ol. commun. lb. ij.

Acet. Acerr. lb. j.

Coq; lento igne ad consumptionem humiditatis. F. Expr. & Colat. adde Myrrhæ pulver. ℥j. iterum bulliant lento igne usq; ad dissolutionem myrrhæ F. denuo colatura.

At veluti venena vermium sunt cornu cervi, cannabis sem. aut fol. succus Corallina, seu muscus marinus. Enulæ recentis succus, hypericum, lumbricorum terrestrium pulvis, petasitis radix, ruta capraria, & argentum vivum probè expurgatum.

Dari etiam potest vulgaris Mercurius benèpurgatus, ℥j. circiter cū auro foliato in pilulam redactus.

Efficax est etiam vinū in quo, vel macerat^o sit per noctē dictus ☿, vel probè agitatus. optimèpurgatur ad hunc finem, & innoxius redditur, si cum succo rutaceo agitetur in phiala vitrea ad perfectam albedinem.

Gratum, & efficax paratur acetum

¶

si in lb. j. acetum maceretur per biduum
 summitatum hyperici P. j. cornu
 cervi rasi ℥ss. cinnamomi fracti ℥j.
 & coletur ad usum, sumitur in ace-
 tariis, vel ex cochleari, addito sac-
 chari momento.

CALCULUM FRANGENTIA.

Longè plura pponuntur à scri-
 ptorib. quam comprobet expe-
 rientia, n si id accidere putemus ob
 lapidum varietatem, nam multa re-
 nales lapides comminuunt, à quib.
 vesicæ calculus vix aliquid patitur;
 neque omnia, quæ lapides adhuc
 molles, friabiles, & ex arena nõdum
 probe compacta cohærētes dissol-
 vunt, eadē atterere possunt calculos
 durissimos ex lento exiccatoq; mu-
 co conglutinatos. Præterea quædā
 minutiores renū capillos, & arēulis
 affines asperitate sua conterūt, & ex-
 purgāt, quæ grādiōrib. calculis etiā
 renalib. nihil conferūt. Operæ pre-
 tiū est ergò distinguere huj⁹ generis

me-

medicænta in tres classes: in ea quæ
conveniūt lapidi adhuc molli, & ex
arenulis non benè compacto, in ea,
quæ induratum lapidem dissolvunt,
& in ea quæ minutiōres calculos, &
arenulas pellunt: Omnium ordinū
magis obvia præcipuè sunt ista.

*Ad calculum minutiorem, & arenu-
las.* Avellan. Sylvest. cortex althææ
flavæ, seu abutyli sem. calx cort. o-
vor. lapis spongiæ, cochlearum hy-
emale operculum, lucii piscis ossa
capitis pulverisata, Lapis ex capite
limacis, lapis Astacorum, mespilo-
rum ossicula, malvæ sem. milium so-
lis, virga aurea. Dantur in pulve-
rem trita ad ʒj. ex jure cicer. rubeo-
rum.

Ad calculū adhuc mollē & arenosum.
Ammi, cardui fullonum rad. cor-
tex rad. lauri, eryngii, rad. fraxini
sem. genistæ radic. cortex Irionis u-
triusque Matthioli semen, Lappæ
minoris sem. mentastrum, nigellæ,
&

& nigellastri semina, Raphani cortex in decoctione.

Alia dantur in pulverem trita ad ℥j. ex jure cicer. rubr. vel alia decoctione diuretica

Ad calculū induratū, & grandiozem.

Apri dētis pulvis, cicadæ ustæ cinis, borax officin. cap. ℥. caudæ tremulæ cinis, & caro. ceraforum nuclei. Galli decrepiti sanguis exiccatus, gummi cerasi, hirundinum pullorū cinis, limonum succus, leporis integri combusti cinis, lumbricor. terrestrium cinis, millepedes vino abluti & exiccati, nuclei persic. pimpinel. saxifrag. solani vesicarii, seu Al-KeKengi fructus, saxifragiæ radix, sanguis hircinus, vulpinus, & leporinus exiccatus, scorpionum cinis, tribulus terrestris, urticæ rad. violæ purpur. sem. Hæc eadem arenulis, & calculo molli conveniunt.

Ex compositis facile parabilibus celebriora, & arcanorum loco habentur ista.

℞

R. Sanguin. hirci herbis saxifragis
nutriti.

Myrrha el. an. ℥℥.

Iuris Cicer. rubr. ℥iij.

Suc. Limon. ℥j. Misce pro potu.

Item R. Sanguinis è viva vulpe.

Vini albi an. p. a.

Coq. lento igne in olla vitriata
ad formam pultis, cujus exhibean-
tur ℥v. per 9. dies continuos.

Vel R. Millepedum præpar. ℥j.

Aq. vitæ ℥℥.

Decoct. Cicer. rub. ℥ix.

Affundatur juri calefacto aq.
vitæ, & sumatur tepidum horis 6.
ante cibum per 9. dies.

Item, R. Boracis ℥j.

Iur. Cicer. rub. ℥iv.

Aq. Ardentis ℥ij. Misc. pro potu.

Item, R. Sem. viol. purp. ℥℥.

Decoct. vel aq. veronica, vel Virgæ
aureæ q. s.

F. Emulsio danda per 7. dies.

Item, R. Succu tribuli maximè ter-

Cc

re-

reſtris ꝑjv. bibatur, calidus p̄r ſe,
vel cum ſucco lim. Eodem modo
haufus ſuccus virgæ aureæ per ali-
quot dies efficaciffimus cenſetur.

PUS MOVENTIA.

QUamvis immediatè materiam
toto genere p. n. non extirpēt,
ſed naturæ potius concoquenti o-
pem ferant, quia tamen pus confe-
ctū citius, tutiusq; evacuatur, me-
diatè ad hoc quoq; opus concurrūt.

Per ſe a. pus movent, quæ partis
calorem ſovent, ſeu ob tempera-
menti ſimilitudinem, ſeu caloris in-
fluentis effluxum prohibendo po-
roſitatum in ſarctū.

Per accidens pus movent, quæ
materiæ exceſſus retundunt, atq; a-
deo cōminixtum ſanguinem aptum
reddūt, ut à calore nativo pariatur.

*Partibus, & habitibus calidioribus
convenient capā cocta, caricæ pin-
gues, crocus, ſcœnugræ cum, lini ſe-
men, lil. alb. radix, thus, & in extrin-
ſecis*

secis adeps anserinus, caprinus, fermentum, resina quæcumq;.

Extemporanea Emplastra poterunt esse huiusmodi.

℞ *Picis arida* ol. liquat & q. s. F. Emp.

Vel ℞ *Resina cujuscunq;*, *cera flava* an. p. x. misce pro cerato, cui addi potest 4. pars adipis anserini, & formari unguentum.

Vel ℞ *Rad. lilior. alb. coct. & contus.* ℥ij.

Farin. seru. lini.

Fenugr. an. ℥j.

Croci. ℥j. Ol. comm ℥i℥.

Cum decoct. rad. lilior. q. s.

F. Cataplasma.

Fermentum per se cum adipe anserino subactum est efficacissimum.

Partibus, & habitibus temperatioribus conveniunt althæa, malva, amygd. dulc. butyr. vitellus ovi, quibus in extrinsecis adduntur, adeps humanus, gallinaceus, suillus, cæsyum, sevyum, cera flava, propolis, sapa, tritici

Cc 2

tici

604 *Medicina Pauperum*

tici farina à furfur. purgata, oleum commune maturum, non admodum vetus.

Per se Emplastri vicem gerunt viva animalia admota, maximè castelli.

Ex aliis extemporanea emplastra sic parabuntur.

℞ *Farin. tritic. vel mica pan. modicè ferment* ℥ij.

Ol. communis ℥j.

Aq. calid. q. s. F. Cataplasma.
Vel.

℞ *Fol. Malv. M. j.*

Butyr. ℥j.

Frigantur simul in sartagine, tum contundantur ad formam cataplasmaris.

Vel.

℞ *Rad. althææ costæ, & per setac. transmiss.* ℥ij.

Farin. scœnugr. vel tritic ℥j.

Vitell. ovor. N. ij.

Ol. commun. ℥j. F. Cataplasma.
Opti-

Optimum est hoc unguentum
ad puris maturationem, & rumpen-
dum abscessum.

℞ Fermenti acerrimi.

Vitell. ov. an. p. a.

Ol. communis

Et Croci ana parum. F. un-
guent. & extendatur
super folium brassicæ.

Partibus, & habitibus frigidioribus
conveniunt Aq. calida perfusa, hy-
drælæum, lac, farina hordei, mala
Cydonia cum lacte cocta, folia vio-
læ purpur. & viscus pomorum.

Vulgare Emplastrum paratur ex
mica panis cum lacte, & oleo com-
muni, vel rosaceo.

Vel. ℞. Fol. malvæ.

Violarie an. M. j.

Coq. & contund. addendo

Farin. bord.

Ol. communis, vel ros. an. ℥ j.

Misc. F. Cataplasma.

Quòd si accidat ratione pravæ

Ce 3

ma-

materiæ tumorem facientis, opus esse pus moventibus per accidens, hoc est, æquantibus excessum materiæ peccantis, quæ aliàs convenirent habitibus calidioribus, convenient tumoribus frigidioribus quia materiam frigidam, & crassam calefaciunt, & attenuant, quæ convenirent habitibus frigidioribus, convenient calidioribus, quia materiæ fervorem compescunt.

Unde constat temperatiora proposita ad omnem occasionem esse aptissima, modo calidis, modo frigidis mixta, prout affectus suppuratione indigens ad frigidū magis, aut ad calidū vergere videbitur.

ALEXIPHARMACA.

Propriè talia sunt, quæ proprietate substantiæ, seu toto temperamento vim verè veneficam oppugnant.

Impropriè hoc nomen merentur quæcunque venena ob evidentis

tis qualitatis excessum respiciunt, qualia sunt Epiceraistica venenis exedentibus opposita, refrigerantia opposita venenis inflammat. & calefacientia cardiaca contraria venenis calorem extinguentibus, narcoticis scilicet.

Licet verò singulis venenis propria convenient alexipharmaca, quia tamen species ferè veneni, nullis propriis, certisque signis deprehendi potest, fit, ut ad communia alexipharmaca, quæ venenis omnibus resistunt, & nativi caloris robur tuentur, semper confugiamus, quorum notitia ideo satis esse videtur ad venenorum, tum præcautionem, tum curationem.

Claritatis autem gratia tres statui possunt communium alexipharmacorum ordines; alia enim adversantur præcipuè venenis in nobis natis, vel ab excellenti putredine, vel indicibili alia corruptio-

ne, & hæc peculiarem habent usum
in febribus malignis, & peste. Alia
opem ferunt venenis assumptis: A-
lia medentur venenis morfu, aut i-
ctu instillatis.

Februm malignarum, & pestis Ale-
pharmaca, calida quidem conveni-
ent tempori, & habitui frigidiori,
frigida verò, & temperata habitui,
ac tempori calidiori.

Calidiora sunt: Carduus San-
ctus, Carduus Stellatus, citri cor-
tex, & sem. dictamni albi radix,
myrrhis, myrrha, scordium, morsus
diaboli; ruta caprar. Scorzonera,
Valerian. major, vincetoxici ra-
dix.

Temperatiora sunt totum citrum,
succus ejusdem, præterea Arantio-
rum, & Limonum, borrago, bu-
glossum, bistorta, bolus armena,
cyanus, cornu cervi, pimpinella vul-
garis, pentaphyl. scabios. tormentil.
terra figil. quæcumque.

Ex

Ex his aliqua satis utilia parari
possunt, bezoarticis pretiosis, & ex-
oticis non inferiora.

In primis utilissimus est hic syru-
pus ex toto citro, satis temperatus,
& omni naturæ conveniens.

℞ *Malum citr. bene matur. & suc-
cul. radula contritum, ponde-
rans ℔.j.*

Rad. Scorzonæ. ℥j.

Herb. Scordij. P.j.

Sem. Cardui Sanct. ℥ij.

*Aq. destill. ex succ. pomor. redo-
lent.*

ex suc. Acetose. an. ℔.ij.

Spir. Vitriol. Div. velejus loco.

Succi Limonum. ℥ij.

Tritis terendis R. infusio per hōr.
xxx. in vase optimè clauso, tum levi-
ter ebulliant ad consumptionem
tertiæ partis.

F. fortis expressio, colatura sen-
sim depuretur per digestionem ca-
lore leni, infundendo quotidie ali-

C c 5 quot

610 *Medicina Pauperum*

quot flores Arantior. vel Citri usq;
ad perfectam depurationem, tum
adde

Sacchari fini lb. iß.

Coquatur lentissimo igne ad li-
quidioris syrupi consistentiam, cu-
jus dosis est ab ℥ß. ad ℥ij.

Optimum est quoque hoc oxy-
mel paulo calidius.

℞ Cardui Sanct.

Scordij, Ruta Caprar.

Scabios.

Bugloss.

Acetos. an. M. j.

Rad. Scorzoner.

Tormentill.

Vincetoxic. an. ℥j.

Aq. Fontan. lb. iv.

F. infusio per diem, tum adde

Mellis optimi lb. jß.

Coquatur lento igne ad perfe-
ctam despumationem mellis, facta
expressione, & diligenti colatura,
adde

Arg.

Aceti optimi, in quo totum citrum
radula tritum contabuerit, ac
bullierit ℥x.

Coq. lento igne ad oxymelitis
consistentiam.

Potest quoque acetum parari ef-
ficax, cujus cochlear j. aut alterum
immitti poterit iusculis alteratis,
aut cibis.

℞ *Citrum* integrum radula tri-
tum. N. j.

Cor. Cervi preparat.

Boli Armeni lutei an. ℥ij.

Rad. bistort.

Tormentil. an. ℥j.

Sem. Card. Sancti ℥j.

Fol. Scordij P. j.

Acet. opt. per filtrum colati tan-
tum, ut 4. dig. superemineat.

Omnia crassè trita infundantur
aceto in phiala optimè clausa, &
stent ad solem, vel in Hypocausto
per aliquot dies agitando materiam
quotidie, donec aceti color ampli⁹

C 6

mu-

612 *Medicina Pauperum*

mutari non videatur, tum F. colatura, & servetur usui in vase clauso.

Est hic pulvis febribus malignis utilis. *R. Bol. Armen. lut.*

C.C. preparat.

Rad. bistor.

Tormentil.

Sem. Card. Sancti.

Acetof.

Cortic. Citri. an. ℥j.

Camphor. ℥j.

Crocig. v. Milce. F. Pulvis subtiliss.

Dandus ad ℥℞. ad ℥j. in jure aut bolo formato cum succo Citri, aut Limonum: immitti quoque potest panatellæ, aut ptisana: potest etiam cum portiuncula Tragacanthæ solutæ in aq. ros. aut suc. citri probe subigi, pulvis reformari in pilam compressam, lapidi bezoartico similem, quæ demum exiccata diutius integris viribus durabit.

Extrinsècus utile erit dictū acetū alte-

alteratum toto citro pro odora-
mentis, & Epithematibus cordis
additum proportionatis aquis, vel
decoctionibus.

Ajunt sulphur vivum continuo in
ore gestatum præservare à peste.

*Venenis assumptis conferunt præter
jam dicta inter calida quidem: Ammi,
angelicæ utriusque radix, anthonæ
radix, anisum, aristoloch. rotund.
aromata omnia, brassicæ sem. carli-
næ radix, caryophilleus flos, crucia-
tæ radix. Eruca flos, & coma, enulæ
rad. Eringii rad. Gent. major. Impe-
rat. radix. juniperi baccæ, ligustici
rad. & sem. napi sem. nux juglans,
polemoniz rad. ruta hortensis, uni-
fol. rad.*

*Temperatiora sunt aq. in ophite
vasc asservata, ebur fossile, fungus
cervinus, glandium quernarum de-
coctum, hyperici semen, terra me-
litenfis.*

Datur dictorum pulvis ad ʒj. ex

Cc 7 vino

614 *Medicina Pauperum*

vino generoso, vel ex aceto tepido,
aut utroque mixto.

Composita variè fingi possunt
pro cuiuscumque arbitrio.

Celebre est, & antiquum antido-
tum ex nuce juglande cum tribus
rutæ foliis, & carica quotidie mane
sumptum.

Huc etiam facit Theriaca Dia-
tessaron dicta, paratu facillima.

& *Rad. Gentian.*

Bacc. laur. (ad venena præfer-
rem baccas junip.)

Myrrhæ.

Rad. Aristol. rot. an. ℥ij.

Mellis despumat. ℔. ij.

F. Electuarium.

Sunt quoq; ad venenorum, & pestis
præservationem celebres, & paratu
facillimi pulveres: Gryscus Casaris,
& Saxonicus, quorum descriptio
extat apud Veckerum lib. 2. anti-
dot. Spec. sect. 20. pag. 721. & 722.

Hoc acutum valet quoq; ad vene-
na, & ad pestem.

&

& Rad. Angelica sylv. in umbra sic-
cat.

Gran. Iunip. an. ℥j.

Myrrha ℥ss.

Fol. Ruta, P. i.

Cinamom. ℥j.

Omnia crasso modo tusa infun-
dantur, & digerantur per octiduum
in aceti optimi (rosar. est melius)
℔b. jss. tum coletur, & ejus sumatur
quotidie mane cochlear unum je-
juno ventre.

Extrins. commendatur raphanus
in taleolas dissectus, sub alis gesta-
tus, procurato interea sudore.

Celebria sunt olea magni Ducis,
& de Scorpionibus Matthioli, quo-
rum loco alia minus laboriosa, &
æquè valida componi poterunt.

& Ol. bene maturi (quod antiquius
ed erit melius) ℔b. iij.

Vini albi aromatici. ℔b. jss.

Rad. gentian.

Erment.

616 *Medicina Pauperum*

Imperat.

Vincetox.

Angel. vulg. an. ℥i.

Fol. Hyperici.

Tabac.

Ruta, an. M. i.

Gran. Iuniperi ℥ss.

F. infusio S. A. in vasa optimè clauso
per 4. dies, deinde bulliant ferè ad
consumptionem humiditatis, F. ex-
pressio, & colat. deinde adde

Herb. scord. M. i.

Myrrha.

Aloes.

• *Croci an. ℥iij.*

Iterum bulliant per 6. horas, F. Ex-
pressio, & Colatura.

*Morsibus, ictibusq, venenatis internè
quidè conveniunt alexipharmaca
cardiacis mixta.*

Externè v. eadem cōveniunt mi-
xta attrahētibus venenum ad partē
læsā, vulnusq; tenentia apertum,
quoad virus expurgatum sit, qualia
sunt

sunt omnia aperientia calidiora & rubeficantia, de quibus alibi dictū.

At propriè alexipharmaca sunt: Ammi sem. aristol. long. bdellium, Distamus uterque, calega, gladioli radix, gallinaceorum cerebrū, organum, pimpinell., Saxifrag. radix, sem. personatæ, succus Tragopogi, & cujuscunque Scorzonæræ fol. & radicum succus: sumuntur hæc omnia cum vino albo.

Idem ferè præstant Alexipharmaca pro assumptis venenis proposita, illud autem universaliter est supponendum, cujuscunque Animalis venenati carnem suo morsui, vel ictui admotam venenum extrahere: inde celebris è serpentum aquaticor. sed maximè viperarū pulvis ad venenatum quorumvis serpentum, imò si famæ credendum est, ad omnia venenatum curanda, tum præservanda, adeo ut pulvere semel sumpto ad ʒß. ex vino aromatico quidam affirmet

cor-

618 *Medicina Pauperum*

corpus à venenis immune per multos dies reddi.

Paratur autem hic pulvis tripliciter, &

Primò quidem:

& Cor, hepar & tres priores vertebrae viperæ, vel colubri, exicca in furno, tere in pulverem adde rad. Imperatoria partem aequalem. Misc.

Secundo, caro viperina optimè lota ex vino albo relicto corde, & jecore lentè exiccerur, ut in pulverem teri possit.

Tertio, caro vip. exemptis intera-
neis, excepto corde, & jecore, inci-
datur, & per ostiduum sale condia-
tur, tum includatur cribro undiq;
bene munito, & subtus excitetur
quotidie suffumigiū odoratū qua-
ter, aut quinquies, injecto ignitis
carbonib⁹ pulvere ex myrrha, bac-
cis lauri, junip. & caryophil: cumq;
caro optimè redolere sentietur, in-
cludatur ollæ vitreæ & operculo lut.
pro-

probè munitæ, & indatur furno panario, ibiq; stare sinatur, donec tota carniū substantia cum ossiculis suis redigi possit in subtilissimum pulverem, huic pulveri plus tribuūt recentiores, quam Antiqui Ther. aut Mithridatio.

Præter ista habet rabidorum animalium virus certa quedam antidota, quibus per 40. dies sumptis, vulnere interim detento aperto arcetur rabies, & aquæ timor. Sunt autem allyssum, cancrorum fluviatilium cinis, rosæ sylv. radix, & pimpinella communis. Dantur seorsim, vel mixtim à ʒi. ad ij. ex vino albo, utiliter miscentur rad. gentian.

Galenus suum antidotum parat ex i. parte thuris, partibus ʒ. gentianæ, & 10. cancrorum fluviatilium crematorum.

Experientia quoque probatum esse ajunt hunc pulverem ad sanandum aquæ timorem, exhibitū in vino

no

620 *Medicina Pauperum*

no à ʒß. ad ʒij. quotidie tribus ho-
ris ante cibum.

℞ *Fol. polypod.*

Rutæ.

Verben.

Salviæ angustifol.

Plantag.

Abynth. comm.

Menthæ.

Arthemif.

Meliss.

Beton.

Hyperic.

Centaur. min. an. p. x.

Siccentur in charta, & terantur
in pulverem.

Hactenus de medicamentis op-
pugnantibus causam morbi princi-
palem, à cujus ablatione morborum
naturalium curatio inchoanda est,
nisi adsit aliquod aliud urgens quod
trahat ad se curat'one: illi enim sta-
tim prospiciendū est, etiam ad tem-
pus neglecta causa, & morbi provi-
den-

dentia, si urgēs nullus det inducias,
& citæ mortis periculum inferat.

Urgere autem intelliguntur im-
media: è quidem, & per se i. imbecil-
litas spirituum vitalium in animi de-
liquio, & syncope; mediatè verò, &
secundariò vehemētissimus dolor,
cōtinuæ vigiliæ, immoderatæ quæ-
cumq; evacuationes, unde imminet
spirituum dissolutio.

Atq; istis urgentibus opponun-
tur roborantia spiritus, dolorem
sedantia, somnum conciliantia, flu-
xus sistentia. Si morbus, aut causa
principalis ob sui vehementiam, &
ægrī imbecillitatem induant ali-
quando naturam urgentis, ut calor
febris ardentis in senē, & pituitæ
crassities ac lentor in febre exquisi-
tè quotidiana, nō alia postulant re-
media, quam per se contraria, de
quibus partim dictum, partim di-
cetur infra in censu remediorum
morbos tollentium.

SYM-

SYMPTOMATUM URGEN-

tium remedia.

Spiritus roborantia, eisdem reficiunt, vel per accidens tollendo causas, ob quas dissipantur, de quibus nō est hic sermo, vel per se,tribuendo materiam, ex qua celeriter generari possint spiritus, & calidum innatum cordis roborando.

Roboratur cor cardiacis, de quibus inter medicamenta opposita morbo *in intemperie*.

Tribuunt materiam aptam converti in spiritus, tum alimenta boni succi, & tenuis substantiæ, inter quæ præcellit vinum odoratū, tum odoramenta, quippe quæ tenues halitus spiritui affines cordi suppeditant.

In causa calida: fiant odoramenta frigida, aut temperata, qualia præbent acetum, camphora, rosæ, violæ, myrthus, cortex pomorum redolentium, & cydoniorum flavescensium. Optimum est acetum his

ma-

materiis alteratū, facta per aliquot horas maceratione, vel levissima ebullitione, tum ad aëris alterationem mixtum aquæ cubilib⁹ inspergenda, tum ad odora menta naribus admovenda.

In causa frigida fient odora menta ex flor. citri, Arant. Limō. Vetonie. coronar. Jasmin. Lil. conval. rad. Angel. Cyper. Valerian. hortēf. fol. Calamenth. Montan. major. Meliss. Menth. Rosmarin. Spicæ, Lavend. Thym. cortic. Citri. bacc. Lauri, & Juniper. & quibuscunque aromatibus.

Præstantissimum est acetum generosum, vel vinum jam dictis alteratum.

Excellit quoq; odor carnis assæ caryophyllis, & cinamomo perpunctæ, quemadmodum, & panis adhuc calentis, malvatico vino, vel simili generoso vino respersi.

In eundem finem parari poterunt olea

olea ex aromatib⁹ minimè laborio-
sa, & satis vilia pro narium, & cordis
inunctione, si cum oleo communi
claro, & minimè fæcoso, atq; pulve-
re Cinamomi, vel Cariophyllor. fiat
veluti puls liquida, quæ in vase clau-
so sinatur p aliquot dies in loco ca-
lido, deinde torculari exprimatur.

Dolorem sedantia sunt triplicia. Sa-
nantia nimirum quæ causam dolo-
ris tollunt, propriè anodyna, quæ
relictæ causa sensum partis demul-
cent, & narcotica quæ sensum om-
nino auferunt, vel stupefacta par-
te, vel inducto somno.

Sanantia huc non pertinent, tam-
latè enim patent, quàm morbi, &
eorum causæ à quibus solvi potest
continuitas partis.

Propriè anodyna sunt Althæa, a-
migd. dulc. aq. tepida, anethū, cha-
momælum recens, fænu græcum,
lini semen, malva, melilotus, ovi vi-
tellum, jus pingue.

Præ-

Præter quæ in extrinsecis conveniunt pro fomentis, animalia enterata adhuc calentia, pulmones, & omenta animalium, hydræleum lana succida, lacovillum, & vaccinum calens, panis triticeus mediocriter coctus adhuc calens.

Pro iniunctionib. adeps suillus, gallinaceus, vitulinus, humanus, Butyrum, sebum, mucilag. sem. lini, malvar. althææ fenugræc. & olea ex dictis herbis, & seminibus per decoctionem parata.

Sed præter hæc anodyma communia, sunt quædam alia determinatis partibus dolentibus singulariter conferentia, quæ idè specificæ anodyma dici possunt.

Ad dolorem capitis ex quacumq; causa efficacissimum est hoc oleum.

℞ Succī verben. optimè depurati
℔b. ij.

Ol. Rosar. simpl. ℔b. i.

Destilletur lento igne cinerum,
liquor abstract⁹ denuo affundatur,
D d iterum-

iterumq; destilletur, id tertio repetatur. Miscetur enim succus oleo inseparabiliter, eoq; tepido imbutur linteolum pro frontali. & illinantur futurae.

Ad dolorem dentium extollicur oleum destillatum per descensum è ligno buxi.

Dolori colico, certam opem adfert cranium humanum præparatū ℥i. pondere exhibitum cum ℥i. sem. anisi in causa frigida, cum coriandris in causa calida,

Item pulvis testiculorum equi castrati ad ℥i. eadem ratione exhibitus prodest.

Ad dolorem hemorrhoidum excellit hoc oleum.

R. Rad. scrophular. ℥iiij.

Chelidon. maior. ℥ij.

Spongiar. cynorrhod. innascent. n. iiij.

Sem. Agnicasti ℥ij.

Ol. commun. lb. ij.

Radices incidantur, reliqua ruditer

difer contundantur, & insolentur
per mensem, & servantur ad usum,
vel macerentur per octiduum in
loco calido, deinde coquantur ad
consumptionem humiditatis, &
fiat expressio cum colatura.

Ad dolorem pectoris singulariter va-
let oleum è sem. lini ad ℥ij. ad iiij.
bibitum.

Ad dolores articulorum expertum
est hoc fomentum.

R. Fol. malvæ.

Ebuli.

Plantag an. M. j.

Aq. fabrorum ℔b. ij.

Bulliant ad consumptionem ter-
tiæ partis, facta expressione, & co-
latura dissolvatur salis nitri per sul-
phur. purgati [appellant salem pu-
nellæ] ℥ß. & linteum imbutum ca-
lide applicetur parti.

Narcotica, eadē parti admota, stu-
pefaciūt, assūpta vero, vel odorata,
aut capiti administrata somnū cōci-

D d 2 liant.

liant: Differunt qualitatis intensi-
one à proprie somniferis, quia hæc
mediocri frigiditate, & humiditate
somnum conciliant. Illa utriusque
qualitatis excessu soporē inferunt,
& si largius usurpentur, etiam ea-
rum, & Apoplexiam.

Est tamen quidam narcoticorum
gradus; alia sunt mitiora, quorum
usus non est tam periculosus; alia
valentiora quibus non est utendū,
nisi dolore, aut vigilia, valde ur-
gente.

Mitiora, sunt, intrinsecus quidē
sem. papau. alb. ad 3 j. circiter, ex-
trinsecus verò in lotionibus, fol. so-
lani horrensis, & papaveris fativi.

Valentiora sunt cicuta, hyoscy-
amus albus, mandragora, opiū, stra-
monium rotundum; hyoscyamo
nigro, & stramonio longo satius est
abstinere ob insignem noxam, quā
visceribus afferunt.

Ex aliis fiunt odoramenta, & lo-
tiones pedum, & capitis; soli opio,
& stra-

& stramonio rotundo internus usus concedatur.

Datur stramonii semen in substantia à ℥ss. ad ℥j. circiter, infusum à ℥j. ad ℥ij. corrigitur vino generoso.

Opium datur à gr. ij. ad v. correctum croco, aut pipere, & vel in pillulam redactum, vel infusum vino generoso; orientale opium nostratè paulò validius est, sed quia exoticum opium sæpe adulteratum ad nos convehitur, & aliquando magno pretio venditur; satius est purum ex nostra te papavere, præparare hac Quercetani ratione. Summe quamlibet quantitatem capitū papaverishortensis rubeum florem gerentis, quando iam primi flores explicati apparent, tunde in mortario lapideo cum pistillo ligneo, materiam pone in vitro capaci, & tantum vini albi generosi affunde, [arbitrari aceto sumpto opus melius processurū] donec materia optimè irrigata sit, & vinum buobus trans-

Dd 3 versis.

versis digitis superemineat, digerantur per quindecim dies circiter, cumque liquor bescere incipiet intente, includatur materia lineo sacculo, & fortiter exprimatur, quod expressum est, lento igne divaporet ad melleam consistentiam, quam adhuc calentem conice in aquam frigidam, ut materia coaguletur, tunc exime, & humiditatem absterge.

Caterum ex compositis Narcoticis duo sunt prestantissima, & pre aliis officinalibus paratu facillima.

Primum est Guainerii pro usu externo.

R. *Opii.*

Succ. Hyosciami.

Mandragor.

Maiorum immaturorum.

Lactuca.

Hedera arborea an. ʒj.

Dissolve opium succis, eo dissoluto imbue spongiam, & ad solem per xv. dies exsicca, cum uti voles,

mer-

merge spongiam in aqua tepida, & naribus admove; retinet hæc spongia vinum suum per aliquot annos.

Alterum inserviet vasis internis, laudanum nimirum, quod bi-
dui spacio parari potest hac ratione.

R. *Extract. croci* ℥j.

Extr. spec. Diamoschi ℥ij.

Extr. opii preparat. Div.

Misc. & cum guttis ij. *ol. caryophil.*
destillat. malaxa.

Crocus, & species extrahuntur
aqua vitæ, opiū v. aceto destillato.

Præparatur autem opium, si subtiliter concisum lento calore exiccetur, donec fumum amplius non emittat: & digitis tritum impulverum redigatur. Huius dosis est à gr. jss. circiter usque ad gr. v. dolores soluit, vigilias pertinaces sistit, & immoderatos acresq; fluxus compescit.

Somnum conciliant etiam Narco-
tica, & quidem tantò potentius;
quā verè somnifera, quāto validio-

Dd 4 res

res causas requirit sopor, quā somnus, quo fit, ut verè somniferis non conferentibus tandem veniendum sit ad narcotica, seu soporifera iam dicta.

Vere autem somnifera sunt Amygd. dulc. & earum emulsio, lac quodq; lactuca sativa, muscus arboreus recens, nymphaea, sempervivum maritimum, viola purpurea, umbilicus vener. & vinum oligophorum benelymphatum, horum administratio varia est.

Jura carniū alterantur lactuca, & violis.

Datur emulsio amygd. dulc. ex decoctione lactucae editur lactuca cocta condita aciditate arantii, citri, aut limonum.

Ex herbis fiunt decoctiones pro capitis, & pedum lotionē.

Parari potest pro illitione narium, & temporum, extemporaneum oleum hac ratione.

R. Lactuc.

Nym-

Nympha.

Semperuivi.

Solani hortens. an. M.i.

Ol. Commun. ℥viij.

Coq. lento igne ad humiditatis
consumptionem, exprime, & cola.

Eundem habet usum oleum vi-
olarum, & nenupharin. officinar.

Fluxum sistētia illa omnia sunt,
quæ materiam pravo motu agitā-
tedant repellendo, revellendo, in-
tercipiendo, viaque adstringendo,
ideo non sunt hoc in loco denuo
recensenda.

Quæ nonnullis fluxibus magis
appropriata esse videntur, peculia-
riter adnotabuntur in censu astrin-
gentium.

Restat ergo enumeratio medi-
camentorum pellentium morbos,
quorum usus est maxime post cau-
sæ, & urgentis ablationem; mor-
borum autem tria summa genera
statuuntur, intemperies, mala con-
formatio, & soluta unitas.

Dd s AL-

A L T E R A N T I A

morbosam intemperiem
totius, & partium.

QUamvis morbosę intemperies
sint octo, quatuor simplices,
totidem compositz, non est tamen
necessarium octo alterantium or-
dines constituere. Primò, quia in-
temperies compositz curantur sim-
plicibus alterantibus mixtis, atque
compositam qualitatem, prout ex-
igit necessitas, producentibus; de-
indè, quia inter qualitates simpli-
ces, humiditas, & siccitas tollun-
tur fere medicamentis calidis, aut
frigidis: humiditas enim excremē-
tia curatur tum calidis rarefacien-
tibus, & absumentib⁹ tum frigidis
exprimentib⁹ tum aridis utriusque
generis cohibentibus humiditatē.

At morbosa siccitas, cum suppo-
nat defectum nativę humiditatis,
quę non restituitur medicamento,
sed alimento, tollitur potius con-
gruo victu, & aliquo calore in exic-
cata

cata parte excitato, cuius beneficio sanguis eò attrahatur, & facilius coquatur, itaque satis erit proponere medicamenta calefacientia partes refrigeratas, & refrigerantia calefactas. Siquidem utriusq; simul mixtis facile erit medicamentū in acti-
vis temperatum conficere, in passi-
vis autem humidum, aut siccum, prout necessitas, & tollenda in-
temperies postulare videbitur.

Alterantium porro medicamen-
torum cum duplex sit genus, alia
sint determinata, à quibus certæ
partes magis affici videntur : alia
sint indeterminata, quæ in totū cor-
pus indifferenter agunt, sufficiet
proponere tantum alterantia de-
terminata, quoniam totius corpo-
ris intemperies alicuius præcipuæ
partis noxam sequitur, cuius reme-
dia, & toti corpori opem ferunt.

Alterantia determinata sumunt
nomen à parte, quam iuvant, unde
cephalica à cap. ab oculis ophthal-
mica,

mica, ab articulis Arthritica, à nervis neurotica, à partibus spiritalib⁹ pneumonica, à corde cardiaca, à ventriculo stomachica, à Iecore hepatica à splene splenetica, à Renib⁹. Nephrica, ab utero hysterica denominantur.

ALTERANTIA

Caput.

Cephalica calida quæque refrigerato capiti conveniunt, præcipua, & magis obvia sunt: Abrotanum, betonica, buxi lignum, calamenth. chamædrys, hyssopus, laurifolia, & baccæ, lavendula, maiorana, pæonia, rosmarinus, ruta hortens. & captraria, salvia, satireia, serpillum, stæchas, thymus, viscus quernus, valerianæ, sylvestris radix, aquæ thermæ sulphuratæ debito modo haustæ.

Ex aliis parentur decocta, electuaria, & vina medicata loco confectio-
num, & conservarum officinalium.

Ex-

Exemplum decocti.

℞ Limatur. ligni buxi ℥ij.

Visci quercini subtiliter incisi. ℥j.

Aq. communis ℔b. vj.

℞. Infusio per horas xv. postea
adde.

Eol. Betonij.

Calamenti.

Maiozan.

Salvia. an. M. i.

Rad. peonie. ℥β.

Bac. Lauri ℥ij.

℞. decoctio lento igne ad con-
sumptionem tertiæ partis & ℞. Co-
latura, cuius exhibeatur ℔b. β. pro
vice per aliquot dies.

Antiqui in curanda intemperie
non admodum recenti, quadragin-
ta circiter dierum spatio sua medi-
camenta administrabant, quorum
exemplo nunc ut plurimum insisti-
mus.

Exemplum Electuarii.

℞ Beton.

Calamentib.

Cha-

*Chamadry.**Maioran.**Rosmarin.**Salvia an. M. ii.**Saturei.**Hyssop. an. p. i.**Bac. Lauri.**Thuris an. ʒ ij.**Mellis despumat. quadruplum.**Misc. F. Electuarium.*

Vina medicata magis commendantur ex infusione rosmarin., & salviæ.

Extrinsecus probantur lotiones, & stillicidia, vel aquar. thermalium sulphuratarum vel decoctiones dictarum herbarum, præsertim paratæ ex lixivio, cui addi possunt arundinis, folia asati, & hederæ muralis.

Ex iisdem herbis addita portione Thuris fiunt pulveres inspergendi suris.

Vtile est quoque suffumigium Thymi, & maior, tubulo exceptum,

eo

eo modo, quo tabaci fumus excipitur.

Deniq; fiunt olea per decoctionem dictarum herbarum pro temporum, narium, & suturarum illitione.

Refrigerant calefactum cerasa nigra, cranium humanum ustum, hordeum, ligustri flos portulaca, rosæ, salicis flores, vitis capreoli, & omnia somnum conciliantia, ex quibus parabuntur decoctiones.

Excellit potus recte institutus aquæ Thermalis ferratæ.

Externe fiunt frontalia ex posca, maxime alterata, fol. salicis, myrthi, lactucæ, violar. & solani.

Fiunt capitis irrigationes ex eodem decocto, vel lacte tepido.

Fiunt oxyrhodina ex ol. ros. & viol. cum quarta parte aceti.

Fiunt odoramenta ex rosis & violis.

Vtilissimum est acetum his floribus alteratū, addito tantillo camphoræ.

Lau-

Laudatur quoque oleum per insolationem factum ex floribus salicis pro narium, & temporum ilitione.

OCULOS ALTERANTIA.

Oculis refrigeratis cum, vel sine materia crasse affluxu, conveniunt. Chelidonium maius, Euphrasia, Feniculum, Ruta hortensis, Verbenaca. Ex quibus fiunt decoctiones, & Electuaria pro usib. internis.

Commendatur usus vini Euphrasiati.

Extrinscus fiant fomenta ex iisdem decoctionibus, quibus utiliter miscebuntur anagallis, & fœnum græcum probe lotum, nec non momentum croci, aut aquæ vitæ.

Confert fotus aquæ marinæ cum tantillo croci.

Prestantissimum est sequens Collyrium ad oculos corroborandos, omnemq; nubeculam, & suffusionem non confirmatam discutiendam.

℞ Vini Maluat. ℥. iij.

Gran.

Gran. Tritici.

Sem. fœnicul. an. M. β.

Cinam. elect. confracti. ℥ ij.

Caryophyl. contus. ℥ iij.

Fol. Rutæ.

Cimar. Lauri. P. β.

F. infusio per diem, deindè coquantur lentissimo igne ad consumptionem quintæ partis, F. Colatura adde.

Tutia preparata. ℥ ij.

Misce, & cum uri volens decoctum agita, & turba: Si ad nubesculam, & suffusionem paretur, servetur in æneo vase ad usum, alias reponatur in vitreo.

Calefactis convenient, Cephalica pro usibus internis.

Extrinsècus confert fomentum, & frequens instillatio lactis tepidi, quo thus ignitum restinctum sit.

Si fluxio sit valde acris, addatur quarta pars aquæ albuminis ovi.

Vrgente dolore, & acerrima fluxione instilletur tantillū emulsio. sem. papav. albi.

Iu-

Inuat quoque cataplasma ex pomodulci in lacte cocto, & contuso.

Valet quoque fomentum aquæ fluvialis tepidæ, in qua thus aliquoties extinctum sit.

ALTERANTIA

Articulos.

Articulis refrigeratis conveniunt Chamæ, ytis, seu Iua Arthritica, helichryson, Juniperi lignum, & bacca, lignum lentiscinum, resina quæcunq; maxime Thèrebintina, salvia, & similacis asperæ radix.

Inter composita duo excellunt. *Primū* est usus Thèrebintin. per xv. dies circiter: Datur sola, vel ante conveniens decoctum hac ratione.

R. Thèrebinth. ʒij.

Pul. iua arthrit. ʒß.

M. F. B. pro una vice.

Si corpus sit humidius, utiliter miscetur ʒß. Trocisc. de Vipera, vel pulu. Viper. descripti.

Alterum est decoctum ligni lentiscini

riscini sumendum per plures dies
cum tenui victu, prout necessitas
postulare videbitur. Exempli gra-
tia.

Ligni lentiscin. ℥ij.

Iuniper. vel visci quercini ℥j.

Aq. comm. ℔.vj.

Materia incisa infundatur per
diem naturalem, deinde addantur.

Fol. Beron.

Iua.

Rosmarin. an. M.i.

Bulliant lento igne ad consum-
ptionem tert. partis Col. dentur
℥vij. pro una vice.

Extrinsècus conveniunt balnea,
& luta therm. sulphur, & alumi-
nos.

Præterea fomenta ex vino rubro
generoso alterata Iua, salvia, ebulo,
rosmarino, tabaco, & myrthi foliis
addito pauxillo salis, & alumi-
nis.

Item Illitiones ex adipe vulpi-
no.

Tan-

Tandem ad articulorum corroborationem conferunt Vinacea calida, & frictio cum oleo antiquo, & quarta parte salis.

Turcæ magna cum utilitate urunt articulos, sed igne siravi, neq; admodum molesto, imbuunt enim linteolum lineum aqua ardente, tum accensum impingunt in articulum, sicque restinguunt.

Compertum est dolores articulorum usu sequentis aquæ per integrum annum, etiam antiquos, vel omninò sanari, vel longe mitiores, & infrequentiores reddi.

℞ Summit. & flor. Rosmarin. partes ij

Aq. vitæ rectificat. par. iij.

F. infusio in vase optimè clauso per horas quinquaginta, tum destilletur B. M. vase ex omni parte benè munito, huius aquæ ℥i. sumatur singulis septimanis semel, & quotidie mane lavetur cum ea facies, & articulus læsus.

Calefactis articulis conferunt inter-
ne

nè quidē ossa humana cremata ad
3i. circiter, aliis refrigerātib. mixta.

Item, decoctio ligni lentiscini
additis rosis, & myrthi foliis.

Externe convenit posca, maxime
cum aceto rosaceo, aqua pluvialis
chalybeata, vel aqua fabrorum al-
terata, rosis, pampinis, & myrtho,
cui utiler additur portiuncula lapi-
dis prunellæ.

Pro illitione valet ol. ros. myr-
thin. & ranarum.

Parabuntur ex tempore per de-
coctionem dictarum materiarum
remedia.

Tale quoq; linimentū erit uti-
lissimum ad leniendum dolorem
ex calida, & acri fluxione.

R. Ol. Ros.

Myrthin. an. ʒi.

Mucilag. sem. Cytonior.

Psill. i.

Maluar. an. ʒij.

Cere, aq. fontan. sepius lota ʒiʒ.

Misc. F. Linimentum.

ALTE.

ALTERANTIA

Nervos.

Nervis refrigeratis precipue conveniunt chamædrys, castoreum, cerebrum leporis assum, centaur. ma. rad. hyperic. Lavendul. myrrha, nuclei pini peucedanum, primula veris, Spica Italica, salvia, & trifolium bituminoum.

Ex his componuntur aliqua efficacia, maxime autem decoctum, quale est arthriticum descriptum, addita chamedrii, & primula veris.

Bolus ex therebinthina cum ℥i. circiter Cerebri leporis assi, & ℥i. circiter castorei.

Extrinscus singularem usum habent balnea, & luta thermalia, sulphurea, & bituminosa.

Item fomenta ex vino generoso dictis herbis alterato, addita portione aquæ ardentis.

Pro unctione fiunt olea per decoctionem herbarum dictarum cum quibus aliqua lumbricorum terre-

terrestrium Vino ablutorum quantitas bullierit.

Duo præstantissima parantur linimenta pro nervorum frigidis affectibus, quorum alterum Spasmo ex repletione, alterum paralyfi, stupori, ac tremori utilissimum est.

Primum paratur ex stellionibus hac ratione.

R. *Stelliones*. Num. *v̄*. veleorum loco *lacertas virides* totidem.

Infunde vivos in *Oleo Chamomel.* *℥viij.* cumq; interierint bulliant in eodem usq; ad colliquationem carnis, mox fiat excretio, cui adde tertiam partem liquaminis anseris asfati, repleti thure, lardo, myrrha, & portione croci.

Alterum paratur ex anseris pinguedine hac ratione.

R. *Fol. chamædrios.*

luc.

Salvia.

Primul. veris.

Lavend.

Lauend.

Hypericon.an.M.j.

Gr.Iuniper. ʒß.

Myrrha.

Thuris an. ʒiij.

Castorei. ʒiß.

Croci ʒß.

Herbæ irrigentur aqua Vitæ,
deinde tundantur, & cum reliquis
fiat farctura, qua impleatur anser;
Cinamomi frustulis perpungend^o,
deinde in veru assandus, collige
colliquamen, cumq; nihil amplius
diffluet, dissecetur anser, & buliat
in Vino albo per horam, superna-
tantem pinguedinem collige, &
misce priori liquamini.

Sunt qui oleo per arenam ex
lubricis terrestribus Vino genero-
so ablutis destillato tantum tribu-
unt, ut eo solo paralyfin, curari
posse affirmant.

Calefactis nervis eadem conferent,
quæ pro articulis descripta sunt, ex-
ceptis crematis ossibus.

ALTE-

A L T E R A N T I A

Partes spiritales.

PNeumonica tum calida, tum frigida, quæ materiam viis spiritalibus inhaerentem educunt, jam proposita sunt in censu vacuantium pectus persputum: eadem corrigendis quoque pulmonum intemperantiis aptari possunt, sed præter illa peculiariter valent ad calefaciendum, & siccandum pectus.

Aqua Thermalis sulphurea pota.

Caricæ aliquot aq. vitæ macerata, donec turgeant, sumptæ jejuno ventre, & in ingressu lecti.

Decoctum enulæ, farsaræ, hyssopi, prassii, pulmonariæ, saturelæ, Thymi; evadet decoctum præstantius, si fiat cum gallo veteri dictis herbis infarcto; iisdem opportune alterabitur mulla plenior pro ordinario potu, aut Oxymeii inde componetur quotidie manè ad ℥ij. exhibendum.

Ec

Est

Est quoq; præstans vinum multum, præfertim si hyssopo aut thymo alteratur.

Omnibus Præcellii sulphuris usus, & terebinthinæ, vel alicuius resinæ, maximè Laricinæ, & Abietinæ.

Dabitur quotidie ℥j. sulphuris, maximè præparati, & in pollinem redacti cum ovo sorbili.

Resina datur ad ℥ij. quæ præstans erit, si calida bibatur dissoluta ℥ij. Oxymelitis.

Externe conferunt balnea sulphurea, mora propè sulphureas thermas in aere vaporibus calidis, & potestate siccantibus pleno.

Vel fiant cataplasmata pectori ex farina meliloti, sænugræci, pulu. hyssop, calamenti, & portione sulphuris cum melle, vino albo, & oleo de seminibus lini.

Calefacto pectori convenient præter proposita, ad expectorandum spiritum salsum, potus aq. thermal. tum acidularum, tum ferrearum, & lybeatarum.

Usus

Vfus Lactis, nisi obster destilla-
tio, & decoctio, vel ligni santalor.
rub. vel ligni Rhodii, maximè ra-
dicis sumenda per plures dies cum
victu tenui ad frigidum vergente,
præcipuè ex hordeo, & feminibus
frigidis maioribus.

Decoctia talis esse poterit.

℞ Santal. rubr. vel ligni Rhodii mi-
nuta incisi ℥j.

R. d. Cichorei.

Hordei. an. ℥ss.

Aq. fontan. Chalybeat. vel pluv. lb. ij.

F. infusio per horas xv. tum bul-
liant ad consumptionem medieta-
tis, & F. Colatura pro duabus vici-
bus.

Celebratur etiam frequens usus
conservæ rosar. tum in ingressu le-
cti, tum mane jejuno ventre, præ-
sertim si immitantur aliquot gut-
tulæ Spiritus acidi sulphuris.

Pro Externa refrigeratione suf-
ficient illitiones ex oleo, vel un-
guento violaceo paratæ.

Ec 2 AL-

A L T E R A N T I A

Cor.

CARDIACA sunt multa quidem
 Ex alexipharmacis veneno-
 rum assumptorum, omnia v. pro-
 posita pro alexipharmacis febrium
 malignarum, & pestis, sed præter
 illa convenient quoque cordi re-
 frigerato aromata cuiuscunq; ge-
 neris, aurantior. cortex, angelica
 odorata, calendula, calament.
 mont. caryophylleus flos, cardiaca
 herba caryophyllata, Flos lil. con-
 vall. hederæ terrestris, Lavendula,
 melissa, menta, ocymum quod-
 cunque, petasitis radix, rosmarin.
 spica Celtica, & Italica, Vlmaria.

Ex his confici poterunt syrapi,
 Decocta, Electuaria, item pulue-
 res, ac species inspergendæ cibis.

Optima erunt ad hoc opus com-
 posita jam descripta pro venenis
 assumptis, & in corpore natis, fe-
 bremque malignam inferentibus.

Item

Joannis Prævotii. 653

Item calida reficientia spiritus
etiam proposita.

Poterit quoque parari vinum
medicatum, quod per se cordi est
amicum. Exempli gratia.

℞ Calamenib. montan.

Card. Sancti.

Scord j.

Rutæ caprariæ.

Lavendul.

Meliss.

Rosmar. an. M. j.

Rad. Caryophyllatæ.

Dictamni, alb.

Imperator.

Cortic. Arantior. an. ℥j.

Myrrhæ.

Cinamom.

Caryoph. llor. an. ℥℞.

Croci ℥j.

Terantur seorsim in pulverem,
tūm indantur manicæ Hippocratis,
& per pulverem trajiciantur vini
albi aromatici ℔.vj. quater, aut
quingies, cuius Vini dari pote-

Ee 3 runt

runt ʒij . circiter pro vice, si traliciatur eo modo, aqua Vitæ, erit medicamentum efficacius, & dari poterit ad cochlear. unum.

Pro externis remediis parentur sacculi ex dictis herbis, & aromatibus ad regionem cordis gestandi.

Item fomenta ex vino aromatico iisdem rebus alterato addita semper portione croci ad maiorem penetrationem.

Deniq; illitiones fiant oleis eorundem simplicium decoctione paratis, aut oleis aromaticis ea ratione paratis, quæ exposita est titulo reficientium spiritus.

Cordi calefacto conveniunt temperatiora pro venenatis febribus proposita, & præterea ebur, flos salicis, mater perlarum præparata, myrthus, nymphaea, os de corde cerui, poma redolentia, rosæ, santala, violæ.

Ex his habes aliqua composita inter alexipharmaca febrium pestilentium.

Uti-

Vtilissimus erit quoq; usus conservæ violar, aut rosar. cum Dj. salis ex matre perlarum pro vice.

Fiet autem sal, si matrem perlarum ustam dissolvas aqua borag. calida, addita portione aceti ros. tum destilles per filtrum, ac tandē coagules, facta totius humilitatis divaporatione.

Externe sunt Epithemata ex aq. flor. salicis, rosar. viol. nymph. addito succo citri, aut limonum, aut aceti ros. ad penetrationem, ac si præsto sit camphora, imponantur quoq; v. aut vj. grana; loco aquarum sumi poterunt decoctiones borrag. bistort. Cyani, nymph. & viol. cum iisdem succis, & aceto ros.

ALTERANTIA

Ventriculum.

Stomachica calida præcipua, & magis obvia sunt absynth. cuiuscunque generis, sed præcipue commune, & pōticū, arantiorū, & citri cortex, ac sem. amygd. amar. gentiana, maior.

Ec 4

menta,

656 *Medicina Pauperum*

menta, origanum, rosmar. & aromata omnia inter quæ præstat rectoria, zinpiber, Galanquia piper.

Ex compositis paratu facilibus. commendatur vinum absinthite. oxymel absynthite.

Aqua vitæ alterata maceratione absinthii in umbra siccati additis, si lubet, aromatibus.

Vinum generosum (quale fiet traiectum per aromata, sem. odorata, aut dicta simplicia trita) ad 3ij, per multos dies jejuno ventre sumptum cum gr. j. aut ij. piperis. crasse triti.

Confert etiam potus aquar. therm. sulphur. & salitarum. utilissimum, erit tale oxymel si eius quotidie accipiatur cochlear. unum, aut alterum.

℞ *Herb. Absinth.*

Calament.

Menta.

Rosmar. an. M. i.

Corric. arancior, aut. Curi. 3j.
sem.

sem. Anis.

Cinamom. an. ʒj.

Mellis lb. j.

Vini albi generosi lb. iij.

Coquantur leni igne ad mellis
despumationem, colaturæ adde.

Aceti optimi lb. β.

Coq. ad syrupi consistentiam,
cum refrigerit, injice zinziberis
subtiliter pulverisati ʒij.

Prodest quoque mirum in mo-
dum quotidie sumere ex ovo sor-
bili ʒj. circiter, mastich. pulveris.
cum momento zinziberis, aut ze-
doariæ.

Extr. nsecus conferent thermarum
sulphur. stillicidia, quæ deficienti-
bus aquis parari poterunt ex vino,
præsertim rubro generoso, altera-
to prædictis herbis, unde etiam
fient fomenta.

Vulgus parare solet optima fo-
menta ex absynthio super regulam
calefacto, & consperso vino mal-
vatico.

Ec ꝑ Item

658 *Medicina Pauperum*

Item ex pane tosto, tum consperso vino maluatico, & pulveribus aromaticis, præcipue Caryophyllis, galanga, & mastiche.

Parentur olea pro illitione ex unius, aut plurium simplicium decoctione. v. gr.

R. Absint. commun.

Mentæ.

Origan.

Calament.

Lavendul an. M. j.

Summitat. rosmarin. M. R.

Ol. commun.

Vini Aromat. an. lb. j.

Coquantur lento igne ad consumptionem humiditatis, & F. expressio cum colatura, ad usum.

Calefacto Ventriculo conferent : acidas arantior. agresta, berberis, cerasa acida, corni fructus, cotonea mala, granator. acidor. succus, hypocistis, labruscæ flos, mala austera, mora immatura, pyra austera, pruna sylvestria, & eorum succus, ribes

ribes vulgaris, rosæ, sorbæ, succus
Rhois, seu sumach, trifolium ace-
tosum, uva crispa, vinum austerum
bene lymphatum.

Dari poterunt dictorū fructuū,
& herbarum succi, vel decoctiones
cum emulsione sem. frigid. maior.

Lactis quoq; asinini, aut caprilli
aliquo ex dictis succis temperati,
usus est opportunus.

Quemadmodum & potus ther-
marum, acidularum aut ferrearum
quales sunt in Italia Cha'darianæ,
Lucenses Noceranæ, & B.V. mon-
tis Orthonis.

Extrinssecus fiant fomenta, & e-
pithemata ex decoctione rosar.
myrthi, balaustior, cydoniorum,
malicor. hypocystio. labrusca, ad-
dita portione aceti ros.

Vulissimum est Emplastrum ex
pulpa Cydonii cocti in aqua pluvii-
ali, vel chalybeata respersum mo-
mento pulveris mastiches, & ros.
rubr. loco cydoniorum sumi pote-
runt mala austera.

Illi-

Illitiones fient ex oleo cum dictis herbis decocto ad humiditatis consumptionem addita semper portiuncula ceræ aliquoties posca ablutæ.

Exiccato ventriculo cum defectu nativæ caliditatis nihil præstantius lacte per multos dies 5; aut 6. horis circiter ante cibum, sumendo sensim ab ʒiv. incipiendo usque ad ʒvij. circiter, recens mulctum, & cum tertia parte mellis circiter, ne acefat.

Extrinsècus juvabunt fomenta, ex oleis præcipue, aut non valde calefacientibus, aut exceptis lana succida.

Conferent etiam picationes factæ cum pice liquata momento olei absinthii, & ad partem relictæ usque ad modicum illius ruborem interim noctu fovendus est ventriculus, vel admoto catello, aut manu propria, vel puello impubere.

ALTE

A L T E R A N T I A

Intestina.

Intestinis eadem terè conveniunt, quæ ventriculo ob partium connexum, & eiusdem substantiæ proprietatem.

Refrigeratis tamen, ut in colico affectu sæpe contingit, peculiariter conveniunt: cuminum, lauri baccae, ruta, & crantior: cortex. Dari poterit eorum pulvis ad $\mathfrak{z}\text{j}$. ex vino aromatico, vel emulsione sem. citri, aut arant.

Commendatissimum est vinum medicatum diuturna maceratione cortic. Arantior. ad doloris colici curationem, & præservationem, si quotidie usurperur.

Ad idem efficacissima est Theriaca diateffaron descripta inter alexipharmaca exhibita ad $\mathfrak{z}\text{j}$. per se, vel cum vino aromatico.

Hæc eadem Clysteribus infundi possunt quacunque forma, quibus

662 *Medicina Pauperum*

bus utilissime adduntur ol. nucum,
colocynthis decoct. & therebin-
thina, vel resina abietina, aut larici-
na, dissoluta cum oleo.

Exempli gratia.

℞ Decoct. chamomeli.

Fol. Lauri.

Colocynth. in petia ligata. ℔. j.

Ol. Laurin. vel ol. nucum. ℥iij.

Mellas crudi.

Therebinth. an. ℥ij.

Salis comm. ℥ij. Misc. F.

Clyster. secund. artem.

Extrinssecus apprime conveni-
unt illitiones ex oleo laurino, & ru-
taceo, nec non luta thermarum sul-
phurearum.

Calefactis intestinis utilia sunt o-
mnia refrigerantia stomachum, &
hepar, sed prius tenent atque aci-
dulæ, & ferratæ thermæ, potæ
jejuno ventre.

Lac clysteribus additum, & me-
dii abdominis irrigatio frequens,
postea subfrigida, quo remedio do-
lores

lores intestinorum à tenui, & mordacissima bile facile, & citò mitigantur.

IECUR ALTERANTIA.

Iecori refrigerato conveniunt. Absinthium, agrimon. chamædrys, gentiana quæcumque lavendula, juniperi bacca, & lignum, polium, spica Celtica, & Italica; quibus adde aromata omnia, & diuretica calidiora.

Inter composita maxime probantur vina generosa medicata absinthio, & aromatibus, qualia proposita sunt pro ventriculo.

Optimum est quoq; ligni juniperi decoctum addita coma absinthii, quod gratus evadet addita portione mellis optimi despumati, præsertim si coquatur cum vino albo generoso in iulepi consistentiam, qua ratione fieri poterunt ex aromatib. & diureticis calidis varia decocta, addito semper absinthio.

Exter-

664. *Medicina Pauperum.*

Externè conveniens fomenta
ex Vino aromatico dictis materiis
alterato.

Item luta thermarum sulphura-
tarum.

Illitiones oleo ex dictis simpli-
eibus per decoctionem composi-
to, quale descriptum est pro ven-
triculo.

Denique sacculi ex iisdem ma-
teriis rariori linteo inclusis, super
iecoris regionem gestati.

*Calefacto verò icori maxime conse-
runt inter simplicia.* Acetos. cichor.
cucurbitæ pulpa, & sem. citrulli
pulpa, & semen, Endivia, epatica,
hieracium, hordeum, lapathum
quodcunq; lactuca, lac (si absint
obstructiones, & febris) maxime
acetosum, melonum pulpa, &
sem. portulaca, scariola, sonchus,
Taraxacon, trifolium acetosum,
serum lactis solum, vel cum emul-
sione sem. frigidior. maior.

Ex herbis fiunt decoctiones in
aqua

aqua, vel exprimuntur succi, qui
reservantur ad hyemem tùm depu-
rati, tùm condensati, illi ab ℥j. ad
ij; misc. juri carnis hyberno tem-
pore, hi verò à ℥i. ad ℥ij. dantur, &
formantur in bolos vel dissolvun-
tur.

Comeduntur herbæ quoque
olerum more elixæ in aqua, aut ju-
re carnis.

Ex hordeo fit prisana, quæ gra-
tior redditur dealbata emulsione
sem. melonum, aut cucurbitæ, cu-
ius usus utilis est quoque in pana-
tellis.

His omnibus addantur aquæ
naturales, vel acidulæ, vel ferratæ
recensitæ pro temperando ardore
ventriculi, illarum enim congruo
potu nihil est præstantius ad jeco-
ris refrigerationem.

Extrinfecus conveniunt Epithe-
mata ex succis, & decoctione po-
tissimum cichorei, & sonchi cum
octava parte aceti ros. vel aceti vul-
garis,

garis, in quo tantillum absinthii cum rosis bullierit.

Ex Violis quoq; & rosis parabitur oleum pro illitione, quod etiam efficax fuerit factum per decoctionem herbar. propositarum, cum oleo commuui ad consumptionem humiditatis.

Sed omnibus remediis præstat balneum aquæ dulcis toti corpori administratum, post debitas evacuationes, nisi febris obftet.

LIENEM ALTERANTIA.

Leni refrigerato peculiariter accommodantur agni casti semen, borrago, buglos. cappar. radicum cortex, ceterach, cuscuta, filicis radix, fraxini cortex, & sem. fumaria, hederæ muralis baccæ, bene maturæ, lingua ceruina, lupuli flos, & radix, osmundæ radix, tamariscus, tenuerium, thymus. Horum pulveres bibantur ad ʒj. per 40. dies ex vino absinthite chalybeato, aut aq. fabrorum.

Ex

Ex his componi possunt varia,
extemporanea, decocta, vina me-
dicata, & Electuaria.

Excellunt decocta ligni fraxini,
tamarisci, teucris montani, & cha-
mædryos, præsertim restincta cha-
lybe novo, vel parata ex aqua fa-
brorum clarificata.

Sunt qui ex aceto, maximè passu-
lato, hæc decocta parant ad minu-
endos extuberantes lienes; si acetū
scylliticū sit præ manib. utiliter mi-
scebitur decoctis ad semicochlear.

Vina parantur maceratione dicta-
rū materiārū, fiuntq; præstantiora
addito chalybe præparato cū cono
sulphur. quæ præparatio fieri potest
ex tempore. Exempli gratia:

℞ *Fol. Chamedrios.*

Cuscut.

Cetrach.

Fumar.

Bulgos. an. M. j.

Sem. fraxini.

Bac. hedera mural. an. zij.

Tby-

*Thymi.**Absinthii. an. p. i.**Chalybis præparati. ℥i.**Vini albi generosi. lb. iij.*

F. Infusio ad Solem, vel in loco calido per octiduum, agitando quotidie materiam semel, atque iterum. Denique vinum percolatum sumatur quotidie ad ℥iiij. per multos dies, quatuor horis ante cibum, & ante opportunum excitium.

Electuaria fient ex iisdem rebus, addito chalybe præparato, vel Ammoniac. & quadruplo mellis despumati.

Sunt qui baccis hederæ in pulverem redactis, & vel commixtis melli ad consistentiam electuarii, vel bibitis ex vino, aut iure Cicerum ad 3 per quadraginta dies miram tribuunt efficaciam.

Extrinfecus conveniunt fomenta ex decoctione herbar. emollientium, addita radice bryoniæ, & cyclat-

cyclaminis, foliis hederæ, tabaci, ebuli, & absinthii. ad part. corroboracionem, nec non portione vini albi, & aceti sub finem decoctionis ad maiorem penetrationem.

Vtilis est huius decoctionis extincto in molari, aut pyrite lapide fumus exceptus.

Præstantissima quoque sunt fomenta ex filo cannabino cocto in lixivio forti, & calido madidoque admoto parti. Insuper ex lutis thermalib. bituminosis xx. aut dierum spatii usurpatis.

A fomento ungatur pars oleis ex tempore factis, coquendo simul, vel seorsim, cyclamen, bryoniam cappares, flores genistæ, tabacum, fol. hederæ, colocynt. ex oleo communium vino albo, & aceto ad humiditatis consumptionem, addendo absinthium vel amygd. amar. ad tuendum robur partis.

Post convenientem usum fotuum, & illitionum applicetur parti
cera-

ceratum, uti est vulgare ex Ammoniaco dissoluto ex aceto scyllitico, vel paretur similis facultatis aliquod ex dictorum simplicium pulveribus, addito mométo olei commemorati, & sufficienti quantitate resinæ pini, vel picis albæ, & ceræ novæ.

Laudatur quoq; propolis melle adhuc turgida per se contusa ad Emplastri formam addito tantillo mastiches ad partis robur.

Horum loco conferet sacculus ex æquis portionibus radic. cucumer. sylvest. pulpæ Colocynth. & absinth. super lienem gestatus.

Calefactum lienem refrigerant eadem, quæ pro hepate sunt proposita, sed addenda sunt quædam attenuantia temperata, ob succi, quo nutritur lien, crassitiem.

Huiusmodi sunt fragaria, capil. ♀ lupuli, asparagi, trichomanes, acetum, aqua fabrorum clarificata, quibus alterentur decocta, fomenta, epi-

ta, epithemata, non negligendo in
externis remediis aliquid absynt.
ad part. robur conservandum.

RENES, ET VESICAM

Alterantia.

Renibus, & vesicæ, eadem conve-
niunt propter operis commu-
nionem, partiumq; connexum.

*Refrigeratis ergo profunt omnia diu-
retica calida suo loco proposita.*

Item betonica, chamomelum,
cyperi longi radix addita decoctio-
nibus, & electuar.

Sed præstantiora censentur ad
calefaciendas vias urinarias, tum
aq. sulphuræ pluribus diebus hau-
stæ ieiuno ventre ad aliquot libras,
imposito pulvisculo anisor. vel fæ-
niculi, aut similis diuretici pro pri-
mo cyatho, tum resina larcina, aut
abietina sæpius sumpta in bolo ad
ʒij. circiter, vel per se vel cum pul-
visculo alicui⁹ diuretici calidioris.

Vinum quoq; generosum, præ-
sertim albū, diureticis calidis altera-
tum,

rum, est huic operi accommodatissimum.

Externè probantur infusiones in aquis thermalibus sulphuratis.

Fomenta ex decoctione calidorum diureticorum in vino albo chalybeato.

Illitiones ex oleo laurino, vel simili ex tempore parato, cuius Exemplum habes inter diuretica.

Laudantur cataplasmata ex cæpis, & aliis in vino albo coctis, & contusis, & admotis per se, vel conspersis pulvere Cymini, aut simili.

Infundendi crebro clysteres calefacientes ex oleo prædicto, & vino alterato Chamomelo, foliis lauri, pulegii, serpilli, & similibus calefacientibus, quæ urinam movent.

Adde his omnibus validum motum equisitionis, cursitationis, ambulationis, quibus lumborum regio incalescit.

Calidis vero renibus prosunt intrinsecus

secus decoctiones fructuum alkekengi, altheæ, acetos. hordei, lactuc. malu. nymph. portulac. graminis Sonchi, cum emulsion. sem. mel. citruli, & cucurbitæ, aut cum succo limonum.

Præterea serum deputatum addita emulsiōe sem. frigid.

Item lac ipsum chalybeatum, nisi renum obstructio impediat.

Potus thermarum acidularum, aut ferrearum, quales sunt Lucenses, Noceranæ, Chalderianæ, Patavinæ divæ Virginis.

Esus deniq³ fragorum, limonum, melonum, citruli, cucurbitæ, hordei, lactucæ.

Extrinsècus juvat balneum, & infusio aquæ dulcis, præsertim alteratæ violaria, parietaria, lactuca, malua, quarum etiam decoctiones utiliter infunduntur clysteribus.

Loco balnei fiant Epithemata ex lacte tepido per se, vel cum decoctione malu. vel ex decoctionib.

Ff dicta-

dictarum herbarum, addito succo
limorum ad penetrationem.

Urgente calore addantur deco-
ctioni fol. semper vivi, folani hor-
tensis, & vesicarii, & tandem hy-
oscyami albi.

Efficacissimus censetur succus
expressus ex rasura interni corticis
cucurbitæ per se, vel cum aliis ad-
motus.

Extemporaneæ quoq; illitiones
parabuntur ex oleo decoctionis
florum, vel fol. nymph. viol. purp.
rosar. pallid. ranarum viridium.

Et urgente necessitate (quod e-
venit in exquisita diabete) sem. pa-
paver albi, & hyoscyami albi, ex
quibus eliciuntur quoque olea per
expressionem ad id efficacissima:

Superponantur lumborum, re-
numque regioni, recentia folia
nymph. tempore decubitus, ge-
stentur vero interdium, aut eorum
locotenuis lamina plumbea, vel
ceratum simplicissimū ex cera flava
sæpius

sæpius lota, & subacta cum aq. ros.
aut dictis decoctionibus, oleisvè
quod sæpius est renovandum ne
vestium attritu incalescens lumbo-
rum calorem foveat.

V T E R V M.

Alterantia.

UTero (cum sit locus generatio-
nis, quæ calore indiget) *nulla*
frigida per se amica sunt, si tamen ob
impensum calorem indigeat, iis-
dem iuvabitur, quæ pro iecore, re-
nibusq; sunt proposita, hoc solum
animadverso, quod externis reme-
diis semper addendum sit aliquid
eorum, quæ calorem eius innatum
corroborant, & peculiarem pro-
prietatem foveant.

Refrigerato autem præcipuè con-
ferunt inter vulgaria, artemisia, an-
gelica, calamentum cyperi longi
radix, daucus, dictamnus albus, cat-
taria, Lauri folio, & baccae, laven-
dula, matricaria, maiorana, melissa,
menta sativa, sylvestris, & Græca,

Ff 2

ori-

origanum, polium, pulegium, rosmar. ruta, salvia, saturei. serpil. spic. celt. spica Italica, tanacet. odoratum, thymus, & aromatica omnia, inter quæ præstant Cinamomum, Crocus, galanga, myrrha, macis, & nux moschata.

Horum pulveres dari possunt ad ʒj. ex vino aromatico vel iure, vel fingi possunt electuaria, addito triplo mellis despumati.

Huic usui interviunt omnes species aromaticæ. satis utiles quarum ʒj. exhiberi poterit cum vino.

Verum decoctiones, & vina medicata, cæteris præferuntur, quod ob liquiditatem facilius perferri possint ad uterum.

Optima decocta parantur ex iure columbi, cuius venter farctus sit dictis simplicibus.

Exempli gratia,

℞ *Herb. Calamenti.*

Puleg.

Melis.

Menth.

Menth.an M.i.

Summit. Rosmarin.

Lauendul.an p.i.

Bacc.Lauri.

Nucis Moschat.

Galang.an. ʒj.

Herbæ inciduntur, reliqua crasso modo terantur, & simul indantur ventri columbi, tum coquantur in s.q. aquæ lentissimo igne ad perfectam carnis coctionem, fiatq; fortis expressio, & colatura, cuius sumantur quotidie ʒvj, circiter per multos dies.

Vina medicata fient infusione iam dictarum materiarum, vel terrena traiectione vini per pulveres earundem oblongo sacculo impositos.

Parant mulierculæ vina per decoctionem, extemporanea quidē, sed minus efficacia, ob tenuiorum partium evaporationem.

Potus quoq; thermarū sulphuratarum opportune haustus uteri

Ff 3 calo-

calorem mirum in modum corrigi, atque fovet.

Extrinfecus profunt infeffiones aq. thermar. sulphur. aut balnea dictis herbis alterata, immiffio in vulvam perforato tubulo, ut vis medicinali penetrare valeat ad uterum.

Idem liquores, uti etiam vina medicata, utiliter infunduntur metrenehytis.

Fiant fuffitus aromatum, & herbarum odoratarum.

Indantur pefsi, quales ex tempore parabuntur fic: G. E.

℞ Pulu. baccar. lauri.

Ruta an. ʒ. j.

Mirrhe ʒʒ.

Succi, matricariae, vel puleg. vel vini aromatici ʒj.

Misc. & excipiantur lana pexa, vel gossypio in formam pefsi.

Vel. ℞ Mellis optimi. ʒj.

Succi, Artemis. ʒ. ʒ.

Coquantur ad debitam consi-
stentiam, tum adde:

Pulu. galanga. vel.

Spec. Aromaticar. vulgari. 3j.

Misc. in pelli formam.

Hypogastrio quoq; applicanda
sunt fomenta cum spongiis expres-
sis aqua thermali, aut decoctione
dictorum simplicium, potissimum
ex vino generoso.

At luti thermarum calidarum
illi parti admotis per aliquot dies
nullum fomentum præstantius.

Illinatur idem locus oleo spica-
to, laurino, rutaceo, aliisq; per de-
coctionem dictorum simplicium
paratis: verbi gratia.

R. Herb. Calamenth.

Maior.

Matricar.

Mentha.

Lauendul. an. M.i.

Bac. Lauri.

Galanga. an. 3ij.

ff 4

Tritis

Tritis terendis infunde per horas 6. in ol. communis ℥b. i℥. vini aromat. ℥b. ℥. deinde bulliant leuto igne ad consumptionem humiditatis.

Sunt qui oleo parato per decoctionem Santolinæ (quam Matthi-olus Abrotanum fœminam facit) peculiarem tribuunt vim ad uteri corroborationem.

Atq; hæc sunt magis vulgaria, & extemporanea alterantia, quibus totius corporis, & singularum partium intemperies corrigi possunt.

REMEDIA MORBORUM

In mala conformatione.

ORgani compositionem constituunt debita conformatio, conveniens magnitudo, partium simularium, quibus organum constat, decens numerus, & appositus situs, ad quem congrua connexio refertur, ideo quatuor recensentur summa genera vitiatæ compositionis;

nis; nempe morbus in conformatione. in magnitudine, in numero, in situ.

Conformationi quadruplex accidit vitium in figura, meatu insensibili aperto, vel astricto, cavitate, seu meatu sensibili ampliato, vel coarctato, & superficie lævigata, vel exasperata.

Morbus in figura non habet medicamenta sibi propria, sed vel curatur sola chirurgia, vel medicamentis respicientib. alios morbos, à quibus pendet. Qui fit ob vitiatam conformationē in utero, motus violentos in partu, imperitam deligationem obstetricum, ambulationem pedibus nondum firmis, dearticulationes, Chirurghi errores in curandis fracturis, & luxationibus, indiget chirurgicis presidiis, de quibus hic non est sermo.

Pars verò denuò conformata corroboratur externis fomentis, & ceratis, quæ ex astringentibus,

Ff 5 maxi-

maximè verò calidis paulò post describendis parantur.

Quòd si vitetur figura ob nimias repletiones, extremas inanitiones, vel ob unius partis in aliam inclinationem, ex paralyfi, aut convulsione, uti accidit nervis, aut tendinibus sectis, dura cicatrice, tumore ingenti; curatur vacuantibus nervos roborantibus, duritiem emollientibus, de quibus jam dictum, adhæc reficientibus partem inanitam, & glutinantibus solutam unitatem, de quibus dicetur postea.

R A R I T A S

Porositatum,

Raritas, seu apertio meatuum insensibilium, quos appellant porositates, quæ in effuso gaudio, & sudore diaphoretico sæpe est mortis causâ, curatur refrigerantibus, astringentibus & emplasticis, seu infarcientibus poros, quæ extrinsecus administrantur. Maximè obvia sunt

sunt aspersio aquæ frigidæ, eoque magis, si perfrigerata sit nive, aut glacie, aut prius alterata frigidis astringentibus, de quibus infra.

Item illinitio corporis ex oleo actu frigido, & maximè omphacino, seu immaturo, aut frigidis astringentibus alterato, uti rosæ, cydonis & aliis.

Aer quoq; frigidissimus exoptatur, ut suo contactu poros contrahat.

Si hæc non sufficiant, incrustetur corpus gypso usto excepto, & diluto aqua frigida.

Si raritas occupet partem determinatam, ut cum ob raritatem penis contineri nequeunt spiritus in nervo fistuloso ad stabilem membri erectionem, convenient astringentia mox proponenda; applicata loco affecto, maximè vero calida, quippe quæ magis corroborant.

DEN.

DENSITAS PORORUM.

Densitati seu astrictioni eorundem meatuum, si fiat ab aliqua materia impacta convenient calida detergentia, & attenuantia, quæ proponuntur ad tollendas obstructions ab infarctu crassæ materiæ.

Si fiat refrigeratione, & siccatione, conveniunt moderatè calida, & absq; siccitate attenuantia, quorum insignis est usus ad disponendum corpus ad sudores necessarios & ad corporis perspirationem, quæ ad internas febrium putredines arceandas, & cutaneas fœditates tollendas, procuratur.

Huiusmodi sunt balneum ad tepidæ, fomentum ex hydræleo, vel aqua tepida, præsertim alterata anetho, alch. malu. vel portiuncula vini albi. Inunctio olei veteris, quod reddetur efficacius in octo vino albo, & anetho, camæmelo, althea, malua rad. lilior. albor. sem. lini,

lini. florib. iasmini vulgaris, & violæ luteæ ad consumptionem humiditatis.

Fiat autem iunctio oleo calidiusculo, & præmissa frictione molli, aut fricetur mediocriter corpus vola manus imbuta dicto oleo, vel vino albo aromatico addita medietate decoctionis violar. & malua. ex aqua communi, si febris sit insignis.

Sed & frictio ipsa per se molli-
bus linteis tepidis facta tollit cutis
densitatem, & multo efficacius, cu-
curbitulæ cum, vel sine scarifica-
tione.

LAXITAS CAVITATVM.

Amplificationi. seu maiori laxitati, &
dilatationi Cavitatum, seu mea-
tuum sensibilium conveniunt astrin-
gentia, quæ cutis etiam meatus
tanto validius densant quantò sunt
minores cavitatibus.

Astrin-

Astringentium v. materia latiffimè patet; potestq; triplex eorum constitui ordo, ut singulorum delectus ad usum sit facilis.

Quædam subadstringunt tantum, quorum præcipuus est usus ad corroborandas partes ad frænandas excretiones, quæ non omnino sunt inutiles, sed quantitate, aut diuturnitate enervare possunt vires.

Alia mediocriter astringunt, quibus ad repellendas fluxiones à partibus suscipientibus, fluxusque omnes noxios sistendos præcipua est vis.

Alia deniq; laxatas partes in profundum cogunt, usurpanda cum ex fluxionis impetu, vel evacuationis vehementia imminet periculum præceps, uti ferè accidit fluenti materia valde tenui, & per vias diuturna fluxione valde laxatas.

Eligantur v. in causa frigida quæ astringunt cum caliditate vel sine manifesta frigiditate.

In

In causa verò calida iuvabunt,
quæ agunt refrigerando.

Ex universo autem astringenti-
um genere hæc ad extemporaneam
medicationem paratu erunt facil-
lora.

IN CAUSA FRIGIDA.

Pro causa frigida subadstringunt, ab-
sinthium, quodcunque sed ma-
ximè ponticum, agrimonia, beto-
nica, brassica bene cocta, coriandri
semen, cuminum torrefactum, cy-
perilongiradix, fabarum cortex,
lentisci lignum, & folia, menta sa-
tiva sicca, mastiche, oriza tosta, ros-
marinus, salvia, scabiosa vulgaris,
thus, resina laticina, vel abietina ad
duritiem cocta, vinum austerum,
aut quæcunque aliud chalybea-
tum.

Dantur intrinsecus aridorum
pulveres per se ex vino austero ad
3j. circiter.

Vel fiunt decocta, aut vina me-
dicata, inter quæ excellunt vinum
absin-

absinthite, lentiscinum, mastichinum, rosmarinum, & salviatum.

Potus quoq; ordinarius utiliter alteratur sem. coriandri, & mastich. & dictorum pulveres inspergiuntur cibis.

Ad Gonorrhæam inveteratam sine ardore urinae, valent dictæ resinæ coctæ in aqua pluviali, vel chalybeata per multos dies sumptæ ieiuno ventre, & in pilulas reductæ ad ℥j. cum ʒi. menthæ siccæ, vel agni casti semine.

Eandem sistit pulveris mastich. ℥j. ex ovo forbili sumpta, per aliquot dies horis quatuor ante prandium.

Idem pulvis ea ratione sumptus, si superbibatur modicum vini absinthites, sistit fluxum, hepaticum proprie dictum, & fluxus coeliacos antiquos, nec non vomitum ex imbecillitate ventriculi.

Extrinsècus fieri possunt illitiones ex oleo communi immaturo
(ompha-

(omphacinum vocant) vel ex maturo alterato absynthio, menta sicca, rosmarino, lentico, mastiche.

Vel linimenta extemporanea, G.E.

R. Pulu. Masti. b. ʒj.

Ol. communis ʒj.

Cera flava q. l. M. F. linimentum.

Fiant sacculi ex cumino torrefacto, & oryza tosta.

Vel fomenta humida ex vino rubro austero dictis herbis alterato.

Aut Cataplasmata ex corticib. fabar. oryza tosta, pulvere absinth. oleo, & vino austero.

Ex mastiche, & thure fiunt Cera-
rata addito oleo absinthii, resinæ
pini, & ceræ flavæ sufficienti quan-
titate.

Ad diuturnas oculi lachrymationes
valet frequens ablutio oculi vino
albo, maximè generoso, quod ac-
censo thure ter restinctum sit, ad-
dendo

dendo tertiam partem aquæ fluvialis, si lachryma sit mordax.

Mediocriter astringunt: Avenæ farina tosta pro ferculis, castanea, caryophyllata, iacea nigra, iuglandium viridium cortex, lens bene cocta, & eius succus, osmundæ radix.

Vvæ nigræ semimaturæ in furno siccata pulvis, cuius 3j, multis diebus bibita ex vino subaustero, tanquam summum secretum proponitur à Septalio ad curandum fluxum hepaticum. Curat quoq; pro fluxum muliebrem sumptum ex vino arom. medicato cum rosmarino, salvia, aut mentha.

Ad faucium affectus calidos singulariter prodest decoctio, aut succus cortic. viridis iuglandium pro gargarismis, in quem usum fit syrupus ex melle, & succo depurato.

Lentis bene coctæ succus cum momento pulveris galangæ, vel nucis moscatae sumptus mane 4. horis ante cibum curat vomitum, & diar.

& diarrhæam ex ventriculi imbecillitate.

Caryophyllatæ, & osmundæ radix decocta ex vino rubro, & in pulverem trita, peculiariter valet ad intestinorum, & uteri prolapsum.

Extrinsecus convenit farina volatilis, addita Emplastris ad mictiones cruentas.

Lumbrici terrestres in Emplastris ad vulneratos nervos.

Sal, & Alumen rupeum addita decoctionibus ex vino rubro factis ad parrium corroborationem.

Balnea thermarum aluminosarum, & gypsearum (quales sunt in monte ægrotorum agri Patavini) ad roborandos artus antiqua fluxione tentatos.

Vinacia calentia ad firmandos articulos.

Mica panis tostæ aspersi vino generoso, & pulvere absynthii, vel menthæ pro fomento stomachi languidioris.

Valen-

Valeter astringunt Alchumilla, filipendula hortensis, præcipuè radix, Geranium omne, maximè pes columbinus, herba Roberti, pilosella.

Datur eorum decoctio, vel pulvis ad ʒi.

Est quoq; efficacissimus pulvis spongiæ ustæ, & interioris pelliculæ castaneæ.

Ex herbarum succis, & radicum pulveribus farinæ mixtis pinfitur panis ad biscocti duritiem, qui in pulverem tritus utiliter miscetur cibariis absq; nausea.

Extrinscus parantur fomenta ex herbarum decoctionibus cum vino austero addito alumine.

Succus ex seminato fructu Guaiaci Patavini expressus linteo, vel spongia exceptus, desperatas hæmorrhoidum fluxiones sistit, idè cum alumine inspissari potest, & ad usum reservari.

Ster-

Stercus etiam caprillum cum aceto tritum, & admotum sistit omnem fluorem sanguinis.

Vrtice vulgaris folia trita, ut succum emittant, & turundæ instar naribus indita, hæmorrhagiam, quantumvis ferocem, illicò sistunt.

IN CAUSA CALIDA.

IN causa verò calida substringunt aq. pluvialis, atq. chalybeata, aqua thermalis ferrata, qualis est Patavina montis Ortonis: acetum, potica, cichorei radix, cupressi folia, fragaria sicca, hordeum torrefactum, unde fit ptisana cum aqua chalybeata, lac chalybeatum, muscus arboreus, myrthus, portulaca, personata, persicaria maculosa, pyrus domestica, pruna acida, prunifolia, potamogetum, rosæ maximè rubræ flos, semen, lanugo. calix, radix; salicis flos, folio, sempervivum, verbascum, vitis folia, & capreoli, umbil. ven.

Ex

Ex his parabuntur potissimum decoctiones, inter quas excellit ad diuturnas fluxiones, decoctio radicis rosar. ex aliqua dictarum aquarum.

Sistit quoque certa experientia unius, aut alterius dici spatio omnem fluxum ventris calidum, excrementosum, & sanguineum hic porus.

& Succi sempervivi maior.

*Succi Persicaria maculata an.
ʒiij.*

Coquantur ad consumptionem tertiæ partis, & porrigantur in potu.

Extrinsècus parabuntur fomenta, balnea, Emplastra, Epithemata, aliævè medicamentorum formæ pro ulus exigentia.

Mediocriter adstringunt acetositas mali arantii, citri, & Limonis immaturi, arbuti fol. balauſtium, berberis, bursa pastoris, castaneæ mediæ cortex, cystus, cornus, eiusq; fructus,

fructus, cupressi coni immaturi,
 seu virides, flos solis, glandes, &
 earum caliculi, herba trinitatis, hy-
 pocistis, labruscæ flos, lysimachiae
 purpureæ flos, Limonium quod-
 cunque, lapis hæmatices vulgaris,
 malum punicum acidum, malum
 cydonium, malicorium, millefoli-
 um, morus immatura, oleæ folia,
 ophioglossum, plantago, pyrus syl-
 vestris, fructus ribes, rubi fol. &
 morus immatura, fideritis, Achyl-
 lea, terra quæcunq; medicata, ul-
 mus, virga aurea, atq; hæc omnia
 fere ubi vis locorum sunt obvia.

Dantur aridorum pulveres ad
 ℥i. in bolo, vel potu, cum liquore
 convenienti.

Ex herbis fiunt decoctiones, sed
 efficaciores sunt succi, quorum do-
 sis est ab ℥i. ad ij.

Habetur pro secretis ad cohi-
 bendum omnem fluxum sanguinis
 flos Lysimachiae purpureæ ad ℥i.
 aliquot vicibus datus cum vino ru-
 bro austero.

Item

Item hic syrupus: R. Aq. poly-
goni, vel millefolii, aut plantagin.
aut decoct. millefol. ℥.v. ducatur
in hoc liquore lapis Hæmatites, do-
nec cruentum colorem contrahat,
deinde adde syrupi cydoniorum,
vel granatorum acidorum ℥i. Misc.
pro potu. Locæ syrupi addatur tan-
tillum sacchari ad penetrationem,
& succi limonum, vel pyri austeri,
aut alterius, qui gustui sit suavis.

*Ad cohibendos ventris fluxus, & vo-
mitus, excavetur malum cotoneum,
aut sativum quodcunque acidum
(præstant autem poma ferruginei
coloris.) repletum cera alba, coqua-
tur sub cinerib. charta involutum,
deturque unum, aut alterum illius
frustulum conspersum pulveribus
mororum immaturorum paulo
ante cibi sumptionem.*

Ad mictionem cruentam.

R. Decoct. virgæ aureæ ex aq. pluvia-
li, vel chalyb. ℥iv.

Aq.

Aq. alb. ovor. ℥ii.

Sacci limon. ℥i.

Misc. propotu.

Pro extrinsecis, fiant olea ex-
temporanea per decoctionem cy-
toniorum, conorum cupressi, pini,
aliarumq; herbarum addita posca
usque ad humiditatis consumptio-
nem, quorum usus erit in illitioni-
bus, vel in unguentis, ad quæ utili-
ter recipitur lytarghyrum in aceto
coctum.

Epithemara fient ex posca cum
albumine ovorum.

Fomenta, & infussiones ex her-
barum decoctionibus.

Defensiva vulnerum ex bolo ar-
meno, vel quacunque terra medi-
cata, & lapide Hæmatite vulgari,
exceptis; & agitatis cum albumine
ovororum ad linimenti consistenti-
am.

Cotis sedimentum per se præbet
Emplastri materiam ad reprimen-
dum quemcumq; fluxum.

Gg

ARu-

A Rulando passim extollitur ad cohibendum sanguinem, cum impetu ex quocunque loco erumpentem, emplastrum ex argila usta, & cum aceto cocta, calidè ad motum parti.

Ventriculo utile est emplastrum ex cotoneo cocto in vino rubro subaustero, solo, vel addita mica panis emollita aceto.

Valenter astringunt inter vulgarissima acini uvarum, acini mali punici exsiccati, amaranti purpurei flos, avellanar. sylvestrium interior pellicula, cerri folia, & radix, consolida maior, consolida media, seu Bugala; equisetum, galla præferrim immatura, herniaria, iridis luteæ sylvestris radix, lapis hæmatites verus, lagopus vulgaris, mala sylvestria, melpila immatura, mori radicis cortex, numularia, omphacium, prunorum sylvestrium succus, polygonum, quercus folia, & radix, liber, qui est inter lignum, & corti-

corticem, sorbus immatura, sumach, fânícula mas, urtica mortua, virga sanguinea Matthioli, seu cornus fœmina.

Ex his aliqua peculiariter commendantur ad quosdam fluxus, licet omnia quibuscunq; aptari possint, ubi valida opus est adstrictione.

Ad profluvium mensium pro expertis habentur mori rad. cortex, urticæ mortuæ radix, & acini uvarû, nec non granatorum, quorum pulveres sigillatim exhibentur ad 3 i. cum vino rubro, aut liquore analogo.

Ad sputum cruentum; lapis hæmatites sumptus cum saccharo rosar. ad 3 i. vel ductus in potionibus adstringentibus, donec cruentum colorem contrahat, vel sacculo inditus ac in pulverem subtilissimum tritus, per quem vinum, aut quicquid aliud pro ordinario potu paratur, sæpius percoletur.

Gg 2 Ad

Ad vomitus, & quoscunque alui fluxus immoderatos, & inveteratos certissima sunt hæc duo Electuaria. Primum:

℞ Rad. Irīd. lutea sylvest. cocta in aq. pluviā, & per setac. transmis. part. ij.

Sacchar. Ros. Antiq. p. i.

F. Electuarium S. A. Cuius dosi est ab ℥ss. ad ℥i. loco sacchari ros. sumatur pro pauper culis dimidium mellis prius despumati & cocti in aq. pluviā, aut chalybeata, in qua folia tenerrima quercus aliquamdiu bullierint.

Secundum.

℞ Rad. consol. mai. cocta in decoct. radic. filipendul. hortens. & per setac. transmis. p. ij.

Sacchar. ros. p. i. vel aequale pondus.

Misc. F. electuarium, cuius eadem est dosi, ac prioris electuarii.

Si paretur ad hepaticos fluxus, (sistunt autem illos feliciter) addenda

denda est quarta pars conservæ absynthii, aut duodecima pars pulv. absynth. vel mastich.

Ad eosdem affectus præstantissimum est decoctum rad. & folior. tenerrimorum quercus paratum ex vino rubro, addito tantillo absynthii, si quotidie bibatur ad $\mathfrak{z}.$ vj. circiter quinque horis ante cibum.

Alia ad alios usus componi possunt pro cuiusque arbitrio.

Extrinfecus conveniunt gypsum crudum ceratis, & emplastris additum.

Item stercus suillum, & asininum, vel recens, vel in pulverem tritum, utroque autem hæmorrhagia immoderata citò cohibetur, si admoveatur cum albumine ovi, aut insuffletur.

Guainerius audet asininum stercus interne usurpare, & syrupum ex saccharo, & recentis stercoris expressi succo præparatum, tanquam summum arcanum ad cohi-

Gg 3 ben-

bendos immoderatos menses, ali-
asq; superfluas sanguinis excretio-
nes proponit.

Oleum de cerro, & rad. querc.
elicitum per descensum, omnibus
aliis astringendi facultate facile
præcellit.

Cæterum ex herbarum deco-
ctionibus fient fomenta, & balnea.

Ex fructibus immaturis cum po-
sca rufis, & mediocriter coctis, fient
cataplasmata.

Extemporaneum erit etiam si-
mile unguentum, cuius usus vicem
supplebit unguenti de castaneis, &
Comitissæ.

℞ Galla immatura.

Nuc. cupress.

Acinorum uvar. rubear.ʹ

Malicorii.

Cortic. median. castanear. Masti-
ches, an. ℥ss.

Ol. immatur. vel ros. sæpius loti in
aq. aluminosa, lb. j.

Cera albæ. ℥iij.

Arida

Arida in subtilem pulverem trita, mergantur in succum prunorum sylvestrium, vel sorbi immaturæ, Omphacium, aut succum herbarum adstringentium, & lento igne siccantur, addendo, priusquam induruerint, oleum & ceram diligenter agitando, & commiscendo.

Si mavis cerati formam sume resinæ ℥iij. & ceræ ℥.v. ad dictam olei, & pulverum quantitatem.

ANGUSTIÆ

Cavitationum.

Angustia, seu coarctatio cavitationum quinque modis accidit, obstructione, constipatione, compressione, coalitu, & subsidencia, unde morbi in angustia differentie sumuntur, quæ quidem uti generatione, & causarum varietate discrepant ita diversis remediis tolluntur.

Obstructio proprie dicitur, illa cavitationis angustia, quæ fit à rebus intrinsecus præter naturam contentis (non adnatis) atque adhærescentibus cavi-

Gg 4 tati;

tati; cuiusmodi sunt humores, & vapores nimis copiosi, crassi lenti, adhæc pus, grumi sanguinis, & lactis, spinæ, & ossicula gulæ transitum impediencia, pili, calculi, vermes, fæces intestinis inhærentes.

Pus abscessibus inclusum tollitur aperture abscessus, quæ sit ferro, vel igne actuali, aut potentiali, id est caustico, de quo paulo infra.

Quod adhærescit ulceribus, tollitur sarcoticis, de quibus inter remedia ulcerum.

Quod effusum est in alias cavitates, uti asperam arteriam, etiam tollitur incidentibus, & detergentibus, quæ mox proponuntur.

Grumi sanguinis prius dissolvendi sunt remediis alias propositis, tum evacuandi per alvum, urinam, sputum & pro partis affectæ situ, deiectoriis, diureticis, expectorantibus ab initio enaratis.

Lactis quoque grumum solventia, & discutientia parent ex dictis.

Corpo-

Corpora inhaerentia gula, si sensui pateant, extrahuntur ferramentis: si minus, dimoventur loco, sternutatione, vociferatione, vomitu provocato per immissum digitum, aut pennam in œsophagum: item copioso potu, deglutitione boli solidioris non benè masticati, & tandem deglutita spongiola prius imbuta resina, ut corpora eidem adhærescant, postea retracta beneficio longioris fili alligati.

Pili aliq̃q; corpora extrinsecus advenientia, si appareant, tolluntur chirurgicis instrumentis: Si lateant in ventriculo, aut intestinis pelluntur deiectione aut vomitu pro ægri inclinatione.

De laxantibus alvum, atq; adeo fæces vacuantibus, præterea de vermium, & calculorum remediis vaporesque copiosos, & crassos discutientibus dictum est inter remedia morbi causam auferentia.

Obstructio à plenitudine, seu copia
Gg s sangui-

sanguinis tollitur victu tenui, non optimi, plurimivè succi, validis exercitiis, multis frictionib. medicamentis exiccantib. totum corpus, & sensibili evacuatione per venas sectas, scarificationes, cucurbitulas scarificatas, hirudinesque.

At pravi humores, copiosi, crassi, & glutinosi quibus frequentissimè obstruuntur mesenterium, iecur, lien, uterus, renes aliarumque partium venæ, & arteriæ postulant medicamenta primò quidem incidentia, attenuantia; & detergentia, deinde vero evacuantia.

De vacuantibus dictum est abundè ab initio. Alterius generis ea sunt, quæ pro crassorum humorum præparatione dicta sunt. Quia tamen hæc exobstruentia latius patent, quam præparantia humores, & eorum frequentissimus est usus in curandis febribus, hypocondriaca melancholia, lienosis, ictericis, menstruorum defectibus, operæ pretium

pretium est paulo distinctius illa recensere, atque in tres partiꝝ clas- ses; frigida nempe, temperata, & calida, ut in usu delectus sit facilis.

Frigida exobstruentia conveniunt febribus acutioribus, partibusque calidis obstructis ab humoribus adustione incrassatis: inter quæ magis obusa sunt acetosa, aciditas citri, & limonis benè maturi, cichor. endiv. fragar. gramin. radix, hepatica, hieracium, lapathi cuius- cunque radix, melonis, & peponis sem. uti & citruli, cucumeris, atque cucurbitæ, sonchus, scariola, taramuncum, trifolium acetosum.

Ex his fiunt decoctiones ex aqua, aut iure pro syrupis, qui præstantiores evadunt addita emulsi. sem. frig. mai.

Setum lactis depuratum per se est efficax, sed sit efficacius eorundem sem. addita emulsione, vel si herbis aperientibus alteretur.

Herbarum succi depurati miscentur

centur iuri pro extemporaneo syrupo ad ℥ij. & iij.

Aciditatis citri, & limonis ulus est maximus in cibis, & medicamentis, uti etiam emuls. sem. melon. & cucurbitæ, qua panatellæ liquidiores, & ptisanæ hordeacæ passim atteruntur.

Pro ordinario potu satis grata est decoctio trifolii acetosi, acetosæ, fragariæ, & graminis; quæ reddi potest acidior. addita portione aciditatis citri, aut limonis.

Verum seminibus acetos. inest hoc maximè necessarium ad fallendos ægros vinum importunè exigentes, quod aquam acidulam reddunt, & rubelli vini colore afficiunt.

Temperatiora, in quibus non observatur effatu dignus excessus calidi, aut frigidi, conveniunt maximè febribus diuturnis ex humorum adustione, quæ deferbuerit: Item melancholicis affectibus, uti

hypo:

hypochondriacis, & scirrhis :
Talia sunt inter simplicia, capillus
♀, aq. thermales, acidulæ, lupulus,
liquiritia, trichomanes, quinq; fo-
lium, quæ omnia adduntur prædi-
ctorum frigidorum decoctioni-
bus.

Composita multo plura fingi
possunt, pro cuiusq; arbitrio; nam
frigida cum æqualiter calidis pari
pondere mixta faciunt temperata.

In hunc finem serum depura-
tum alteratur aliquando agrimon.
radic. asari, cuscuta cum momento
absynthii; quo nil utilius in mor-
bis melancholicis.

Eodem modo dari solet succus
cichorii condensatus cum succo
agrimoniæ, & tantillo chalybis
præparati in bolo sumendo ante
aliquam decoctionem aperitivam.

Mel quoque, & saccharum ad-
dita succis, & decoctionibus exob-
struentium frigidorum faciunt
temperata.,

Huic

Huic vivi maximè serviunt vulgares, & paratu facillimi duo syrapi, oxymel nimirum simplex, & syrupus acetosus simplex, qui constant ex una parte aceti, & duabus mellis, aut sacchari, & quatuor aq.

Verum remediis huius classis præcellunt tria sequentia paratu facillima.

Primum Aq. fabrorum clarificata pro potu ordinario, cum qua fieri potest mulla dilutior addita vigesima parte mellis, aut sacchari.

Secundum cremor Tartari à Di. ad 3 j. additus iusculis aperientibus.

Tertium chalybs præparatus, sine quo scirrhi, & obstinata obstructions vix cedunt.

Multiplex est eius usus, & præparatio. Omnium facillima, maximeq; extemporanea, imò & optima est ista.

Extendatur chalybs in tenues, longosque bacillos, aut laminulas, nam admoto sulphuris cono funduntur,

duntur, & supposita aqua excipi-
untur, inq; subtilissimum pollinem
teruntur. Datur hic pulvis à ʒß. ad
ʒij. circiter, vel in bolo, velectu-
ario, vel vino.

Forma boli est huiusmodi.

R. Succi agrimon.

Succi borag. condensat. an. ʒj.

Chalyb. preparat. ʒij.

Misc. F. boli, num. ij. sumendi
paulo ante decoctionem exobstru-
entem.

Electuarium erit tale:

R. Pulu. Agrimon.

Capil ♀.

Ceterach. vel,

Lingu. cervin.

Rad. Quinquæfol.

Liquirit.

Chalyb. preparat.

Fol. Senæ. an. ʒi.

Cinamom. ʒi.

Pulpæ passular. in uino albo coctar.

& per setac. transm. ℥. i.

Syr. de pomis simpl. vel pro pau-
perculis, oxym. simpl. ℥ij.

F. Elect. S. A. sumendum ad ℥i. circiter, quatuor horis ante prandium. Cum vino dupliciter porrigitur, vel bibendo pulvisculum chalybis mixtum vino, vel parando vinum chalybeatum.

Optimus erit hic pulvisculus pro una dosi.

℞ Chalybis præparati.

Cremor. tart. an. ℥i.

Cinamom. ʒss. Misc. F. pulvis.

Vinum chalybeatum fiet, si in ℔. iij. vini albi odorati ponatur chalybis præparati, sol. sena an. ℥i. Cinam. ℥ij. Herbar. aperientium, & appropriatarum parti obstructæ. M. iij. stent in loco calido per octiduum, & frequenter agitentur. Tum percolentur ad usum, & porrigantur, ℥ij. aut iij.

Potest quoque præstantissimus syrupus chalybeatus parari in hunc modum.

℞ Chalybis præparati, q. lubet: affunde acetum acerrimum ad eminen-

mentiam transuerforum 4. digitor.
& sinatur in loco calido, donec
chalybis tincturam extraxerit, tum
inclinato vase separetur à sedimen-
to, huic adde *sacchari*, vel *mellis* opti-
me despumati duplum, præterea
passularum ℥℞. & *absynth* j. com. P. j.
ad singulas libras aceti, coquantur
lento igne ad syrupi consistentiam,
fiatq; colatura, cuius dosis erit ℥i.
cum decoctione appropriata parti
affectæ.

Quæ extrinsecus admoventur
mixta sunt ex emollientibus, & di-
gerentibus, qualia sunt fomenta ex
decoctione maluar. alth. melil. fæ-
nugræc. aneth. chamomel. & por-
tione absynthii ad partis corrobo-
rationem; addendo sub decoctio-
nis finem aliquid vini albi, & aceti
ad penetrationem.

A fomento fiat inunctio olei ex
iam dictis parati per decoctionem,
quale describitur inter emollientia
humorum duritiem.

Calidiora

Calidiora exobstruentia conveniunt habitui, & tempori frigidiori, nec non febribus diuturnis, qualia sunt hæc vulgarissima simplicia : Absynth. agrim. apium, arthemif. asparag. betonica, capparis, maxime radicis cortex, ceterach, chamædiis, cuscuta, daucus vulgaris, enulæ campanæ radix, filicis radix, fæniculum, fraxini cortex, fumar. communis, & lutea, gentianæ rad. hædyllarum, hyssopus, irio, iva arthritica, *lingua cerviua*, matricaria, marrubium album, mentastrum, petroselinum, puleg. rubia tinctor ruscus, tamariscus, satureia, in quorum usu eligenda semper ea, quæ appropriata sunt partibus affectis, & inter alterantia determinata proponuntur.

Fient autem ex iam dictis; syripi electuaria, & decocta pro rei exigentia, &c.

Redduntur efficaciora decocta
in

in iure galli senioris, aut columbi,
si fieri possit.

Vina quoq; medicata, uti absyn-
thite, optima censentur, cum visce-
rum imbecillitas antiqua est, atq;
ex vinis addita dimidia quantitate
mellis despumati fiunt syrupi uti-
les, & grati; sed efficacissima red-
duntur vina additio chalybe modo
paulò ante dicto.

Mulsa paulò plenior alterata
herbis propositis præstantissima
erit pro potu, uti oxymel quodcùq;
compositum ex iisdem pro syrupo,
quale est vulgare officinarum ex
quinq; radicibus aperientibus, apii,
asparagi, fœniculi, petroselini, rusci.

Extollitur quoq; usus aceti scyl-
litici ad semicochlear additi syru-
pis, ac decoctionibus.

Sunt qui radicem ari sæpius in-
fusam vino, & vicissim exiccata, donec
acrimoniam pene omnem
exuat, ad inveteratas obstructions
omnib. præferant, addi potest ele-

ctua-

716 *Medicina Pauperum*

Etuariis, sed frequentius usurpatur:
pulvisculus inde factus cum vino,
aut iure exhibitus, cuius forma hu-
iusmodi esse potest.

℞ *Chalybis preparati.*

Rad. Ari preparata an. ʒ℔.

Cinauom. ʒ℔.

Sem. feniculi ʒ℔.

Sacchari fini. ʒi. Misc.

Redditur efficacior addita salis:
absynthii ʒi. F. pulvis subtilissimus,
cuius dosis sit ʒi. circiter.

Vel. ℞ Rad. Ari preparata ʒj.

*Summit. Absynthii comm. (sal.
absinth. longe præstan-
tius est) ʒj.*

Cinamom. ʒi. ℞.

Sacchari fini ad pondus.

Misc. F. pulvis subtiliss.

Per se valde exobstruunt aquæ
Thermales sulphureæ, ac nitrosæ
post totius corporis purgationem
potæ, uti etiam Terebinthina vul-
garis exhibita in bolo ad ʒ℔. circi-
ter, quæ etiam b. bi. potest, si cum
tan-

stantillo lutei ovi agitur, sensimq;
addatur aq. agrimonix vel vinum
usque ad ℥ij. vel iij. continue agi-
tando usque ad perfectam albedi-
nem.

Extrinsècus admoveantur fo-
menta ex decoctione digerentium,
& emollientium addito sub finem
decoctionis vino albo, & aceto ne-
que neglectis herbis appropriatis
parti affectæ, ex quibus fient quoq;
olea per decoctionem pro inun-
ctione.

Præstantissimæ sunt irrigatio-
nes, aut stillicidia aquarum sulphu-
rearum, & bituminosarum, atque
earundem luta debita ratione ad-
mota.

CONSTIPATIO.

Constipatio cavitatis proprie dici-
tur, angustia orta à rebus intus
adnatis & adhærescentibus parti,
puta tumoribus, carne, callo, fœtu
mortuo.

Pellentia fœtum mortuum sunt
propo-

proposita inter remedia causæ peccantis substantia.

De tumoribus dicetur inter morbos auctæ magnitudinis.

Caro, & callus quemadmodum ferro, & igneo non difficulter tolluntur, quando sub aspectum cadunt, ita solis medicamentis, & quidem difficiliter auferuntur, quando in profundo latitant, cumque mollior sit caro, quam callus, requirit mitiora medicamenta, quæ vel strenue siccent, vel levissime exedant. Callus autem erodentia, seu septica postulat.

Carni ergo convenient Aristol. rot. rad. alumen vstum, antimonium calcinatum, ellebor. nig. rad. gallæ vstæ, mellis vsti cinis, minium vulgare, Gentianæ rad. cinis, ostrearum testæ, maxime crematæ, plumbum, cum sulphure vstum, spongiæ vstæ cinis horum omnium pulveres miscentur vnguentis, vel liquoribus, qui infunduntur.

Exper-

Expertum est sequens vnguentum ad carneas excrescentias, in primis verò carunculas in meatu urinario absque dolore, aufert, si candelæ extremitati apponatur, validè enim adhærescit, & partes sanas non excoriat.

℞ Mellis in cinerem usti.

Tutia preparata.

Butyr. recent. loti.

Terebinthina lota.

Cera flava. an. ʒβ.

Alumin. usti. ʒβ. Misc. F. Linim.

S.A.

Præstantissimus est etiam hic pulvis à Mercato descriptus libro 2. de recto presidio. usu. cap. 7.

℞ Aeruginis.

Auripigment.

Vitriol.

Alumin. rupei an. p. æ.

Cum aceto acerrimo terantur, & lævigentur in pollinem, exponantur soli caniculari, siccatur pulvis rursus aceto affuso levigandus, ac vicissim

vicissim soli exponendus, idque faciendum 10. dierum spatio; tum.

R. Lytarg. auri triti, & cribrati partem unam.

Ol. Ros. partes ij.

Coq. ad consistentiam Emplastri, cuius accipitur æquale pondus cum prædicto pulvere, & miscetur ad usum.

Tollit quoque omnem excrementiam certissimo experimento hic alius pulvis.

R. Corric. nuc. ingland.

Spongie.

Rad. Aristol. rot an. p. æ.

Exiccantur simul in olla in furno posita, ut in pulverem teri possint; hocq; pulvere inspergatur locus affectus melle prius perunctus.

Callos extirpant inter maxime vulgaria, auripigmentum, ærugo æris, calx viva, sæx vini usta, sæx acetii usta, vitriolumustum, ol. sulphuris, & vitrioli: hæc omnia in usu temperantur mitioribus, modo maiori,

maiori, modo minori quantitate
pro usus exigentia.

Exempli gratia pro infusione:

R. Decoct. Aristoloch. rot.

Gentian.

Ellebor. nig.

Rad. althææ. ℥ß.

Ol. Sulphuris aut

Vitrioli. ℥ß. Misc.

Pro unctione.

R. Vitrioliusti.

Alumin. usti. an. ʒj.

Butyr. rec. opt. lor. ʒß. Misc.

Si pulverem sem. papaveris albi
addideris, vel hyosciami: medica-
mentū plane indolens reddideris.

Pulvis Mercati per se usurpatus
est efficacissimus.

Optimus est iste, paratu facilior.
Subigatur calx viva cum melle in
formam pastæ, sicceturq; in forno,
ut in pulverem teri possit: insper-
gendum callositati, aut superflua
carni melle prius illita.

Hh

COM.

COMPRESSIO.

Compressio cavitatis cum fiat ab omni re incumbente cavitati, & comprimente, interventu, vel gravitatis, vel tensionis, vel impulsionis violentæ, vel astrictionis, nō habet particularia remedia; nam gravitas, & tensio à copia materiæ, tollitur vacuantibus sensibilibus, & insensibilibus, de quibus ab initio dictum est.

Tensio à flatu tollitur discentientibus.

Impulsio violenta ferè sequitur luxationes, depressiones, & fracturas ossium, quæ chirurgia curantur.

Astrictio violenta sequitur causas potissimum externas, uti fascias arctius deligatas, & quarum prompta est remotio.

COALITUS.

Coalitus cavitatis fit mutua agglutinatione laterum, quando natura ipsorum ulcera, implet
ex

ex boni sanguinis affluxu, unde curatur tantum ferro incidente, & separante latera conglutinata, sed post separationem munienda sunt probe latera, ne vel se contingant, vel denuo coalescere valeant, idcirco incurabilis est coalitus internarum cavitatum, quæ incidi non possunt.

SVBSIDENTIA.

Subsidentia cavitatis, si quidem fiat evacuata materia, quæ intus contineri deberet, restituitur solis alimentis regenerantibus materiam necessariam, si fiat parietibus cavitatis ob nimiam ariditatem contractis, aut ob insignem relaxationem concidentibus, curatur humectantibus, aut insigniter exiccantibus, ad humectationem sumuntur emollientia mitiora, & anodyma propriè dicta suis locis proposita: ad exiccationem conferent dige-

Hh 2 rentia,

rentia, & dilcutientia mixta astringentibus valentioribus iam enumeratis.

LÆVITAS.

S*uperficies levigata* tollitur primo detergentibus, deinde exiccantibus.

Ad detergendum conveniunt omnia propolita pro pituitæ præparatione, & pro tollenda obstructione ab humorum crassorum; & viscidorum infarctu, & pro detergenda cute. Habent tamen quandam prærogativam aquæ salitæ naturales, vel artificiales, & mel decoctionibus additum, quæ potissimum ex amaris parantur, uti gentiam radic. helenij, aristoloch. long. centaur. min.

Pro exsiccatione conveniunt evacuantia insensibiliter, mixta validis astringentibus, de quibus antea.

ASPE-

A S P E R I T A S.

Superficies exasperata curatur emollientibus, & anodynis propriè dictis, quando fit à siccitate; privatim v. asperitas faucium, & laryngis, quæ frequentissima est, curatur iis, quæ ad vacuationem pectoris per sputum in materia salsa sunt proposita.

Quod si fiat à materia acri, & mordaci superficiem leviter abrudente, tollitur demulcentibus acrimoniæ, tum abluendo; tum oblinendo v. Epicerastica, de quibus inter remedia alterantia causam morbificam.

R E M E D I A M O R B O R U M

in vitiata magnitudine.

Magnitudo naturalis excessu, vel defectu fit vitiosa, eum supramodum augetur, vel diminuitur. Diminutæ magnitudinis species recensentur, atrophia, seu macies singularum partium; & Ma-

Hh 3

rasmus

raſmus, ſeu conſumptio totius corporis conſequens febrem hecti-
cam, aut Tabem, nam macies con-
ualeſcentium, poſt morbos acutos
vix morbi nomen meretur, cum
cito recedat, morbo, à quo pende-
bat, iam ſuperato.

Magnitudinis aucta, quam ru-
morem appellant, differentia om-
nes à cauſa ſumuntur, quæ genere
quadruplex ſtatui poteſt.

Prima eſt ſolidum corpus ſecun-
dum ſubſtantiam, pertinens ad in-
tegritatem corporis, unde fit obe-
ſitas à nimia pinguedine, Hyperſar-
coſis à carnis excreſcentia, hernia
intesti-
nalis & omentalis à deſcen-
ſu intesti-
ni, & omenti, qui mor-
bum etiam in ſitu parit.

Secunda eſt humor, aut quid af-
ſine humori, unde ſiunt phlegmo-
ne à ſanguine, œdema à pituita, ery-
ſipelas à bile, ſcirrhus à melanco-
lia, cuius quædam ſpecies eſt to-
phus, & ſtruma, cancer ab atrabile,
carbu-

carbunculus à sanguine adusto, & ab aquositate humoribus affini hydrocephalus, hydrops abdominis, & uteri.

Tertia est, quod præter naturam ex humoribus natum, unde inflatio à flatu.

Quarta est quid toto genere præter naturam ortum ex varia, & indicibili humorum corruptione, unde fit propriè abscessus, seu tuberculum cum folliculo, nempe meliceris à materia melli persimili, steatoma à materia pingui, seu o simili, & atheroma à materia quasi pulmentacea.

M A R C O R.

A Trophia particularis, quali paralytica & convulsa membra detineri solent, requirit primò expurgantia corporis impuritatem per vias convenientes: tum alimenta probum sanguinem generantia; denique attrahentia sanguinem ad partem,

Hh 4 illi.

illiusque calorem excitantia, & roborantia.

Hæc omnia præstant frictiones mediocres, usque ad ruborem partis, & levem intumescantiam.

Item balnea aquæ dulcis, subcalidæ, cui herbæ parti appropriatæ incoquantur, administranda usque ad levem partis tumorem.

Aut fomenta, vel irrigationes ex hydræleo, lacte, aq. dulci, alterata fol. malu. althææ. & herbis parti appropriatis.

Tandem validissima erit picationisq; ad ruborem & tumorem partis: Sunt autem hæc agenda peracta concoctione, ante novam cibi sumptionem.

In Oculi tabe nullus est locus picationibus, & frictionibus, sed fomentis tantum, quæ parantur optima ex lacte cum momento Croci, vel ex eodem cocto cum malua, violis, althæa, & faniculo, aut cum pomo dulci redacto ad formam molli-

mollioris cataplasmatis cum tantillo croci.

H E C T I C A.

Marasmus calidus sine tabe, qui sanabilis est pellitur præcipuè usu lactis, & balnei: bibitur lac humanum ex uberibus, vel asininum, vel caprillum recens mulctum cum tantillo sacchari, aut mellis sensim ascendendo ab ℥iij. ad viij. aut viij. quinque horis circiter à sumpto lacte administratur balneum aquæ dulcis, quæ subcalida tenetur usq; ad tempus egressionis, quo leviter refrigerari sinitur ad caloris unionem, & alimenti retentionem: vel statim à balneo molliter fricetur corpus vola manus imbuta oleo violaceo, & amygd. dulc. subfrigido. Si adsit Tabes dimitrendum balneum, & tantum fricandum corp⁹ ante cibi sumptionem, modò jam dicto, lactique indulgendum, nec non respicientibus pulmonum

Hh 5 vlcus;

730 *Medicina Pauperum.*

ulcus; Si lactis usus prohibeatur à
caulis enumeratis s. aph. 65. sub-
stituenda ptisana hordeacea.

Sunt qui secteti loco habeant
hanc ptisanam extemporaneam,
quotidie bis sumptam.

R. Farina horde. partes iiij.

Sacchari fini partem. i.

Eiat S.S.S. in olla fictili vitreata,
ut primum, & ultimum strarum sit
sacchari; facto deinde ex pasta o-
perculo, indatur furno post panis
extractionem, & coquatur ad suf-
ficientiam, id tertia ferè vice seu
immissione in furnum accidit.

Pro ptisana.

R. Huius farina coctæ. Zij.

*Iuris testudinum memorialium,
vel limacum Zij. Misc.*

*Ad ulcus verò pulmonum peculia-
riter commendatur pulvis mille-
fol. ad Zij. quotidie sumptus ex iure,
aut convenienti decocto.*

Item placenta ex farsara sicca,
butyro, & lardo quotidie sumpta.

Alii

Alii sacchar. Ros. cum bol. armeno, aut simili terra medicata, lapide hæmatite continuis aliquot mensibus usurpatum, reliquis omnibus præferunt.

O B E S I T A S.

Obesitas extenuabitur post decentem vacuationem totius corporis.

Primò quidem victu tenui, multisq; validis, ac frequentib. frictionibus, deinde verò quotidiano usu quorundam attenuantiũ, & siccantium medicamentorum, inter quæ magis laudantur; fraxini seminis $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. ex iure cū $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. aceti generosi, vel aceti scillitico cochlear ex iure multo ante cibum; oxymelitico, ac scilliticis trochiscis eadē vis tribuitur.

Valet quoq; sem. Ameos, aut sem. existentis in baccis sambuci $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ pota cum decoctione fraxini.

Sed pulveri viperino, de quo inter alexipharmaca dictũ est præcipua vis inest in exiccando corpore,
 $\mathfrak{ss}$ $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

fi 3 ſ. ſumatur quotidie ex iure, aut vino, 4. horis ante cibum, eoque magis, ſi corpus ſtrenue exerceatur poſt pulveris ſumptionem.

Huc pertinent omnia ſudores, & urinam provocantia.

HYPER-SARCOSIS.

CArneam excreſcentiam tollunt remedia conſtipationis à callo, aut carne, iam propoſita.

HERNIA INTESTINALIS.

Hernia omentalis ſola ſectiōe periculi plena, ſanari, arcto cingulo ægrè cohiberi poteſt. Intestinalis facile agglutinatur in pueris, & infantibus, externo uſu alstringentium cum accomodata deligatiōne. In aliis ætatibus, ſi antiqua ſit, exiſtimata eſt hæcenus ſolis medicamentis, ſine chirurgia, inſanabilis: Uſus tamen optimus rerum Magiſter, & medicamentorum iudex non ita pridem edocuit aduſtorum hernias, & magnas quidem, atque

inve-

inveteratas solis medicamentis, & congrua victus ratione coalescere, sexagesimo ad summum die in virili, & senili robusta aetate: quadragesimo verò in iuventute, & adolescentia, quorum remediorum opera pueri intra vigesimum diem restituuntur, nisi pro lusus intestinorum in scrotum sit ingens, & quodammodo habituarus.

Hæc autem medicamenta inter paratu facilia reponi possunt, cum ex paucis, neque exoticis componentur, unico excepto.

Primum est huiusmodi, sumatur ʒj. pulveris caulis herbæ bilinguis ex semicyatho vini rubri cum fol. eiusdem herbæ decocti, quotidie mane quinq; horis ante prandium: Locus v. affectus illinatur quotidie oleo omphacino, in quo bullierit totus erynaceus terrestris senior, non detracta pelle, usque ad carnis contabescentiam.

Secundum, Sumatur per sexaginta dies

734 *Medicina Pauperum.*

ta dies cyathus vini rubri potentis, alterati ℥j. equiseti (accipienda tota herba cum radicibus, & quam tenerrima, si fieri potest) ruditer primò contusi, eoq; tempore gestetur continue ad locum affectum sponsia, eodem vino imbuta, & expressa.

Tertium, Sumatur ℥j. pulveris ex æqua portione herniariz, rutæ caprariz, & asparagor. equiseti, ex semicyatho vini rubri generosi, iam dicti temporis spacio, & quotidie locus bis illinatur ol. communi, vel hypernici, in quo vivæ lacertæ diuturna insolatione contabuerint.

Quartum, gestetur ceratum ex æqua portione bdellii, & aloes tritæ cum albumine ovi, coque tempore quotidie sumatur ℥j. infrascripti pulveris ex semicyatho vini rubri generosi quinque horis ante prandium.

℞. Rad. consolid. mai.

Caryophyllat. vulg.

Rad.

Rad. Gratiola.

Bilinguis.

Equiseti.

Coriandr. preparat.

Sacch. ros.

Chalyb. preparati cum aq.

Ros. an. ʒiʒ.

Misc. F. pulvis tenuissimus.

Præparatio charybis ea est, ut limatura charybis, vel ferri restinguatur aqua rosar. tum exiccetur in umbra, iterum igniatur, & extinguitur eadem aqua, donec subtiliter teri valeat.

Cæterum in istorum medicamentorum usu id universim observandum est, ut subligaculum continue gestetur, vitetur quæcumque spiritus contentio, corporisq; exercitatio, & cibi, potusq; flatulenti indulgentia.

TVMOR AB HUMORE.

TVmorū, qui fiunt ab humorib; remedia ex dictis patēt, cum diligantur ad causæ ablationē, quæ ab initio

initio repelli debet, in augmento
partim repelli, partim digeri, in sta-
tu digeri, aut si id fieri, non possit,
suppurari; tumor vero admodum
durus, primò accuratè molli, tum
digeri, & resolvi: aliqua ergo hic
tantum subiunguntur, tanquam
quibusdam tumoribus compertis-
sima, paratuq; facillima remedia.

Ad erysipelas cuiuscunque partis. ℞.
farin. siliginis q. v. inde sacco ra-
ræ texturæ, & parti admove quo-
cunque fluxionis tempore.

*Ad perniones non ulceratos unguen-
tum præstantissimum.*

℞ Fol. Tabac. virid.

Cortic. mediet. sambuci an. M. i.

Rad. asphodel. maris incisæ. ℥j.

Ol. Commun. ℔. j.

Coq. lento igne ad consumptio-
nem totius humiditatis, facta forti
expressione, adde.

Thuris subtilis. pulveris. ℥ß.

Cera flava. ℥vj.

F. linimentum, quo illinatur
pars,

pars, deinde calentibus digitis fortiter perfrietur usq; ad insignem eius ruborem, & incalescentiam.

Valet quoq; ad cutis fæditares, & vitiliginēs.

Ad tumorem pedum ex lassitudine, diuturno morbo, & contusione.

℞ Totius farina triticea (h. est non repurgatæ.) ℥b. β.

Pulver. Absynth. ʒβ.

Rosar. ʒj.

Vini rubr. aust.

F. Cataplasma ad lentum ignem addendo in fine.

Ol. ros. compl. ʒi β.

M. admoveatur bis quotidie.

Ad strumas non ulceratas singulare remedium post debitam totius corporis purgationem exhibeatur quotidie per quadraginta dies continuos ʒj. pulu. rad. gladioli vulgaris, qui inter segetes est frequentissimus, sumaturque ex iure alterato radice scrophulariæ, quatuor horis ante cibum.

Partii

Parti vero applicetur Emplastrū
ex confusa cera nova nondum pur-
gata ab apibus, & melle, quod si fi-
eri non possit, substituatur hoc ce-
rarum.

℞ Pulu. lacert. infurno exiccat. ʒiʒ.

Succi Tabaci.

Cera flava.

Picis Burgundicæ. an. ʒʒ.

Mise. F. Ceratum; loco picis
Burgundicæ, quæ rara est in Italia,
sumatur Colophonia.

Ad *cancrum non ulceratum qui ad
insignem magnitudinem non pervenerit*,
nihil præstantius est usudiuturno
emplastri Aquapendentis post ex-
quisitam totius evacuationem.

Habet autem farin. milii. ℥.j.

Ol. ros. (ducti in mortario
plumbeo cum pistillo
plumbeo, donec plum-
bi colorē contrabat) ʒv.

Sape ʒjv.

Redigantur in Emplastrum cum
s. q. decoctionis solani hortens.
son-

sonchi, & virg. aureæ, æquis portionibus factæ in aq. purissima.

Pro aquosis, & statuosistumorib. valent remedia proposita inter dicutiētia.

Abscessus cum folliculo solis medicamentis non curantur, sed extrahendus est totus folliculus, vel si id fieri non possit, post tumoris apertionem est absumendus partim scriptis putrefacientibus, partim causticis exedentibus, de quibus iam dictum est.

REMEDIA MORBORVM

In numero.

CVm morb. in numero deficiente constitnatur, penes defectum rei pertinentis ad integritatem viventis, morbus in numero aucto proprie spectari debebit, penes additionē alicuius rei naturalis, & numero tantū redundantis; usu tamen, & abusione quadam vocum referuntur quoque ad morbum in numero, calculi, vermes, & suffusio.

Remedia vermium, & calculi habent.

habentur inter ea, quæ respiciunt
causam à tota substantia.

SUFFUSIO.

Ad suffusionem hæc inter facile
parabilia maximè conveniunt
oculo tepide admota, potissimum
vero ope cucurbitæ ocularis, ut re-
medium diutius atq; validius agat..

R. Chelidon.

Fœnicul.

Verbena.

Ruta. an. M. i.

Mellis ros. lb. ss.

Sem. Rapi contus. ℥ ij.

Herbæ contendantur, omniaq;
mixta exponantur soli, & quotidie
agitentur; post quagraginta dies
exprimatur succus in æneo vase
servandus ad usum; oculoq; instil-
landus per se, vel miscendus colly-
riis mitioribus.

Aliud. R. Sacchari fini pulverisati,
& in patina vitrea super cineres ad
rubedinem usq; decocti, item vitri-
oli à fecibus purgati, solique expositi
donec.

donec album colorem contrahat.
an. partes æquales. Hoc pulvere
impleatur acetabulum ovi adduri-
tiem cocti, partibus ambabus ovi
deinde arctissimè ligatis, macere-
tur quatuor dies in aq. Eufrasia,
vel in vino albo subdulci, in quo
prius bullierit Eufrasia, vel fœnicul.
aut sileris montani semen, expressio
seruetur ad usum in vase vitreo.

Aliud. R. *Vini albi dulcis optimè
purgat. & clarificat. lb. j.*

Sem fœnicul. ʒiij.

Cariophil. Indicar. ʒiʒ.

Macerentur per horas 24. F. Co-
latura, adde.

Aq. Vita. ʒij.

*Antimonii semel fusi cum æqua-
li portione salis petrae. ʒij.*

Macerentur per duos dies, dein.
serventur ad usum in vase vitreo.

Aliud. Succus cæparum per se in-
stillatus, aut modico vini albi dul-
cis dilutus, est præstantissimum
collyrium, & quod mirè oculi in-
flam-

flammationem, si quæ adfit, è vestigio tollit.

Est quoque singulare collyrium inter opthalmica descriptum, quod exigente necessitate efficacius reddi potest admixtione alicuius fellis, vel secundi collyrii propositi, aut succi capæ albæ cum lacte leviter decoctæ.

Ad proprie morbus in numero aucto, qui abundantiam materiæ roburq; formatricis facultatis sequitur, *ustione, & sectione* melius curatur, quàm medicamentis absummentibus.

Morbus in numero deficiente, si sit connaturalis, est omnino insanabilis, cum fiat defectu materiæ, & formatricis imbecillitate; adventitius etiam, si in parte spermatica consistat est incurabilis, in parte carnosâ interdum sanationem admittit; eademq; exigit remedia, quæ ulcus cavum, aut vulnus compositum, cum partem deficere contingat, ob illo-

illorum causas, puta, sectionem, u-
sionem, erosionem, putrefactio-
nem.

REMEDIA MORBORVM IN
situ, & connexione.

MOrbus in situ, & connexione,
vel est connaturalis, & fit di-
stractione materiæ tempore for-
mationis; vel adventitius, à tripli-
ci nimirum causarum genere fieri
soliis, laxatione, seu dearticulati-
one continentium; solita continui-
tate, & violenta tensione ob nimi-
am repletionem, vel exiccationem.

Vitium formatricis non admit-
tit curationem.

Aliæ tres causæ eadem postulant
remedia, quæ morbus in figura;
qui morbum in situ necessario co-
mitatur.

REMEDIA MORBORVM IN
soluta unitate.

Solutæ unitatis duo statui pos-
sunt summa genera ulcus & vul-
nus.

Illud

Illud fit à causa erodente, atque adeò necessariò coniunctam habet depreditionem substantiæ.

Vulnus verò est quæcunq; alia soluta unitas sine causa erodente, siue simplex sit unitatis solutio, siue cum depreditione substantiæ, ut in vulnere composito.

Ac licet pro partium diversitate subinde mutentur hæc nomina (si quidem ulcus in osse dicitur caries, vulnus in ossibus dicitur fractura, in nervis ruptis spasma, in punctis punctura, in carne contusa thalassma) naturam tamen retinent, modoq; generationis non differunt: nam quodcunq; ulcus fit à materia acri, & erodente; uti sunt humores, & ichores acres, venera acria, medicamēta septima, & caustica, ignis actualis, pus, humiditas in quam putrefacta substantia solvitur, ut in gangræna, reliquæ omnes causæ continuum solventes, secando, frangendo, tendendo, contundendo

do faciunt vulnus lato modo sum-
ptum.

SIMPLEX VVLNVS.

Simplex vulnus, seu solutio conti-
nui sine deperditione substantiæ
curatur agglutinantibus quæ sic-
cando, astringendo, adhærendo,
labia vulneris in se mutuo cogunt,
uniuntq; quæ unio in ossibus im-
mediate fieri non potest ob eorum-
dem duritiem, sed fit mediante cal-
lo, cuius materiam alimenta gluti-
nosa præbent.

Fracturas vero affigunt, & firmant
eadem glutinantia medicamenta,
quorum duplex statui debetordo:
mediocrium & valentium; illa
conveniunt parti, & habitui humi-
diori: ista parti, & habitui ficciori,
ac vulneri cruento.

Mediocria glutinantia magis obvia
sunt: albumen ovi, ascyrum, achyl-
lea, androsimum, bursa pastoris,
balsaminæ repentis fructus, caseus
recens, & ei⁹ gluten, cauda equina,
li
cera,

cera, caryophyllata, cythus, flos solis, gramen-ischæmon, gummi prunorum, hederæ terrestris, herba Siciliana, herba trinitatis, hypericum lingua serpentina, millefolium, me-spili folia, ophris, plantago, pyrus sylvestris, rosæ damascenæ, rubus, fanicula mas, ferratula, scabiosa, veronica, virga aurea, ulmi folia.

Ex his parari possunt vulnerariæ potiones, possunt & quacumque alia forma internè dari.

Extrinsèc' verò admoventur, vel contusa, vel pulveris modo aspersa; vel expressa, & instillata, vel decocta maximè ex vino rubro austero, eorūq; opera adiuuatur deligatione quæ labia vulneris unira detinet.

Sunt quædam alia quib. recentia vulnera simplicia citissimè glutinantur, per se applicata, & deligata, nempe lachryma abietina, parietaria contusa, tabaci folia contusa, pix arida, persicaria maculata contusa, oleum insolatione factum ex fol is

Foliis linguæ serpentinæ, aut fructibus balsaminæ.

Omnium verò præstantissimum & instar balsami occidentalis (quo in glutinandis vulnerib. nihil, præstantius) est oleum, quod & florib⁹ recentibus hyperici, phialæ inclusis ad solis radios, per descensum elicitur. Valent quoq; vermes terreni vino nigro eloti, ac triti, potest quoq; inter facile parabilia oleum hispanum reponi descriptum in Chirurgico pentareucho aq. pendens, quo 24. horarum spacio vulnera consolidari perhibentur.

Valenter conglutinant Alchimilla, Amaranthi purpurei flos, bugula, consolida maior, galla, immatura, Geranium quodcumq; (sed maxime pes columbinus) hypocistis, lagopus, malicorium, oleæ, præsertim sylvestris folia, pilosella, polygonum, pruni sylvestris succus, quercus folia teneriora, symphitum

tum petræum Lobeli, virga sanguinaria.

Quorum omnium administrandi ratio est eadem cum superiori.

Extrinsecus addantur pilileporis combusti, stercus asinin. spongia usta in pulverem trita, & matri-sylva quomodocumq; usurpata.

C O N T U S I O.

Quod si absq; sensibili solutione contusa dumtaxat sit pars, convenient roborantia mixta digerentibus, & anodynis: huiusmodi sunt lardum cum absynthio contusum; absynthium in tegula calefactum, & vino aspersum, farina fabarum cum sapa in formam Cataplasmatidis redacta, tota tritici farina cum vino nigro, pulvere rosarum, aut absynthii, & oleo ros. cataplasmatidis forma, persicaria contusa, & vino calente aspersa, Fetus aquæ calidæ, præsertim matinx alteratæ absynthio.

Cæterum hoc linimentum omnibus

nibus aliis præferendum ad sanan-
das contusiones, quod mirificè
quoque lenit tumentium hæmor-
rhoidum dolorem, & dentium do-
lorem tollit gingivis molliter affri-
ctum.

℞ Ol. commun. ℥. j.

Medul. cruris bubul. Cera flava.

*Resin. abietine aut picee (vulgo
rasa) an. ℥. ij.*

Butyr. recent. ℥. iij.

Liquefiant omnia lento igne,
cumque medullam liquata fuerit,
removeto.

V L C V S.

Ulcus, vel est superficiale, vel
profundus.

Illud, vel est actuale, cui deest
summa cutis, uti intertrigo puero-
rum, vel est potentia tale, quod ex
vi causæ externæ citò evadit tale,
nisi prohibeatur, uti est ambustio,
cui si citò succurratur, nullum sub-
sequitur ulcus.

Superficiale ulcus curatur miriori-

li 3

bus

bus inducentibus cicatricem, iisdem curantur ambusta disruptis iam vesicis.

A M B V S T A.

Illasam autem partem servabis sequentibus mature applicitis; sunt autem atramentum scriptorium, vernix liquida molissimo linteo excepta, totum ovum cum ol. ros. aut per se agitatam, oleum ex mediano sambuci cortice per decoctionem paratum, albumen ovi optime subactum cum aceto, addita particula aluminis rupei crudi.

Præstantissima sunt duo sequentia unguenta, quorum primo illæ partes ignem absque noxa tractare poterunt.

❧ *Succi ex tota althæa cum radicibus express* ℥vj.

Ol. Sambucini ℥iiij.

Alum. rupei crudi ℥i.

Coq. lento igne ad mediocrem consistentiam, tum adde:

Cera. ℥ss. Mile.

Secun.

Secundum:

& Olei commun. ℥iij.

Cera novæ. ℥i.

Vin. ovor. subciner. coct. N. ij.

Dissolvantur, & misceantur, donec habeant in unguenti formam, extendatur super linteum, & bis in die renovetur.

Extollitur quin etiam unguentum ex Icthyocollæ, & alum: plumei paribus portionibus aceto subactis.

Item succus altheæ agitatus cum ovi albumine.

Profundius ulcus est primo implendum carne sarcoticis appellatis, quæ partis excrementum crassum detergunt, tenueq; absument, tum cicatrice obducendum epuloticis, quæ insigni exsiccatione non modo excrementa, sed etiam sanguinem absument, summamq; ulceris superficiem obdurant, & veluti in cutem convertant.

Ii

4

IMPLEN-

IMPLENTIA VL CVS

Cavum.

S*Arcotica*, seu implemtia ulcus
Stamlatè patent, quam variæ
sunt cavi ulceris differentia.

Nam ulcus valdè humidum re-
quirit valide desiccantia, adeo ut
obducentia cicatricem ulceri pla-
no necessaria sint ad implendum
ulcus cavum præhumidum : quod
verò est valde sordidum, requirit
valenter detergentia.

Hoc autem unice observandum,
ne sarcoticis valde siccantibus, &
detergentibus misceantur adstrin-
gentia, quia excrementum ulceri
impingunt, redduntq; profundius,
& serpentius ulcus.

Itaq; sarcoticorum duplex sta-
tui potest ordo; mediocrium, quæ
conveniunt parci molli ulcerique
non admodum humido, ac sordi-
do; & valentium quæ conveniunt
parti siccioris, ulcerique sordido,
ac præhumido.

Cate-

Cæterum nulla est spes implendi ulceris ope sarcoticorum, nisi auferantur prius impedimenta regenerationis deperditæ substantiæ impedimenta regenerandæ carnis: videlicet fluxio cuiuscumq; materiæ, vel copia, vel prava qualitate peccantis, intemperies partis ulceratæ, callus innascens ulceri, caro flaccida excrefcens, ossisq; subiecti caries, intemperies, corruptio.

FLUXIO.

Fluxionem tollunt vacuantia, revellentia, repellentia, intercipientia, contemperantia, roborantiaque male affectas partes, quarum vitio excrementa regenerantur, de quibus iam dictum est in remediis causarum, & morborum similiarium.

INTEMPERIES

Ulceratæ partis.

Intemperies ulceratæ partis corrigitur alterantibus contrariis, de quibus etiam dictum est in gangræna certe

li s tanta

tanta est humiditas partis, & innati calidi dissolutio, ut igne actuali, vel potentiali sit opus, quorum ille citius operatur, partemque magis corroborat.

GANGRÆNA.

Incipienti gangræna, aut ubi eius est periculum, ut in magnis vitiis sclopetorum, nihil præstantius sequenti balsamo, si carpta filamenta eo imbuta ulceri applicentur, quo etiam sordida omnia ulcera, si malignitas absit, feliciter persanantur.

R. Flor. sulphur. ℥iij.

Ol. ros. comp'et. ℥b. β.

Vini rubr. optimi. ℥iiij.

Macerentur per octiduum leni igne, atq; aliquoties agitentur, tum coquantur lento igne, & semper movendo ad vini consumptionem: In colatura dissolve.

Terebinth. clarissima ℥iij. β.

Misce, & serva ad usum.

HER.

H E R P E S.

IN ulceribus quoque à bile tenui, uti herpete miliaris, aut non valde excedentibus, & ulcerato erysipellate, maximum facessere solet negotium partis humiditas cum acrimonia coniuncta, cui egregie prodest sequens unguentum sambucinum, quo non modo similia ulcera, sed ambusta omnis generis, & omnes penè cutaneæ fæditates persanantur.

R. Salis communis. ℥iij.

Dissolvatur pari quantitate, vini rubri opt. deinde adde:

Cort. med. Sambuci ℔.β.

Macerentur per duas horas, tum adde

Ol. ros. completi ℔.iss.

Bulliant lento igne ad humiditatis ferè consumptionem, fiat colatura sine expressione, tum residuo cortici adde ulterius

Ol. ros. compl. ℔.β.

Salis vino soluti, ut sup. ℥℔.

Coquantur strenue ad totius humi-

humiditatis evaporationem, ut cortex fiat friabilis, cum hoc oleo diligenter expresso coque.

Lithargyr. auri preparati, & cribrati. ℥ij.

Quibus ex arte coctis adde prædictum oleum, move, donec incallescant, postremo impone sensim sequentia simul per setaceum transmissa: videl.

Cerusse optime ℥ij.

Plumbi cum sulphure usti non loti ℥vii.ß.

Cera flava. q. s. ad unguenti consistentiam.

C A L L V S.

CAllustuissime tollitur forcipe, aut igne actuali, ubi id fieri potest, sin minus tollitur erodentibus descriptis inter remedia constipationis cavitatis. Huius impediementi occasione sæpe remanent profundæ fistulæ incurabiles, quæ secari non possunt, & necessariis remediis opportune undique tractari:

tractari: FISTULA his confert sequens balsamus, quo profunde ani, testiumq; fistulæ sanari visæ sunt.

Paratur autem hoc facile pacto.

R. Rad. Geranii columbini incis. ℥ij.

Rad. iridis opt. notæ. ʒ iij.

Rad. ellebor. nig. præparat. ʒ ij.

Granor. Tritic. M. i.

Contundantur ruditer, & infundantur per diem in vini rubri austeri ℥. i. deinde adde,

Ol. Hyperic.

Myrtini an. ʒ iij.

Bulliant lento igne ad consumptionem humiditatis, facta expressione, & colatura, adde

Bituminis.

Myrrhæ an. ʒ β.

Stent ad lentum calorem, donec perfecte liqueantur, deniq; adde

Lacryma abietina.

(& si fieri potest) Balsami occidentalis. an. ʒ i.

Misce ad lentum calorem, & F. balsamus fistulæ instillandus, & turundis illinendus.

CA-

CARO LVXVRIANS,
& Vitiosa.

CArnem flaccidam in ulcere luxuri-
antem tollunt remedia descri-
pta contra morbum in constipatio-
ne à carne, & callo.

His tamen addatur sequens pul-
vis Escharoticus, quo maligna ul-
cera (uti scrofulæ malignæ, & can-
cri ulcerati) si parva sint, & recen-
tia, feliciter per sanantur.

R. Rad. *Serpentaria maior*. in Iunio
coll. sectaq. in taleolas, & in umbra
ficcata.

Arsenic. chrystall. an. ℥j.

Pulverisentur, misceantur, &
usq; ad Octobr. initium radiis so-
laribus exponantur in ampulla vi-
treâ bene clausâ, & frequenter agi-
tentur, tum servetur pulvis ad u-
sum: qui talis erit: abluatur aliquo-
ties ulcus, madidoq; linteolo fove-
atur aq. nenupharina, aut eius de-
cocto: postmodum, inspergatur pulvis
munitis partibus sanis aliquo cera-
to, ne

to, ne ultra quam par est, serpat
pulvis; sponte excidet eschara intra
duos dies, & curatio perficietur sar-
coticis valentioribus.

OSSIS SVBIECTI VITIA.

O Sulceri subiectū, ac detectū,
est corroborandū inspersione
pulverū, ut caro superinduci possit.

Parantur autem ex æquis porti-
onibus rad. peucedani, aristolochiæ
rot. Iridis, myrrhæ, thuris.

Quod si iam nigredinem contraxerit,
ferro deradente, atq; igne actuali
opus est, tum inspergendus pulvis.

Si cariem contraxerit tollenda est
quoque ferro, & igne.

Cæterum aliquando accidit ob ul-
ceris angustiam, & flexuositatem tan-
gi nullatenus posse subiectū os fer-
ro, aut igne, ac stylo ægrè percipi,
quo casu infundendum est aliquid
acre, & exiccans per aliquot dies,
ut caries firmetur. Huiusmodi est
inter paratu facilia decoctū aristol.
gentian. & Ari, trajectum per tar-
tarum

tarum calcinatum sacculo inclusum.

Laboriosior est spiritus tartari, qui ad hoc opus in primis commendatur, si convenienti liquore contemperetur. Ablatis impedimentis proficius postmodum erit usus sarcoticorum, seu implentium ulcus, quorum sequitur enumeratio.

SARCOTICA

Mediocris.

Vlceri non admodum humido, sordidæ partiq; molliori conveniunt, *sarcotica mediocria*, nempe aq. thermales salæ, & nitrosæ, betonica, gentianæ radix, hædysarum, iris, matrifylua, mel coctum, personata, resina omnis, scordium, triticum, thus.

Ex herbis fieri possunt decoctiones pro ablutione, & infusione. Fient etiam extemporanea unguenta, facto prius oleo per decoctionem, tum addita portione ceræ, & si placet, aliqua etiam mellis, & resinæ,
aut

aut pulverum, qui maximè parantur ex radicibus, & thure.

Potest quoq; simplex pulvis etiam ex herbis parat⁹, ulceri inspergi

Externis addatur tabacum, & centaurum minus.

Forma ex temporanei unguenti poterit esse huiusmodi,

R. Fol. Beton. M. j.

Fol. Tabaci. M. ß.

Ol. commun. ℥iiij.

Concidantur herbæ, & coquantur in oleo ad totius humiditatis consumptionem, deinde adde

Resina vulgar. ℥i.

Cera nova. ℥ß.

Pulu. rad. Iridis, vel Thuris ℥ij.

Misc. F. Vnguentum.

IMPLENTIA VLCVS

Sordidum.

Valentiora sunt, ulcerig³ sordido, ac parti duriori conveniunt aristol. rot. radix, Bonus Henricus, Colus Iovis, Marrubium, Mel crudum, Myrrha, Peucedani radix.

Et

Et in extrinsecis Aes ustum Hispanicū (vulgo Feretto di Spagna) mixtum aq. plantag. fuligo camini, fuligo picis, calx optimè lota, & eius aq. pix arida, pix liquida mixta melli, testæ buccinar. & quæcumq; marinæ crematæ, omniumque sarcoticarum herbarum cineres.

Horum potest varia esse forma, puta linimenti, unguenti, pulveris, fucci, aut decocti.

Folia quoq; boni Henrici, & colus Iovis leviter tusa, & adversa parte administrata per se curant ulcera disepulotica.

Huc pertinet balsamus sulphuris descriptus, qui cava ul. era mirifice implet; ex eo conficit Rulandus, unguentum ad omnia ulcera rebellia valde celebratū; habet autē

Balsam. sulph. .r. ℥iij.

Cera nova. ℥ss.

Colophon. ℥iij.

Mirrhe ad pondus omnium.

Mirra subtilissimè trita insper-
gatur

gatur paulatim reliquis, simul liquefactis, probeq; commixtis, atq; igne lento coquantur, spatula semper agitando, donec optimè fuerint permixta, quod fere contingit post quartâ horæ partē tum removeantur ab igne, & paulatim frigescant.

Huic tamen medicamento neq; ulli alii cedit Emplastrū Theophr. paratu facillimū, quo ulcera inveterata, putrida, fœtida, cavernosa, sordida egregie curantur, potestq; omnibus cavis ulceribus aptari, si pro ulceribus acri fluxione tentatis, valdeq; sentientib. temperetur unguento simbulino supra descripto pro herpete, addendo maiore, aut minorem quantitatem, prout sensus partis acutior fuerit, & maior, aut minor aderit necessitas regenerandi carnem.

Est autem Emplastrum huiusmodi.

R. Viæl. ovor. N. x.

Terebinth. clara, lb. 3.

Misco-

Misceantur spatula lignea unguentum, in ipso vase ubi debent coqui, & hoc perficiatur spatio semiquadrantis horæ; tùm adde mel. ad pondus omnium, moveantur strenuè, & subito, ne grumos edant tum coq; lento igne carbonū, continuè movendo, post modum ignē aut augendo, donec contraxerint fuscum colorem, & ad nigrū poti⁹ quam flavū, aut rufum vergentem.

CLAVDENTIA VLCVS.

R Epletum ulcus, atq; ad aquabilem cum parte sana superficiem redactū. clauditur opulecticis, seu cicatricem inducentibus, quorum alia sunt mitiora, convenientiā parti molliori, alia valentiora, convenientiā parti & habitui duriori, quibus si in carne molli utaris, cicatricem quidem obduces, sed duram, collosam, & quę articuli motum impedire possit.

Mitiora magis obvia sunt, argilla, seu creta alba, cauda equina, flos utriusq; mali punici. cerussa, glossypium

pium ustum, linteorum cinis, numularia, os sepia, spongia usta, pili leporis usti, tormentillæ radix, terræ quæcumq; medicatæ, lythargi⁹, omniaq; frigida mediocriter astringentia; immo frigidi aeris contact⁹ per se cicatricē obducit; aridâ formâ efficacius agunt quam humidâ, itaq; inspersi pulveres superpositis filamentis captis conferent.

Ad vitandam tamen cicatricis inæqualitatē, atq; duritiem in parte cōspicua satius est uti linimentis, vel unguentis.

Præstantissimū est sambucinum iam propositum contra herpetem.

Alia extemporanea parari poterunt ex cerussa, vel lythargyro cū quadruplo olei ros. aut similis, & momento ceræ, immiscendo pulveres magis siccantes, si necessitas postulet.

Valentiora sunt omni frigida strenuè astringentia alias proposita, quibus addantur, aqua thermalis, alumi-

aluminosa, & gypsea, qualis est Patavina, mōtis ægrotorū, Antimonii calx optime lota, calx vulgaris probe lota, creta vitrioli, aq. calcis vivæ, gypsum, ferri limatura toties aspersa aq. ros. plantag. aut simili liquore, & siccata, donec in pulverē teri possit; squāma, & scoria ferri lota, plumbum per se ustū, & lorū, testæ quorūcunq; animalium ustæ, & lotæ, quæ omnia (excepto ferro, & aliis propositis astringentib.) externe adhibentur vel pulveris forma, vel mixta mitiorib. unguentis, thermæ balneis, & infussionibus inserviunt.

Atq; hæc fere sunt medicamenta facile parabilia, quib. ubicumq; terrarū, & absq; pharmacopæi opera quodlibet ægritudinū genus persanari potest.

Modus omnia, ubi opus sit, expedite, & absq; instrum. apparatus permiscendi non obscure colligi potest ex variis extemporaneorum compositorū exemplis, quæ per totam tractationem sunt sparsa.