

SIMEIOTICE
Sive
ENCHIRIDION.
DE SIGNIS.
JOANNIS
PRÆVOTII.



METHODUS COMPENDIO-
sa dignoscendi affectiones præter
naturam, ac earum eventus
prædicendi.

IOH. PRÆVOTII.

De signi natura, & Differentiis.

CAPUT I.



Væ sunt artis
Medicæ partes
præcipuæ, in-
ventio remedij;
& recta inventi
administratio.

Vtraq; ab affectus pender notitia,
quam idè appellat remedij in-
ventionem: Quod autem nos ve-
luti manu ducit in alicuius rei co-
gnitione, signum dicitur: Estq; no-
tius nobis sive sensu, sive ratione,
quàm sit signatû, cui⁹ notitiâ per si-
gnû quærimus, ut propterea consti-
tui debeat, vel mediû demonstratio-
nis, [quia] quæ à nobis notissimis ad
causâ

causarum pergit investigationem, vel à medio demonstrationis [propter quid] quando à causâ nobis nota. aliquem effectum denotare contingit, frequentius verò est medius terminus Syllog. cum multo maxima signorum pars dubia sit, & coniecturalis. Signi autem nomen cum indicio confundo, licet Galenus pressiori acceptione dicat signû esse certum rei alicuius argumentum, inditium verò probabile.

Signorum variae sunt species propter rerum, quas indicant, diversitatem. Indicantur corpora, & eorum causarum formales, tum efficientes, quæ tria cum sint salubria, insalubria, & neutra, oritur prima species signorum, salubrium, insalubrium, & neutrorum, quorum sunt etiam tot subdivisiones, quot corporum & causarum. Cumq; alia manifestius indicent, alia obscurius fiunt signa vel propria, vel communia, illa certiora sunt, ista incertiora.

Pro-

Propriorum quædam dicuntur
Pathognomonica, & essentialiter
concomitantia, quædam mox ap-
parentia, & supervenientia. Rur-
sum significari omnia sub aliqua
temporis conditione oportet præ-
teriti, præsentis, aut futuri. Hinc si-
gnorum divisio in anamnesticæ, re-
memorativa, Diagnostica & Pro-
gnostica: Rememorativorum quæ-
dam sunt præterita, & indicant rem
præsentem, ut cum ex naturali statu
antea cognito metimur præsentis
morbi recessum à statu naturali,
quædam sunt præsentia, & indicant
rem præteritam, utpote causam ex-
ternam morbi. Diagnostica tot sunt
quos indicata curativa præservati-
va, & vitalia, quæ omnia signis di-
gnosci debent ad curationem recte
instituendam. Prognostica alia in-
dicant morbum adventantem, alia
in morbo iam facto quidpiam præ-
dicunt, à quo appellationem su-
munt signorum salutis, aut mortis,
lon-

longitudinis, & brevitatis, coctionis, & crisis.

Al æ sumi possent signorum differentiarum, [quamquam minùs utiles] ratione facultatum, quibus res significantes sunt cognite, cum quedam visui, quedam gustui, & ceteris sint notæ. Sed à diversitate rerum significantium oriuntur quatuor precipue signorum differentie, quæ signorum fontes idèò dicuntur, quod reduci ad ipsos necesse sit quidquid aliud quidpiam prius ignotum manifestat. Primus fons est natura rei signate, quam Gal. essentialiter inherencia vocat. Secundus est ab effectibus. Tertius à causis. Quartus à simili, & dissimili Essentialiter inherere dicitur quidquid ad rei constitutionem attinet, & proximè illam sequitur: Illud in membris similaribus est temperamentum durities & molities, in organicis, est figura, cavitas, conformatio, magnitudo, numerus, situs, nexus, proportio :

Morbi

Morbi, & eorum causæ varias habent naturas pro sui diversitate: sic Tertianæ noscitur à propria idæa cum Febris tertia quaq; die revertitur. Effectus in sanis dicuntur accidentia, in egris symptomata. Accidentia sanitatis sunt actiones bonæ, naturalia excrementa non permutata, maximè forma, & pulchritudo. Symptomata sunt effectus morbi, scil. actio læsa, qualitas mutata, & excreta, vel retenta. In excretis sex considerantur. Substantia, quantitas, qualitas, motus, locus, & tempus. Causarum autem morborum effectus sunt morbi ipsi, & præterea quædam actiones læsæ, quæ intermedio fiunt per modum erroris externi, veluti cruditas à nimia copia cibi. Causæ sunt externæ, aliæ internæ.

Externæ vel necessariò occurrunt, cibus, aer, somnus, & vigilia, motus, & quies, excreta, & retenta, animi perturbationes. Vel nō necessariò

riò

riò occurrunt nempe venena, medicamenta, & quodcunque ab electione, fortuna, casu variisque hominũ studiis pendent, ut vectiones, equitationes, lucubrationes, &c. Internæ aliæ naturales, suntq; dispositiones, & constitutiones partium, quas ideo causas dispositivas appellare liceat: Aliæ sunt principaliter efficientes: Aliæ foventes tantum, sive id faciant per se, ut calor bilis respectu iecoris æstuantis, sive per accidens, ut cutis densitas respectu materiæ, quæ digeri deberet: Et causæ multiplicantes respectu abundantium humorẽ qui nec vitio efficientis, nec assumptorum colliguntur. Alię demum quęcunq; sint internæ, aut externæ, vel sunt iuvantes, vel lædentes. Hinc patet alia signorum divisio in signa tantum, & in ea quæ sunt signa, & causæ signi; Per simile, aut dissimile intelligo quodcumq; signarum notum, quod ad aliud comparatum nos

nos ducit in eius cognitionem: Vnde si materialiter loquamur, simile, & dissimile, non est a tribus reliquis fontibus distinctum sed per omnes vagatur. Formaliter autem est diversus, quia ratione dissimilitudinis infert aliquid, cuius alterum simile nec est causa, nec effectus, nec essentialiter inhaerens. Ut si ex Feb. populariter grassante colligas Feb. Petri esse malignam: Nam feb. cuius tutor similitudine non est forma identica, aut causa, aut effectus feb. qua Petrus vexatur. Ut autem optima sint comparatio eius, quocum facienda est comparatio, habenda, est cognitio exactissima; ideo naturam ægri, mores individuales proprietates diligenter discere ante oportet, quam fiat unius cum altero comparatio. Ex iis fontibus petendum quodcumque signum rei nobis incognita, sufficiunt tamen plerumque; signa ex uno fonte ad rem manifestandam nec semne est opus
revo-

revocare ad usum omnia signorum
cap. Ultimus locum habet in mor-
bis occultis, qui experientia magis
quam ratione innotescunt.

Ordo signorum, si naturam spe-
ctes, sic esset distribuendus, ut ab
illis initium sumeretur, quæ indi-
cant quid agendum; Ac si facilitatē
nostre cognitionis, ordiendum ab
indicantib. indicans inherens, un-
de sumitur ubi agendum, unde
Galenus I. de l. aff. præcipit, ut à lo-
co affecto cognitionē auspicemur,
deinde affectionem, ac postremò
eius causam investigemus: Quam-
quam interdū evenit ut duo simul
cognoscantur, & locus affectus af-
fectionem quoq; detegat; ut dolor
in articulis manus charagram, in
coxis ischiadem. Ergo pergamus ad
signa tum diagnostica, tum pro-
gnostica, omissis interim signis re-
spicientibus indicatum vitale, quæ
ad tuendam sanitatem propriè per-
tinent.

Qua

Qua ratione locus affectus dignoscatur.

CAPVT II.

IN dignoscendo loco affecto primò tenendum, quæ pars afficiatur, deinde afficiatur ne per essentiam an per consensum; locus affectus cognoscitur primò ab essentialiter inherētib. vid. intemp. mala compositione, soluta unitate, partisque proprietate. Si tamen totū corpus sit affectum, ut in febre signis non eget. Intemperamentum est signum partis affectæ, quæ tactu percipitur à magnitudine imminuta totius corporis colligimus affectū esse viscus aliquid naturale. Aucta magnitudo cap. in hydrocephalo significat pericranium esse affectum, quia cranium attolli nequit in tumorem: situs partis efficacior est in indicando loco affecto: sicut tumor in dextro latere sub costis mendosis affectum hepar significatur: ex figura colligimus spinam affici,

affici, cum quispiam sit gibbus; Ex cavitate arguimus arteriam affectā si adsit tumor pulsans, & in profundum cedens, ex asperitate os esse corruptum, si stylo in vulnus immisso næqualitas sentiatur. Ex soluta unitate concludimus mæninges esse læsas, si vulnus ad cerebrū pertingat, quia partes superpositas vulnerari oportet. A partis proprietate dicimus affici musculorum intercapedines, si ingens palpitatio in tibia conspiciatur, quia nimirū ossium cavitates omnino distendi non possunt, Vasorum autem non tantopere. Item si cum urina calculus exeat, vesicam, aut renes affici notat, quod illis partibus proprietas sit calculos producendi.

Secundò cognoscitur locus affectibus ipsum consequentibus. quæ sunt sympt., & morbi aliis morbis symp. more succedētes. Inter symp. primū locum tenet actio læsa in diagnoscendo loco affecto, quoniam actionem

actionem aliquam lædi impossibile est non læso quadantenus ipsius organo. Sola actio læsa, quæ ab errore externo fit, nihil valet ad indicandum locum morbo affectum: Si quis enim de cruditate conqurens referat se cibum præter modum ingessisse, ventriculum morbo affici nemo dicet, sed tantum ab errore externo. Actionum verò cum multæ sint species, quælibet indicat affici partem, à quâ produci-
tur: læsio rationis, necnon sensus, motusque universi corporis affectum cerebrum significat: Læsio sensus, & motus totius, excepto cap. significat læsum esse principium spinalis medullæ. Sensus tactus, cum habeat objectum communius, quàm alii sensus, doloris proprietate affectus part. indicat, de qua re Galenus 2. de l. affect. Dolor pulsans significat partem arteriis præditam inflammari.

Nn

Gra-

Gravativus affici aliquod viscus;
Extensivus, & punctorius membra-
nam. Divellens carnem. Ulcero-
sus musculos, totos, aut cutem.
Ostocopus, seu profundus, & quasi
contundens, membranas ossium:
Pruriginosus cutem, extensivus
cum gravitate venam, aut arte-
riam: At si doloris proprietati, ejus-
dem situs conjungatur, evadit si-
gnum minimè fallax. Læsiō pul-
sus cor: sanguificationis vitium, af-
fectum hepar notar. Et sic de cæt.
Quòd si pars affecta multis con-
stat partib9 similaribus iisdem mo-
dis judicandum, quæ ex ipsis præ-
cipuè afficiatur, ex.g: si repente
accidat cæcitas, læsum quidem esse
oculum constat; Sed quæ potis-
simùm pars ipsius affecta sit igno-
ratur. Itaque à mutata qualitate,
si oculus minimè turbidus appa-
reat, si sano oculo clauso læsi pu-
pilla non dilatetur nervos opti-
cos

cos affectos esse cōstat. Tertiò cognoscitur locus affectus ab excretis, substantia excretorum indicat locum, undè excernitur dupliciter, vel quia ejus est substantia, quomodo ramentum in dejectionibus ulcus intestinorum denotat; vel quia in eo naturaliter continetur, sic stercus exiens è vulnere abdominis læsa intestina crassa significat. Urina ex vulnere exiens vesicā. A quantitate excreti cognoscimus locum, quando copiosam mictionem sanguinis renes affectos indicare dicimus: A qualitate arguimus pulmonum venas affici, cum sanguis floridus, & spumosus tussi rejicitur: Sic dejectio cibi alterati à ventriculo tenuia intestina lædi significat, Arenulæ, rubræ renes; Arenulæ, albæ, magnæ, & furfuribus similes vesicam: A modo excretionis colligitur læsa arteria, si sanguis cum saltu ex vulnere e-

Nn 2 rum

rumpat. Pariter sanguis jam faëibus mixtus intestina tenuia, partesque superiores, non mixtus anum, vel crassa intestina affici ostendit. A loco per quem fit excretio sæpe colligitur locus affectus, ita pus copiosum fluens è naribus cerebri abscessum significat. A tempore excernendi: Si in Homine patiente singulis mensibus hæmorrh. sanguis ex alvo iusto circuitu fluat, ex hæmorrhoidibus illico prodire firmamus.

Retenta quoque affectas significant partes, nam exempli gratia, si lotium retineatur affecta velica, aut meatu urinario id contingit. Qualitas mutata per omnia sensibilibus genera vagatur: Inter colores, caro & cutis livida subjectum os corruptum monstrat, color flavus totius corporis jecur obstructum, niger lienem, pallidus jecur labefactatum, oculus perspicuus

in

in cavo nervum opticum affectum. Morbi quoque habent rationem effectus in significando loco affecto, cum quidam certis tantum partibus afficiant, ac certos mo-
bos consequantur; Sic aquosus abdominis tumor jecur affectum: Tabes pulmonem: Hydrocephalus cerebrum: Gibbositas spinam affici significat.

Tertius fons signorum sumitur à causis; ac externæ in primis consideratæ quatenus juvantes, aut lædentes aff. loc. significant; Ut si quis post diuturnum usum ciborum calidorum incidat in maciem, potius jecur esse læsum, quam ventriculum, quia calidiora plus inferunt noxæ hepati, quàm Ventrículo: Si quis post assiduam coitum, de totius languore conquærat, cor affectum esse dicimus, quia ejus robur coitu solutum est. Si quis ab assumptis cantharidibus

Nn 3

con-

conqueratur ; vesicam ulceratam colligimus , quia ipsa ab eo veneno peculiariter afficitur. Si quis natationi in aqua dulci assuetus ambulandi perdat potentiam, nervos primariò affici dicimus. Hæc ratione ex remediis admotis, & assumptis, quatenus lædunt, aut juvant, sepe cognoscitur pars affecta: Ut si digito sensu, & motu privato ceratum applicans calefaciendi, & digerendi vi præditum lædas, juves autem eodem medicamento principio spinæ appposito, nervos à secunda vertebra procedentes affici, nequaquam verò digitum apparebit. Si in Ventris dolore anodyna per os assumpta dolorem non leniant, leniant autem injecta per alvum, significatur affecta esse crassa intestina, si dubites de caruncula urinam supprime, an sit in collo vesicæ, an in meatu urinario candelæ longiore immissa faciliè concijies,

jicies, si enim nihil juves collum afficitur. Omnino si diligenter examines, quæ res determinatam partem præcipuè afficiat, siue juvando siue nocendo, eam partem affectam non obscure indicabit. Causæ dispositivæ adjuvant ad loci affecti cognitionem, præsertim hæreditariæ affecti. parentum, ætas quibusdam morbis magis obnoxia; Sexus cujus causa morbos muliebres ferè omnes ab utero fieri voluit Hipp., & consuetudo laborandi, cum quidam quarundam partium affectionibus prehendi soleant.

Quartò cognoscitur l. aff. à simili, & dissimili, similitudines maximam vim habent, cum nulla habēt signa pathognomonica. Ut si quis sicca tussi sensim crescēte cum maxima pulsus inæqualitate repente moriatur; Quia in eo dissectio tuberculum reperi circa arterias

Nn 4 lares,

læves, alium videns similibus pre-
hendi accidentibus arterias læves
pulmonum affici tuberculo affeve-
ro : In Pleuritide dubitant pleri-
que, an affecta sit pleura, an mem-
brana Pulm. investiens : Quia in
nonnullis pleuriticis mortuis, &
sectis Pleuram inflammata vidi,
eam in omni pleuritide similitu-
dine ductus affici cognosco : Ha-
tenus hæc sunt signa locorum
affectorum assignata à Gal. l. de
l. Aff.

Similitudinem omisit, quia in
dignoscendo loco affecto raro ea
utimur, & solum ubi ratio deest;
compendiosæ autem, quam pro-
fitetur, doctrinæ ratio postulat,
ut minus necessaria præ-
termittantur.

* *
*

Quo-

Quomodo locus affectus per essentiam
distingatur ab eo, qui afficitur
per consensum.

CAPUT III.

COgnito loco affecto distin-
guendum est propriis signis,
an per consensum afficiatur, an
per essentiam, ut constet, cuinam
parti sit remedium applicandum
2. del. aff. c. 3. Fiunt autem morbi
per consensum dupliciter. 1. de
l. aff. c. 6. vel quia materiæ, vel fa-
cultatis debita copia parti nō trans-
mittitur, diciturq; propriè morbus
per consensum, vel quia à vapo-
ribus, aut humorib9 aliunde fluen-
tibus pars vexatur, qui morbus per
consensum minùs propriè dicitur;
Illum privativum, illum positi-
vum consensum nuncupant, qui
etiam fit parte vicina ad intemp.
deducta ob connexum nulla com-
municata materia. In positivo

Nn 5

con-

consensu attendenda est dispositio
partis mandantis, & recipientis:
In privativo connexus, & dependen-
tia partium, communicatio in
actionibus, & facilitas, & difficul-
tas communicationis affectus:
His enim rectè cognitis, non erit
operosum distinguere affectum
per consensum ab essentiali. Affi-
ciuntur facilè per consensum par-
tes calidæ, & humidæ, atque adeò
molles, quia ratione caloris attra-
hant, ratione humiditatis, & laxi-
tatis facilè suscipiunt: Difficulter
frigidæ, siccæ, & duræ, ut ossa. Ra-
tione situs, caput facilè suscipit
quidquid sursum evāporat, quia re-
liquis partibus supereminet: Ven-
tres, & Pulmo, quia cap. subiacent,
facilè à labentibus inde excremen-
tis ad locum declivem afficiuntur.
Ratione connexus cor facilè con-
sentit ori superno ventriculi, ven-
triculo intestina, nervis cerebrum,

venis jecur, arteriis cor: Planè quæ-
cunq; partes communicant in ve-
nis nervis arteriis, undè proximè,
& sine magnis gyris fieri translatio
materiæ possit, facilè invicem con-
sentiunt, ut sunt partes habentes
nervos ejusdem conjugationis, vel
venas, aut arterias ab eadē propa-
gine derivatas. Ratione cavitatis
thorax facilè afficitur à cerebro:
Meatus etiam, quò sunt plures, eò
procliviorè reddunt partem ad cu-
juscunq; rei influxum admittendū,
veluti cutis, quæ etiam ob situm in
corporis superficie facillimè omni-
um afficitur per consensum: A na-
turali constitutione resultat partis
proprietas, quæ est causa consensus
efficacissima. Nam partes actionem
communem habentes afficte, aliis
inde gubernatis noxam imperti-
unt: Sic marcescente corde, jecore,
ventriculo, totum consumitur: Af-
fecto cerebro totius corporis sen-

Nn 6 sus

fus, motusque læditur. Sic partes
 ad idem opus conspirantes facile
 se se mutuò offendunt; Uterus
 mammas, partes ventriculo in-
 cumbentes, & concoctionem ad-
 iuvantes ventriculum: Quæ ve-
 rò publicum habent usum, & à na-
 tura debiles factæ sunt frigida sc.,
 & laxæ; Aut sanè alia proprietate
 destinata ad alicujus excremen-
 ti receptionem, expurgationem-
 que, ut Anus, lien, vesica sellea,
 glandulæ, renes, vesica, uterus, na-
 res: facile per consensum afficiun-
 tur à partibus nobilioribus, qua-
 rum custodiæ, & repurgationi sunt
 dicatæ: Ex morbis verò partem di-
 sponentibus ad affectionem per
 consensum est in primis laxitas,
 sive morbus in meatu, deinde in-
 temperies frigida, & humida, qua-
 rû causa redditur pars prima ad su-
 scipiendû: Postremò intemperies ca-
 lida, cujus ratione dissentaneos hu-

mo-

mores, & vapores aliunde ad se allit. Unde constat morbos à materia provenientes frequentissimè communicari per consensum, sive sint intemperies, sive malæ conformationes, præsertim verò tumores, sive ulcera, quæ sæpe fiunt materia acri, aliò, quàm ubi est genita, expulsâ. Intemperies sine materia, aliquando communicatur per consensum, sic à Bubone, & Erisypelate fit Feb. Eph. à pedum frigiditate fit intestinorum imbecillitas: Actiones læsæ quæ ob errorem externum fiunt ferè accidunt per consensum, & potissimum dolor.

His notatis ne in cognoscendo morbo per consensum Medicus decipiatur, advertendum, si diu durent, præsertim verò si à materia pendeant, fieri consuevisse essentialiales: Advertendum, cum Aver. 4. coll. Medicos interdum decipi ab essentialibus affectibus putantes

Na 7

inde

inde provenire omnium, quæ apparent, actionum laciones: Ut si quis cap. laboret proprio affectu, qui tamen dolorem per se inferre nequeat, ascendente tamen à ventriculo vapore, dolore corripitur, fallitur Medicus, si dolorem esse cap. essentialem judicet. Opposito modo fallitur affectum putans essentialem esse per consensum, quando essentialis dispositio malū non producit, nisi aliquid aliunde accedat, quod essentialem causam excitet. Patet enim gratia exempli esse essentialis apparatus epilepticus in cerebro, qui tamen paroxysmum non efficiat nisi accedente ab infernis partibus aliquo vapore, à quo agitur materia in cerebro latens: Tunc enim affectio partim essentialis est, partim per consensum, & maximè cognoscitur à duratione, quia si sæpius revertatur accessio, licet primis vicibus per consensum tantum fiat,

fiat, mox tamen cerebrum trahit in malam, & essentialem dispositionem, unde mali recursus in posterum præcipuè pendet: Advertendum tertio decipi Medicum cum ex una causa duæ aut plures partes afficiuntur à tertia aliqua parte mittente, ita ut læsio in una prius appareat, utrobique simul augeatur, accesset, veluti si jecur bilem mittens ventriculo, & capiti, efficiat prius angorem, sitim, vomitum, deinde capitis dolorem, qui crescentibus ventriculi accidentibus crescat, & unà cum ipsis recedat: Falsò judicabit dolorem capitis esse per consensum à ventriculo, cum sit per consensum à jecore.

His ergo signis affectus per consensum ab essentiali distinguitur. Primum ab essentialiter inherentibus, si affectio ex se sit facile communicabi-

cabilis, timendum ne sit per consensum: si altera aliqua, quæ appareat in corpore, sit posterior, vel tempore, vel natura, & causâlitate, ut febris ratione inflammationis: Secundò distinguitur à causis juvantibus, & lædentibus, nam si præcessere causæ potissimum nocentes uni parti, ac postea superveniant accidentia alteri parti, quæ possit cum priori consentire, talia per consensum fieri judicabimus: Ut si assumptis pravis cibis ventriculo primò noxiis cephalalgia superveniat, credibile est per consensum à ventriculo fieri. Pariter si remedia alteri parti applicita affectionem irritent, aut juvent, nullis interim remediis alteri applicitis, affectio est essentialis parti, quæ à remediis applicitis juvatur, aut læditur, alteri autem inest per consensum: Tertiò distinguitur à symptomatibus. Nam in parte essen-

essentialiter affecta apparere prius
solent symptomata, quàm in ea,
quæ per consensum afficitur, solent
etiam esse graviora, & uturniora.
Ad quorum magnitudinem crescunt
accidentia partis per consensum
lesæ: Minuuntur, & penitus abolen-
tur illis abeuntibus, & cessantibus:
Nisi affectus per consensum diu-
turnitate temporis migraverit in
essentialem; tunc enim recedentib.
accidentibus partis primò læsæ al-
terius accidentia leniuntur qui-
dem, sed planè non evanescent.
Præterea affectiones per consensum
solent reverti quibusdā intervallis,
nec habent continua accidētia, sic-
ut affectus per essentialiam. Evenire
tamen potest essentialem affectum,
esse quoque interpolatum, ut dolor
à flatu, & è contrario affectum per
consensum esse continuum, si ab
initio eadem ferè materiæ portio à
parte essentialiter affecta ad aliam

con-

continuè transmittatur, quod rarissimum est.

Ab exeuntibus cognoscitur locus per essentiam affectus. Nam duabus partibus affectis si ad unius evacuationem altera sublevetur illam per consensum laborare certum est. Ut si ventres caputq; dolorib. afficiantur, & vomitu bilis mitigetur cap. dolor; Eodem pacto, si dolente capite, aut Ventre menstruum superveniens dolorem tollat, indicat utramque partem utero consensisse. Atque hæc signa simul juncta faciunt certitudinem, sola accepta non perpetuò distinguunt affectum per consensum ab essentiali.

Quandò cognoscitur locus affectus per consensum à simili: nam exempli gratia, si cuidam ex curru decidenti ex inflammatione circa tertiam vertebra[m] perditus fuit sensus, motusque medii digiti, cuius

ius curatio ex applicatione Medicamentorum ad partem contusam docuit medium digitum affectum fuisse per consensum; Quando tumore circa illas vertebrae exorto medius digitus resolvitur; sumpto argumento à simili licebit affirmare digitum affici per consensum.

Quomodo morbus cognoscatur.

CAPUT IV.

LOci affecti notitiam sequitur cognitio pravæ dispositionis, quoniam prima indicatio ad morbum dirigitur, secunda, & minus principalis ad morbi causam. Morbus in genere duplici signo cognoscitur, primò à causis morbificis, si præcesserint, secundò, & maximè à symptomatis, in actione simpliciter læsa, dummodo

do non sit laesa, ob errorem exter-
num.

Species morbi sæpe est sensibus
conspicua, nec signis eget: Intem-
peries enim partium externarum
facta percipitur; Aucta magnitu-
do, & soluta unitas visu, & tactu.
Quod si morbi species sensus la-
teat, iis signis dignoscetur: Primò
à causis externis (ab aere) nam ae-
ris qualitates producunt morbos
inintemp. sibi similes. Huc refe-
runtur, quæ aeri accidunt, regio-
nes, anni tempora, cœli constitutio
caliginosa, pluviosa, æquilonaris,
austina, &c. Sed & aer, ut juvans,
aut lædens est considerandus, siqui-
dem in aere calido morbi frigidi
sublevantur, in humido sicci, & è
contrario. In alimentis spectanda
est substantia, quantitas, qualitas,
præparatio, ordo, tempus. Substan-
tia namq; cibi optimi succi, & plu-
rimùm nutrientes morbos faciunt

ex

ex plenitudine, cibivarii, & dissimilis substantiæ morbos ex cruditate. *Quantitas:* cibus enim plus ingestus morbos facit ex repletione 2. aph. cibi penuria ex inanitione morbos. *Qualitas,* nam cibi calidi, ut vinum generosum, fercula aromatibus condita, allii, porri, & caparum usus calidos, & siccos morbos pariunt, & pariter cibi crassæ substantiæ, ut lac, panis non fermentatus, ostrea obstructiones, quod etiam cibus adstringentibus convenit, ut mēspilis, sorbis, cotoneis, &c. Hac ratione si cibus calidior agram juvet signum est morbi frigidi, si juvet cibus laxans morbi in adstrictione, si noceat, morbi in laxitate, &c. *Ordo:* Nam qui cibo adstringente in prima mensa uti consuevere, doloribus & gravitate ventriculi corripuntur ob tardum cibi descensum gratia stricti Pylori id est inferioris ventriculi. *Tempus:*

pus: natura comedentes horis in-
tempestivis priore cibo adhuc in-
concocto incidunt in morbos ex
cruditate, ut obstructions, scyr-
ros, &c. A motu, & quiete ducitur
quoque argumentum, otium enim
& nimia quies morbos frigidos hu-
midosque parit, & significat, vali-
dus motus calidos, siccosque. In-
tempestivus motus assumpto ci-
bo indicat obstructions. Ni-
mius coitus refrigerationem, &
laxationem partium spermatica-
rum. A somno, & vigilia:
Nam vigiliæ assiduæ inferunt sic-
citates, & calidum innatum dis-
solvunt, somnus immodicus i-
dem obruit, & extinguit. Ex
Animi perturbationibus. Nam
immodica iracundia corpus ac-
cendit, timor, & mœror refri-
gerat. Retenta, & excreta,
ut morborum causæ eisdem si-
gnificant, sic retentæ fæces in-
di-

dicant morbum intestinorum in angustia ex constipatione : Retentæ narium humiditates , cerebrum humidius : De iisdem excretis , & retentis , ut habent rationem effectus , & symptomatum rursus dicetur. Inter causas non necessariò occurrentes maximè indicant morbos medicamenta priùs applicita : Nam immodicus usus calidorum medicamentorum morbos calidos gignit , incrassantium obstructions , &c. Idem significant medicam. ut lædunt , aut juvant : Nam si venter malè affectus cal. medicam. juvetur , frigidityte laborat , si lædatur caliditate. Venena significant peculiare morbos , quos efficiunt , nam assumptum Arsenicum significat ulcus ventris , assumptum Euphorbium , Ranunculus ventriculi inflammationem. Aconitum , aut napellus feb. synochum malignam

ex

ex corruptione: Ad hoc genus causæ pertinent eventus fortuiti, nam gratia exempli, casus ab alto significat venæ ruptionem, ictus validus cap. cranii fissionem, ictus sclopeti vulnus compositum cum amissione substantiæ, & contusione: Præterea varia hominum studia, & consuetudines significant morbos consequentes. Sic assidua equitatio indicat laxitatem articuli coxendicis, cujus causa Hipp. ait Scytas ob equitandi exercitium ischiadi esse obnoxios: Ex venatione subdicio cerebrum fit frig. & humid. Ex venatione per rura torida pedes refrigerantur: A consuetudine balneandi in aqua dulci fiunt articulorum laxitates, & Ventres debilitantur: A studiis post cibum cap. repletur. Ab interrupto somno, quando concoctio laboratur, ut accidit Religiosis pituita cumulatur, unde venter frigidus, humidusque redditur.

ditur. Sanè cum antecedentes causæ ab externis moveantur sunt diligenter examinandæ, nam externæ causæ prægressæ, veluti certos morbos prænunciant, ita si prægressæ non fuerint magnam contrariorum morborum conjecturam præbent, quod ad dignoscendos morbos complicatos maximè usu venit: gratia exempli, si aliquæ causæ externæ morbum calfacere potentes præcesserint, & si non multæ, neque vehementes magnum præbent inditium morbi calidi: si nulla præcesserit causa contrarium morbum efficere potens.

Sed, & internæ causæ morbi speciem connotant tum efficientes, seu antecedentes, tum dispositivæ. Efficientes sunt humores, & quæ ex illis fiunt, omneque excrementi genus, quæ omnia sub ratione causæ obscura esse solent, propriisque signis egent, morbum

Oo

au-

autem significant, quatenus excernuntur, aut retinentur, de qua re in sermone de symptomatis. Dispositivæ verò morbos significant quatenus ostendunt, quæ pars una morbi specie facilius corripiatur, quàm alia: Jecur ob temperiem calidam facilius corripitur morbo calido, quàm Ventriculus: Genus carnosum facilius exsiccatur, quàm spermaticum, quia carnositas citius absumitur, quàm spermatica: Ratione mollietatis facilius ulceratur caro, quàm nervus, cartilago, ossa, quorum durities erosioni resistit. Ratione conformationis, facilius obstruitur Uterus in virgine, quàm adulta, quoniam illius venæ sunt exiliores, & angustiores: Jecur est obstructionibus obnoxium, quia minimis venarum propaginibus totum est confectum, velut & mesenterium: Membranae quia venas habent parvas, inflammantur.

flammationibus ægrè prehendantur. Ratione situs, connexionis, & cavitatis articulus coxæ difficulter laxatur, & semiluxari non patitur ob articuli rotunditatem. Ratione proprietatis, & naturalis constitutionis lien facilè tumescit, quia sanguine crasso, terrestrique alitur, pariter, glandulæ ad tumores sunt pronæ quia viscerum repurgationi sunt dicatæ: Anus facilè ulceratur, quia est corporis velut sentina, ad quam excrementa cujusvis conditionis deponuntur. Ad causas dispositivas refero ætatem, & sexum, quia sunt quædam temper. passionēs. Ratione ætatis oris ulceribus prehendi solent infantes, quia lac prævum aliquando sugunt. Adolescentes hæctica ægrius afficiuntur ob affluentem humiditatem, quam adulti. Ratione sexus mulieres, & eunuchi, ob mollietatem corporis lentiùs emarcescunt.

Mulieres faciliè corripiantur cancroſis mammarum tumoribus ob ſanguinis confluentis copiam.

Secundò noſcitur morbi ſpecies ab eſſentialiter inhærentibus, ſoluta unitas morbi ſpeciem oſtendit, ubi unq; ſub aſpectum, aut tactum cadit. Mala conformatio in externis partibus pene denotat qualis ſit morbus, maximè morbus in figura, magnitudine, numero, & ſitu.

In partibus internis indicat mediâtè ratione qualitatis mutatæ in partibus ſuprapoſitis: Sic ex eminentia cui ſupra heneſem, & ejusdem partis duritiæ lienis tumorem cognoſcimus: Intemperies vel externa tantum, vel in partibus non profundiffimis, quarum alteratio ad cutem perveniat, aut ſanè ab ægro perſentitur, ſe ipſam prodit: Si æger referat, ſe velut gelu circa Ventrem perpetuò ſentire, nemo
du-

dubitat de frigida illius intemp. Si
supra jecur calorem continuum, &
mordacem sentiat, intemperie ca-
lida afficitur. Sic feb. adesse dicimus
cum universum corpus deuri ad ta-
ctum judicatur.

Febres autem distingues ex ca-
loris motu, & qualitate: calor mitis,
& halituosus ephem. significat, i. de
Differ. feb. 8. Calor primo occurru
vaporosus, deinde cum in aqualita-
te increfcens, acriorque factus feb.
ex Pituita 2. de diff. feb. 12. calor
erodens & mordax feb. ex bile ibi-
dem. Calor intensissimus, atque
mordacissimus cujus nullam muta-
tionem æger percipiat, feb. arden-
tem. Calor ægro intolerabilis eo-
dem in statu à principio ad finem
usque manens, vel semper decre-
scens, aut increfcens, siquidem ta-
ctui minimè sit mordax; synocham
sine putredine; Si verò sit mordax,
cum putredine 9. Meth. 4. Calor

Qo 3

mu-

multos dies in eod. statu perseverās
 primo manus occursumitis, deinde
 v. acris, & squalidus apparens atq;
 una, vel altera hora à cibo sumpto
 quoddam incrementum sumens;
 Febrem hecticam I. de diff. feb. I. I.

Pariratione calor quarto quoq;
 die revertens quartanam, tertio
 tertianam significat, quem caloris
 motum feb. constitutionem, id est
 naturam, ac ideam vocat Hipp. I.
 Aph. 12.

*Tertio cognoscitur morbus in
 genere quidem ex præsentia sym-
 ptomatum, quæ ipsum, ut umbra
 corpus comitantur, ac præsertim ex
 sensibili læsione operationum, un-
 de alia symptomata succrescunt: In
 specie v. ex symptomatum diversita-
 te, & modo. Ad læsam actionem
 quod attinet incerta est ex ipsa mor-
 bi conjectura, nisi distinguas actio-
 nem læsam ob errorem externum
 ab ea quæ morbum sequitur, & pro-
 prie*

priè symptoma dici meretur. Quod cognoscitur ex lésionis modo: Nam morbus, cum permanens sit aétionem semper lædit; ac eodem ferè modo causa cum ita constans non sit, maioremque recipiat mutationem, ac morbus, aétionem ferè lædit per quædam intervalla. Præterea si externus error ad evidentes causas pertineat, erit conspicuus, moxque eo prægresso secuta est aétionis læsio, interim absque manifestis signis alicujus morbi, à quo potuerit illa aétio lædi: Si verò externus error spectet ad causas antecedentes, aderunt signa præcedentis fluxionis humoris, aut vaporis in partem, cujus aétio læditur: Vel si causa sit corpus solidum, aut vivens (nam fiunt dolores ab agitato calculo, & à vermibus mordicantibus) aderunt signa istorum corporum, de quib. infra. Considerandū porro in aétione læsa, an sit abolita,

Qo 4

an

an imminuta, an depravata. Tum
citò ne an sensim fiat, ac desinat.
Operationes imminutæ, & abolitæ,
præsertim verò vitales, & natura-
les, aliquando etiam animales,
morbos frigidos: Depravatæ cali-
dos, ut plurimum consequuntur.
Respiratio frequens, & magna, pul-
susque similis, iracundia, temeritas,
cor calidum arguunt, respiratio ra-
ra, parva, pulsus similis, timiditas,
inæror cor frigidum: Ne tamen
hæc signa sola putes sufficere, nisi
cum aliis juncta capiantur. Immi-
nuta sanguificatio in cachexia je-
coris refrigerationem. Penè abla-
ta in Ascite maximam refrigeratio-
nem indicat, Cruditas acidæ ventri-
culi frigiditatem, nidorosa calidi-
tatem arguunt, si error externus ab-
sit. Potus inappetentia, frigidita-
tem, humiditatemve, inappetentia
cibi caliditatem sæpe significat: Ap-
petentia canina, & vaccina inten-
sam

ſam frigiditatem : Tarda conco-
ctio nativi caloris ventris, partium-
ve circumſtantium languorem :
Imminutio principum facultatum
cerebri frigiditatem , earundem
detentio , ac ſopor frigiditatem,
& humiditatem : Deſipientia cali-
ditatem : A modo verò actionis
læſæ repentina læſio ſenſus , &
motus , principumque actionum,
quæ citò deſinat, ut evenit in Apo-
plexia, & Epilepſia, ſignificat ma-
lum non provenire ab intemp. quia
nec citò fit, nec citò deſinit, ſed
ab anguſtia ventriculorum, à flatu-
bus.

Excretorum ſubſtantia, & quã-
litas morbum quoque indicant, à
quo pendent. Sic bilis abundan-
tia calidam jecoris intemperiem.
Atra, & aduſta bilis calidiſſimam ſi-
gnificat, ſi error externus abſit.
Vomitùs pituitæ, ventriculi imbe-
cillitatem. Abundantia muci, aut

salivæ acrioris cerebri caliditatem,
 & humiditatē. Fæces semper siccæ,
 aridæ, & subnigricantes. Jecoris ca-
 lorem cum siccitate junctum: Vo-
 mitus fæcum angustiam tenuium
 intestinorum: Sudor colliquati-
 vus totius corporis caliditatem,
 & siccitatem: Pus effluens nunc
 paucum, nunc copiosum, & sa-
 niosum fistulam: Urinæ rubræ
 splendentes, jecoris renumve cali-
 ditatem. Urinæ oleaginosæ, in-
 temp. calidam renum, quem admo-
 dum & urinę copia longè excedens
 quantitatem assumpti potus, cibo-
 rumque liquidorum; Urinæ fursu-
 raceæ scabiem Vesicæ. Eadem ex-
 crementa retenta interdum insinu-
 ant morbos, quorum causa reti-
 nentur. Retentio fæcum modò si-
 gnificat angustiam intestinorum,
 modò jecoris calorem, cujus causa
 exiccantur fæces, trahuntque lon-
 giorē moram in intestinis: Re-
 tentio

retentio menstrui in muliere boni habitus, uteri angustiam: Retentio solita vacuationis per nares, ossis cribrosi obstructionem: Retentio sputi in tabidis extremam siccitatem calidique absorptionem.

Inter qualitates mutatas significantes morbos numerantur sensibilia communia, & propria: Communia tamen ad essentialiter inhaerentia referuntur, figura, numerus, & magnitudo; Ut in feb. hectica, si nares acutæ fiant, ungues adunci, tempora collapsa, oculi concaui; ex figura tertii gradus hecticam significabunt: Ex propriis sensibilibus colores: Nam niger color totius corporis lienis arguit obstructionem; Citrinus vesicæ fellicæ, aut pori ad duodenum tendentis: Faciei pallor, cerebri frigidi, Genarum rubor in feb. acuta, pulmonis, vel cerebri inflammationem: Intensus rubor cutis Erisipelas: Oculi

micantes, & immobiles desipientiam : Rubor non adeò intensus, cui junctus sit calor, & dolor, phlegmonem : Linguae nigredo feb. ardentem : Cutis albicans in parte tumida cedema ; subnigricans, scyrrhum : Livida circum ulcus cancerum : supra os, cariam. Proximæ coloribus sunt tangibiles qualitates tum prinx, tum quæ primas sequuntur, mollities. s. quam comitatur facilis compressio ; Et durities, quæ semper adjunctam habet rententiam, & aliquando etiam gravitatem, quando à repletionem oritur. Insignis calor ferè continuus in volis manuum, ac plantis pedum, significat cal. jecoris intemperiem : Frigus extremorum in feb. continua, feb. ardentem, & malignam : Frigus perpetuum membri lividi sphacalum : Intensa siccitas, & ariditas faucium, feb. biliosam. Tumor digitis cedens, ita ut in parte com-

compressa fovea relinquatur œdema: Renitens sine dolore, scyr-
rum: Cum dolore, inflammationem absente calore; Eo præsentem,
& feb. inflammationem: Reniten-
tia, & durities hypochondriorum,
obstructiones: Si accedat etiam
ponderis sensus, tumores, vel sanè
grandes obstructiones. Sani, & sa-
pores non morbum, sed causam
morbificam indicant. Odores in-
terdum præbent aliquam morbi
conjecturam, ut cum ex urinæ fæ-
tore conjicimus renes, aut vesicam
ulcere laborare: Ex sputo fœtido,
& anhelitu graveolente ulceratos
esse pulmones: Ex narium fœtore,
Ozænam: Tandem non est sper-
nenda similitudo ad morbi cogni-
tionem, siue comparatio fiat ejus-
dem ad se ipsum, seu ad alterum.
Novi Religiosum, qui circa Æqui-
noctium vernalis quotannis in feb.
incidit aspectu minimè mitem

Oo 7

cum

cum desipientia, insigni cap. dolore, & utinarum turbatione, quæ tamen feb. trigiata summum horarum spatio terminatur. Ex quo id observavi, quoties postea in ipsum incidi eo tempore febrientem, collegi à simili cum Ephem. feb. detineri, neque unquam à primo ad ipsum ingressu falsus sum. Alium novi virum nob. qui quoties tertiana corripitur, statim tussi prehenditur, dolore lateris, spirandi difficultate. Pleuriticum esse jurares: Tamen in feb. declinatione omnia accidentia evanescent, quo aliquoties observato, minimè mihi venit in mentem dubitare, an feb. in quam rursus inciderat Pleuræ inflammationem sequeretur. Comparatio cum parentibus, quia sunt simillimi nato magnam vim habet. Si cujuspiam Pater renū doloribus vexari solitus ferè semper calculos excreverit, filius autem in
 simili-

similes cruciatus incidat, magno
est argumento à calculo in Ureter-
res excusso dolorem gigni.

*Quomodo cognoscatur morbi
magnitudo.*

C A P U T V.

VERùm non sufficit morbi
nosse speciem, nisi specifi-
cum gradum cognoscas, quem
morbi magnitudinem vocant,
quæ ad constituendam curatio-
nem morbi maximè confert. Cum
verò morbus dupliciter magnus di-
catur, absolute, & respectivè.
Quamvis non omnis magnitudo
sit morbo essentialis, sed illa tantùm,
quæ dicitur magnitudo quoad es-
sentiam, aliæ autem sint accidéntales
morbi differentię: De omnibus
tamen hoc in loco agendum est,
tum ob nominum affinitatem,
tum

tum ne inter signa prognostica harum magnitudinum diagnostica signa desiderentur. Morbus dicitur absolutè magnus tripliciter, ratione essentia, ratione dignitatis, & ratione facultatis 4. Meth. c. 6 & 7. Meth c. 12. Magnitudo ratione essentia mensuratur penes recessum à naturali statu, quo equidem ignorato, ignorari quoque necesse est, quanta oporteat esse remedia: Magnitudo ratione dignitatis spectatur ex præstantia partis læsæ, si habeat facultatem totum gubernantem, aut actionem gubernanti servientem, velut est Venter. ratione jecoris, organa respirationis ratione cordis. Magnitudo ratione facultatis à præstantia læsæ actionis, ac supervenientium sympt. magnitudine, vehementiaque æstimatur, quæ quidem morbum malignum mali moris, cacoethes constitunt. Magnitudo respectiva atten-

attenditur penes remediorum materias, quibus morbus, morbi que causa, vel difficillimè cedunt, vel omnino non cedunt.

Magnitudo ratione essentiæ cognoscetur primo ab essentialiter inhærentibus, si intemperies ad tactum valdè extensæ appareant, easque tales æger sentiat: Si mala conformatio sensu visus, aut tactus ingens etiam videatur, quod de ulcere, ac vulnere pariter intelligitur.

Secundò noscitur à causis prægressis: Multæ enim validæ, & diu agentes in corpus morbos magnos producunt, & à statu naturali valdè recedentes.

A juvantibus, & lædentibus: Nam si medicamenta generosa insigniter alterantia, & vacuantia non juvent, arguunt affectus magnitudinem cuius causa resistit remediis tam efficacibus; Si levia juvent

vent affectum parvum quo ad essentiam indicant. *A causis internis efficientibus* : nam insignis abundantia aut pravitas humorum magnas efficiunt corp. mutationes. *A causis dispositivis* : Nam quò minus sexus, ætas, temper., & constitutio, vel membri, vel individui dispositiva sunt ad aliquem morbum, eò significant ipsum esse vehementiorem, si adveniat. Cum enim inter dissymbola transmutatio sit difficilior, causas postulat vehementiores, quarum efficacia, major fit recessus à naturali statu. E diverso quò magis est pars disposita, vel individuum ad morbum, eo & facilior fit transmutatio, & minorem recessum à naturali statu significat. Hanc ob causam febr. ardens in sene major est ratione essentia, quam febr. ardens in juvene: Ulcus in parte sicca majus est ulcere partis carnosæ. Destillatio
in

in juvenem major est in juvene, quam
in sene. Quod de causis internis
disponentibus dictum est, exter-
nis quoq; congruit: Nam quò red-
dunt corpus minùs dispositum ad
talem morbum, eò indicât esse ve-
hementiorem, si accidat; Ut si hy-
berno tempore oriatur feb. ardens.
Hoc voluit Hipp. 2. Aph. 34. in
morbis, (inquit) minus periclitan-
tur, quorum naturæ, aut ætati, aut
habitu, aut tempori magis cōgruit
morbus, quàm quibus secundum
nihil istorum congruit. Inter cau-
sas dispositivas robur virium præ-
cipuam vim obtinet, nam robu-
stissimi homines morbificis causis
validè resistentes vix unquam mor-
bis parvisprehenduntur, quoniam
vegeta natura leviores causas
vincit: Unde videre est eos, qui to-
to vitæ tempore nunquam ægro-
tarunt à prima ægritudine plerun-
que vinci & enecari: Sic morbi ve-
hemen-

hementiores fiunt vere, quam alio anni tempore, quia tunc natus calor maximè fortis est ad expulsionem, & nonnisi à causis multis validis, diuque agentibus enervatur. *Tertiò cognoscitur ab effectibus:* Nam quæ accidentia statim cum ipso morbo vehementia apparent ad quodcumque sympt. genus attingant, morbum magnum ratione essentiae significant: supervenientia autem accidentia ostendunt magnitudinem morbi ratione facultatis, ut dicetur. Magnitudo morbi ratione dignitatis non indiget talis signis, quin quæ indicant locum aff. præstantem publicamque actionem habentem, immò & publicum usum ad vitæ necessitatem. Unde si afficiantur lien; Uterus, Renes, Vesica, morbus fit magnus ratione dignitatis, quia sine excretionem urinæ, cui dicata sunt renes, & vesica, & sine sanguinis defæca-

facatione, cui præest lien, incolumis vita diu servari non potest. Uterini morbi sunt magni ratione dignitatis, siue speciei propagationem, siue individui custodiam spectes, cum ex retento menstruo vita non rarò in discrimen adducatur: Eò autem censendus est morbus major ratione dignitatis, quò affecta pars ad tuendam vitam magis necessaria est: Unde primas sibi vendicat cor, deinde jecur, & ventricul. tum cerebrum, quod ad vitam simpliciter solùm concurrit, quatenus respiratio sine ipsius ope non fieret.

Magnitudo ratione facultatis plerunque sic latet, ut ob ejus ignitionem ægri intereant. Hanc dixi constituere morbum malignum, & mali moris, neque differre à cacoethia, quamquam Petrus Sahus existimat in com. L. P. Hipp. de Morb. differre cacoethiam à maligni-

gnitudinis morbi. Inductus est fortasse à Gal. qui has morbi magnitudines proponens statuere videtur differentiam inter malignitatem, & vehementiam ratione facultatis. Nam 4. Meth. c. 6. bifariâ, inquit, omnia vitia gravia, & magna redduntur, vel ob afflictâ partis præstantiam, vel ob affectus magnitudinem, vel quia sunt cacœthes. At 7. Meth. c. 12. sic loquitur (morbi magnitudo spectatur in præstantia actionis lætæ, in propria affectus essentia, & facultate totû corpus gubernante.) Profectò cacœthes morbus dicitur, vel ratione supervenientium signorum, prævæ cruditatis, vel insignium sympt., differtque à lethali, quod iste mortem denotat, ille periculum: Unde Gal. 1. Prorhet. 14. Cacœthes, inquit, morbos. i. malignos appellamus, quicumq; periculum minantes salutis spem non adimunt, licet

mali-

maligni morbi tandem in lethales
migrent, cum igitur morbis parvis,
& debilibus gravissima interdum
præter omnium opinionem super-
veniant accidentia, qua ratione
inquit Gal. aliquando debiles, &
parvas feb. valdè esse malignas: Cō-
cludit Salius aliud esse cacoethiam,
aliud vehementiam morbi ratione
facultatis, darique morbos, & mali-
gnos. Errare autem Salium, & u-
troque voluisse eandem diffe-
rentiam magnitudinis morbi pro-
ponere, ex eo colligitur, quia super-
venientia accidentia gravia sunt
effectus præcipuè alicujus virtutis
nostri corporis valdè læsæ. Nihil
ergò est opus cacoethiam, seu ma-
lignitatem à vehementia faculta-
tis læsæ distinguere: unde licet ve-
rū sit dari morbos malignos quoad
essentiam, vel dignitatem, nulli ta-
men maligni sunt parvi ratione ve-
hementiæ, ac magnitudinis læsæ
facul-

facultatis. Ceterum ut malignus morbo certius cognoscatur, sciendum est, non omnem morbum minantem periculum propriè dici malignum (nam feb. lentam, & diurnam in lene, hæcticam, apoplexiam nemo malignos affectus vocat) sed illum tantum in quo citra causam evidentem, & præter omnem spem, graviora superveniunt accidentia quam postulare videatur morbi magnitudo, & causæ ipsius vehementia. Idcò admodum malignæ sunt illæ feb. in quibus licet calor sit mitis, illico concidunt vires, principes functiones perturbantur, & humores inquinantur. Unde licet omnis morbus malignus sit etiam vehemens ratione læsæ facultatis, est tamen morbus malignus, quædam veluti differentia morbi vehementis ratione facultatis, ac minùs latè patet, cum non omnis morbus vehemens ratio-

tione facultatis propriè sit malignus, sed ille tantum, in quo gravissima accidentia mox superveniunt, vi morbi, aut causa morbificæ; Quod idè addidit, ut à morbi maligni notione excludantur sævissima accidentia supervenientia, quæ partis affectæ acutum sensum consequuntur, aut vehementiam manifestæ qualitatis humorum, quis enim tertianam simplicè intermittentē in cuius augmento cardialgia excitetur propriè malignam febr. appellarit? Licèt huic accidenti proxima sit syncope? Quando morbi propriè maligni appellātur, valdè putridam, aut venenatam alicuius humoris qualitatem comitē habere consueverunt, sive illa extrinsecus corpori advenerit ab aere, cibis, venenis, sive intus sit nata ex varia corruptione. Hæ siquidem malignæ qualitates cum sint naturæ maximè omnium adversariæ, il-

Pp

lam

lam vehementer lacessunt, angunt, agitant, ut universas ipsius functiones longè magis perturbare necesse sit, quàm si evidens aliqua, & sensibilis qualitas, cui non est tanta cum natura viventium repugnantia in ipsum ageret, & calorem naturalem exerceret. Ut igitur non confundatur, omnis morbus magnus ratione læsæ facultatis cum maligno iis signis distinguetis. *Primò ab essentialiter inherentibus.* Nam sunt aliqui morbi ex sua natura maligni, nimirum carbunculus, cancer, elephantiasis, variolæ, pestis, lues gallica, lues polonica, scorbutus. Quicunq; verò nobiles partes, & maximè sentientes morbi magni occupât, fiunt etiam magni ratione læsæ facultatis, ut inflammationes internæ, affectus oris ventric., cordis, cerebri, jecoris, pulmonum, nervorum, tendonumq; punctiões. Vulnera musculi temporalis, bici-

bicipitis, menyngum. Cereb. &c.
Secundò à causis. Atque ad exter-
nas quod attinet, si aer inspiratus
fætibus extiterit contaminatus ca-
daverum vaporibus mineralib⁹ ex-
halationib⁹, ac repentinis flatuum
è terra eruptionib⁹, ut in Terremot-
ibus accidit, aut quovis alio modo
putridus, & impurus, suspicio est
morbi maligni: Ita si diu indulserint
pravis cibis, quã ob causam omni-
bus pravi succi eduliis censet absti-
nendum Gal. 2. de alimentorum fa-
cult. c. de cucumere, etiam si ea qui-
busdam coctis sint facilia. Nobis e-
nim non advertentibus pravus suc-
cus ex ipsis post longum tempus in
venis colligitur, qui postea exigua
ad putrescendum occasionem na-
tus malignas feb. accendit. Quan-
tò facilius id accidet ex corruptis,
& jam putridis cibis, quales in an-
nonæ egestate plerunq; assumuntur.
Præter cibi pravitatem disponun-

Pp 2

tur

tur mirum in modum corpora ad
 excellentes putredines, & malignas
 succorum corruptiones ex convi-
 vationibus: Nam ut inquit Avic.
 3. p. doct. 2. c. 2. nihil est deterius,
 quam diversa nutrientia simul ad-
 jungere, & in comedendo tempus
 prorogare, quoniam a prioribus jam
 digeri incipit, cum postremus inge-
 ritur. Ex varia autem diversorum a-
 limētorum corruptione difformia
 gignuntur excrementa, quā tanto
 deteriorem nanciscuntur putredi-
 nem, quanto longius absunt ab ali-
 menti conditione. Fiunt & morbi
 maligni à putrida aqua potu, nec-
 nō aqua mercurialis, & venenorū,
 seu casu, seu electione, assumptione.
 Planè quaecunq; causæ externæ
 corpora præparant ad insignes pu-
 tredines, ut luxus, otium, somnus
 immodicus, &c. aliquid conje-
 cturæ præbent malignitatis supe-
 venientis morbi. *A juvantibus, &*
læden-

ledentibus : In morbis malignis nullum remedium magnopere prodest, nisi habeat vim alexipharmacam, quod si alexipharmaca juvent, ubi ratione evidētium qualitatum pauci auxilii præstare possent, ut decoctum ligni in quibusdā gall. cis feb. theriaca in feb. malignis, & pestilentibus certissimum est malignitatis argumentum. Si excretionēs fiunt, quæcumque illæ sint, quæ quantitate sint convenientes, neque eatenus deijcere vires possint, videanturq; repletioni respondere, interim verò vires deijciant, vel certè non profint, signum est naturam non tam humoris copia, quam pessima ejusdem qualitate opprimi. *A causis internis dispositivis.* Corpora pingua valdè humida densioris habitus insignes humorum corruptiones, & inde morbos malignos maximè omnium patiuntur. Ab efficientibus. Nam

iniq
Pp 3 cor-

corruptio sanguinis, seminis, ver-
mum, menstrui, bilis atræ, & æru-
ginosæ malignos morbos effici-
unt, harum verò causarum signa
suo loco proponentur.

Tertiò deducuntur signa, & qui-
dem præcipua à symptomatis. *Ab
actione læsa vitali.* Cum malignitas
ad corusque pervenit, quod maxi-
mè evenit in feb. malignis, statim
languet vitalis facultas, spirituumq;
maxima fit dissolutio: Qua causa
pulsus respectu caloris feb. proti-
nus acquirit improporcionatam, ac
insolitam parvitatem, languidita-
tem, quæ virium casum significant:
Incredibilem inæqualitatem cum
frequentia præsertim in systole.
Quæ omnia si facta levi vacuatione
à principio, vel medicamento, vel
sanguinis missione non cessent,
ac natura non sublevetur sed magis
debilitetur longè certius malignā
inducant qualitatem, quæ vitales
spiri-

spiritus solvat. Ubi talibus facilis accidere solet animi defectio à levi occasione. Impedita respiratio semper significat morbum magnū ratione læsæ facultatis: At respiratio laboriosa quibusdam suspitiis intercepta, parva, & frequens in feb. malignitatem, ut plurimum comitatur. *Ab actione naturali.* Solet præsentē malignitate ita exsolvi natus calor, ut exigua fiat alimentī in substantiam viventis mutatio. Itaque si statim ab initio major appareat corporis attenuatio, quam vel corporis dispositioni, vel causarum efficientium manifestè facultati conveniat evidens est malignitatis inditium. Repentina cibi abominatio, & carentia sitis cum intensa feb. linguæ nigritie, orisque, & faucium siccitate, si delirium absit, insignem malignitatem arguunt. Pariter in principio morbi sitis intensissima excedens caloris inten-

sionem, si absint signa bilis, aut
 pituitæ falsæ in Ventriculo nota est
 malignitatis. *Ab actione animali.*
 Ægrum adeò non sentire malum,
 ut se non ægrotare dicat, interim
 verò esse inquietum, mœstum, an-
 xium, jactabundum, indicat, vel
 mentem esse læsam, vel calorem
 naturalem malitia humoris esse
 confopitum. Ineffabilis quidam
 angor, & cordis dolor sine causa
 manifesta, somni valdè perturbati
 naturam non reficientes, sed gra-
 vantes: Levis quidem, sed pertinax
 dolor cap. à principio magnis re-
 mediis non cedens: Deliria citra in-
 signem cap. calefactionem oppor-
 tunis auxiliis reluctantia, motus
 quidam convulsivi partium extre-
 marum, comatosa affectio cum
 murmure hypochondriorum, aut
 parvo tumore causa aures, visum,
 atq; auditum in feb. hebetatū, cali-
 gare oculos statim ab initio raro
 mali-

malignitatem nō significant. *Aqualitate mutata.* Repentina, & maxima faciei mutatio, præsertim extenuatio, & expallescētia, maculæ rubræ, sed maximè nigræ, aut lividæ (Græci exanthemata, vulgò petechias vocant) in pectore, dorso, & toto corpore apparētes: Manuum, ac pedum frigiditas à principio perseverans, aut postea adveniens feb. existente continua, sine causa modò horrere, modò incalescere; Dentium denigratio: Grav s quidam foetor, & ut ita dixerim, cadaverosus ægri odor, à sensibilibus excretionibus non proveniens malign s feb. magna ex parte comitantur. *Ab excretis.* Excretiones bilis auginolæ, atræ: Excretiones vermium, & maximè mortuorum in augmento, aut feb. statu, si vermes tempore sanicatis non sint ægro familiares: Magnæ vacuationes peccantis humoris sine juvamenō:

Pp 5 Stil-

Stillæ sanguinis die critico, vel omnino initio morbi è naribus, utero, hæmorrhoidibus, excretionibus quæcumque valde fatidæ, lacrymæ involuntariæ mordaces, & citò nascentes, pinguis alvi egestio, sputa liventia, urinæ turbidæ extra tempus declinationis cum malis signis, præterea nigra lividæ, paucæ cum intenso rubore, valde oleaginosa: Sudor paucus frigidus circa frontem, & cervicem manans malignos morbos significat præsertim si plura in unum convenient; inter quæ indiciis expulsi petitis primus locus est deferendus: Nil enim satius in præcipiti nimium casu, licet aliæ omnes abessent malignitatis notæ. Ad effectus morbi maligni referendi quoque nonnulli morbi qui illos consequuntur, ut exulceratio faucium, & parotides in feb. mali moris. A simili noscitur malignitas, quando morbum similem

popu-

populariter grassari, & plures eo interire observamus.

Signa postremæ magnitudinis, quam voco respectivam ab iisdem fontibus hauriuntur, de quibus inter prognostica opportunior erit sermo, cum idem sit cognoscere morbi diuturnitatem, & magnitudinem ratione remediorum, quibus nimium resistit.

Quomodo causa morbifica cognoscatur.

CAPUT VI.

Cognita morbi specie, ac magnitudine convertenda est ad morbi causam Medici solertia, quæ quoniam multiplex esse posset, ne in causarum signis demonstrativis aliquid intactum prætermittatur, accuratè imprimis inquirendum, quarum causarum dignotio

Pp 6

signis

signis egeat, sitque ad curationem necessaria. Causas morbificas primò in externas, & internas dividunt: Externas ideo evidentes vocât, quòd sensibus sint notæ: Cumque nihil sit notius nobis, quam quod sensu percipitur non videntur causæ externæ signis egere: Nam præsentis quidem in sensus incurrun, præteritæ verò ex ægri, & astitium relatione interrogationeque certè innotescunt. Quia tamen multum interest ad sustentandam Medicæ artis famam, ægrique conciliandam sibi fidem posse de præteritis divinare, ægro cum accidentibus tacente non spernenda sunt signa, quæ præteritas externas causas indicent. Sed & præsentis interdum indigent signis ex accidenti, quatenus internæ fiunt, ut instrumenta vulnerantia, aut cõtundentia, quæ in vulnerata parte remanent, quæcunque inter labia vul-

neris

neris incidunt, ejusque impediunt agglutinationem, excrementa naturalia quæcunque retenta: Aer pestilens inspiratus, qui per arterias dispergitur: Venena quæcunque assumpta in corpore permanentia, quorum ut maxima est copia, ita varii effectus, & difficiles conjecturæ, denique omnia assumpta, quæ nullam à nativo calore mutationem recipiunt, venefica tamen non sunt, uti acini uvarum, nuclei cerasorum, argilla, carbones, & similia multa, quæ in pica, & malacia alteri loco ingeruntur. Quin & medicamenta nonnulla fiunt aliquando causæ internæ, quæ ut tales, sunt sensib. inconspiciæ, veluti aqua thermales potæ, cum vel omnino detinentur, vel maxima ex parte. Ex internis aliæ obtinent rationem causæ efficientis per se, aliæ efficientis per accidens. Causæ per accidens, vel sunt naturales, vel præter

Pp 7 na-

naturam. Præter naturam sunt tum morbi, qui aliquando fiunt causæ aliorum morborum, ut intemperies calida ventris, quæ vicinum jecur in consensum trahit; tum symptomata, quæ ad eam vehementiam deveniunt, ut vel augent morbum, foveantque, vel vires prosternt, quæ quidem ad actionem læsam, & immodicam excretionem attinent. Ex qualitatibus enim mutatis nulla rationem causæ unquam induit. Inter actiones læsas numerantur dolor vehemens cujuscunque partis, & præcipuè cardialgia, item vigilia, delirium, animi deliquium. Inter excretionem obtinent rationem causæ quæcumque moderationem excedunt quacunque ex parte fiant, aut sanè naturæ fini omninò inconveniunt, ut chyli, aut cibi nondum confecti dejectiones, ac vomitiones. Hæc symptomata signis, vel

maximè indigent, ut à seipſis diſtinguantur quatenus ſunt cauſæ, cum id plurimum interſit ad ſalutem ægrotantis. Naturales v. cauſæ morborum per accidens ſunt nativæ corporum conſtitutiones, (quas diſpoſitivas cauſas ſæpe appellavi) ad ſimilaria, & diſſimilaria membra attinentes, quæ ipſa ad certos morbos diſponunt, aut ſanè jam factos foveant, quales ſunt naturalis denſitas cutis reſpectu internæ putredinis, virium imbecillitas reſpectu morbi materialis, cujus cauſam conſumere, & expellere languidus calor nequit. Harum quoq; cauſarum ſigna, tum ad præſervationem, tum curationem ita ſunt neceſſaria, ut naturali conſtitutione corporis ignorata nihil medica arte dignum præſtari poſſit. Ad naturalem diſpoſitionem corporis reducere lubet hæreditarios characteres, qui ad longum tempus latent absque

que sensibili operationum noxa, & temporis decursu in actum deducuntur, quorum cognitio ad retardandos, ac omnino avertendos morbos apprimè convenit. Causæ internæ per se efficientes sunt humores, & quæcunque ex ipsis orta morbos creant. Oriuntur autem ex humoribus vermes, calculi, flatus, venena, & solidæ partes, quæ interdum morbos per se faciunt, ut caro in meatu urinario excreescens, mortuus, & corruptus foetus in Utero, &c.

Ab his causis cum ledatur corpus, quatuor modis peccant, vel substantia, vel quantitate, vel qualitate, vel motu, & singulis vitiis propriè accommodentur indicationes opus est signis hæc vitia indicantibus. Ad vitium substantiæ spectant quæcunque sunt putrida, aut toto genere præter naturam, ut venena, calculus, vermes, materiæ in abscessibus

sibus contentæ, vapores. Ad vitium quantitatis pertinet tamen plenitudo quo ad vasa, & quoad vires, tum cacochymia, quæ ex humorum non alimentariorum redundantia pendet. Ad vitium qualitatis reducuntur omnes excrementorum differentiæ, vitium verò in motu potissimum attinet ad fluxionem. Harum omnium causarum signa proponuntur eo ordine, quo inventæ sunt causæ (ad evitandam resolutionem) initio sumpto à causis, quæ præterierunt, externis.

*De dignotione causæ præteritæ
externæ.*

CAPUT VII.

CAusæ externæ præteritæ ut cognoscantur, diligenter attendendum est ad vitæ studium, consuetudinem ægri, conditionem
re-

regionis, & prægressas cœli constitutiones: Nam ex causis inditium exhibent perspicaci Medico causarum internarum, quæ præsentem morbum efficiunt. Quod sanè inditium firmitus evadit consideratis effectibus causarum præteritarum, & examinata cujusq; causæ efficacia. Sic ergo noscemus morbum ab aere factum primò ad effectibus, nam morbi ab aere accidere solent pluribus, ac præsertim his membris, cerebro, cordi, habitur corporis, & si aeris qualitates sint intensæ nervis, & articulis, quæ fitum habent non admodum profundum. Aer calidissimus caput inflammando dolores, & vigilias facit, & ephemeram, aut synochum sine putredine, in qua cutis apparet sicca, & squallida, calor primo occursu vigens, deinde mitescens, caput velut adurit, oculique rubeant; Quod si ægrum noverimus.

sub

sub radiis solaribus morari consue-
visse, aut meridianis deambulationi-
bus per loca soli exposita dele-
ctari ab aere malum proficisci asse-
remus. Si aer calidus, & humidus,
qualis est in constitutione austrina
cap. gravitatem, destillationem, ac
inde etiam feb. effecerit, cognosce-
tur ideo quia post talem constitu-
tionem statim secutum est malum,
& ger caput habet natura humidius,
& ad talem offensam pronum, de-
stillatio est tenuis, oculi apparent
subtumidi, & fortasse tale malum
populare est; Si aer frigidior e-
phem. fecerit ex cutis densatione,
noscitur à causis, quia patiens con-
suevit corpus ex calfactum expone-
re aeri frigidiori: *Ab effectibus* quia
levis aliquis rigor percipitur, fu-
dor diutius cohibetur, calor dif-
filius, & tardius per totum cor-
pus expanditur, neque apparet in
principio halituosus. Sit Miles, aut
Nun-

Nuncius, cui artus obtorpescant, absque evidentibus signis destillationis ad partes nervosas, talem sub Dio pernoctasse præsertim frigidiori tempore, vel per loca gelida, & nivosa, aut frigida, & pluviosa tempestate iter longum fecisse asseremus. Occurrat pauper in annonæ penuria alioqui boni habitus, sæpe animo deficiens sine causa manifesta, quis non statim conjiciat ipsum longam inediam sustinuisse? Si quis admodum studiosus de ventriculi queratur imbecillitate, qui in delirium cum studio incidat, squallētibus oculis, siccis naribus, contracta fronte, ex vigilis malum prodire asseremus. Præcedens immoderatus somnus cognoscitur ex vita otiosa, nullis curis impedita, oculorum tumore, vultus pallore, palpebrarum crassitie, cap. gravitate. Si nimius, & violentus motus præcessit adest lassitudo cum quo-

quodam articulorum calore, qui per quietem mox sedatur. Intempestivus motus colligitur ex vitæ studio, murmure hypochondriorum, & alvi suppressione. Ad delegendas animi perturbationes multum refert eorum nosse conditionem, quibus cum æger conversatur, & rerum circumstantias diligenter intueri. Sic Galenus servum cursorem, cui genu hero peregrè profecturo intumuerat ex appolita in bi thapsia, detexit amore Domine compulsam talem finxisse morbum, ut domi remaneret: Et Erasistratus, cum filii Regis Antiochi pulsam præsentem noverca miris inæqualitatibus agitari animadverteret, ipsum novercam suam deperire, & ex amore tabescere cognovit. Galenus certè rerum præteritarum prænunciatio omnibus tacentibus celebrem sibi apud Romanos laudem comparavit. Ut cum Cerial-

rillum Boethi filium alio, quam iustus fuerat à Medicis, cibo usum fuisse vaticinatus est: Et divitem illum arrogantem Medicorum, ac Medicamentorum contemptorem, negantem se medicamentum accepisse mendacii coram convicit, signo expulibus accepto: Venenorum assumptorum cum plurima sint genera, & effectus vari non posset certum aliquod inditium scribi, præsertim quia idem specie venenum pro varia passi dispositione varia solet, & propemodum dissimilia inferre accidentia, præcipua tamen sumpti veneni, & maxime communia signa sunt, angor, cibi abominatio, pulsus parvitas, & languiditas non apparentibus interim indiciis alterius causæ manifestæ, à qua potuerunt tanta symptomata produci, quæ certè idoneis medicamentis manifesta qualitate agentibus non sublevantur,

tur, sed augentur potius, remittuntur autem protinus ab alexipharmacis; nisi venenum altas jam egerit radices.

De particularium venenorum notis legatur Sanctus Arduinus, qui omnium copiosissimè in hoc argumento versatur.

Causæ externæ præsentēs, quæ internæ evadunt, si sint instrumenta vulnerantia, quæ in læsa parte remaneant vel ipso styli contactu dignoscuntur, si visum lateant, vel vulneris magnitudine: Ut si quis sclopetto ictus vulnus habeat ex alia parte exitum non habens licet glans tangi non possit, relicta esse tamen in vulnere censetur. Aeris pestilentis, & putridi hæc signa proponuntur. A causis prægressis multi, & validi terræmotus, multorum cadaverum corruptiones, maligna syderum, & perseverans constellatio, maximè luminari-
bus

ribus defunctum patientibus. *Ab effectibus*, repentina exitia Animalium præcipue humi præstulantium: febres pestiferæ grassantes, etiam in eos, qui montosa loca incolunt, temperanter vivunt, & ab omni ægrotorum commercio abstinere.

Poriò si panis recens cœlo sereno aeri exponatur mox situm contrahit, caro rubeum colore mdeponit, adeps albedinem in pallorem flavitici proximum. Excrementa naturalia, quæ cuivis homini sano conveniunt, & necess. excernuntur, si sanitas integra esse debet sunt alvi fæces, excrementum tertix coctionis, tum crassum, quod cuticulæ adhæret, tum tenue, quod evaporat: Præterea bilis, quæ ad fæcum egestionem ad intestina transmittitur, nec non urinæ, & narium mucus, auriumque fordes, quæ cum retinentur fiunt morborum causæ inter-

næ,

næ, & eatenus sensus interdum latent.

Fæces naturales alvi retentæ, vel inde cognoscuntur, morbum facere, quod longè diutius retentæ fuerint, quàm præterita ferat consuetudo, unde ventris pondus persentitur, & in eo durities, maxime in regione crassorum intestinorum, adestque ventris dolor, sæpe etiam cap.

Urina retenta morbos efficit, quales ab aliis causis crebrò producuntur: Nam si cavitatem abdominis petat, facit tumorem vero hydropi similem, si in venis reservata putrescat, excitat lentam, & quotidianæ affinem. Si ad ambitum corporis feratur, molestos ciet sudores, quales ab ichoribus, & tenui pituita fiunt. Signis ergo est opus, ut cognoscamus, quando urina retenta hæc mala procreat, præsertim cum minimè sit neces-

Qq

ces.

cessarium ipsam penitus retineri, ut dicta damna inferat. Urinæ collectio in abdomine hydropem infert: noscitur (*Ab essentialiter inhabitantibus*) quia lotium in minori copia redditur, quam pro naturali consuetudine, & humidi victus ratione. *Ab effectibus*, quia nulla circa vesicam tensio, ac dolor percipitur, corpus non pallet, artus non intumescunt, nec apparet jecur ulla ex parte labefactatum. *A causis*, quia diuretica, aut copiosi sudores malum auferunt nulla facta mutatione in jecoris temperie. Si Urina in venis putrescat præter signa jam proposita excitatur febris lenta, continua sine typo, in qua sudores copiosi in omni febr. tempore erumpunt, præsertim circa partes inferiores, & grave aliquid redolent. Bilis, quæ naturaliter ad intestina fertur cohibita noscitur ex ventris adstrictione, fecum colore ni-

nihil flavum præ se ferente, facili
dejectione aut medicamentis, aut
cibi acris, falsi, aut amari sumptio-
ne; denique à caussis, quæ obstru-
ctionem parere potuerint præteri-
tis. Cerebr. i naturalia excrementa, si
diu cohibita fuerint, ac præcipuè si
tempore sanitatis copiosè fluere
consueverint, & cap. malè tempe-
rati absint indicia morbum facere
putanda sunt. Uvarum acini, nu-
clei, carbones, & similia, quæ vinci à
calore naturali nequeunt, cogno-
scuntur, quia quæ ob duritiem, nec
à dentibus, nec à ventriculo com-
minuuntur alvi stypticitatem per-
tinacem faciunt, reliqua autem
nauseam & cibi ingens fastidium,
seu abominationem. Ad hæc ipso-
rum assumptio ex egri relatione in-
notescet, ac si excrementa conside-
rentur aliquid simile continere vi-
debuntur. Aquæ thermales cohibi-
tæ signis non egent, quoniam ex

Qq 2

uri-

urina pauca pro aquę sumptę copia eo spatio reddita, quo tota aqua effluere consuevit horis nim. sexdecim plũs minũs noscitur, maximẽ si neque sudores, nec aquolę alvi dejectiones apparuerint, & venter turgere sentiatur.

Inter internas causas per accidens morbi quidem rationem causę habentes iisdem notis cognoscuntur, quibus innotescunt ut morbi sunt: symptomata verò rationem causę habentia faciliẽ dignoscuntur. Dolor immodicus noscitur à propria magnitudine, quam æger percipit si mente constet, pars affecta est acerrimo sensu prædita, præcesserunt causę violenter agentes, ut frangentes, contundentes, aut tales adhuc perseverant, mox excitantur fluxiones, vigilię, sæpe etiam febres, vires debilitantur & imprimis vitales, unde pulsus fiunt celeres, parvi languidi. Vigilię

liæ quæcunq; immodicæ rationem
causæ obtinent, nec alio signo e-
gent, sicuti nec delirium, aut lipo-
thymia, vel syncope. Excretiones
tunc habent rationem causæ, quan-
do vires franguntur, sive excretio
sit copia maxima si e moderata :
Præterea cum vires paulò pòst ne-
cessariò debilitantur; licèt in prin-
cipio vacuationis consent, ut cum
excernitur chylus, aut cibus non-
dum laboratus à ventriculo : De-
nique cum excernitur sanguis per
locum, quò natura rectè operans
nonquam vergit, ut in sanguinis
vomitu, & sputo ex thorace, nam
sanguis grumescens in ventricu-
lo, & putrescens in pulmone lethala
affectus excitare potest. Quæ-
cunque excretiones iis conditioni-
bus carent intra symptomatum fi-
nes comprehunduntur, nilque in-
dicant.

Ad causas internas, & natura-

Qq 3 les

les quod attinet, si de causis dispositivis sermo sit, petenda sunt ipsarum signa ex Galeno lib. art. Med. ubi docet totius corporis, & singularum partium temperies, hic exempla quaedam proponemus quibus distinguuntur causae naturales, quando morbificae evadunt, & sui postulant ablationem. Gratia exempli, in dolore vehementi, à quo imminet animi deliquium, cerebri temperies fit per accidens causa morbifica, quia objectum molestum ejus merito dijudicatur, unde stupefacientia postulat. Magnitudo cutis, ejusque naturalis unitas fit morbi causa, cum pus sub ipsa continetur, ideoque eadem signa indicant pus sub cute collectum, & magnitudinem naturalem cutis, ut est causa morbi; situs naturalis venae in ulceris fundo causa evadit fluxionis, soloque visu, & tactu cognoscitur. Sic plenitudo
na-

natura'is boni succi fit morbi causa cum in feb. ardente necessariam impedit transpirationem. Naturalis vizium imbecillitas, quæ in calidi innati penuria consistit, noscitur ex corporis vel gracilitate, vel nimia pinguedine, ætate inclinante, mala dispositione ventriculi, jecoris, cordis: Hæreditariæ verò morbificæ dispositiones, priusquàm in actum exeant, alia conjectura colligi nequeunt, quàm si cujuspiam progenitores aliquo habituali morbo laborasse constet, & fratres, ac sorores iisdem pœnè affectibus subjici, qui remediis ex arte administratis non ita cedant, quin aliquanto post repullulent.

Sequuntur causæ internæ efficientes per se, quæ in quotidiano usu occurrunt, & maximam morborum partem creant. Ac vermium quidem, & calculi signa à practicis petantur in propriis tractatibus,

Qq 4

ve-

veluti excrescentiæ carnis sive in
meatu urinario, sive in alio loco,
nec non foetus mortui, & putre-
scents : De humoribus tantum,
& inde genitis vaporibus, hic ser-
mo est, quorum signa exproposi-
tis fontibus sic hauriuntur. Va-
por in genere primo noscitur à cau-
sis materialibus prægressis scilicet
alimentis, aut medicamentis flatu-
lents: Nec non à causis efficien-
tibus caloris nimirum imbecillitate
præsentis, aut sanè ejusdem vehe-
mentia, dummodo adsint indicia
præsentis humoris copiosi, & cras-
si. Præterea à causis juvantibus :
si discutientia sumpta, aut applici-
ta malum levent. Secundò nosci-
tur ab effectibus, qui partim sunt
morbi, partim symptomata. Mor-
bi sunt quæcunque inflationes, sive
tumores renitentes cum dolore
post digitorum compressionem
mox resurgentes sine sensu ponde-
ris

ris modò elatiores, modò depresso-
res.

Symptomata sunt cujuscunque
partis palpitatio, pandiculatio,
oscitatio, aurium tinnitus, vertigi-
nes, imagines ante oculos, epile-
psia, catalepsis: Nam hos affe-
ctus, qui citò fiunt, & citò desinunt
à flatibus fieri omnes confitentur;
Huc pertinent turbulenta insom-
nia, crebri ructus, ventris murmu-
ra, & rugitus, crepitus, sonitus, ex-
cretiones humorum cum quodam
strepitu. Adde dolores vagos, &
inconstantes præsertim si magna
celeritate modò unam, modò al-
iam corporis partem occupent,
neque in ulla firmentur; Secùs ac
evenit in doloribus à materia tur-
gente, & ab uno fonte ad varias cor-
poris regiones decumbentes pro-
venientibus. Vaporis verò spe-
ciem non ante noveris, quàm ejus
mineram, quæ non est solum hu-
mor,

Qq 5

mor,

mor, sed quæcumque res evapo-
rans, ut chylus, potus, semen, lac,
fœtus, & vermes putrescentes. Hu-
mor in genere cognoscitur maxi-
mè ab effectibus, nam plurimi mor-
bi ejus sunt naturæ, ut non nisi ab
humoribus fieri possint, quos ideo
materiales vocant; Præterea si hu-
mor in toto redundet, adest gravi-
tas, & lassitudo corporis; si in de-
terminata parte, adest in ipsa sen-
sus ponderis: Denique humorum
effectus constantiores sunt, quam
flatulenti, neq; mutationes subeunt
tàm repentinæ. In specie verò
qualis humor redundet, aliis etiam
signis cognoscitur: Et quia simul
cognoscimus redundantem humo-
rem, & humoris conditionem si-
mul, proponenda sunt signa quan-
titem, & qualitatem humorum
indicantia.

Sanguis redundans, seu plenitu-
dinem faciens quo ad vasa, vel quo
ad

ad vires noscitur primò à causis
externis, aere, regione, cœli statu,
anni tempore, vel temperatis, vel
ad calidum, & humidum modicè
vergentibus: Victu pleno, & boni
succii, cui longo tempore indulse-
rit, vita sedentaria, suppressa aliqua
naturali, & consuetà sanguinis va-
cuatione per nares, uterum, hæ-
morrhoides. *A causis iuvantibus*, si
sanguinis, vel arte, vel à natura libe-
ralis facta vacuatio, aut restauret vi-
res, quæ oppressæ videbantur, ut in
plenitudine quoad vires, aut certè
non frangat. *A causis efficientibus*
proximis, & remotis: si jecur sit tem-
peratum vel in caliditate, & humi-
ditate notabiliter non excedat, si
ventriculus probè sit constitutus,
adeo ut chylum pituitosum non
conficiat: Quò pertinet ætas ado-
lescentiæ, & pueritiæ, scilicet passio
calidi, & humidi temper. à quo plu-
rimus sanguis producitur.

Qq 6

Se

Secundò noscitur ab efficientibus, tum præter naturam qui sunt morbi, & symptomata, tum secundum naturam, qui sunt naturales corporis passiones, & accidentia. Synochus putrida inter morbos significat peccare sanguinem, quia est ejus causa, quemadmodum, & phlegmone, sive exquisita, sive mixta, quales fiunt in Phrenit. pleur. & Angina: Unde sanguineum dicere licebit, qui iis malis crebrò fuerit obnoxius. Symptomata indicantia sanguinem sunt, delirium cum risu, rubra spectra ante oculos obversantia, lassitudo inflammatoria, dolor tensivus cum sensu caloris, & ponderis, necnon rubore partis, in qua sanguis putrescit. Naturales corporis passiones sanguinis dominium sequentes sunt proba nutritio, quæ facit corpus carnosum, & boni habitus, mores ad gaudiû, & hilaritatem proni: Cutis cum

cum rubore albicans ; Venarum magnitudo, & tensio : Insomnia læta : Ingenium facile ; Pulchritudo corporis. Si sanguis qualitate peccet, quia id evenit vel mixtione alicujus excrementi, vel alteratione facta ab assumptis, aut jecore, præter signa subdominium alicujus excrementi indicantia abundè cognoscetur ex assumptis, aut cibis, aut medicamentis puta acrioribus, calidioribus, &c. aut ex iis, quæ jecur frigidius, calidius arguere valent.

Pituita in genere cognoscitur primo à causis externis, vel adhuc perseverantibus, vel paulò ante præteritis, acre, tempestate, regione, anni tempore frigidiori, cibis frigidis, & humidis consuetis, vel intemperantia in ciborum etiam proborum varietate, quantitate intempestivi edendi horis, priori cibo nondum cocto, nimio aqua po-

Qq 7 tu,

tu, aut cujuscumque reigelidæ, ut
vina nive perfrigerata æstate bibi
solent, item ex diuturno usu medi-
camentorum valdè refrigeranti-
um, quæ ventriculi calorem debi-
litare potuerint, somno immoder-
ato, intempestivo motu à cibo,
assiduo otio, nimio Veneris usu. A
caussis efficientibus internis, si ven-
triculi, jecoris, aut cerebri calor
languidior etiam appareat. A caus-
sis foventibus, & multiplicanti-
bus, si suppressa sit consueta pitui-
tosi humoris excretio per os, nares,
vomitum, secessum, uterum, fon-
ticulum, fistulam. A causis juven-
tibus, si calida juvent, item phleg-
magoga, ac omnino ad pituitæ ex-
cretiones degravari corpus videat-
ur; A causis dispositivis, si à nativa
constitutione viscerum calor lan-
gbeat, ætas sit declinans (quam-
quam, & pueri ob ingluviem pitui-
ta scatent, & sexus muliebris.) Se-
cun-

candò noscitur ab effectibus M.
S. pituit. symptomatis, & naturali-
bus accidentibus, quæ à dominan-
te pituita corpori, animoque ad-
veniunt. Itaque anasarca, cachexia,
œdema, febris quotidiana signifi-
cant pituitam, à qua pendent, vel-
uti, & consuetudo huiusmodi mor-
bo laborandi. Morbi quoq; diutur-
nitas, atq; parvitas pituitam argu-
unt, nisi adsint evidentissima me-
lancholici humoris indicia. Sym-
ptomata pituitam consequentia læ-
tè patent, ut sunt coma soporiferū,
caros, lethargus, catarrhus, asthma,
stupor, amentia, memoriæ læsio,
nausea, inappetentia potus, dolo-
res gravativi, frequentes pituitæ
excretiones per os, nares, sputum,
vomitū, uterum, decoloratio cor-
poris, extremorum tumor, & sum-
ma ad omnes actiones inertia. Ac-
cidentia, secundum naturam pitui-
tosi hominis, sunt habitus à natura
pin-

pinguior, mollis, laxus, albicans, tarditas ad motum, propensio in somnum, longi, profundiq; somni, rarissima insomnia, aut sanè insomnia natationum, piscationum, tardior pilorum ortus, paucorum, tenuium, rectorum, subalbican-
tium, facilis tolerantia famis, cum minimo virium detrimento, venarum exilitas, urinæ albæ, & decolores, pulsus parvi, tardi, rari, molles, sed minus quam in morbis pituitosis, denique mores placidi, ad misericordiam, fletum, & timorem pròni. Tertio noscitur ab essentialiter inhzrentibus ipsi pituitæ, quæ sunt naturalia ejus accidentia sensibus sæpe obvia. Sic albicantes evacuationes dicimus etiam pituitam, & corpus ad tactum frigidius pituita abundare: Qualis verò sit pituita tenuis, an crassa, insipida, acida, an falsa, iisdem mediis innotescet: ab essentialiter inhzrentibus, quia in
ex-

excretionibus, visu ipso, & baculi
ope crassam, & viscidam à tenui di-
scriminat, ac si per os, sapor quoque
percipitur. *A causis*, nam pituita a-
cida fit à caussis vehementius refri-
gerantibus, quàm dulcis, ac insipi-
da. Quod si cum pituita abundare
bilem flavam, si pituitam, aut pu-
tredine, aut quovis alio modo no-
tabiliter incaluisse cognoverimus,
falsam esse redditam cognoveri-
mus: In quo statu nescias ab initio
facile iudicium ferre, quæ magis
noceant, aut juvent, nam frigida
pituitæ falsedinem tollunt, crassi-
tiem augment, calida mordacitatem
acuunt, crassitiem attenuant. Ab
effectibus nam à pituita acida, &
falsa dolores acuti fiunt, à dulci, &
insipida remissiores. Pituita salsa in
exitu est mordax, ulcerat, pruritum
facit, & sitim, quæ abstergentibus
magis cedit, quam refrigerantibus.
Acida primò caninam, mox vacci-
nam

nam famem excitat. A crassa pituita affectus fit pertinacior, quàm à tenui, quæ & repentinas movet fluxiones, etiam ad longinquas partes, & citò dissolvitur. Si bilis redundet, præcesserunt, aut adfunt causæ corpus calefacientes; Externæ quidem aer calidus & siccus, multus aromatum, & vini generosi usus, nec non medicamentorum valde calefacientium, ut sunt balnea sulphurata, theriaca, aqua vitæ, decoctum Guajaci, addo & venena, ut morsum viperæ, luem gallicam, &c. Præterea prægressa inedia, assidua vigiliæ, validi corporis motus, nec non frequens ex-candescētia. Internæ verò efficientes proximæ, & remotæ, tum jecur calidius, sicciusque, tum ætas juvenilis. Foventes, ac multiplicantes, si cohibita sit consueta bilis vacuatio, si fellea vesicula vel nequeat sanguinem repurgare à superflua bile.

bile, vel receptam bilem deponere ad intestina stimulantæ expultricis ergò. Tunc enim licet minimum bilis generetur, temporis tamen decursu plurima cumulat in venis etiam in pituitoso homine, quod est diligenter observandum. Ac propositæ causæ siquidem intensæ fuerint, ac diu persisterint bilem atram, & adustam significant, sin minus flavam. Ad bilis effectus quod attinet, inter morbos censentur Erysipelas, herpes, Febr. de tertio in tertium invadens, febr. ardens exquisita, & in genere morbi vehementes, & valde acuti. maxima ex parte bilem significant. Symptomata sunt vomitus biliosus, & similes diarrhœæ, frequens hæmorrhagia, menstrua anticipantia, & immoderata, rigores crebri, vigiliæ, desipientia cum furore, dolores acutissimi, mordicativi, pungitivi, ulcerativi, lancinan-

tes.

tes, erodentes, spectra ignita, æ
 scintille anteculos sæpè obverſan-
 tes, aurium ſibilus in hoc à tinnitu
 differens, quòd ſibilus eſt acutiſſi-
 mus quidam ſonus, qualis ſerpen-
 tum vox, at tinnitus eſt quilibet a-
 lius gravior ſonitus intra aurem
 excitus. Adde ſitim, linguæ ardi-
 tatem, & nigritiem, oris amaro-
 rem, flavitiem corporis, pulſus ce-
 leritatem, & crebritatem, calorem
 intenſum partis affectæ, ſudores a-
 cres, & mordaces, urinas croceas,
 intenſè rubras, admodum ſplen-
 dentes. Naturalia accidentia bi-
 liofi corporis etiam extra ſtatum
 ægritudinis ſunt corporis gracili-
 tas, venarum amplitudo, hiſpida
 hypochondria, cutis ſquallida, ſitis
 frequens, matutino tempore oris
 amaritudo, ſomni breves, inſomnia
 circa cædes, ignem, aliaque iis affi-
 nia, motus corporis concitatus, in-
 genium velox & acutum, urinæ ci-
 trinæ,

trinx, & splendentes, mores ad iram, audaciam, ac temeritatem comparati, pulsus celeres magni, & minimè molles. Ab essentialiter inhaerentibus, si contingat bilem excerni omnium certissimè cognoscetur. Nam humor flavus, citrinus, qui vitello similis, amarus, acris bilem denotat, quod si cum flavitie nigricet, & quendam præferat splendorem, atram, & æruginosam bilem significat.

Melancholici verò recrementi proventum arguunt, causæ quidem externæ, aer frigidus siccus, qualis est autumnalis, alimenta terrestria, & crassi succi, qualia sunt caro bubula, salita, legaria, & huiusmodi, curæ mordaces, & perseverans tristitia. Internæ & dispositivæ causæ sunt jecur retorridam, lienis imbecillitas, tunc enim melancholicum recrementum affluit per synathrismum, & collectionem,

nem, dum splen suo super sedet officio, ætas consistens. Causæ foveantes, & multiplicantes in viris sunt consuetæ hæmorrhoides suppressæ, in mulieribus etiam menstrua purgamenta, nam sanguis detentus assatur, & in atram degenerat bilem. Ad melancholici humoris effectus, quod attinet, febres quartanæ emergunt, melancholia, seu atæbiles, impetigines, scyrrhosæ affectiones, Arquati nigri, tertianæ nothæ minoris famæ, ut ait Arabum princeps Avicennas. Cancri nonnunquam in mulieribus, mammas inoccupant, quos si eximere studueris, renascuntur in utero, in viris sæpius nasum exdunt, & faciem totam populantur. Dolores osthocopi, excreta sive per vomitum, sive per alvum nigricantia. His adde corpus livore quodam luridum, numerosa pilorum segete scatens, gracillimum, in-

interim tamen nervosum. Sudor plurimus adest, pediculi nonnunquam infestant, olet anima, labra finduntur, somnia perturbantur, visis horrendis mortuorum, dæmonum malorum, cædium, solitudo deligitur, & diligitur, tristium consuetudo placet, & arridet juxtà illud Horatianum:

*Oderunt hilarem tristes, tristemque
jocosi.*

Quid quæris? Tristitiæ species omnis florescit in ore.

Serosi verò excrementi copiam significant causæ quidem externæ,avidior aer, vinum, vel aqua affluentius epota, usus fructuum horariorum, aut etiam leguminum. Causæ internæ foventes, & ingeminentes sereum excrementum sunt sudores compressi, renum imbecillitas, unde serum non attrahitur. Causæ dispositivæ sunt jecoris imbecillitas, & atonia ex frigida,
hu-

humidaque intemperie. Inter effectus censentur potissimum hydrocephali, hydrocele, Ascites, & cæteri tumores aquei, ptyalismus, urinæ profluvium, sudor copiosior, hydroa &c. Corpus subsquallidum, & albicans, facies potissimum pallescit, pedes tumescunt.

Purulentæ urinæ cognoscuntur, primo à causis, si præcesserint, renes aut vesicam ulcerantia, ut cantharides, & asperi calculi excreti, aut præcesserit apostema alicujus partis, quæ possit per urinam expurgari, aut etiam sanguinis mixtio; nam sanguis grumescens in vesica adveniente putrefactione in pus vertitur. Secundò ab effectibus, si adsit febris, dolor mordicativus in vesica, aut gravis circa lumbos, isque continuus. Tertiò ab essentialiter inhærentibus, nam excretio gravius olet, quàm naturalis urina, aut aliis excrementis mi-

mixa, & minor esse solet puris copia, quàm pituitæ: Illud ad cinereum magis vergit, ista magis albicat, illud ponderosius est, ac matulæ inum statim petit, ista ob permixtos flatus non tam citò subsidet: Denique pus si matula agitur, divellitur à se invicem, & disgregatur, neque sic adhærescit, ut pituita.

Sputum purulentum, ut cognoscatur, possitq; incipiens phthisis distinguui à f. b. catarrhali orta propter putredinē pituitæ crassæ, quæ tussicula rejicitur, consideranda sunt naturalia puris accidentia, quæ in sputis visuntur, & quatuor connumerantur. Primum est gravitas, cuius causa pus illico fundum petit. Pituita minimè, si utrumque in vas aqua calida plenum conjiciatur. Secundum est, quod pus injectum prunis fœdum odorem spirat, pituita putrida nō tantum. Tertium,
Rr quod

quod pus est cineritium, pituita magis albicat. Quartum, quod pus si bacillo dividatur, partes ab se invicem facile abscedunt, & in fundo vasis iterum coeunt: At pituita neque patitur se dividi ob lentorem, nec divisa amplius coit. Exiis signis quartum est omnium certissimum, reliqua sola me iudice, incerta sunt. Primum quidem, quia pituita aliquando sic adurit, ut deposita flatuositate ita in fundum petat. Secundum, quia nec pituita est semper expers odoris, nec pus semper graveolens, nam pus ita insigniter corrupta foetidum exhalat, pus autem probe coctum minime, ut colligitur ex Gal. I. de Diff. feb. 8. & 2. Aph. 47. ubi pus reponit medium inter sanguinem probe elaboratum & vitiatum, cum graveolenti putredine; Tertium etiam est fallax, quia pus bonum visu est candidum teste Gal. I. de Diff. feb. 8.

Se-

Semen putridum dignoscitur ex causis, si Venus fuerit diu intermissa, maximè in corpore sanguineo, & testium calida, humidaque dispositione, si veneris usus juvet.

Ex effectibus, si adsit uteri præfocatio, epilepsia, tremor cordis: Ac si fortè gonorrhœa superveniat, vel naturalis pollutio visu ipso putridum semen à non putrido internoscitur.

Humor putridus solo effectu certissimè patescit: Nam putrescente sanguine oritur feb. plurium dierum nullum habens circuitum, à bile fit febris revertens tertio quoque die, &c.

Humor veneficus, si quidem putrescat omnia ferè habet adjuncta signa febris malignæ superius proposita, iis tantum exceptis, quæ excellentem putredinem indicant, quæ altera est febris malignæ

Rr 2

cau-

causa. Si non putrescat, & in aliquo corporis ignobili loco immobilis hæreat nullo naturali indicio deprehendi potest. Si ad aliquam partem moveri sentiatur, majora infert symptomata, quàm ullus alius humor qualitate manifesta peccans, in corde excitat syncopē, in cap. Epilepsiam, in ore ventric. cardioginum, &c. Deniq; si humores in alienam substantiam migraverint per varias corruptiones, eodem modo cognoscuntur, ut tubercula quorum sunt perpetuæ causæ.

Restant signa humoris peccantis in motu.

Est autem motus vel aboliutus, vel imminutus, cum humor, qui ex naturæ instituto statuto tempore moveri solet, aut planè quiescit, aut lentè movetur, ut evenit in menstribus suppressis, & imminutis, in sanguine qui ad lactis generatio-

ratio-

rationem ad ubera ferri post partum deberet, aliò rapitur, in hæmorrhoidib. inoatis, & in con-
suetâ aliquâdo narium hæmorrhagia. Vel motus est depravatus cum aut fertur humor quò non oportet, ut evenit in fluxionibus, aut quomodo non oporteret, si moveatur tempore à natura minimè destinato, ut in mensstruis inordinatis, si cum labore, ut in mensium st. Illicitio, si per locum minimè convenientem, ut cum sanguis per sputum, aut vomitum à natura expurgatur. Motus imminutus, vel ablatus duo habet signa certissima. Primum est, si tempore consueto non accidat. Secundum si gravia sequantur accidentia, quæ nimirum à retenta materia fieri possunt, quibus absentibus non est dicendum materiam retineri præter naturam, aut imminutè vacuari, ut cum menses cohi-

Rr 3 ben-

bentur facta conceptione , aut
 parcius erumpunt. Motus pravus
 ratione modi, vel loci, vel tempo-
 ris , quo excretio naturaliter fieri
 non deberet , est sine signis per se
 evidens. At motus depravatus
 ratione termini ad quem fit flu-
 xio, cognoscitur, primò à caussis
 efficientibus, si in parte affecta adsit
 calor, aut dolor, qui humores aliun-
 dè possit trahere; aut imbecillitas,
 ob quam prona sit ad cujuscunque
 humoris susceptionem : Si adsint
 signa humorum quantitate , aut
 qualitate peccâtium, quæ nobilio-
 rem aliquam partem irritare pos-
 sint ad expulsionē. Secundò ab ef-
 fectibus. Nam sunt quidam mor-
 bi, & nonnulla symptomata, ad quæ
 fluxio necessariò concurrir, ut in-
 flammationes, calculi, &c. Deinde
 morbi à fluxione pendentes , si in
 affecta parte imbecillitas relinqua-
 tur, solent per quosdam circuitus

re-

reverti, & citò gigni, ac omninò ferè omnia ad sunt indicia superius enumerata ad cognoscendum locum affectum per cōsensum. Tandem contingit non rarò ab essentialiter inhærentibus cognosci fluxionem, ut cum sentitur materia ab una ad aliam partem fluere, velut evenit in catarrho ad partes infernas delabente, quando materia descendit à cap. per os, nares, asperam arteriam, partes subcutaneas, occipitis, cervicis, ac dorsi. Hæc de signis diagnosticiis.

De signis Prognosticis.

CAPUT VIII.

EX prognosticis quædam prænunciant futuram ægritudinem, quædam ægritudinis jam factæ exitum felicem, aut infav-

Rr 4 flum

rum prænunciant. De prioribus agit Gal. cap. 42. art. Med. vocatq; signa neutra, quoniam corpus ad imminuentem ægritudinem dispositum nondum tamen habens actiones sensibilibus læsas, neutrum nuncupatur. Posteriora sunt in triplici differentia, quædam sunt salubria, quæ futuram indicant sanitatem, quædam lethalia, quæ prænunciant mortem, quædam inter hæc media, quæ neutrum portant, *sed significant morbos comitantes usque ad mortem*, ut sunt tophaceæ arthritides, epilepsiæ post pubertatem advenientes. Ac lethaliū quidem aliqua sine addito lethalia vocantur, quædā dicuntur valdè lethalia, illa semper prænunciant futuram mortem, ista ut plurimum eventientem. Omnino siue salubria sint signa, siue lethalia, vel morbi longitudinem ostendunt, vel brevitatem, illa dicuntur

cuntur signa morborum chronico-
rum, hæc brevium, & acutorum.
Quod si morbum solvi oporteat,
sive ad salutem, sive ad interitum
id accidat, quia morbum solvi ne-
cesse est, vel per mutationem sen-
sim factam, vel per repentinam:
Quæ lentam mutationem signifi-
cant, signa coctionis, & cruditatis
appellantur, quæ repentinam indi-
cant, signa critica, sive decretoria.
Quia igitur in medendo id pri-
mum Medico considerandum est,
possintne morbus auxiliis pelli, tum
quanto tempore sit duraturus, de-
nique sitne exitum habiturus co-
ctione, aut ipsi appositæ cruditate,
vel crisi. Primum proponitur pro-
gnostica salutis, ac mortis, secundò
longitudinis, ac brevitatis, tertio
coctionis, & cruditatis, & signa
critica.

Verum prius ostendere oportet,
quomodo morbus immi-

Rr 5 nens

nens prævideatur, cum tantò sit præstantius futuram ægritudinem avertere, quàm præsentem opportunis remediis expugnare, quantò jocundior est sanitatis præsentis fruitio, quàm recuperandæ spes. Imminentem morbum præcipuè indicant causæ, quia ipsum producunt. In primis considerandus est aer, qui si aliqua insigni, ac diuturna constitutione sit perturbatus indicat eos, qui ob intemperie affinitatem sunt magis dispositi ad aeris alterationem similibus morbis paulo post laboraturos, de quibus diffusè agit Hipp. tertia sectione Aph. Ideò astrologia periti, qui ex vario syderum ortu, & occasu futuras præsciunt aeris magnas mutationes, magnâ sibi laudem comparant, maturè iis providendo, qui ob malam corporis dispositionem necessariò in morbum inciderent ab aeris injuria. Secundò confide-

ran-

randus est, & maximè, cibus, ac potus, qui plenitudinis, aut cacoehymia comes est. Quis enim non prædicat, hominem gulæ deditum, casurum in cruditates, obstructions, tumores, febres? Nec secus cibi qualitas futurum morbum indicabit, veluti si quem noris renum caliditate detentum cibus crassæ, lentæque substantiæ indulgere, eumq; renū calculo exacta pubertate laboraturum prænuncies, somni valdè perturbati, atque insomnia absurda à vigilantium cogitationibus alienissima futurum morbum indicant, atq; ut plurimum febris, capitisq; dolorem. Cohibita naturales vacuationes ob intermissa exercitia, alvus cohibita, retenti menses, occæcata nares, & hæmorrhoides, brevi futurum morbum prædicunt retentæ materiæ quantitati, & qualitati respondentem, ut cohibita vacuatio per os, & nares

Rr 6 por-

portendit dolores capitis gravat-
ivos, sopores, destillationes. Ex
animi quoque perturbationibus
id colligitur. Nam præter consue-
tudinem, & circa causam tritari,
morosum esse, faciliè irasci, inve-
recundiùs agere in societatibus
imminentem desipientiam præ-
nunciat. Nec secus ex causis non
necessariò accidentibus futuræ no-
tantur ægitudines, sive studia vi-
tæ spectes, sive assumpta venena,
aut medicamenta, v. g. si cuiquam
cerebrum frigidius, atq; humidius
habenti somniferum porrigatur,
soporem prænuncia subsequiturum.
Si menstruis imminentibus, im-
peritus Medicus venam cubiti se-
cet, menstrui est expectanda sup-
pressio, sic piscationes podagram,
venationes nocturnæ sub dio tre-
morem, & paralysem adventuram si-
gnificant. A lædentibus cognosci-
tur imminens morbus, ut si quæ fa-
mi-

mi-

militaria esse consueverant, & naturam recreare, amplius non oblectent, sed magis tædium pariant, ac molestiam. Porro si accuratè expendas naturalem viscerum dispositionem, ac totius etiam constitutionem ratione ætatis, sexus, consuetudinis, faciliè judicabis, qui morbi, & quando concitari valeant à causis internis, siquidem omne agens agit in passum dispositum, faciliusque V. G. incidet virgo, cui uteri viæ sunt adstrictiores, in mensium suppressionem ex modico fructuum adstringentium usu, quam ex multo eorundem usu mulier adultior, quæque pepererit, quoniam uteri vias laxas habet, & patentiores. Sunt porro quidam morbi, qui alios necessariò consequuntur ut ulcus ad magnas inflammationes, extenuatio corporis ad ulcus pulmonum, &c. Denique si adsint signa humorum, vel præter natura-

Rr 7

tu-

turam redundantium, vel prava aliqua qualitate affectorum, licet nondum sint operationes sensibilibiter læsæ, tamen haud procul abesse morbum affirmabis. Nec minus efficaciam habent effectus, ad arguendum imminentem morbum, quàm causæ. Ac si de actionibus sit sermo, læpe evenit actionem ita debiliter lædi, ut læsionem egrotantes vilipendant, quæ tamen læsio, si diu perseveret propinquum esse morbum significat. Sic pigritia ad motum siue lassitudo spontanea morbos prænunciat: Stupor prænunciat paralysem, palpitatio faciei oris torturam: Palpitatio artuum convulsionem: Motus debilitas sensuumque turbatio apoplexiam: Muscæ ante oculos volitantes, atque apparentes coruscationes suffusionem. Sonitus aurium cephalalgias, furditates, ac vertigines: Oris amaror assiduus angorem,

rem, capitisque dolorem. Frontis,
ac palpebrarum pruritus ophtal-
miam: Pruritus ani hæmorrhoides,
inappetentia cibi febres: Eadem
cum nausea, & alvi adstrictione co-
licos dolores: frequentes exolu-
tiones, ac tremores cordis synco-
pen. Considerandæ sunt quoque
excretiones, etiamsi naturalis ex-
cretio in quantitate, qualitate, &
tempore varietur, sicque diu perse-
veret, morbus expectandus est. Fæ-
ces, quæ subpallidæ esse consueve-
rant, redditæ albæ, ac decolores i-
cterum prænunciant: Mollis deje-
ctio cum dolore dysenteriam: Re-
jectio fœtens, & albicans vermium
generationem: Rejectio fœtens, ac
pallida febrem biliosam: Sudor no-
cturnus multus alvi stypticitatē: Uri-
næ pauciores sudorem: Urinæ mo-
dò crassæ modo pellucidæ, & splen-
dentes calculum vesicæ: Sputa sal-
sa cum tussi phthisin. Sed & mu-
tata

tata qualitas magnam vim habet ad indicandum morbum imminentem. Etenim forma, & p̄t̄ritudo corporis deflorescens, p̄currere morbos solet: sic ex faciei pallore, cum levi palpebrarum tumore proximam cachexiam colligimus, ex cachexia hydropem, ex rubore, & tumore oculorum cephalæam: Ex frigiditate extremorum revertentem feb. &c.

Signa salutis, aut mortis.

CAPUT IX.

IN salute, aut morte prædicenda, quoniam per sæpe labitur medicus, quædam ante prædictionem accurate sunt advertenda, ne temeritate iudicii dignitas artis infametur.

Sit ergo primum præceptum, ne in principio morborum chronicorum

rum

rum statim aut salutem, aut mortem prænuncies, tum quia utriusque signa sunt in principio valdè debilia, tum quia natura medicamenti adjuncta vincit non rarò temporis diuturnitate affectus, nostra opinione insuperabiles. Secundum ne materia adhuc fluente, aut urgente, quidquam certi prædicas, cum adhuc dubium sit, quò sit terminatura fluxio ad partem nobilem, an ad ignobilem, quam ob causam statuit Hipp. in morbis acutis non omnino certas esse prænunciationes salutis, aut mortis, quia nimirum magnæ, ac repentinæ in ipsis accidunt mutationes, quæ iudicium pervertunt. Tertium ut etiam apparentibus signis bonis salutem non prænuncies, si metus sit, ne ob aliquam causam externam æger in deterius labi possit. Sic ergo prædicendum salutarem fore morbum, nisi talis causa accesserit,
nec

nec ullus error ex parte ægri, assidentiumque committatur. Quartum ut signa diebus criticis apparentia siue bona sint, siue mala plus virium ad significandum habere putes; magisque æstimes. His animadversis expendenda sunt deinceps singula signa at inter se conferenda, ut cum aliqua bona concurrerint cum signis lethalibus, eorum viribus æstimatis conijcere liceat, quænam illorum sint prævalitura. Quod si omnia bona signa apparuerint, salutem, si omnia mala exitium prænuncient: Prima autem signorum salubrium, lethalium, ac mediorum classis ab essentialiter in hærentibus sumitur, à morbi inquam specie, vehementia, ac diuturnitate. Si intemperiem spectes, morbi hæreditarii, & habituales membri ad vitam necessarii sunt lethales, in aliis partibus sunt quidem incurabiles, sed non lethales, inter
in-

intemperies verò sicca est cæteris
lethalior, & incurabilior, tum quia
humidi, calidi que defectum neces-
sariò habet adjunctum, tum quia
humectationi difficulter cedit :
Unde feb. hætica incipiens est si-
gnum valdè lethale, progressa au-
tem simpliciter lethale, porrò licet
intemperies, non sint maximæ, si
tamen sint contrariæ, atque duas
occupent partes ad vitam necessa-
rias fiunt periculosæ, & interdum
lethales maximè decursu tempo-
ris, ut accidit ventriculo insigni-
ter refrigerato, & jecore accen-
so. Ex morbis in mala com-
positione, morbus in figura ut
plurimum est signum medium,
& comitatur usque ad mortem,
ut gibbositas, crurum tortuo-
sitas, antiquæ femoris luxatio-
nes, distortio pedum, quæ ac-
cidit valgus, & vacuus. Morbus
in numero deficiente nisi partem
præ-

præcipuam, aut ipsi ministrantem occupet, est quoque signum medium, cum nec interficiat, nec amoveri possit. Morbi diuturnitas, si cum viribus conferatur longè certissimum est salutis, aut mortis indicium. Cum enim inter naturam, & causam morbificam lucta fiat, & in alterutrius victoria stet salus, aut interitus: si natura adeò sit robusta, ut quanto tempore duraturus est morbus resistere valeat, morbum victum iri asseremus, moriturum verò ægram, si adeo langueant ejus vires, ut per totum morbi statum durare non valeant. Metiri igitur omni studio virium statum oportet, & perspicere brevine, an tardè adventurus sit morbi status. N m debiles vires in principio, vel augmento universali morbi sunt signū lethale: Utcumque verò fortes, usque ad statum signum salutare, præsertim cum signis coctionis. Hanc
ob

ob causam morbus acutus alteri morbo acuto superveniens est lethalis, quia vires à priori morbo fractæ, alterius supervenientis decursum sustinere nequeunt. Eadem ratione ait Hipp. lethale esse utero gerentem acuto morbo corripì, quia ob uteri gestationem, generosa remedia, quibus in curandis morbis acutis egemus, perferre non potest. Quomodo verò adveniens morbi status cognoscatur inter signa longitudinis, ac brevitas morbi proponetur. Cæterum ea fieri debet collatio virium cum morbo, ut illæ vires conferantur, quas maximè lædere aptus est morbus. Illud tamen universim statuendum, virtutem vitalem, à qua vitæ custodia primò pender, maximam habere vim ad significandam salutem, aut mortem: Deinde accidentalem, si tanta sit ejus læsio, ut aspiratio tolli possit. Tertiò naturalem

ralem vitalis quippe fundamentum. Quo circa post vitalem maximam dignitatem habet naturalis, quando animalis virtus adeò læsa non est, ut respiratio in discrimen vocetur, siquidem vis animalis solum est necessaria ad vitam, quatenus respirationem calori cordis eventando per necessariam fovet. Sed inter hæc signa facile primas tenet morbi vehementia: In parvo enim morbo salus est expectanda, & omnis morbus magnus futurum esse vitæ periculum significat. Qui morbus magnus est ratione dignitatis, essentiæ, & facultatis simul, est lethalis, si sit magnus ratione dignitatis tantum, parvus tamen ratione essentiæ, & facultatis, ut plurimum est salutaris, præsertim verò morbus in intemperie aliquando est lethalis ut pustula pulmonum, quæ post disruptionem abit in ulcusculum, Morbus

ma-

magnus ratione essentia in parte ignobili longitudinem tantum denotat, in parte nobili est lethalis: Pessimus est morbus magnus ratione facultatis, eò enim periculosior censenda est affectio, quò plura, magisque terrifica symptomata eam comitantur. At magnitudo morbi respectiva, ex se solum longitudinem morbi denotat per accidens autem fit lethale, salutare, aut medium: Medium si causa insuperabilis sit in parte ignobili, veluti pituita intra articuli cavitatem in tophum concreta: Salutare si causa morbifica non sit penitus insuperabilis neque actionem præcipuam admodum infestet, ut diuturnæ uteri, ac lienis obstructions: lethale, si morbus unà sit magnus ratione dignitatis, aut facultatis, ut est jecoris scirrhus, & vesicæ calculus urinæ excitans suppressionem, & acerbissimos cruciatus.

Se-

Secunda signorum classis desumitur à causis, inter quas, quæ externæ dicuntur eatenus fiunt signa salutis aut mortis, quatenus morbi magnitudinem, aut parvitatem significant. Gratia exempli, quantò validiores fuerint externæ causæ, egerintque diutius, tanto periculosiorem fore morbum significant, quia sunt indicia morbi magni ratione essentia. Causæ internæ disponentes sunt signum salutare, quando sunt affines morbo facto, lethale verò cum valdè sunt dissimiles, unde ait Hipp. 2. Aph. 34. in morbis minùs periclitantur, quorum naturæ, aut ætati, aut habitui &c. Internæ efficientes, quemadmodum morbum magnum, aut parvum citò, aut tardè solubilem faciunt, ita indicant salutem, aut mortem, vel medium inter hæc extrema. Corpora solida morbos producentia, ut topi, calculi, vapores

pores in oculo concreti, ac suffusiones facientes, & ferè semper indicant morbum insolubilem, & comitaturum homines usq; ad mortem: Bilis adusta, & æruginosa lethales morbos significat, veluti quicumque alius humor excellenter putridus, aut veneficus. Humores benigni, ac sola copia peccantes morbos potius longos, quàm lethales significant, nisi propter humoris copiam, virtutis immineat suffocatio.

Causæ juvantes, quæcunq; illæ sint, sunt signa non lethalia, non tamen necessariò salutaria, unde ait Hipp. 2. Aph. somnus in quo morbo juvat non lethale, quæ verò juvare deberent, & non juvant sunt signa valdè lethalia, ut si multæ vacationes arte, aut natura factæ, quibus humor peccans diminutus sit, egrum non sublevent. Quod si non modò non juvent quæ juvare deberent,

Ssrent,

rent, sed præterea noceant, sunt signa lethalia, ut si quis ex evacuationib. rationabiliter factis debilitetur, morbusq; crescat, qua ratione ai Hipp. morbum eum lethalem, in quo morbus laborem facit. Verum quia in eorum, quæ juvare deberent, administratione aliquando adveniunt mala præter rationem, & pariter delitescere videntur morbi citius, quam in eorum natura, copiaq; humorum ferat, jubet Hipp. 2. Aph 27. iis, qui non ex ratione levius se habent non oportere fidere, neque rursus formidare mala, quæ præter rationem eveniunt, plurima enim talia stabilia non sunt, nec multum durare consuevere. Si igitur morbus acutus nulla facta evacuatione, sed ne apparentibus quidem signis coctionis cessare videatur, non est signum salutare, quia mox savius recrudescit; Contra si apparentibus signis coctionis, natura item

Va-

valida existente, ac nullo errore externo commisso, nova adveniant symptomata, uti graves somni, inquietudo, jactatio, anxietas, &c. non est signum lethale, imò plerumque salutare est, futuramque crîsim citò prædicit. Deniq; causæ foventes in præfagienda salute, aut morte non sunt prætermittendæ cum scribat Hipp. 2. Aph. 44. qui natura admodum sunt crassi citiùs interire, quam qui *graciles*, internæ enim putredines à densitate corporis foveantur, raritate solvuntur. Propterea videmus tempore pestis facilius quidem infici mulieres, ac pueros ob corporis laxitates, citiùs autem, ac faciliùs interire viros obejusdem densitatem.

Tertius, ac longè uberrimus lethalium, salubriumque signorum fons ab effectibus derivatur scilicet actione læsa, qualitate mutata, & excrementis. Actio læsa in ge-

Ss 2

ne-

nere est signum non lethale, quando parva est læsio, magna autem læsio præcipuè actionis, vel ipsi ministrantis vitæ periculum minatur. Quando autem actio est ad vitam magis necessaria, tantò majus est in ejus læsione periculù, ut propterea cordis actiones, maximè omnium sint considerande, non ille quidem, quæ ad irascibilem facultatem pertinent, quæque ad causas externas referuntur, atque ad appetitum sensitivum verius pertinent, sed quæ ad vitalem facultatem spectant certum præstant futura salutis, aut mortis indicium; spectant autem ad vitalem potestatem spirituum vitalium generatio, eorundem communio cum omnibus corporis partibus, & calor ipsorum conservatio, utrique verò pulvisca facultas cordis, & arteriarum inservit. Ex iis operationibus, ut aliquid certi prædicatur, adverten-

tendum primò periculosius esse si virtute vitali labefactata superveniat morbus, quam si morbo superveniat virium debilitas. Secundò minùs etiam periculosam noxam quæcumque his facultatibus eveniat per consensum, non autem propter essentialem cordis affectum: Nam corde primariò affecto reliquas virtutes totius corporis deficere oportet; at corde per consensum patiente reliquæ virtutes non ita debilitantur: Nulla tamen cordis passio est contemnenda quamcunque ob causam eveniat, præsertim si causa interna sit, tum quia cor interim, dum patitur, cæteris partibus non fert suppetias, tum quia verendum est, ne tandem essentialis affectus in corde fiat. Tertiò advertendum læsiones cordis, quæ citò recedunt nihil certi portendere, sed vel tales perseverare

Ss 3

opor-

oportet, vel sæpius reverti. Imprimis verò generationis spirituum cessatio lethalis est, maximè si frequenter fortiter, & absq; causa manifesta eveniat, unde Hipp. 2. Aph. 42. qui frequenter, ait, fortiter, & absque causa manifesta exsolvuntur, repentiè pereunt. Sunt hæc symptomata semper lethalia, quando in morbis acutis superveniunt egro jam debili: Atque si iis recedentibus causa perseveret, viresque non instaurentur proxima est mors. lethalißima est quoque abolita spirituum influxio, & conservatio caloris partium, quando perseverat, vitioque cordis oritur: Unde refrigeratio extremorum, & sudores frigidi totius corporis proximam mortem antecedunt. Rarum est enim, quod Venetiis observavi in præcipua Matrona, quæ cum integro tridui spacio ab undecimo die ad decimum quartum usque febre ma-

ma-

maligna laborans totos artus habuisset frigidus, ac in frigidus sudores assiduos secundum frontem, ac sternum soluta fuisset, nihilominus convaluit. Quod si caloris influxio, vel à causa externa impeditur, ut in metu, ac repentina tristitia, vel interna causa non perseveret, ut in principio Februm intermittens non est signum lethale. Motus vitalis depravatus minus est periculosus, quam diminutus, vel abolitus, hic enim semper est lethalis, ille non semper. In acutis feb. tremor cordis ut plurimum est lethalis, si febris absit vix unquam est lethalis. Vera palpitatio in agro debili plane est lethalis, in aliis rarissime persanatur. Sed quia pulsus evidentissime monstrat virtutum vitalium statum, præcipua signa salutis, ac mortis ex ipsius læsione desumuntur. Pulsus parvus, ac languidus semper est malus, sed in mor-

borum principiis est lethalis, maximè si fiat ab imbecillitate virium, non ab earundem suffocatione. Tardissimus, ac rarissimus pulsus parvitati junctus caloris vitalis extinctionem, & proximam mortem significat. Pulsus valdè durus in interiore inflammatione est lethalis, quia maximam indicat inflammationem, est etiam lethalis, quandoque exsiccatione arteriæ provenit, ut in marasmo. Magnùs verò vehemens, & intercat. moderatus semper est signum salubre, cum virium robur indicet. Celeritas, ac frequentia ex se, nec salutem, nec mortem significant, nisi unà considerentur aliæ differentiæ: V. G. pulsus celerrimus, ac frequentissimus in principi morbi est lethalis, quia necessario est parvus, & languidus morbi que vehementiam arguit. Pulsus inæqualis æqualiter, & maximè inæqualitate
 sy-

systematica est lethalis, minùs periculofus est inæqualis inæqualiter, ac si pulsus inæqualis ordinem fervet est pejoreo, qui est perturbatus. Inter pulsus inæquales abolitus est deterrimus deinde miurus deficiens, vermicans, & formicans, proximam enim mortem significant. Pulsus caprizans, cujus ultima pars motus est vehementior prima, semper est signum salutare, lethale verò, cujus ultima pars motus est debiliior prima, diciturque dicrotus. Tremulus pulsus in feb. semper est periculofus, ac si una intermittat est valdè lethalis. Illud tamen observandum ne ex intermittentia, aut inæqualitate pulsus de salute, aut morte sententiam feras, nisi tibi explorata sit ægri natura: quia tales pulsus quibusdam sunt naturales, ac perinde in morbis nihil boni, aut mali indicant. Omnino indicia salutis, ac

Ss 5

mor-

mortis, in compositis pulsibus præcipuè defumuntur à debilitate, ac parvitate, cujus quò magis fuerit particeps pulsus, eò erit periculofior.

Actio naturalis quando rectè celebratur semper est signum salutare, magna ejus lasio tanto est pejor, quanto magis occupaverit partes, quib. communis nutrimenti elaboratio dicata est, unde scribit Hipp. 2. Aph. 35. in quovis morbo partes ad umbilicum, & imum ventrem attingentes crassitudinem habere melius est, multum verò extenuari, & contabescere pravam. Quia verò concoctione valida existente excrementa cocta emittuntur, fit ut omnia signa coctionis sint semper bona, ac si in principio apparuerint celeritatem judicii significant, signa autem cruditatis sint mala, nam hæc diu perseverantia, & ab initio cum virium robore morbi diuturnitatem

tem significant, cum virium imbecillitate mortem: cibi fastidium, non modo in quocumque morbo diuturno est malum, ut notat Hipp. 7. Aph. 6. sed etiam in acuto. Pessimum est illud, quod ad cibi abominationem pervenit, ita ut ægri malint mori, quàm cibum capere, aut siquidem edant plurimum affligantur, nam cibi abominatio est causa, ut vires citò concidant, ac præterea insignem caloris nativi labem arguit. Unde inquit Hipp. 2. Aph. 33. in quovis morbo bene se habere ad oblata bonum, contrarium verò malum. Carentia sitis in feb. acutis (nisi adsit aliqua destillatio pituitosa ad fauces, & oesophagum) est signum valdè lethale. Nam vel delirium significat, vel caloris extinctionem. Si de expultrice sermo sit, quæcunque naturalis, & consueta excretio debito tempore, &

Ss 6

per

per convenientem locum facta est
signum salutare, perturbata verò
semper est mala, & quò majus est
expultricis irritamentū eò pejor est
excretio. Singultus in feb. cum vi-
rium debilitate est lethalis: In acu-
tis verò febrib. semper, unde feb.
singultuosa dicta inter mortiferas
recensentur. Omnium pessimus
singultus cum oculorum rubore, &
vomitu 3. Aph. 3. nec non à vulnere
cap. quia magnam cerebri inflam-
mationem significat, deniq; inter
inflammationibus superveniens
singultus perpetuò est lethalis. In
feb. continuis si rigor incidat feb.
non desinente ægro jam debili le-
thale est 4. Aph. 46. contra verò ri-
gor superveniens feb. ardenti, si nec
debilis sit æger, nec febris perleve-
ret, morbi solutionem significat 4.
Aphor. 18. Inter actiones acciden-
tales primam vim habet respiratio
ad indicium salutis, aut mortis. Ve-
rum

rum ut ex mala respiratione valida argumenta imminentis mortis desumimus, ita ex bona respiratione nō semper securitatem morbi conijcere licet. Et si enim respiratio bona semper est signum non lethale, in morbis tamen malignis, ac pestilentibus ex bona respiratione nil colligi potest, quia virtus vitalis ante dissolvitur, quā insignes in respiratione mutationes accidunt. In plerisque affectibus cap. nim. soporosis tantum est vitæ periculum, quanta adest, vel imminet respirationis læsio. In feb. acutis lethalis est respiratio parva, ac frequens, in qua pinna nasi moventur, ac si in expiratione thorax quasi collabatur tanquam si virtus motrix gravitatem pectoris regere non queat, vicinam mortem significat, ut & respiratio obscura, ac ferè quoad sensum abolita, lethalis est quoque respiratio rara, & ma-

Ss 7

gna,

gna, cerebrique inflammationem, ac delirium significat, item respiratio extensa, qua luctuosa suspiria expirando efficiuntur. Adde respirationem, quam urgentem vocant, nec non strepentem, ut in stertore. In illa thorax celerrimè movetur cum exsufflatione, fitq; à natura copia humorum putridorum, fuliginumq; deducta: In ista inspiratio fit cum strepitu ob instrumenta spiritus summè coarctata. Utraque igitur vicinam mortem significat. Sed & aliæ sunt motricis facultatis affectiones periculi plenæ, aut spei: Imprimis decubitus ægri quam simillimus decubitus ejusdem sani, adhuc corpus in quodlibet latus facilè vertere, brachia movere sine adminiculo, sine labore surgere cum oportet bonum, & semper quidem salutare, si in statu morbi, vel augmento perseveret. Contrarium verò malum,

lum, quando in principio, vel in
augmenti parte apparet, cum ma-
ximam virium debilitatem signifi-
cet. Item Hipp. in Coacis malum
esse dixit supinum decubitum ma-
ximè cervice, & cruribus extensis
(nisi naturalis sit decubitus) quia
in eo situ motrix feriatur, nec po-
test corp^o vertere jam devicta ipsius
vi à gravitate corporis. Supinus
decubitus, sineq; sit naturalis, nec
ventris dolores adsint, est lethalis,
deliriumque significat, ut & motus
convulsivi brachiorum, crurum,
ac manuum, earundemque assi-
duus tremor, aut gesticulatio. In
feb. valdè acutis ventriculi, Hypo-
chondriorum, & maximè totius
corporis palpitatio est lethalis, quia
magnam caloris resolutionem fa-
ctam fuisse ostendit, de qua re apud
Hipp. historias pete r. Epid. sect. 3.
tex. 21. Convulsio feb. acutis super-
veniens, nisi cæ permutatione
maç

materia fiat, est lethalis, nervorum-
que sequitur exsiccationem. Stri-
dor dentium in acutis feb. si deli-
rium sequatur est lethalis, mortem-
que vicinam significat, si delirium
præcedat illud imminere præfagit.
Ad cognoscentis facultatis lætio-
nes quod attinet, ut mentē consta-
re, & ad omnia oblata rectè se ha-
bere est bonum, ita pro varia men-
tis alienatione, ejusq; causæ con-
ditione majus, aut minus pericu-
lum impendet. Delirium conti-
nuum superveniens feb. acutis est
lethale, ac si ægrum jam debilem
corripiat, mors in propinquo est.
Delirium ferinum, aut quietum, &
obscurum, qualis in phrenitis, hec-
tica lethale est, somnus item cum co-
lorem facit est lethalis. Sopor feb.
superveniens in statu, ac declina-
tione particulari est malus, ac si
feb. sit valdè acuta, vel addita inter-
na aliqua inflammatio est lethalis.

Vi-

Vigilia assidua feb. superveniens cum signis cruditatis, aut corruptionis humorum est pessima, cum signis autem coctionis non est mala, quia ut plurimum significat futuram crisin per sanguinis excretionem è naribus. Fatuitas læsioque Memoriz febr. superveniens, si feb. solvatur insanabilem quidem affectum, sed non lethalem significat. Aurium ingens sonitus in principio aut augmento acut. est malus nisi mox sanguis è naribus fluat. Apparentibus autem signis cruditatis est lethalis, proximum delirium significat surditas perseverans, in principiis acutorum superveniens est lethalis, eamq; mox delirium subsequitur. In statu morbi superveniens, si æger sit debilis, & adsint signa corruptionis humorum extinctam vim rationalem, & vicinam mortem significat: Si adsint signa coctionis, nec adeo imbecil.

becillus sit æger futuram crīsum
 per abscessum retrò aures prænun-
 ciant. At si apparentibus jam pa-
 rotidibus surditas superveniat, est
 penitus lethalis. Intuitus fixis ocu-
 lis, & vel micantibus, vel squallen-
 tibus in morbis acutis est lethalis,
 veluti ægrum jam debilem adstan-
 tes, ac familiares non cognoscere.
 Dolor magnus in acutis superveni-
 ens ægro debili, & cum signis malis
 est lethalis, at in signis bonis, ut plu-
 rimum est signum decretorium.
 Nam dolor cap. in juvenibus san-
 guinem è naribus fluxurum, in se-
 nibus superventuras parotides si-
 gnificat, dolor ventris dejectione-
 nem. Sed ut ex dolore certius
 quid pronuncies, attentè inspiciē-
 da est doloris causa, pars affecta,
 ejusdem magnitudo, duratio, &
 ægri virtus. Nam vehementissimi
 dolores continui in ægro non forti
 feb. superveniente, ut plurimum
 sunt

sunt lethales. Cardialgia inter omnes doloris species est perniciosissima, post ipsam angor, .i. ineffabilis quædam molestia oris ventric. in febr. b. continuis est maximè lethalis, ac vix nisi in febr. mali moris reperitur.

Ab excretis plurima desumuntur indicia salutis, & mortis, cum illa præcipuè indicent morbi vehementiam: Quamquam neutrum immediatè significant, sed quatenus sunt effectus fortis, aut debilis facultatis. Priusquam verò præfagia salutis, ac mortis proponantur quædam admonere oportet, quibus veluti regulis prædictiones istæ diriguntur. Primum enim in omni excreto quantitatem, qualitatem, excretionis modum locum, tempus, & ordinem spectare oportere, ut inde certum, quid prædicatur. Secundū est præcipua signa salutis ac mortis ab excre-

cre-

crementis sumi quatenus cruda sunt, aut cocta, ac signa quidem perfectæ coctionis salutem pollicentur: Sed tamen cum iis signis observandum est, an remittantur accidentia, & impediri possit coctorum excrementorum expulsiō. Potest enim mori eger in statu cum signis perfectæ coctionis, si expultrix, vel languida, vel impedita excernere nequeat cocta excrementa, ut evenit Erastionacti, qui ex suppuratis parotidibus interiit. Præterea in morbis Thoracis licet cocta sint excrementa si virtus animalis sit debilis sine cuius auxilio excerni nequeunt non sunt periculi expertia: Ita in internis inflammationibus suppuratis, si vacuari nequeat, mori oportet. At excrementa imperfecte cocta, si cum aliis malis signis jungantur sunt lethalia, præsertim si talia diu perseverent, juncta verò cum bonis signis

gnis longitudinem morbi significant. Porro si coctionis signa statim in principio morbi acuti apparentia paulò post delitecant sunt lethalia, si perseverent, sensimque ad perfectam coctionem tendant, celeritatem iudicii pollicentur, ut de sputis in pleuritide statim advenientibus ait Hipp. 1. Aph. 12. In morbis etiam à materia heterogenea provenientius non est fidentum nisi coctioni perfectæ, evenit enim aliquando, ut una materia coquatur, altera, quæ deterior est, cruda remanente, quo tempore si feb. cesset recidiva est expectanda, ut in feb. autumnalibus contingit. Quod si signis bonæ coctionis critica signa superveniant indicium est illico subsecuturam crisin, & cum ea salutem. Eadem autem critica signa supervenientia signis cruditatis, aut corruptionis citam mortem significant; Signa integræ cru-

cruditatis, diu perseverantia cum virium robore diuturnitatem morbi significant, cum debilitate mortem. Signa corruptionis excrementorum perpetuò sunt lethalia, maximè cum in augmèto, aut statu apparent, quo tempore naturam coctioni incubere oporteret. Differunt autem quodammodo excrementa cruda à corruptis: nam licèt utraque sint inconcocta, atq; adeo coctis opposita id est lata appellatione cruda: Tamen cruda propriè sunt ea, quæ per caloris actionem coqui, & perfici possunt, corrupta autem sunt inconcocta per negationem, quia coctionem non recipiunt, siue ob materiæ pravitatem, siue ob caloris imbecillitatem. Intercepta cruditas dubium eventum semper significat, & infidum fore iudicium ostendit. Cæterùm humorum conditiones sensibus explorari nequeunt, nisi aut

aut

aut vacuētur, aut ad cutis extimam
superficiem ab interioribus par-
tibus transferantur. Vacuantur vo-
mitu, dejectione, mictione, sudore,
spuito, hæmorrhagia, vel simili efflu-
vio, quemadmodum pus ex ulceri-
bus quamcumque partem obtinet,
effluit. Transferuntur ad cutem in
Ictero, in abscessibus retro aures,
morbillis, ac variolis, aliisq; pustu-
larum eruptionib9, pruritu, ac sca-
bie, à quibus omnibus varia hau-
riuntur salutis, ac mortis præsa-
gia. His autem vacuationes sumo
non ut principales affectus, sed ut
aliorum morborum accidentia.
Vomitus igitur cum singultu, &
oculorū rubore est lethalis 7. Aph.
3. quicumque vomitus cibi, vel in
chronicis, vel in acutis morbis diu
perseverans est periculosus, ægro
autem debili est lethalis maximè
in acutis, & in morbi statu, ac
peior est solius cibi vomitio, quàm
¶

si excrementa cibo misceantur. Hoc enim expultricem irritari ab excrementis significat, illud verò expultricis debilitatem à sola cibi gravitate opprimi ac stimulari. Omnium pessimus est vomitus cibi inalterati, si non statim à sumpto cibo fiat. Exsolutionem enim caloris significat, & in morbis magnis paulò ante mortem accidit. Vomitus diversorum excrementorum sive unà excernantur, sive vicissim in principio acutorum cum virium robore longitudinem, ac difficilem morbi solutionem significat, cum virium debilitate lethalis est. Vermium vomitus in augmento, aut statu acutorum est timendus, tum quia putredinem indicat, tum ob gravissima symptomata, quæ vermes in ore Ventric. excitant; Vomitus paucus, & valdè frequens in acutis, ut plurimum est lethalis, quia summum irritamentum caus-

semorbificæ indicat, & expultricis imbecillitatem. Vomitus atræ bilis lethalem vocat Hipp. in principio morborum 4. Aph. 22.

Pariter est lethalis vomitus copiosus, ac frequēs materiæ peccantis, si interim malum non remittatur; nam præter materiæ copiâ etiam significat, vel ipsam intro retrocedere, vel à debili calore amplius expelli non posse è venis ad ventriculû: Pessimi sunt quoq; vomitus porracei, lividi, fœtêtes, nam cum virium imbecillitate mortem perpetuò prænunciant. Vomitus sanguinis qualiscumque sit, malum esse statuit Hipp. 4. Aph. 21. At minus est malum si accidat sine febre, quàm si cum feb. 7. Aph. 38. Nam præsentē febr. facilè putrescit sanguis, ulcusq; excitatur, unde Hipp. 7. Aph. 88. à sanguinis, inquit vomitione tabes, & puris supernè purgatio. Illi verò vomitus sunt saluta-

T t

res,

res, qui sponte fiunt, cum vacuatione humoris peccantis, tolerantia viriū, & morbi imminutione Aph. 2. Sed, & inane vomēdi desiderium (nauseam vocant) in acutis sæpè est periculosum, arguit enim, vel materiam valdè acrem, & mordacem, quæ minima sui parte naturam valdè stimulet, vel expultricis importantiam. Minus est malum, sitantur à materia ventriculi tunicis impacta proveniat.

Dejectio, quæ similima est dejectioni naturali est salutaris, est autem optima, & maximè naturalis dejectio mollis, modicè consistens, parum foetida ad rufum vergens, quantitate respondens ingestis, & facta congruis interval-
lis post chyli distributionem: Ab iis conditionibus quantò longius recesserit; tanto erit deterior, & periculosior.

Dejectiones chylosæ, nigrae, lividae,

vidæ, pingues, admodum foetidæ
 in acutis supervenientes ægro de-
 bili velut cuiuscunque alterius hu-
 moris immodicæ egestiones sunt
 lethales, vermes in dejectionibus
 apparentes in augmento, aut sta-
 tu febr. ingentem significant pu-
 tredinem, maximè verò si mortui
 sint, neq; æger valetudinis tempore
 vermes gignere sit solitus: Ac si a-
 lia mala signa adsint sunt lethales.
 Salutaris est dejectio facta die
 critico cum tolerantia: At si die
 critico vestigia supervenientis di-
 arrhœæ cernantur, moxque desi-
 nant in morbi incremento lethale
 est. Bonum est quoque si in proflu-
 viis alvi mutationes excremento-
 rum fiant ad melius 2. Aph. 24. præ-
 fertim si varia excrementa non si-
 mul, sed ordinatè, & successivè ex-
 cernantur, id enim à natura vin-
 cente, & humores absq; perturba-
 tione secernente provenit.

T t 2 De

Dejectio sanguinea nisi critico motu ex hemorrhoidibus fiat, semper quidem est periculosa, in feb. verò ægro jam debili est lethalis.

Ab urina plurima signa lethalia, & salutaria desumuntur pro vario recessu à naturali urinæ statu. Est autem urina hominis sani subruffa, mediocris consistentiæ cum eo colore permanens, cum quo excreta sunt respondens quantitati potus cum hypostasi alba, laevi, & æquali, si mictionem ipsam consideres sive modum, quo urina excernitur, mictio copiosa & involuntaria in acutis feb. est lethalis, nam significat ob magnam cerebri inflammationem convelli vesicam, & insignem materiæ pravitatem, lethalis est etiam involuntaria mictio in acutis ægro jam debili, quia emortuam facultatem significat. Urinæ suppressio cum gravi lumborum dolore, ac febr. est lethalis, &

& à renum inflammatione oritur, est etiam lethalis in hydrope, quia jecoris calor citius suffocatur, ejusdem suppressio pessima est in acutis si cum convulsione, ac delirio jungatur: In statu tamen, apparentibus signis bonæ coctionis, urinæ suppressio cum rigore est signum salutare, & crism fore per sudorem prænunciat. Pauca urina in febr. acutis, nisi adsint sudores, ac liquidiores dejectiones semper est mala: quoniam retenta humiditas & putredinem auget, & calorem obruit. Sunt verò lethales in feb. cōtinuis urinæ claræ, quæ prius crassæ erant, si mentis alienatio superveniat: Urinæ sæt di, si absit calculus, item nigræ, ac tennes, quales ex caloris mortificatione fiunt: Crassæ, paucæque confusæ, & turbatæ cum virium debilitate, maximè si tales minguntur, & permanent, vel clarè minguntur, & paulò

Tt 3

post

post turbantur; Urina viridis, aut æruginosa in morbi principio lethalis est, in augmento, aut statu vicinam mortem significat. Urina oleaginea nisi vitio renum fiat in acutis est lethalis: Quemadmodum & nigra crassa nisi in morbi melancholici declinatione appareat, tunc enim critico motu talis redditur, cum virtutis sublevatione, urina cōtenta livida, aut nigra quamcumq; vasis partem occupent sunt lethalia, nam vel summam adustionem, vel caloris extinctionem significant.

Sudores in feb. acutis dieb; non criticis evenientes sine conferentia cum virium robore morbi longitudinem cum imbecillitate mortem: eandem prænunciant frigidi sudores circa caput tantum, aut circa vultum, ac cervicem in morbis acutis, at in leviori morbo ipsius longitudinem significant.

Col.

Colliquativus, & diaphoreticus sudor semper est lethalis, in acutis enim vicinam mortem indicat, in chronicis habitudinem prænunciat. Calidus sudor circa caput tantum, ac cervicem cum difficili anhelitu, vel anxietate in febr. acutis imminentem syncopen portendit. Est quoque lethalis sudor in acutis, qui fit cum rigore, aut horrore febr. non desinente. Sputa quæcunque pessimos colores, & odorem tetrum habentia in principio, ac statu acutorum sunt signa lethalia, quemadmodum & cessatio sputi malo non remittente, vel etiam si sputum maximè cum labore reddatur ob materiæ copiam, ac crassitiem, agro valdè debili: pessimæ sunt quoque hæmorrhagiæ guttatim factæ in acutis, diebusque criticis, ac planè lethales, si virium adsit imbecillitas; Abscessus criticè facti, si morbum non

minuant, sunt lethales: Aut si simul, ac apparuerint, mox recurrant. Parvi abscessus in morbis magnis facti sunt mali, quia morbum non judicant: neque tutæ unquam censendæ sunt parotides ob cerebri viciniam sive suppurentur, sive resolutione sanentur. Pustulæ ad cutem enatæ in acutis deinde intro regredientes sunt lethales. Quantò autem deterioris conditionis extiterint nigræ, lividæ ex atro flavescentes, ichorosæ, valde dolentes, &c. tantò certius mortem prænunciant. Icterus superveniens in feb. ante diem septimum inter prava signa recensetur ab Hipp. 4. Aph. 62. est autem signum salutare, si superveniat septimo, undecimo, aut decimoquarto, nisi dextrum ilium obduruerit, tunc enim est signum lethale 4. Aph. 64. & 6. Aphorism. 42.

Sed icterus ad mutatam qualita-

litem pertinet tertium sympto-
matis genus, à quo lethalia signa
desumuntur. Imp- imis facies simi-
lima faciei naturali in morbis a-
cutis signum est salutare 2. in 6.
Epid. 34. dissimillima verò qua-
lis est Hippocratica, & cadavero-
sa dicta, est mortis nuncia maximè
si non pendeat à causis externis,
nec sit admodum absimilis natu-
rali faciei ægrotantis, & tamen
minus mala in morbis chronicis,
quam acutis. Facies non multum
à naturali differens, & apparenter
sana in febribus continuis diutur-
nitatem significat, quæ verò citius
extenuatur, quàm ratio postulet
mortem 2. Aph. 28. In oculis hæc
lethalia signa passim leguntur in
Coacis. Oculi cavi lucem fugien-
tes, assiduò mobiles, alterius oculi
extenuatio & atrophia, livor vena-
rum oculi, splendoris amissio, oculi
squaliditas, rubrum album oculi

Tt 5 06-

occupans, lachryma præsertim in oculo cavo siccescens, palpebræ perversio, livor aut pallor; Hæc enim in acutis supervenientia, omnia quidem mortem pleraque autem vicinam significant: aures contractæ, frigidæ, & pellucidæ sunt signum lethale, viridis, livida, aut nigra facies in acutis est lethalis, & caloris extinctionem significat, mutatio coloris totius corporis ita ut modò unus, modò alter color appareat morbi longitudinem significat 4. Aph. 40. quia varii colores à variis pendent excrementis, quæ non nisi longo tempore vinci possunt: Ac si virium juncta sit imbecillitas ista mutatio fit signum lethale. Experientia etiam constat ruborem manuum, ac pedum in acutis paulo ante mortem cerni, ac protinus in livorem desinere. Livor totius corporis, vicinam mortem significat. Vnde adolescens rela-

tus,

tus 2. in 3. Epid. 80. qui cum tertio die extremitates haberet lividas septimo tantum die mortuus est, tandem servatus est ob insigne virium robur aliàs die quarto periisset. Idem significat color niger, si sit sine tumore, aut cum corporis gravitate, nam si cum iis signis appareat, & morbus imminui videatur, significat pepulisse adustam materiam extra venas, & longè à partibus nobilibus; Frigiditas partium extremarum diu perseverans in feb. continuis est valdè lethalis, quemadmodum totum corpus æque incalescere est bonum, & salutare, si alia bona signa conjungantur. Denique in cognoscenda futura salute, aut morte non est contemnendum signum à simili præcipuè in morbis populariter grassantibus, aut iis, quorum causam ratione planè assequi non possumus, ut propterea in arte ex-

erciti longè certius prædicere sci-
ant exitum morbi sumpta similitu-
dine ex iis, quæ quotidiana expe-
rientia observarunt.

*De signis longitudinis, & brevi-
tatis morbi.*

C A P U T X.

POSTquam constiterit, morbum
lethalem, aut salutarem fore,
investigandum est porro, brevine,
an longo tempore habiturus sit ex-
itum, quod sanè cognitu est diffici-
le, cum proportio agentis ad pas-
sum, seu efficacia naturæ pugnan-
tis, & causæ morbificæ resistentia,
à qua morbi pendet duratio sci-
ri exactè vix possit. Ut igitur ra-
tiocinando quam proximè asse-
quamur longitudinem & brevira-
tem morbi, scire imprimis oportet,
morbum brevem appellari,
qui

qui citò terminatur, longum, qui diuturno tempore vincitur, aut vincit, vel perseverat usq; ad mortem, brevium quidam sunt acuti, qui præter motus celeritatem habent etiam magnitudinem, ob quam periculo non carent: Quidam sunt non acuti, qui citò quidem finiuntur, sed periculo carent, ut Ephem. & tertiana exquisita. Neque est admittenda Petri Salii sententia primo de M. tex. 3. negantis omnem morbum acutum esse celeris motus. Aliud est inquit citò terminari, & celeriter moveri: Nam cita terminatio circumscribit breve spatium temporis totius morbi, cuius ratione morbus dicitur brevis, quia paucis diebus terminatur, at celeriter moveri non denotat tempus, sed conditionem motus, qui in illo tempore fit, unde quia morbi acuti à materia frigida non habent celeres accessiones, licet terminentur,

Tt 7

non

non sunt celeris motus, atque adeo non omnis morbus acutus erit motus celeris. Ex quo infert, dari posse morbos longos lethales, & celeris motus, quales ait esse Epilepsiā, & asthma, quia licet diu durent, celeres tamen habent accessuum motus; ideo Gal. cum 2. de D. decret. cap. 12. & 2. Aph. 23. ait, acutum esse, cujus motus est velox, & celeriter ad statum properat; respicere non qualitatem motus, sed ejus terminum, ad quem paucis diebus pervenitur.

Verum hæc sententia non est ad Gal. mentem, qui morbi acuti brevitatē, ab ejus celeritate non distinguit, & rectè: Nam morbus acutus non habet aliud spatium pertranseundum, quàm durationem, qua mensuratur, unde cum motus velocitas ex Aristotele 4. Phys. attendatur penes tempus, quo numeratur motus, brevis autem penes spa-

spatium, quod mobile pertransit, ac in morbo acuto eadem sit mensura & spatii, & temporis, non est brevitās à celeritate distinguenda: Ut igitur simpliciter verum sit, motus brevitatem, à celeritate distinguere: Quia tamen spatium acutorum consideratur penes durationem, qua materia morbifica movetur, & agit in corpus cum periculo; Non est in acutis necessaria hæc distinctio. Quando non est admitendum dari morbos acutos tardum motus, aut morbos longos celeris motus. Nam licet aliqua eorum pars sit celeris motus, tamen fit denominatio à toto morbo, qui ad suum terminum lentè deducitur, alioquin eadem ratione liceret appellare, hos morbos breves, quia ipsorum accessiones non modò sunt celeris motus, verum etiam citò terminantur.

Acutorum verò quemadmodum

va-

variae sunt differentiae, ita distincti termini. Exquisitè peracutus quatuor primis diebus terminatur. Peracutus simpliciter prima septimana. Exquisitè acutus undecim diebus si natura admodum sit robusta, sin minus diebus quatuordecim. Acutus simpliciter ad summum vigesimo die judicatur, non rarò decimo septimo, si virtus robustior extet. Quod si vigesimum pertranseat, fit acutus exdecidentia, & quadragesimo die terminatur: Ultra quem terminum appellari desinit acutus, fitque chronicus, adeo ut morbi chronici ultra quadraginta dies per se necessario prorogentur. Qui ex acutis chronici fiunt, si vires habeant satis validas habeatque materia aliquid stimulantis acrimoniae terminantur sexagesimo die, sin minus octuagesimo, & ad summum centesimo. Reliquorum chronicorum, qui ex acutis

cutis non fiunt, incertus est terminus, quem is solùm exactè metietur, qui naturę robur, & causę morbi ficę resistantiam æstimare poterit. Observandum tamen, morbos fieri breviores, quàm sua natura forent, si opportunis remediis naturæ succurratur; Ac propterea morbi longitudinem æstimandam esse non tantum penes proportionem naturæ agentis ad causam morbificam patientem, ac reagentem, sed etiam penes resistantiam causę morbi ficę ad materias remedium, à qua resistantia respectivam morbi magnitudinem sumi dictum est. Fiunt quoque morbi breviores, ex accidenti, quando ægrum ita languidum adoriuntur, ut totum morbi impetum sustinere non queat, ut plerunque accedit in morbis lethalibus: His notatis haurienda sunt signa longitudinis, ac brevitatis morbi à cõsuetis fontib.

Ad

Ad essentialiter inhærentia quod attinet; A specie, ac motu morbi prænunciatur brevitæ, aut longitudo. A specie. Nam morbi calidi cum materia cæteris paribus sunt breviores morbis frigidis; morbus fœcus, aut planè est insanabilis aut nonnisi longissimo tempore sanatur 7. Meth. 5. Omnis morbus acutus est brevis. Morbus magnus respectu causæ juvantis est longus, nisi mox aliundè adveniens malum breviet. Tumores, ac solutiones unitatis sanabiles tantò sunt longiores, quantò majores, lethales verò tantò breviores. Morbi complicati, & contrarii longiores sunt quam simplices. A motu morbi præcipuum sumitur argumentum nam quò longius abest morbi stat⁹, eò morbus est longior, eò brevior, quò status est vicinior, quia statum excipit declinatio, statum autem citò venturum conjicies, si statim

appareant signa coctionis, aut corruptionis : Si symptomata statim fiunt vehementissima : Sed si accessiones non ampliùs anteponan, verùm aquali hora revertantur, pariterq; affligant, & durent, jam adest status: Ac si à principio eadem hora fiant accessiones, diuq; durent cum signis cruditatis longissimum fore morbum indicant, si postponendo minùs durent, brevi finituum significat: Quæ sæpe anticipando præcedunt magisque affligunt, durantq; diutius, proximum jam statum, & morbum fore brevem ostendunt, ac si cum signis coctionis jungantur, salutarem, si cum signis cruditatis lethalem.

Causæ & ipsæ tum externæ, tum internæ quandiu duraturus sit morbus significant. Longiores fiunt morbi quando externæ causæ habent rationem conservantis morbos, & remediis adversantur,

tur, breviores verò evadunt quando habent rationem causæ juvantibus, & remedii. Si remediis opportunè adhibitis, statim levetur malum, brevis à juvantibus significatur: Si parum, aut nil remedia prosint, longum fore morbum significant, nisi ob ejus vehementiam æger citò pereat; Evenit autem quatuor præcipuè ob causas morbificam causam valdè resistere remediis, quæ omnes longitudinem morbi significant, & curationis difficultatem. Prima est, si remedia ad partem affectam afferri nequeant, nisi post multas alterationes, & viribus ferè exsolutis. Secunda, si medicamentum permanere nequeat in parte affecta, ut fit in ulceribus Gulæ ob ejus declivitatem. Tertia, si materia morbifica admodum sit crassa, viscida, dura, copiosa. Quarta, si natura non adjuvet, aut valdè debilitet vim remedii:

dii: Unde affectus partium nervo-
sarum, & ex sanguine longi censetur,
quia partes affectæ ob inopiam
caloris ægrè dissolvunt materiam
morbificam. Qua ratione ait Hipp.
destillationes in senibus difficulter
concoqui, & renum, Vesicæque vi-
tia in iisdem difficulter sanari. Pla-
nè dispositio naturalis tum totius
corporis, tum partis alicujus affe-
ctus multum confert ad cognoscen-
dam morbi durationem. Etenim
iisdem specie affectus longiores sunt
in senibus, quàm in pueris, & ado-
lescentulis: Diuturniores sunt, cu-
ratuque difficiliore affectus par-
tium ignobilium, ad quas natura
consuevit varia excrementa depo-
nere, ut sunt intestina, anus, glandu-
lar, uterus, renes, vesica; Vel quæ
ob propriam, aut contractam im-
becillitatem quodvis obvium faci-
lè suscipiunt, ut articuli, & Pulmo-
nes diuturna fluxione relaxati, sic
ob

ob partis dispositionem citius curatur vulnus in carne, quam in nervo. Ab internis causis efficientibus conjicies affectū fore diuturnum, aut brevem collatis humoribus, aliisque inde genitis inter se, & ad corpus, quod afficiunt. Nam quantò vehementiorem efficiunt morbum, tantò significant breviorē fore, quia natura extremos contus diu perferre non potest. At servata paritate longiores fiunt morbi à copiosa, crassa, lenta, indurata, *impacta materia*: Breviores à paucā, tenui, spirituosā. Ideò brevissimis sunt morbi à spiritu, ut eph. Postea à bile, & sanguine: Longissimi à Melancholia, & Pituita maximè verò impacta, aut indurata, quales sunt exacta suffusio, calculi, scirrhi, scirrhosi tumores, antiquæ obstructions uteri, & Hypochondriorum. A flatu fiunt breves affectiones, nisi adsit causa con-

continuo regenerans flatum, e-
jusque mineram, ut in tympani-
te, & ventriculi languidi inflatio-
ne. Si de symptomatis sermo
sit, actiones læsæ cum statim
deveniunt ad summam vehe-
mentiam adesse statum signifi-
cant, quia est vehementissima
pars totius morbi p. de cri. 8. at-
que ad eum morbi brevitatem indi-
cant.

Propterea scribit Hipp. I. Aph. 7.
Morbum peracutum cognosci, cum
protinus extremos habet labores,
itaque vehementia, aut remissio sym-
ptomatum in accessionibus statum,
aut propè adesse, aut proculabesse,
morbumque aut brevem, aut lon-
gum fore indicat. Quia tamen sæva
interdum in principio morbi con-
spiciuntur symptomata, quæ adve-
niente statu delitescunt, quæque
non morbi propria sunt, sed causæ
morbificæ ad certas partes agita-
tæ,

ta, diligenter sunt distinguenda propria morbi accidentia ab iis, quæ aliundè pendent: Illa enim eadem habent tempora cum morbo, ista vix unquam, ac propterea statum morbi non indicant. Privatum verò virium vitalium, & naturalium imbecillitas in acutis morbum breviter mortis interventu, in aliis producit; Eadem vires validæ in acutis cum signis cruditatis arguunt morbi longitudinem, cum signis coctionis breviter; Ab excretis quatenus cruditatem, aut coctionem præ se ferunt (quæ signa mox apparentia vocat Hipp. 2. Aph. 12.) cognoscitur adveniens status: Ideò signa coctionis statim apparentia breviter; signa cruditatis diu perseverantia longitudinem, at signa corruptionis statim supervenientia una cum brevitate mortem significant, Qualitas mutata idem monstrat non raro. Lenta extenuatio

tio corporis in febribus continuis diuturnitatem significat 2. Aph. 28. quemadmodum in toto corpore mutationes accidunt, ita ut modò refrigeretur, & vicissim calefiat, vel color alius, ex alio oriatur 4. Aph. 40. Ingens durities in tumoribus, & obstructionibus morbi denotat insolubilitatem, quæcunq; alia durities longitudinem, ac difficultatem. Frigiditas in accessionibus intermittentium diu durans indicat longam fore accessionem, atq; etiam totum morbum, si in singulis circuitibus eandem rationem servet. Siccitas, & asperitas cutis in hecticis brevi adventuram mortem significat.

Restant signa critica, necnon coctionis, & cruditatis, sine quorum notitia incertam reddi necessarium est salutis, ac mortis præcognitionem.

Mu

De

De signis coctionis, &
cruditatis.

CAPUT XL

COctio, eique opposita cruditas, & inquinatio praesertim attenditur in sputis, urinis, alvi dejectionibus, pure ex ulceribus, ac vulneribus egrediente. Suntque tres ejus gradus: Debilis, & obscura coctio, quae in fine principii universalis morbi salutaris cernitur p. de Cr. 17. Coctio manifesta, quae augmenti principium significat, & perfecta, quae in statu morbi salutaris conspicitur? Quod de cruditate opposito modo est intelligendum: Nam exacta inquinatio, ac corruptio morbi lethalis statum designat, manifesta augmentum, obscura autem principii finem: At integra cruditas abs-

absque signis corruptionis primam, ac mediam principii universalis partem circumscribit. Verum cum coctio sit assimilatio rei coctilis cum concoquente, primò quidem quoad accidentia, quæ materiam disponunt ad receptionem formæ substantialis agentis, d inde verò quoad substantiam ipsam, ut evenit in completa nutritione, ac substantiali transmutatione alimenti, non idèò dicuntur excrementa cocta, quòd perfectè assimilata sint naturæ concoquenti, vel quoad formam, vel quoad naturalia accidentia; sed quòd eam elaborationem à naturali calore acquisiverint, quam ex propria dispositione recipere potuerunt proximè accedentem ad naturalia humorum accidentia, nam ad bonam concoctionem præter vim principalem nativi caloris agentis, quem externus,

Uu 2

&

& potissimum medicamentorum calor adjuvat, requiritur etiam dispositio passî, quod si nimirum recedat à naturali constitutione, facile vincitur, & assimilatur ab agente; si alienas qualitates contraxerit difficilius vincitur, quinimodò agens ipsum vincit, & enervat, si adeò pravæ sint alienæ passî dispositiones, ut naturalem calorem extinguat obruatque. Calor autem concoquit, disgregat heterogenea, & paulatim cogit homogenea quoad moderatam consistentiam acquirant. Cum coquere non potest, sive ob propriam imbecillitatem sive ob pessimam excrementi qualitatem, quæ acrem caloris actionem respuit, materias confusas finit, tenues non incrassat, crassas non attenuat: Quando ob agitationem, quam à calore debili sumunt excrementa, deteriores indicant conditiones, quæ

quæ devictum calorem nativum arguunt, ut sunt calor niger, lividus, plumbeus, fœtor, acrimonia.

Concoctæ censentur urinæ sub-
ruffæ, aut paleæres mediocris con-
sistentiæ, cum sedimento albo læ-
vi, & æquali, in fœminis, pueris,
aliisque, habitu humido præditis
copiosiori. Sed notandum, istas
esse notas urinæ exactè coctæ in
corpore benè temperato: Nam in
corpore bilioso, urinæ quantumvis
coctæ non omnia enumerata indi-
cia præseferunt, quia bilis tam pro-
bè elaborari non potest à calore.
Absolutè ergo præstat sumere no-
tas urinæ coctæ, aut crudæ respec-
tu urinæ corporis sani ante quàm
ægotaret, quàm facta compara-
tione ad optimam, & coctissimam
urinam, quæ convenit benè tem-
perato corpori. Universaliter e-
nim verum est, mensuram status sa-

Uu 3 norum

norum esse optimi corporis constitutionem, statum verò ægrotantium mensurari debere penes recessum à proprio statu naturali. Crudissima est urina alba, tenuis, perspicua, nullum habens contentam, tenuisq; permanens post mictionem: Minus cruda est tenuis, colore ruffo, flavo, aut rubro tincta. Quæ tenuis mingitur, & paulò post crassescit, obscuram indicat coctionem.

Urina crassa micta, & talis permanens, neque subsidens, sive sit ruffa, sive alba, semper est cruda. Quæ crassa mingitur, & paulò post attenuatur obscuram denotat coctionem, crassa autem in declinatione ac subsidens, perfectam arguit coctionem, hypostasis crassa, aut tenuis, cujuscumque sit coloris cruditatem significat: Suspensum matulæ fundum attingens, ac divulsus imbecillum, & obscuram

coctionem sequitur. Nubecula rubra, aut alba manifestam indicat coctionem: Livida verò viridis, aut nigra manifestam corruptionem. At rubra urina, & confusa, crassa & nigra extra tempus declinationis, crassa & viridis, crassa quævis, ac foetida, quæ ex partium mixtioni dicatarum ul. e. re non pendeat, perfectam indicant iniquationem, cum qua diutius stare vita non potest. Tenuis, & nigra summam cruditatem significat, quam non sequitur coctio, aut iniquatio, propter omnimodam caloris extinctionem, ideoque mortem portendit ante morbi augmentum: Nisi placeat dicere nigredinis gradus in urina tenuissima etiam gradus iniquationis, ac tam fieri manifestam iniquationem, atq; adeò augeri morbum, quando urina tenuis obscurum, ac plumbeum colorem contra-

Uu 4 here

here incipit, adesse verò omnimodam corruptionem, & morbi statum, quando planè plumbea, livida, atra reddita est urina: alvi excrementa perfectè cocta sunt molliora, modicè consistentia subrufa non admodum foetida: crudissima sunt liquida quemcunque colorem præ se ferant; Quæ prius liquida leviter crassescunt, obscurè cocta sunt. Dejectio sanguinea, ac chylosa, & pinguis ex substantificæ humiditatis colliquatione, licet propriè loquendo non sit rei cruda, & inconcocta excretio, quia tamen est toto genere præter naturam, & fæcum elaborationem impedit, cruda dici debet respectu naturalis excretionis alvi. Siccissima, & nigra fæces non coctionem, sed tostionem: at liquida excretio valde foetens, nec ullum sincerum excrementum referens, insignem arguit corruptionem, nigra verò, liqui-

liquida, splendens, liquata pici similis, aut erugini oleo solute iniquinationis ab urent calore facta index est.

Pus optimum, & concoctum est visu candidum, aut cineris probe excocti referens colorem, præsertim, si os aliquod affectum sit, est crassum, sibi undiq; simile, tangenti læve, ac minimè fœtidum i. de D. ff. febr. c. 5. Crudum est tenue, s. n. osum, modò unum, modò alterum colorem referens respondentem excremento semiputrido, sanguini mixto, qui in bonum pus converti non potuit; Cumque varia sint huiusmodi excrementa, & specie, & colore, & consistentia, sit ut imperfecti puris differentia latissimè pateant, uti Galenus ibi admonet. Ac pus saniosum, sublividum, gravissimè olens correctionem significat, tantò maiorem, quantò evid-

Uu 5 den

dentiora in ipso fuerint hæc accidentia,

De sputis crudis, aut concoctis, multa passim à se dicta velut epilogo colligit Galenus 1. Aphorism. comm. 12. Sputum inquit summam cruditatem indicat, quod omninò non spuitur. Tenuè verò debilis, & obscuræ coctionis, est signum, maximè si sit sincerum, ac minimè permixtum, vel flayum, vel ruffum. Si sit fœtidum, lividum, nigrum, æruginosum, corruptionem significat. At perfectæ coctionis, signum est sputum album, læve, æquale, mediocriter coherens, nec supra modum humidum, aut crassum: quanquam in inflammationibus pectoris fieri potest, ut sputum probè coctum sit rubrum, cum minimæ pleuritides solo sanguinis sputo, prima statim aut secunda die incipiente, septem dierum spatio terminentur. Coctio-

ne

ne autem terminantur diuturni
morbi à materia non admodum ir-
ritante pendentes.

De signis criticis.

CAPUT XII.

Cum crisis sit repentina mu-
tatio morbi ad salutem, aut
mortem, ea dicentur signa critica,
quæ hanc repentinam mutationem
prænunciant, quorum duplex est
genus, alia enim proximam mu-
tationem præcedunt, aut comitan-
tur, quæ propriè crisima signa à
Galeno vocantur 1. Aph. 12. suntq;
supervenientia, nec in principio
morbi apparere unquam solent:
Alia futuram mutationem longè
antecedunt, & etiam à principio
apparentibus ipsa morbi essentia
morbificæq; causæ proprietas judi-
-

Uu 6

cat

cat statim ab initio, quib. in morbis expectanda sit crisis. De utrisque hic sermo est, ut signorum ubertas certiore pariat crisis cognitionem, quæ ut exacta evadat, cognoscere in primis oportet, an sit expectanda crisis, tum quando sit futura, quo die, qua hora, cujus materiæ futura sit vacuatio, & per quem locum: Deniq; distinguenda est perfecta crisis ab imperfecta, salutaris, à lethali.

Futuram crisin indicat primum natura crisis, nam in omni morbo magno, ac celeris motus expectanda est crisis. In morbis chronicis contingit quidem aliquando post longam excrementorum coctionem naturam moliri causæ morbiicæ expulsionem: Sed primo id est rarum, cum chronici morbi salutares coctione terminentur, deinde ea vacuatio, cum non sit repentina mutatio, sed sensim facta
mi-

minus propriè crisis nomen meretur.

Secundo indicatur crisis à morbi, ac ipsius crisis natura. Nam si materia morbifica naturæ valdè sit gravis, & vel quantitate, ut in syncho, vel mala qualitate admodum irriter expultricem, visque expultrix sit valida certè superveniet crisis. At si virtus sit debilis, adeò ut pugnam aggredi non possit adversus causam morbificam, moriuntur ægri absque crisi. Quod si cum materiæ morbificæ irritamine, ac facultatis robore, adsit quoque viarum dispositio, per quas fieri crisis potest, non est de futura crisi dubitandum; ut si in morbo, in quo sudor rationabiliter expectatur, adsit magna raritas cutis, nec habitus corporis sit densus. A juvantibus, & lædentibus, non solùm futura crisis cognoscitur, sed etiam si qui motus acciderint ægro per modum

Vu 7

cri-

crisis facile à symptomatis distinguuntur. Itaque iuvantia coctionem crisis portendunt, quando in principio, vel augmento morbi magnas vacuationes non concomitantur: Siquidem vacuationes, quia materiam minuunt, roburque expultricis quadantenus frangunt, crisis quæ aliàs futura erat impediunt. Ita si motus accidentes ægro præsertim die critico vires sublevarint, morbumque remiserint, criticos fuisse certum est, unde Hipp. 2. Aph. 13. noctes crisis subsequentes leviores, esse ait, at si morbum non levarint, sed etiam viribus graves extiterint, non sunt critici censendi, & à natura dominante provenientes, sed symptomata. Tertiò indicatur crisis ab effectibus, seu supervenièntibus symptomatis ex forti pugna naturæ cum causa morbifica, cujus causa sit insignis agitatio materiæ adeoque.

varia sumptomata pro humoris agitati, partis quam petit, & naturæ roboris conditione, cujusmodi sunt rigor inexpectatus, repentinus cap. dolor, vehemens & inopinata dispnoea, hypochond. dolens cōtentio, vigilia, delirium, inquietudines, faciei rubor, spectra ante oculos obversantia, unde ait Hipp. loco citato, iis gravem esse noctem ante accessionem, quibus futura sit crisis. Sanè nunquam certius adventantem *crisim* cognoscere est, quàm cum sine ratione, & inopinatò gravia superveniunt accidètia, apparentibus signis coctionis, & valida existente natura: Quibus signis, ut metus assidentibus ægris; incutitur, ita medico proxima morbi judicatio indicatur. Similitudo, & ipsa futuram *crisim* interdum prænunciat. Nam si occurrat aeris constitutio, in qua plurimi affectus similes crisi esse terminati ab ini-

initio fuerint observati, speran'um
est omnes alios deinceps eadem ra-
tione terminatum iri. Talis fuit
constitutio Patavii M.DC.VIII. æ-
stivo & verno tempore, vere enim
omnes biliosæ feb. per cutanea tu-
bercula judicabantur, adveniente
autem autumnno pruritu ac sca-
bie superveniente statim solve-
bantur.

Quando futura sit crisis.

CAPUT XIII.

Futuræ crisis tempus, diem, &
horam, is solus perfectè divina-
bit, qui efficaciam naturæ, & causæ
morbificæ metiri didicerit. Nam
cur hoc, vel in illo die crisis fiat, id
equidem non diei, aut numero ad-
scribendum, sed vincenti naturæ,
cujus virtus cum finita sit, quemad-
modum finita quoque est morbifi-
cæ

causæ resistantia, & activitas, atque adeò una in alteram infinito tempore agere nequeat, & durare, donec ab unius parte victoria, subsequatur, sit, ut eo tempore iudicium accadat, quo natura domare potest causam morbificam, ex determinata efficacia propriæ virtutis agendi, & causæ morbificæ dispositione, in quibus si variatio aliqua contingat, accelerari, vel retardari crismum necesse est.

Dies itaque ac omnino tempus non aliter crismum indicat, quam ut est mensura agentis ac patientis finitæ virtutis, quam ut semper agere, ac pati impossibile est, ita tanto tempore vincere, aut vinci oportet. Sed quia nullus est mortalium, qui potentias activas suis gradibus definire possit, ideoque critici dies à priori constitui nequeunt. Diuturna observatio id tandem assecuta est, ut quanto tempore durare natu-

natura possit contra causam mor-
bificam in morbis acutis determi-
nare valeat. Quia igitur gratia ex-
empli observatum est, in morbo
peracuto apparente coctione se-
cunda die, crisin apparere septima
die, dicendum est naturam huma-
nam, ut similem causam morbifi-
cam vinci jam ceptam omnino su-
peret, aliorum quinque dierum spa-
tio indigere. Idem de cæteris die-
bus criticis est judicandum, quo-
rum unica est causa, limitata scilicet
naturæ, ac morbificæ causæ ac-
tivilas, ex intrinseca finita virtutis
constitutione, adjuvantibus causis
externis præsertim aeris calore, à
lumine syderum excitato, à quibus
causis alterutrius actio, vel juvari,
vel retardari potest. Etsi verò cri-
sis tempus à priori præcisè mensu-
rari nequeat, proximè tamen con-
jicere licet ex propriis signis, quan-
do ea futura sit. Imprimis verò
con-

considerare oportet morbi idæam,
vehementiam, ac motum.

Nam quo vehementior est mor-
bus, quò celerius ad statum prope-
rat, eò citius futura est crisis: Opti-
ma enim, nō nisi in universali mor-
bi statu, & exacerbatione paroxy-
smi cōtingit, tum quia perfecta co-
ctio ad bonam crisin necessaria an-
te statum non absolvitur, tum quia
in exacerbatione maximè pugnat
natura cum causa morbifica, & i-
psam maximè agit.

In principio aut declinatione u-
niversali nunquam expectanda est
crisis, ut propterea ridendi sint im-
periti Medici, qui in universali de-
clinatione pharmacum exhibere
volentes ad avertendam recidi-
vam dies criticos observant, ne ali-
quem naturæ motum præpediant.
Porro extremè peracuti primo
quaternario judicantur, peracuti
septenario, acuti simpliciter &

cx.

exquisitè tales decimoquarto die ,
 si natura sit valde fortis undecimo,
 non exquisitè tales vigesimo, si na-
 tura sit fortis decimoseptimo. Acu-
 ti ex decidentia à vigesimo, usque
 ad quadragesimum, nimirum vige-
 simoquarto, vigesimoseptimo, tri-
 gesimo, trigesimoquarto, trigesi-
 moseptimo, & quadragesimo, pro-
 ut major, aut minor coctio diebus
 indicatoriis observata fuit. Præ-
 terea qui morbi diebus paribus ex-
 acerbantur diebus paribus judi-
 cantur, ut legere est 4. Ep. 3. de La-
 rificæ virgine, & de Pithione, qui
 decima die hōratus est, qui ve-
 ò imparibus diebus exacerbantur,
 ut morbi à bile, imparibus quoque
 judicantur. Si itaque crisis dē
 cognoveris, ejus horam à morbi
 motu cognosces inquirendo ho-
 ram vehementæ accessionis, quæ
 præcessit, quoniam in vehemen-
 tiori hora totius accessionis, ac-
 sum-

summo ejus vigore crisis accidit, maximè quæ definit ad salutem, nam lethale judicium, & cum eo mors quocumque advenire potest tempore, quo gravissima accidentia succrescunt, quod nonnullis evenit in statu, moriunturque ex vi morbi, nonnullis in declinatione particulari, qui intèreunt ex languore, & dissolutione virtutis. Causæ etiam celeriores, aut tardiores crism ostendunt; Nam si anni tempus, regio, cæli status, natura patientis ad calorem non mediocrem inclinent, atque morbifica causa ejusdem conditionis extiterit, citò futuram crism necessum est, tardius autem, si magis ad frigidum vergat.

Verùm ab effectibus, seu symptomatis longè certius indicatur crisis tempus. Nam apparentes criticæ perturbationes, quas propriè dici crislina signa à Gal. notatum est,

est, significant crislum futuram in
proximæ accessionis vigore. De iis
agit Hipp. 2. Aph. cum ait noctem
præcedentem crislum esse gravem,
& 2. Epid. 2. ubi reformidat judi-
catoria statim in principio appa-
rentia: Nam per judicatoria non
intolligit signa coctionis, quæ secu-
ritatem, ac celeritatem iudicii sem-
per pollicentur, sed perturbationes
criticas, quæ instante crisi excluda
naturæ cum causa morbifica ino-
pinatè adoriuntur; Quoniam tales
non accidunt in principio nisi ob
ferociam humoris à natura non
domiti, & tumultuario motu varias
corporis regiones infestantis. In-
super quo modo symptomatum
vehementia, ac motus, universa-
lem morbi statum significat, eo-
dem significat & crisis tempus,
quod est totius morbi vigor: Siqui-
dem morbus sit ejusmodi, ut in eo
crisis expectetur. Ab excretis qua-
tenus

tenuis coctionem præferunt, illamque die iudicatorio ostendunt, præcipua temporis crisis indicia petuntur. Ac coctio quidem tanti est momenti ad crisin, ut scribat Galenus 3. de crilibus se neminem vidisse unquam mortuum, qui præcedentibus coctionibus esset iudicatus.

Coctio ergo apparens quarto die, si æger deterius habuerit, iudicium in quinto die promittit. Quod si error committatur, cujus causa vires labantur morbusq; celeriores motum requirat, ac per accessiones pares, iudicium futurum septimo die antevertet sexto die. Pariter coctio apparens quinto die iudicium promittit nono, aut undecimo. Si appareat septimo iudicium erit undecimo, nisi celeritas motus aliquando ob causam remissa iudicium protrahat usque ad decimum quartum diem, & tan-

tò

tò ultra deinde fiet iudicium quantum apparuerint dicta signa ultra septimum, nisi morbus celeriores acquirat motum. Verum si coctio apparet undecima die, iudicium fiet decimo septimo, ac si celerior fiat, decimo quarto, si tardior, vigesimo, & sic deinceps. De quibus indicatoriis, ac iudicatoriis diebus scripsit Hipp. 2. Aph. 24. cum inquit, septenorum quartus est index, & cætera. Caterum ne coctio apparens in prædicendo crisis tempore fallat, nihil ex coctione certi prædices, nisi sit continua, ac continuas per totum morbi progressum, ab eo tempore, quo apparuerit, ad finem usque. Nam cum varias ob causas retardari, & interrumpi coctio possit, præsertim vero errore Medici, ægri, aut assidentium, tantò magis retardari crisis potest, quantò majus impedimentum naturam à suo opere distraxerit, sed &

accc-

accelerari potest , si virtus aliquam ob causam gravata robustior fiat, quia & melius validiusq; coquit, & validius expellit. Unde colligo coctionis conditionem indicare crisin ejusque tempus quatenus coctio est, non quatenus hoc vel illo die apparet, nam ut judicatorius dies est terminus actionis nostræ in morbum , ob limitatam utriusque agendi ac patiendi vim, ita indicatori9 est signum durationis illam pugnam mensurantis, nō quatenus quartus , aut septimus, aut undecimus, sed quatenus certum denotat gradum coctionis, à qua nativi caloris robur , & materiæ morbificæ dispositio per se significatur. Verum illud quidem est, crises incidentes in dies intercalares , & minimè in judicatoriis diebus præmonstratas, infidas ut plurimum esse, at non ex propria dierum cōditione, sed quia signum

Xx est,

est, naturalem agendi ordinē, quem diuturna observatio certis diebus jam circumscripsit, perturbatum fuisse. Natura autem perturbata nihil satistutum agit. Sed tamen quocunq; die coctio proba appa-
 ruerit, & quocunq; crisis sequatur, dummodo naturæ robur adsit, magis est fidendum, licet utrumque in alienos dies incidat, quàm si coctio non æquè bona die indicatorio non appareret, & crisis die judicatorio sequeretur cum languore. Plerunque etiam apparere solent quædam præludia accidentium, quæ solent crisin præcedere juxta futuræ vacuationis naturam, & conditionem; ita ut eodem signo non modo judicii diem prædicere possis, sed etiam vacuationis speciem, V.G. si quis septimo die est sudaturus, quarta die levi sudore corripitur. Si fluxurus est sanguis per nares, aliquæ san-

sanguinis stillæ erumpunt. Nau-
seant quarta die, septima sunt vo-
mituri, Ventris torminibus corri-
piuntur, qui sunt Diarrhæa judi-
candi.

Quemadmodum verò signa co-
ctionis cum virium robore certis
diebus apparentia tempus bonæ
crisis prænunciant, ita contra si-
gna corruptionis cum virium lan-
guore diebus indicatoriis apparen-
tia eò die mortem adventuram por-
tendunt, quo fieri iudicium oport-
eret: Ut si quarta die signa corrup-
tionis appareant, viresque magis
languidæ, septima die mors expe-
ctanda est.

Neque negligendi sunt lunæ a-
spectus ad prædicendam crisis diem,
nam si in iudicatorios dies felices
incidant aspectus, eò certiùs ex-
pectanda est crisis, sin aspectus sint
mali, & nativo calori opem non
ferant, luminis & caloris benefi-

Xx 2

cio,

cio, verendum, ne aut tardetur crisis, aut admodum laboriosa fiat, quam ob causam critici dies, mensisque Medicus penes lunæ circuitum ab omnibus desumuntur, circuitum inquam, qui metitur reditum lunæ ad idem Zodiaci punctum, qui viginti septem dies tolaret, & octo æquinoctiales horas circiter comprehendit, quantum est spatium veri mensis Medici. Unde nec computari possunt dies pro cursu solis horarum, id est viginti quatuor æquinoctialium, nec proportionaliter debent dici solari tot horæ, quot diebus abest mensis lunaris à solari, ut inde veri dies Medici resultent, quia Lunæ motus est irregularis, & proportionaliter sumi non potest singulis horis, ac diebus, cum aliquando sit celerior, aliquando tardior. Pessimè verò faciunt Medici, qui in numerandis, & consti-

stituendis diebus criticis unicuique
 diei naturali unam horam demunt
 ut medicum diem constituent,
 nam lunaris peragratio fit viginti-
 septem diebus, & octo horis, id
 est sexcentis quinquaginta sex ho-
 ris æquinoctialibus. Quare si mo-
 tum proportionalem lunæ species
 singulæ septimanæ continebunt
 horas centum sexaginta quatuor,
 singuli verò dies horas viginti tres,
 & triginta quatuor minuta circi-
 ter, quæ ratione diei solari, ac natu-
 rali demi deberet triginta quatuor
 minuta, 17. secundæ circiter, non
 autem hora integra. Tunc ergo
 prima septimana medica comple-
 tur, cum nonaginta gradus sub Zo-
 diaco, id est tria signa percurrerit,
 tunc est quartus dies, quando ab-
 solverit quadraginta quinque gra-
 dus, quod aliquando celerius fit,
 aliquando tardius. Ita ut cum lu-
 na celerem habet motum, prima

Xx 3 se-

1038 *Medicina Pauperum*

septimana vera incidat in diem sextum Astrologiæ imperitorum opinione, & cum motum habet tardum incidat in octavum, unde, & in prædicendo die crisis errant, & in distinguenda perfecta crisi ab imperfecta. Quanto igitur tempore hi lunares quadrantes, ac septimanæ absolvantur, & quantum spatium singulis diebus luna percurrat ex vero lunæ motu qui in Ephemeride exprimitur, petendum est.

Qualis materiæ futura sit evacuatio, vel abundè ex illis ostenditur, quæ peccantem humorem indicant, fit enim crisis ejus materiæ, quæ peccat, cum natura pugnat, ab ea coquitur, vincitur, & expellitur, unde quæcunque materiæ non peccantis, & inconcoctæ fit excretio, ea non critica, sed
 symptomatica
 est.

Per

*Per quem locum futura
sit crisis.*

C A P U T XIV.

AT quomodo, & per quem locum futura sit crisis sedulo est explorandum, tum ut per loca conferentia, & quò natura vergit vacuemus, si adjuvandus sit naturæ motus; tum ne intemptivis remediis imminetent naturæ motum impediamus. Duplici autem modo accidere solet crisis, per excretionem, & abscissum, illa ad perfectam crism requiritur, iste sit translatione materiæ peccantis de uno in alium locum non sine novi affectus generatione, qui salutaris est, quando materia à loco nobili convertatur ad ignobilem, lethalis, quando morbus in deteriorem, vel æquè gravem permutatur.

Xx 4 Ad

An ergo futura sit crisis per vacationem, an per abscessum, inde cognoscitur, quod morbi calidi, ut plurimum per excretionem, frigidiores per abscessum terminantur. Fiunt aliquando excretiones etiam in chronicis, cum adest robur facultatis, humorisque ad aliquam partem propensio, & viarum præparatio, quâ ratione quartanas febres urinæ nigrae excretionem aliquando solvi conspiciamus: E contrario in acutis aliquando fiunt abscessus ob contrarias causas; Si verò materia morbifica sit valdè tenuis, ac fluxilis, valdè irritans, & viæ, ad quas humor inclinatur, sint apertæ, validaque expultrix, futura est crisis per excretionem. Propensio quoque humoris, ac dispositio corporis, idem indicat: Nam si quis tempore sanitatis frequentem habeat vomitum, aut frequentes sudores, incidatque in feb. ardentem, credibi-

dibile est per vomitum, aut sudorem solutum iri. Hac ratione quia pueris familiares esse variolas novimus, si quis ejus ætatis, qui variolis non laboravit, in synochum incidat, erupturas esse variolas opinabimur. Sed quoniam morbi à frigidis humoribus aliquando per abscessum finiuntur, aliquando per coctionem, illud quoque prædicere oportet.

Abscessum fore arguit primo dispositio materiæ, si crassa sit, acris, ideoque irritans expultricem, ita tamen, ut propter visciditatem, & copiam, sui expulsionem extra corpus prohibeat, quam ob causam in quotidianis, ac quartanis febribus sæpius fiunt abscessus. Contra si materia neque copia, neque acrimonia valde irritet expultricem, sola coctio expectanda. Præterea ubi magis vigere expultricem, quam concoctricem advertemus,

Xx 5

ma-

majus est futuri abscessus, quam co-
 ctionis indicium. Ac ut semel di-
 cam, omnes causæ producentes
 crassos, & multos humores, eosque
 genitos significantes, futurum in
 feb. abscessum prænuntiant. Cru-
 ditas urinæ toto feb. tempore per-
 severans cum aliis signis salutaribus,
 abscessum fore indicat 2. Prog.
 34. His adde signa particularia ab-
 scessuum quibus indicatur ad quam
 partem futurus est abscessus. Primū
 est humoris conditio, nam tenuis
 humor ad partes superiores, & exti-
 mas inclinatur, crassus ad internas, &
 inferiores. Secundum est situs ac
 natura partis mandantis, ac reci-
 pientis, nam pars valida expultrice
 donata ad longinquam transferre
 solet materiam, pars aliqua imbe-
 cillitate adventitia vel naturali præ-
 dita significat eò abscessum fore,
 præsertim si à parte affecta adsit re-
 cta via, per quam fieri possit ma-
 teriæ

tertiæ transpositio. Itaque si ante morbum pars aliqua laboraverit in eam morbus decumbet 4. Aph. 34. Si cerebrum afficiatur, expectanda sunt parotides, si jecur bubones, si venosum genus, abscessus articulorum, si cor, abscessus sub axillis. Tertium sumitur ab effectibus, nam ibi firmari solet abscessus, ubi dolores accidunt, & perseverant 4. Aph. 32. lassitudinem habentibus in feb. abscessum in articulos, & secundum aures potissimum fieri scribit Hipp. 4. Aph. 31. Rubor faciei, capitis gravitas, surditas cum sopore, urina crassa in febrib. continuis, parotides prænunciat.

Per quæ loca futura sit excretio, colligitur primo ex morbi natura, nam Phrenitides, & synochi fluxu sanguinis è naribus solvi consueverunt: feb. ardens, sudore, aut hæmorrhagia, aliæ feb. biliosæ, vel sudore, vel vomitu, vel alvi

Xx 6

fluxu,

fluxu, vel omnibus ex Gal. 4. Aph. 60. Pleuritis per sputum, aut urinam : Inflammatio Jecoris fluxu sanguinis per nares: Colligitur secundo, ex natura, situ, & connexu partis affectæ: nam gibba pars Jecoris affecta per urinam, aut sudorem, aut fluxum narium, cava per secessum, aut vomitum, excretionem fore significat. Cerebrum in calidis affectibus expurgatur per nares, in frigidis per aures, aut parotides, dextræ verò partes per dextram, sinistræ per sinistram expurgantur. Pulmones per sputum, lien per alvum, & vesicam, &c. A causa efficiente sumitur quoque argumentum: nam bilis tenuis crissim ocyus per sudorem, aut vomitum portendit, crassa per dejectionem, sanguis tenuis per nares, crassus per venas uteri, aut hæmorrhoides. Causæ dispositivæ corporis idem præmonstrant: etenim

enim si cui per sanitatem facilis, & familiaris sit vomitus, aut alvi fluxus, aut sudor, aut fluxus sanguinis è naribus, per eam partem ad quæ natura assuevit, critica excretio expectanda est. Ac si aliqua vacuatio consueta suppressa sit, ut menstrua purgatio, fluxus hæmorrhoidum, verisimile est naturam in facienda crisi ad pristinum opus redituram; ita si quis feb. ardente correptus habitum corporis habeat densum, in eo non est expectandus sudor, sed magis biliosa dejectio &c. Denique à symptomate futura excretionis cognoscuntur. Nam hæmorrhagiam narium præcedit faciei, & oculorum rubor, cap. & colli dolor, aurium tinnitus, narium pruritus, temporum pulsatio, aut gravitas, visus hebetudo, rubra spectra ante oculos obversantis, lacrymatio, & indolens hypoch. dextri distensio,

Xx 7

Qui-

Quibus apparentibus paulò pòst fluxurus est sanguis è naribus, maximè ætate juvenili natura biliosa, & feb. valdè acuta : Ac si in dextra parte evidentius apparuerint, fluet sanguis è nare dextra, & è contrario. Criticum menstruum antecedit gravitas, & æstus lumborum, hæmorrh. fluxum præcedit gravitas ventris, ac lumborum dolor, ac pruritus ani maximè in eo, cui innatæ sint hæmorrh. Sudorem futurum indicant rigor cum suppressione, aut imminutione urinæ, pulsus mollis, undosus, sensus halitusosi vaporis è toto prodeuntis, extimarum partium calor, maximè verò si horum aliqua die indicatorio obscurè apparuerint, & ambientis frigiditas sudorem non prohibeat. Instans crisis per urinas noscitur ex gravitate hypogastrii, pubis extensione, pudendi ardore, præsertim si in die indicatorio urina cocta co-
niosior

piofior fluxerit, quàm pro confuetudine. Vomitus criticum præcedunt cap. dolor mordicativus, tenebricofa vertigo, palpitatio labii inferioris, oris amaritudo, frequens fputatio, fastidium, anxietas cum naufea, aut etiam cordis morfus, frigus partium, quæ sunt ad hypoch. ac earundem rigor, fpirandi difficultas, pulfus durior, ac inæqualior, quàm ante, maximè fi patiens ad vomitum fit pronas, & indicatorio die infueta naufea præcefferit. Diarrhæam imminentem indicant tormina, ventris inflationes, rugitus cum dolore lumborum, alvi crepitus, pulfus minor, ac frequentior, urinæ albidiores redditæ, ac tenuiores, vel etiam planè fuppreffæ. Ac concurrentib. quidè variis fignis indicantibus vacuationes per diverfas partes, excretionè per unum locum fore fciendum eft: Si v. evidentiora fuerint v.g. futuri fudo-

sudoris indicia, quàm hæmorrhagiæ narium in feb. acuta prædicendum est sudorem jam jam uberiùs manaturum, sed fluxurum etiam aliquid sanguinis è naribus. Idem de reliquis intelligitur.

*Quomodo cognoscatur perfecta crisis
ab imperfecta, salutaris à le-
thali.*

CAPUT XV.

NEc verò sat est crisin prædixisse, nisi veram discernas à notha, perfectam ab imperfecta, quæ vel præsentem morbum non aufert, vel novum minatur, ex imminente recidiva periculum: nam si factum sit perfectum judicium, Medico nihil est agendum ulterius 1. Aphor. 20. at si crisis fuerit imperfecta, naturæ defectus est arte compensandus, quia quæ relinquuntur in morbis

bis post judicationem, recidivam
facere consueverunt 2. Aphor. 12.
Crisis ergo fore lethalem prænun-
ciat natura morbi maligna, pessima
ejusdem causæ qualitas, virtus de-
bilior in die indicatorio, cum signis
corruptionis, aut majoris crudita-
tis; à contrariis indicatur futura
crisis salutaris. An verò perfecta
sit, an imperfecta vera, an falsa, sic
distinguetur. Si motus die critico
incidens morbum nihil minuat, aut
etiam augeat, viresque non suble-
vet, aut etiam dejiciat, fuit motus
sympt. & falsa crisis; at si conferat,
vires sublevet, morbum minuat,
aut penitus tollat, crisisque appa-
ruerint indicia in die indicatorio,
fuit motus criticus, & à natura,
quem perfectum fuisse judicabis si
acciderit in statu universali, præap-
parentibus signis coctionis in die
indicatorio, si & talis vacuatus sit
humor, & ea quantitate quemad-
mo-

modum morbi, magnitudo postu-
labat, & per locum convenientem,
ideoque morbus recesserit, vires
sint resectæ, non relictæ sit in pulsu
frequentia, aut inæqualitas notabi-
lis, æger somnum capiat minimè
gravem, cibum benè appetat, &
concoquat, excretiones per al-
vum, & vesicam, ad naturalem con-
ditionem redierint, perfecta crisis
fuerit: Sin vacuata sit minor excre-
menti portio, quam requirere vi-
debatur affect^{us} vehementia, corpo-
risque plenitudo, neq; talis omni-
no vacuata sit qualis peccabat ma-
teria, si bilis tantum vacuatio fiat,
quando melancholiæ est permixta
(velut accidit in autumno, in quo
feb. aliquæ temporis spatio delite-
scere solent, post vacuatam tenuio-
rem materiam, deinde repullulare
ob novam putredinem crassioris
humoris intus relictæ) si post crisim
tendantur hypochole relinquatur cibi
fa-

fastidium, nausea, ructus, sitis, celeritas, ac inæqualitas in pulsu, aut somni fiant perturbati gravesq; urinæ appareant tenues, aut rubræ, alvus constipetur, aut liquida, vel nigra, exsiccata deiciat, imperfectam fuisse crisin certum est, & nisi opportuno remedio occurratur tempestivè, recidiva expectanda est. Addit Hipp. à typo sumptum, seu circuituum ordine: Nam si morbus pares habens accessiones, impari die iudicetur, recidivam expectat, & contra si morbus impares habens accessiones die pari iudicetur, quia nimirum naturam incoquendo, & expellendo perturbatam fuisse indicat ea sollicitudo: perturbatam autem naturam perfecta crisis raro sequitur:

Hæc de signis universim, compendioseq; dicta sint.

