

quandam vehiculi rationem obtinet.

Sed quia superius dictum est, simplicia esse permiscenda modò eadem, modò diversa quantitate; inquirendum est, quæ sit illa quantitas unicuiq; proportionata, qua misceri invicem debet basis, adjuvans, corrigens, & deferens.

C A P U T IX.

De Quantitate & proportionemiscendorum.

Cùm omne agens naturale determinatam postulet magnitudinem, ut operari possit; necesse est duos dari terminos, inter quos operatio commodè fiat, pro materia efficaciaq; cuiusq; agētis; unum minimæ quantitatis, infrà quod agens, per efficaciam suæ virtutis non amplius operetur: alterum ma-

Bbb

ximæ

ximæ quantitatis, cum qua agens perfectè potest agere, quantum ipsi per virium fortitudinem à natura concessum est, & supra quam, ob actionis diuturnitatem, maioremque resistantiam transfundere suas vires videtur.

Ideo singulorum medicamentorum triplex est dosis sive quantitas, quæ tam in compositione, quàm administratione medicamento spectanda est. Dosis inquam, *minima, maxima, & quæ inter extremas est, mediocris*, totam latitudinem inter extrema complectens. Hæc autem determinata quantitas, tamen nec dici nec scribi, nec commodè concipi possit: atque exactam cujusque simplicis miscendi mensuram ante expertam invenire non possumus, conicere tamen, judicare, ac componere pharmacum propriâ experientiâ possumus, nullum infirmi-

gni-

gniter improspere successum habiturum.

Primum ergo artificiali conjecturâ inveniam propriam cujusque simplicis mensuram: deinde ipsum magis particulariter determinabo ex iis, quæ experienciâ nobis innotuerunt.

Si ergo sermo sit de quantitate simplicium, ut constituit certam proportionem miscendorum: advertendum est, simplicia, quæ componuntur, alia habere rationem basis, nimirum quæ facultatem constituunt requisitam, ac rei auferendæ contrariam, sive unum sit tantum simplex istâ facultate præditum, sive ex pluribus commixtis confletur: alia habere rationem corrigentis, quæ scilicet superfluas facultates, nostroque proposito nullo pacto accommodatas castigant: alia esse adjuvantia, quæ vel medicamentum ad la-

Bbb 2 la-

borantem partem deducunt, vel
ibidem firmant ac sistunt.

Basis, quia præcipuum juvamentum præstat, ut plurimum debet esse quantitas, quam corrigentis & adjuvantis; cum per accidens tantum operentur, quatenus impedimenta remouent.

Proportio autem basis ad quantitatem aliorum ea ferè à scriptoribus observatur, quam experientia quoque confirmat, ut superet quantitatem adjuvantis & corrigentis, ad minimum proportionem dupla, ne basis facultas labefactetur, ad summum duodecupla proportionem, ut basi iuvamentum præstare possint: adeò ut adjuvantia & corrigentia nec infra subduodecuplam proportionem misceantur basi, nec supra subduplam. Hoc rarò tamen accidit, cum vel propter robustissimam actionem basis adjuvantia & corrigentia longè

gè superent basin dupla proportionem: vel è contra propter imbecillitatem basis, & robur adjuvantium & corrigentium, adjuvantia & corrigentia admiscentur basi infra subduodecuplam proportionem.

Prioris exemplum sit Bezoar, qui habet rationem basis, quando consilium est, humorum malignitatem retundere, & ad cutem protrudere; ut tamen ejus siccitas in curanda febre maligna corrigatur, & commodè per venas deferatur, grana 3. vel 4. Bezoar, vel conservæ acetosæ citri drachma una; ita, ut basis superetur vicecupla proportionem: vel ex aliquot unciis aquæ acetosæ, aut similis ebibantur, ita ut basis superetur plus quàm centupla proportionem.

Exemplum posterioris sint cantharides, quæ in pertinaci urinæ suppressione miscentur aliis diure-

Bbb 3 ticis,

ticis, longè infra sub duodecuplam proportionem. Quandoquidem media pars unius tantharidis, quæ vix pendet gr. 2. miscetur verbi gratia uni drachmæ conservæ malvarum, quæ habet grana 60. duo autem superantur à sexaginta trigecuplâ proportionem.

Ut igitur hanc miscendorum proportionem, quantum fieri potest, proximè adsequamur; accuratè sunt æstimandæ omnium miscendorum vires & hujus, quorum gratia commiscentur. Quæ sunt facultatis intensione debilia, majori quantitate sunt miscenda, fortia minori: quorum substantia faciliè resolvitur ac dissipatur, majorem quantitatem postulant: quæ lentius agant, tardiusque resolvuntur, ut crassa, densa, viscida, minorem. Quæ plures habent utiles facultates visceraque roborant, largiùs admiscenda, quàm quæ
pau.

pauciores habent facultates usui nostro necessarias : omnium paucissima oportet esse illa, quæ præter utiles qualitates, aliquas habent valdè nocentes. vel affectui ipsi vel causæ: ut sunt quæ qualitatem veneficam alicui alteri conjunctam habent. Illud præterea simplex parcè est admiscendum, quod in tota compositione non habet aliud suis qualitativis contrarium, à quo debilitari possit. Quando autem plura simplicia contraria habuerit, tantò majori pondere admisceri debet. Pariter, si basis in uno tantùm simplici consistet, erit copiosior: si plura similia pro cõstituendâ basi sumuntur, minor erit singulorum mensura.

Denique si medicamentum agere debeat in partes longinquas & profundas, plus ejus accipiendum, quàm si agere debeat in partes proximas, & superficietenus.

Bbb 4. Ideò

Ideò quemadmodum quantitas remedi-
ii administrandi in Methodo
medendi indicatur ab indicato,
sive affectu parùm aut fortiter a-
gente in remedium : ita in com-
positione medicamenti quanti-
tas simplicis commiscendi deno-
tetur à debili ex forti actione al-
terius, cum quo permiscetur, in
ipsum.

Verum enimverò quia æqualis
mensura simplicium componen-
dorum, vel inæqualis ratione pon-
deris comparari quoque debet ad
vim agendi cujusque naturalem:
cum, gratia exempli, non sit ea-
dem mensura ponderis, qua valet
agens in quarto, & agens in secun-
do; magis particulariter deter-
minata est quantitas pro cujusque
gradu facultatis: ut, cum su-
menda est æqua quantitas calidi
exempli gratiâ in primo, & cali-
di in 3; non sumamus idem pon-
dus

das Arithmeticè, sed proportionaliter, nempe mensuram, quâ unumquodq; calidum potest cum suæ virtutis efficacia corpus immutare. Cum itaque singuli gradus triplici mansionem definiantur; rationabile est; triplicem quantitatem seu dosim esse *infinam, mediam & summam.*

Infima dosis, verbi gratiâ calidi in primo, est illa quam requirit, ut illâ corpus calefiat in prima mansionem primi gradus: Summa, cum calefacit in primo gradu completo, ultra quam dosim si adhibeatur, propter actionis diurnitatem, & agentis resistentiam, eo ferè modo corpus nostrum immutabit, ac calidum in secundo gradu.

Et quia *activior forma minus requirit materia;* fit, ut quodammodo hæc dosium latitudo, quæ uni agenti convenire potest, quando ipsius

Bbb 5 vires.

vires nobis exploratissimæ non sunt; quoad gradus mansionem ita aptetur singulorum graduum mansionibus, ut quo agens est efficacior, eò minorem quantitatem requirat. Idèò summa dosis cõvenit illi, quod est tale in prima mansionem; infima illi, quod est tale in 3. mansionem. Atque ut hæc dosis constituatur, sumendum est principium à sensu & experientia, sine qua ratio in perfectam huius rei notitiam pervenire non potest.

Est autem experienciâ confirmatum, ea quæ summam habent facultatem, & in quarto, requirere ad summum grana 20. seu scrupulum unum; ad minimum grana 4. vel 5; ita ut nec infra gran. 5. suam operationem edant, nec supra grana 20. perferri possint à natura. Propterea hæc agentia (& hoc de omnibus aliis intelligendum) infra minimam dosin accepta, nunq̃

nunquam habere possunt rationem basis, licet possint adjuvantis aut corrigentis naturam induere: verbi gratia, diacrydium nec infra grana quinque vacuat bilem, nec supra grana 20. tolerari potest à natura, quia facit superpurgationem: si tamen infra minimam dosin, ut ad tria misceatur Khabarbaro, potest habere rationem stimuli & adjuvantis.

Quod si minima (dosis agentis in quarto minima gran. 5. mediocris exactè gran. 12.; Summa scrup. 1.) dosis est gran. 5.; summa gran. 20. exactè media erit gran. 12.; quia habet æqualem distantiam ad 5. & ad 20. Et quia magnam habet latitudinem media non exactè; prout egebimus operatione, mediam magis versus primam aut tertiam mansionem sumemus; vel supra vel infra 12. grana: sc. 8. aut 16. Quia

Bbb 6 verò

verò forma imbecillior requirit plus materiæ, ut agat; tantò maior erit dosis agentis in tertio constabit ex duabus extremis dosibus agentis in quarto, eritque scrup. 1. gran. 5. Et quia est proportio facultatis in tertio gradu ad suam materiam, quæ est facultatis in quarto ad suam.

Si summa dosis facultatis in quarto superat minimam quadruplo; necessarium est; id quoque evenire in tertia facultate, & aliis proportionaliter. Undè gran. 100. seu scrup. 5. erunt summa dosis agentis in tertio, mediocris exactè erit gran. 62.; id est, scrup. 1. gran. 2. Rursus quia eadem est proportio secundi gradus ad tertium, quæ est tertii ad quartum; minima dosis agentis in 2. erit gran. 125. seu scrup. 2. & gran. 5. Summa dosis erunt grana 500. sive drachma 1. & scr. 1. Media exactè

actè erit gran. 312. seu drachmæ 5.
& gran. 12. denique eadem propor-
tione infima dosis agentis in pri-
mo erunt gradus 625. sive drach-
mæ 10. scr. 1. gran. 5. summa dosis
erunt gran. 2500. sive uncia 5.
drachma 1. scrup. 2. Media autem
erit granor. 1562 seu unc. 2. drach.
2. & gran. 2. Temperati autem do-
sis minima erit gran. 3125. seu unc.
6. & gran. 5. summa erit gran. 11520.
sive uncia 26. & scrup. 1. Media
exactè erit gran. 5940. sive drachm.
13. & scrup. 1. Licet enim tempe-
rati proportio ratione virtutis nul-
lam habeat latitudinem ; ratione
tamen quantitatis, quam requirit
ad agendum, habet latitudinem
non exiguam, sicuti reliquæ fa-
cultates.

Hæc mihi visa est rationabilior,
& usui magis consona graduum &
dosium supputatio ; ex qua facile
adparet, quomodo sumenda sit æ-

Bbb 7

qua-

qualis quantitas duorum simplicium, ut ex utroq; compositum mediæ facultatis proveniat. Nam, gratiâ exempli, ex calido in primo, & calido in tertio velimus comparare calidum in secundo; sumendum est calidum in primo ea quantitate, quæ requiritur ab agente tali in tertio.

Et rursum sumendum est calidum in tertio ea quantitate, quæ requiritur ab agente tali in tertio. Propterea si lubeat accipere minimam utriusque dosin, ad hoc, ut fiat compositum calidum in secundo incipiente, sumes calidum in primo: gratiâ verbi, mastiches drachmas decem & scrupulum unum, calidi verò in tertio, ut cinnamomi, scrupulos quinque.

Non est autem necesse, ut præcisè compositum efficias ex tanta quantitate: sed sufficit, observare

vare proportionem, quam unius-
dosis habet ad dosin alterius: ut in
hoc casu: quia proportio drach.
10. & scrup. 1. nimirum scrup. 3 1.
est sextupla cum una quinta ad
scrup. 5. Sumes mastiches sextu-
plo plus quàm cinnamomi. Hæc
de ratione componendi medica-
menta, pro præsentî instituto sint
satis.

CAPUT X.

*Quomodo compositi medicamenti virtus
& dosis cognoscatur.*

AD alteram tractationis partem
quod attinet; inquirendum est,
quomodo compositi medicamenti
facultatem, dosinque cognoscamus,
præsertim ne nobis regula desit,
quam ad examinanda, quæ in An-
tidotariis continentur, exempla ac-
commodemus.

Ne-