

vare proportionem, quam unius-
dosis habet ad dosin alterius: ut in
hoc casu: quia proportio drach.
10. & scrup. 1. nimirum scrup. 3 1.
est sextupla cum una quinta ad
scrup. 5. Sumes mastiches sextu-
plo plus quàm cinnamomi. Hæc
de ratione componendi medica-
menta, pro præsentî instituto sint
satis.

CAPUT X.

*Quomodo compositi medicamenti virtus
& dosis cognoscatur.*

AD alteram tractationis partem
quod attinet; inquirendum est,
quomodo compositi medicamenti
facultatem, dosinque cognoscamus,
præsertim ne nobis regula desit,
quam ad examinanda, quæ in An-
tidotariis continentur, exempla ac-
commodemus.

Nec

Neq; pluribus heic agito contro-
versiam: an ex medicamento-
rum compositione, ac præsertim
post fermentationem, nova quæ-
dam forma generetur. Est enim
controversia partim inutilis, par-
tim in superioribus decisa.

Etenim *cum mixtio sit miscibilium
alteratorum unio*, medicamenta au-
tem in se agere non possint, ante-
quam à colore nostro in actum re-
ducantur: clarum est, compositum
non esse unum mixtum nisi per ag-
gregationem, neq; novam formam
substantialem ex composito resul-
tare, licet novus modus agendi
proveniat, ob variam agentium
mixtorum proportionem atq; con-
fusionem. Id docet Galenus, dum
inquit lib. I. de Antid. c. 10. compo-
sitorum medicamentorum virtus
ex simplicium vigore consurgit,
parva quadam intervenienti diffe-
rentiâ ex componendi arte. Par-

va.

va inquit, differentiâ: quâ omnium vires propriæ retinentur: quia dum compositione sibi apponuntur invicem medicamenta per minutissimas partes, non habent penitus eundem operandi modum. Quod si aliqua substantialis forma proveniret, solâ experienciâ dignosceretur; ac propterea nihil ad hoc institutum pertinet.

Querimus igitur facultatem manifestam, quæ ex mutua simplicium actuatorum alteratione oritur, eo pusque immutat. Cognoscitur autem hoc pacto: si in composito sint aliquæ facultates materiam habentes aliquam contrariam, compositum retinet illam facultatem in eo gradu, quo est simplex permixtum. Si contrariæ virtutes permisceantur, media inde resultans duplici viâ investigabitur.

PRI-

PRIMA.

Si ingredientium dosis sit proportionata, id est, si omnia simplicia sint in ea quantitate, quam requirit gradus, quem habent; numerandi sunt singulorum gradus, deinde summa quantitatis utriusque seorsim colligenda & dividenda per numerum ingredientium compositorum: quod prodidit ex divisione, indicabit qualitatem in composito dominantem; ut, si compositum constet ex tribus simplicibus in dosi proportionata mixtis, quorum unum sit calidum in tertio, siccum in secundo: alterum sit calidum & siccum in secundo: tertium sit calidum in primo, siccum in tertio. Quoniam tria simplicia composita ingrediuntur, signentur singulorum gradus: ita calidum in tertio habet caloris partes septem, frigoris

frigoris unam: calidum in 2. habet
 frigoris partes duas, caloris sex:
 calidum in primo habet coloris
 partes quinque, frigoris tres.
 Summa partium frigoris erit sex:
 summa caloris erit decem & o-
 cto.

$$\begin{array}{r|l} 18 & 6 \\ \hline 3 & 3 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 2 & 2 \\ \hline 3 & 3 \end{array}$$

Cumque tria sint simplicia, divide
 utrumque numerum per tria; pro-
 veniunt frigoris partes duæ, caloris
 sex. Ergo compositum illud erit
 calidum in secundo.

Eodem modo intelliges passi-
 vam qualitatem. Nam siccum in
 secundo habet siccitatis sex partes,
 & duas humiditatis: Tertium verò,
 quod est siccum in tertio, habet
 siccitatis septem partes, humida-
 tis unam. Quare partes siccitatis
 decem & novem erunt, humiditatis
 verò quinque, quibus per tria di-
 visis.

vifis, fient ficcitatís partes 6. cum una tertia.

$$\begin{array}{r|l} 18 & 1 \\ & 6 \\ \hline 3 & 3 \end{array}$$

Humiditas 1. cum duabus tertiis.

$$\begin{array}{r|l} 3 & 2 \\ & 1 \\ \hline 5 & 3 \end{array}$$

Erit igitur hoc compositum sic-
cum in principio seu prima man-
fione terti gradus.

SECUNDA.

Sive dosis ingredientium fit pro-
portionata, live improporcionata,
adeò ut vel plures doses sint unius:
vel aliquid infra minimam suam
dosin mifceatur; numerandæ sunt
ingulorum doses: quotquot erunt
anuis gradus doses, toties sunt gra-
dus illi numerandi.

Deinde summa graduum divi-
den-

denda est per numerum dosium :
nam ex divisione prodibit virtus
compositi: ut in dato exemplo. Si
calidi in primo & sicci in tertio es-
sent tres doses: ter numerandi sunt
gradus calidi in primo, & sicci in
tertio: quod habet nimirum cali-
ditatis partes quinque, frigoris tres,
siccitatis septem, humiditatis u-
nam. Si calidi & sicci in secundo es-
sent duæ doses, bis numerandi es-
sent gradus calidi & sicci in se-
cundo, quod habet calidit. & siccitatis
partes sex, frigiditatis & humiditatis
partes duas.

Summa igitur istarum dosium est
quinque dosium agentis calidi: ac
propterea, si summam partium ca-
lidity, quæ sunt 27. & summam
partium frigiditatis, quæ sunt 13.
diviseris per quinque; fient
quinque, & duæ quintæ calo-
ris,

fri-

$$\begin{array}{r|l} 2 & 2 \\ 27 & 5 \\ 5 & 5 \end{array}$$

frigoris verò partes 2. & 3. quintæ,

$$\begin{array}{r|l} 13 & 3 \\ 5 & 2 \\ & 5 \end{array}$$

eritque compositum tale calidum in prima mansione secundi gradus; quia licet duæ quintæ caloris faciant plus quàm una tertia, non tamen omninò efficient mediam mansionem.

Nec aliter temperatum in passivis qualitatibus colliges. Quòd si simplex aliquod infra mansionem suam quantitatem compositum ingrediatur; numerandæ sunt semel illius qualitates, ac si virtutem uno gradu inferiorem obtinuerit: ut, si dosis calidi in tertio, & sicci in primo sit infra minimam; numerandi sunt ipsius gradus, ac si esset calidum in secundo, aut calidum

in

in primo, prout dosis illa erit subdupla, aut subtripla ad minimam illius dosin.

Qui verò virtutem compositi colligunt, dividendo illud in partes aliquotas, expositis omnium partium gradibus, subtrahendo minorem numerum à majori, ut relinquatur gradus compositi; errant, (*Vales. 10. contr. c. 11.*) cum non habeant rationem ad proportionem quantitatis, quæ varia est, pro diversâ agentium efficacia.

Dosis verò compositi non alia est, quàm quæ superius assignata est singulis gradibus: ut, si compositum sit tale in quarto; dabitur à gran. 4. ad drachm. 2. Quod verò tale est in tertio, à gran. 25. ad scr. 5. Quod tale est in secundo, à drachm. 2. ad unc. 1. & scrup. 1. Quod est tale in primo, à drachm. 10. & scrup. 1. ad unc. 5. & drachm. 1. cum semisse.

Tem-

Temperatum denique à semilibra
ad libras 2.

Verùm quia *purgantis facultates non adversantur sibi invicem, ac propterea à irretracta perseverant; non possumus hac ratione ex unius virtutis intensiōe dosin purgantis compositi colligere.*

Quâ ratione autem sit colligenda, paucis & optimè explicat *Averroës 5. Collig. § 8. duabus regulis.*

PRIMA. Si purgantia composita sint ejusdem virtutis, ac omnia purgent vehementer, vel leviter, vel mediocriter; danda est composito dosis, quæ æquet unam dosin singulorum per se: ac propterea dividi debeat compositum in tot doses & partes, quot doses singulorum simplicium sunt acceptæ: ut, si compositum constet ex 4. integris dosibus quatuor purgantium; dividatur in 4. partes, dabitur una quarta pro dosi.

SE-

SECUNDA. Si purgantia sint inæqualis virtutis: aliqua sint mitia, aliqua furentia; pro una dosi compositi purgantis tantum est sumendum ex dosi integra uniuscujusq; purgantis simplicis, quantum relinquere videbitur operationi compositi: ut, si operatio compositi requirat magis unius quàm alterius virtutem, quâ indigemus (verbi gratia) cujus operatio magis expetitur; sumetur dosi mediocris; cujus operatio minus expetitur; sumetur dosi prope minima. Illud tamen est advertendum, posse ex compositis purgantibus, quæ fermentantur, ut sunt Syrupi magistrales & Electuaria, dari quantitatem, quæ etiam contineat ultra summam dosin alicujus simplicis purgantis. Nam virtus purgatrix, alexipharmaca, deleteria, factâ totius temperamenti, à quo provenit, proportionis

Ccc

tionis aliqua immutatione, necessariò redditur à fermentatione imbecillior.

Ex solidioribus autem purgantibus compositis, ut pilulis, pulveribus, non licet dosin accipere, quæ alicujus purgantis simplicis contineat dosin supra summam: Siquidem solidiora composita retinent simplicium vires integras, donec à nostro calore fuerint actu secundo posita.

Quare ut possimus justam dosin uniuscujusque purgantis compositi examinare, dividendum est totum compositum in suas doses, ac per numerum constituentium totum compositum dividenda est quantitas singulorum simplicium purgantium. Nam ex divisione patebit, quantum cujusque simplicis ingrediatur unam maximam dosin compositi: exempli gratiâ; Sit aliquod compositum pur-

purgans ponderans unc. 4. cujus
dosis summa sint drachm. 4. Con-
tineat autem compositum Turbith
drachm. 4. & diacr. drachm. semis.
Si scire velimus, an revera drach. 4.
sint summa dosis hujus compositi,
divide per octo, tum 30. gr. diacry-
dii, tum 260. gr. turbith; repe-
rins 240. Summam dosin compo-
siti habere Turbith semidrachm.
diacrydii verò ferè gr. 4. Quia
igitur summa dosis recipit dia-
gryd. infra minimam dosin, &
Turbith in dosi mediocri: diagry-
dium autem infra minimam dosin
non habet rationem electivè tra-
hentis, sed stimuli; statuendum est,
drachmas 4. non esse summam do-
sin dicti compositi; nisi plura alia
purgantia eandem dosin ingredi-
antur.

Sed enim verò quò clarius ha-
tenus dicta percipiantur, & de
medicamenti compositione, & de
Ccc 2 com-

compositi virtute ac dosi ; subji-
ciam duo exempla , alterum pur-
gantis, alterum roborantis, sive al-
terantis, quæ in articulorum, par-
tiumque nervosarum affectibus,
insignem semper utilitatem attule-
runt. Purgans est tale:

℞. Turbith

Hermodaetylana drach. 4.
diacr. drachm. i.

ZZ. scrup. 2.

sacchar. fini unc. i. M.

F. pulvis subtilis ex jure pullæ
propinandus. Consilium est mi-
hi, ex dictis partibus vacuare pitui-
tam mucosam, nec non tenuem. ac-
cipio Turbith , quod utrumque
præclarè facit : sed quia magis mu-
cosam vacuat, quàm tenuem, & æ-
qualiter ex toto venoso genere tra-
hit; sumo Hermodaetylos, qui te-
nuem pituitam valdè expurgant,
& proprio quasi genio ad articu-
los, nervosque suam deferunt fa-
cul-

cultatem : ita ut Hermodactyli a-
gant æquali virtute, fumantur in
eadem dosi: sed quia in fluxione pi-
tuitæ ad articulos bilis habere so-
let rationem vehiculi, purgandum
est quoque aliqua ex parte: propte-
rea duobus phlegmagogis propo-
sitis, carentibus hac facultate bilem
evacuandi, jungo diacrydium,
quo ipsa est præditum. Sed quia
diacrydium non habet rationem
dosis principalis, cum sit à dominio
pituita crassa, tenuisque ducenda;
sumo ipsum eâ quantitate, ut una
dosis purgantis compositi recipiat
diacrydii prope infimam dosin.
Nam summam dosin si reciperet
diacrydium ultra dosin medio-
crem, haberet rationem principa-
lis: & tale compositum æquali vir-
tute purgaret bilem & pituitam.

Sed quia Hermodactyli & Tur-
bith superfluam unam habent fa-
cultatem, qua ventriculum subver-
tunt,

Ccc 3

tunt,

tunt, ejusque calori adversantur,
& maximè quia tardè agunt, diu-
que in ipso morantur; loco corri-
gentis fumo Zingiber, quod & vī
veneficæ utrique resistit, & sui acri-
monia expultricis adjuvat actio-
nem, ne illa medicamenta ultra
debitum tempus in ventriculo
commorentur. Sumitur autem
Zinziber eā quantitate, ut una do-
sis medicamenti ingrediatur infra
minimam suam dosin, nimirum ad
gr. 5. Quia Zinziber ratione acri-
monia, quā egemus ad excitandam
ventriculi expultricem, est agens in
summo, idèd. sufficit minima dosis
agentium in quarto. Ratione au-
tem caliditatis est agens in tertio
completo: sed quia ipsius calidita-
te non egemus, ea ratione est mi-
scendum, ut una dosis compositi
habeat Zinzib. infra minimam do-
sin agentium in tertio. Quare cum
sit gr. 25, datur singulis vicibus in
sub-

subquintuplâ proportionē ad minimam sui dosin, ad eò ut nihil penitus possit calefacere.

Tandem, quia diaerydium insignem habet amarorem, misceo saccharum, ut natura medicamenta non avertetur, misceo autem octuplo plus sacchari, ut amaror ex toto auferatur. Cumque pulveris substantia dissipata deglutiri non possit, sed oris partibus & gulæ adhæreat; indigemus in administratione ac ulteriori compositione cum aliquo vehiculo fluido, quale est pullæ iusculum vel vinum album odoratum.

Tale est igitur artificium hujus compositi. Quòd scire velis ejus virtutem, an bilem an pituitam à prædominio purget; collige integras doses singulorum purgantium, ex Turbith & Hermodactylis. Cùm eundem specie humorem purgant, & in eodem gradu 38. in

tertio fit velut unum purgans, cuius sunt drachm. 8. in composito: & quia drach. i. constituit med ocrem dosin purgantium in tertio gradu (licet enim dividere purgantia in quarto gradu debiliam , medio-crium, fortium & furentium) erunt octo doses phlegmagogi, media vero dosis est tantum extremè furentium, velut est antimonium, & hel-leborus albus, quorum substantiæ summa dosis est dosis infima: aut propè infimam furentium remissorum, sc. gr. 12.

Erunt igitur Cholagogi doses quinque, quia compositum habet drach. i. diagrydii, seu gr. 60. Quare compositum purgare dicitur à prædominio pituitam, cum doses phlegmagogi superent duplas doses Cholagogi. Hujus autem compositæ dosin facillè cognosces. Cum enim pituita purganda sit à remotis partibus, sumes pro unâ dosi paullò ultra

tra mediocrem quantitatem basis,
quam dixi constare ex drachm. 8.
Hermodactylorum, & ex quatuor
Turbitib; & quia mediocris basis est
drach. 1. sumi poterunt pro una do-
si compositi utriusq; scr. 2. ita ut ba-
sis *sumantur* scr. 4. videndum igitur
est tibi, quot doses basis continet
totum compositum. Continet au-
tem 6. quia scr. 4. sexies ingrediun-
tur drachmas 8. Itaq; divide totum
compositum, quod constat ex
drach. 18. in sex partes; reperiēs,
summam dosin hujus compositi es-
se drachm. 3. infimam sesquidrach-
mam sive subduplum dosis summæ;
mediam autem esse circiter drach.
2. Alterans est tale:

℞. Trochisc. de vipera drachm. 1. - c.
in 1. l. in 3.

Terebinth. colt. in aq. salv. & pu-
leg. - - - c. in 1. l. in 3.

pulv. lva anadrachm. 5. c. in 2. l.
in 3.

ccc 5

gra-

granor. juniper. drachm. 2. c. in

3. l. in 1.

flor. anthos - - - c. in 1. f. in 2.

salv. anapj - c. in 2. f. in 2.

mel. anthosar. unc. 5. c. in 2. f. in 2.

F. Electuarium in forma Opiatæ.

Consilium est, nervos relaxatos calefacere mediocriter : insigniter autem exsiccare, cum aliqua adstrictione, ne calidum innatum, quod exiguum inest partibus, valida exsiccatione absumatur. Unde medicamentum compositum valde debet esse siccans, & calefaciens circiter duobus gradibus. Siquidem ob partis affectæ longinquitatem, & varias, quibus subijci debet medicamentum, alterationes, non parum propriæ caliditatis medicamenti deperdetur in via, aded ut ferè calidum in ad affectas partes perveniat; quo quidem caloris gradu in hoc casu indigemus.

Trochisci de vipera enim articulos

con-

convenienter siccant, cumque siccant in 3. sumitur mediocris dosis agentium in 3. Præter siccationem indigeo caliditate majori, quam insit viperis: indigeo præterea deferente viperarum ad locos affectos, & roborante ipsos. Terebinthina id omne facit: nam calefacit in 2. vimque siccandi viperarum roborat. Sumitur cocta, ut magis adstringat: coquitur autem ex aqua salviæ, ut nulla ipsius facultatum, quibus egemus, coctione exsolvatur. Cumque calefaciat in 2. sumitur ad drachm. ʒ. quæ est dosis mediocris agentium in secundo. Quia verò Terebinthina coctione perdit partes magis spirituosas, quibus maximè inest vis penetrandi: vis ipsius deferendi in partes roboratur Iva, quæ tenuium est partium: sumiturque Iva, æquali pondere: quia in omnibus facultatibus

Ccc 6 com.

communiceat cum Terebinthinā,
& in eodem gradu, ut propterea u-
traq; junctā simul habeat rationem
basis.

Rursus: Quia viperarum caro
superfluam habet facultatem, vide-
licet veneficam, quæ in trochiscis
viperinis non est sufficienter corre-
cta; sumo proprium corrigens, vi-
delicet grana juniperi, quæ sunt ca-
lida in tertio, & nervolis partibus
adpropriata. accipio autem in du-
plâ proportionē ad dosin Trochi-
scos, quæ proportio efficit duas a-
gentium in tertio, geminam ob-
causam: tum ut vis illa venefica vi-
perarum, quæ est magnæ activita-
tis, penitus auferatur: tum ut me-
dicamentum aliquantò fiat cali-
dus. nam ex viperis solis, Tere-
binthina, & lva non potest resul-
tare vis calefaciens in secundo gra-
du completo. Porro acutus gra-
norum juniperi odor sensui mole-
stus

ffus temperatur floribus anthos & salvia, & ipsis nervo articuloq; adpropriatis. Sumuntur autem utriusque pugilli duo, qui ferè æquant pondus drachm. trium prope minimam dosin agentium in 2; Qualia sunt salvia & ros marinus. nam majori dosi non est opus, cùm caliditate & siccitate illorum magnoperè non egeamus.

Postremò Ivæ & salviæ amaror, carnisque viperarum cum Terebinthina insuavis sapor, melle potissimum anthosato, quippe nervis & cerebro magis consentaneo, corrigitur. Quod cum sit calidum in secundo incipiente, sumatur eâ dosi, quæ est summa dosis agentium in primo, nimirum unciarum quinque, quia non tam caliditate & siccitate mellis opus est, quàm dulcedine: & quia ea mellis quantitas ad constituendam Electuarii formam requiritur, & probam ingredien-

Ccc 7 tium

rium permixtionem. cumque mellis qualitates non aduersentur virtutibus basis; non est verendum, ne ex mellis quantitate compositum reddatur imbecillius.

Hujus verò compositi virtus ex ingredientium facultate ut cognoscatur, sic numerandæ sunt. singulorum graduum doses. Viperæ, Terebinthina & Iva siccant in tertio gradu: omnium autem simul habentur in composito drach. ii. Itaque 17. doses mediocres siccæ in tertio gradu continet dictum compositum: ac propterea undecies sunt numerandi gradus siccæ in tertio: decies autem septem gradus siccitatis faciunt 70. partes siccitatis, & undecies unus gradus humiditatis facit undecim partes humiditatis. Mel autem, flores salviæ; & flores anthos siccant in secundo. Omnium autem habentur in composito unc. s. cum media circiter, id est, novem do-

doses mediocres siccitatis, quæ mixtæ siccitati in secundo faciunt 54. partes siccitatis, & 8. partes humiditatis. Grana juniperi siccant in primo, negligitur ipsorum siccitas.

Quare in toto composito erunt 20. doses medicamenti siccantis, ac partes siccitatis 131.; partes humiditatis 29. diviso utroque numero per numerum dosium, id est, per 20; reperies siccitatis partes sex, & plusquam dimidiam, quæ sumenda est pro duabus tertiis. Humiditatis autem una tertia. Quod autem habet sex partes, & duas tertias siccitatis, est siccum in secunda mansionem tertii gradus.

Rursus: Grana Juniperi calefaciunt in 3; quorum habetur drach. 2. seu duæ mediæ doses calidi in tertio, quia faciunt 14. partes caloris, & duas frigoris. At Terebinthina, Iva, fl. salviæ, nec non mel anthosatum calefaciunt in secundo. Omnium

mnium autem habentur uncia sex cum semisse, seu decem doses media calidi in secundo. Decies ergo numerando gradus calidi in secundo, sunt calidi partes 60.; frigoris partes 20. Tandem trochisci viperini, & fl. anthos calefaciunt in primo: sed quia utriusque dosis est infra minimam dosim calidi in primo, negligitur ipsorum caliditas. Sunt ergo summatim in hoc composito 12. doses agentis calidi: caloris autem partes 74.; frigoris 22. Quibus utrinque divisus per 12.; faciunt caloris partes sex & unam sextam, frigoris vero partes unam & quinque sextas: quia una sexta non efficit unam tertiam, seu unam mansionem: numero tamen sex gradus caloris, & quia 5. sextæ efficiunt ultra duas tertias, seu duas mansiones: ex quibus stationibus, in quas singuli gradus sunt divisi, numero frigiditatis duos gradus integros.

Con-

Constat igitur, siccum medicamentum esse calidum in secundo completo: siccum verò in secunda mansione tertii gradus.

De dosi, quomodo sit colligenda, id facilè colligi potest ex dictis. Nam cum mediocris dosi calidi in secundo sit circiter drach. 4; sicci autem in tertio dosi mediocris sit drach. 1; æqualiter autem indigemus caliditate & siccitate hujus compositi; ipsius dosi mediocris erit media inter istas duas circiter drach. 3; summa erit drachm. 5; minima verò circiter drachm. cum media. Quod si tamen siccitate compositi egeremus; dosi ipsius esset dosi siccantium in tertio, aut, si solâ ipsius caliditate esset opus, daretur ea dosi, quæ convenit calidis in secundo.

Haftenus de hoc argumento dixi: si ad omnium commodum, satis fideliter: si absque fructu, nimis pro-

prolixè. Optarim tamen, ut aliquis
 alius maturiore ingenio, ac inda-
 kriâ magis elimata, tractatû istum,
 omnium quæ in Arte continentur
 longè difficilimum, & à paucis ex-
 cultum, elaboret. Ego enim onus
 hoc mihi impositum suscepi, non
 quòd pares esse rei difficultati meos
 conatus arbitrarer: sed ne vel pri-
 mos juventutis annos à dignissimo
 labore abducere velle judicaret, vel
 studiosissimorum adolescentum
 desiderio nolle respon-
 dere.

T E T A E E T A L.

