

DE MEDICA- MENTORVM SIM-

PLICIVM PRAEPARA-
TIONE, LIBER
SECYNDVS.

* *



HAEC pharmacopœiæ pars
vilis & hominis eruditi in-
genio indigna nemini de-
bet videri, cum medicamē-
torū compositorum facul-
tates propemodum totæ ab hac proficiſ-
cantur. Quæ enim vis, quis vsus simpli-
ciū medicamentorum citra trituram, co-
ctionem, infusionem, & alia pleraq; post
dicenda esse possit? Quæ mistio ad com-
positionem omnino necessaria sine his
præparationum modis fiat? Quam autem
facultates non simplicium modò, sed etiã
compositorum varient, vel sola præparã-
di ratione tam apertè postea cōdisces, vt
neque testibus, neque demonstratione
longa opus sit. Quóque difficilius fuit
rem à nemine hætenus tentatam ceu
nouam excitare, & in hominum manus
& animos ponere: eo mea sententia erit

&

& præclarius. Quanquam enim Hippocrates, Galenus, aliique celebres medici, vt interim empiricos taceam, leuiter simplicium medicamentorum quorundam præparationem attigerunt, & nonnullos superiores medicos de præparandi ratione quædam scripsisse testetur Galen. tamen nullus hodie extat quem sciam, qui hac de re aliquid memoria dignum absoluerit: præterquã quod pauca quædam, sed tamẽ legi dignissima, de quatuor præparandi generibus, tritura, coctione, vstione, infusione, Mesues in sua methodo deligendi medicamenta purgatoria & castigandi perstrinxit. Nam quæ Seruitor nescio quis partim ex Dioscoride deprauauit, partim ex indoctis collegit, quis ferat?

His nos rationibus cõmoti ex Hippo. Diosc. Galeno, aliisque permultis quorundam simplicium præparationes passim dispersas, in ordinem congeessimus, multas ipsi & inuenimus, & experti sumus, & à doctissimis hac ætate pharmacopœis didicimus. Quæ dum à nobis stylo mediocri scripta legis, candide lector, tecum reputa nos rudibus introducendis hæc scribere, quorum captui seruire malui res nudas docendo, quàm singulorum ra-

tionem prolixius afferre: quāvis & id ad
re propositam felicius absoluendā, pluri-
mum pertinere videatur. Porro præpara-
tionem exequi statui medicamentorum
simplicium tantum, non aliarum etiam
rerum, per quas omnes præparationis ra-
tio & virtus spargitur: vt nihil à natura gi-
gnatur, augeatur, aut alio quouis modo
moueatut citra præparationem: nihil ar-
tes tam mechanicæ quàm aliæ omnes
tentant non adhibita prius præparatione
aliqua, per quā ars sæpe naturam vin-
cere videtur.

Medicamenta præparare est, ipsa per ar-
tem vsui vel compositioni commodiora
reddere, hoc est, vel mitiora, vel valentio-
ra, vel gratiora, vel salubriora, vel magis
miscibilia, & vt paucis dicā, meliora vel
ad vtendum vel ad componendum. Quæ-
dam enim vbi à nobis sunt præparata,
etiā citra compositionem mox vsurpa-
mus. Plurima autem præparata ante vsu
ad compositionem veniunt. Ad præpara-
tionis quoque vim (de qua paulò post
dicam fusius) reducendum putamus cum
vnā medicamenti facultatem nobis in
præsens noxiam tollimus, vel optatam
detegimus, vel nouam acquirimus.

At verò medicamenta omnis generis
metalli

metallica inquā, plantas, animātia, vel ex *Lib. 9.*
 iisdem sepe alimenta, paramus interdum *simpl.*
 adhuc viventia, frequētius emortua. Ter
 rā enim lemniā (quā dum adhuc in colle
 est ex quo effoditur, velut in matre viue-
 re videtur) sacerdos Dianæ dū sumit (par
 so tritico & hordeo piaimenta ritu patrio
 faciens preparare videtur, vt hinc magnā
 virium suarum partem, nisi etiam vires
 suas omnes consequi putetur. Nōne ar-
 senicū in sandarachā, & fori in chalcitin,
 chalcitis in misy prōptius in vena ipsa trā
 sibat, si specū ipsum soli meridiano ape-
 rueris? Ratione eadē vomica hydrargyri
 si in solē erūpat tenuior euaserit, & sulfur
 in Vesuuio vel alio monte vstum minus
 quidē oleosum sed tenuius euadit. An nō
 longa & asperrima hyeme qua vētres ac
 viscera terræ plus calidi habēt, metalla o-
 mnia largius gigni & plenius augeri re-
 cipimus? Nam & mihi aureæ quædā velut
 arbores in durissimis quibusdā lapidibus
 visæ sunt, & velut quædā arbores ex auro
 & argēto rudimenta, vt nō ambigā quod
 doctē Augerellus in chrysopœia scripsit,
 metalla in momēta gigni, nutriri, augeri,
 perfici, etiam si puteus Hānibalis, & me-
 tallā Iluē Tyrrheni maris insulæ inextrah-
 sta, & alia pleraque huius rei testimonia

dare, fidemque facere poterant.

Lib. 9 In fossam super collem in Cypro plu-
Simp. uia recepta per venam misyos, chalciteos
 foreos transfusa in specum subditum,
 quædam est chalcanthi præparatio aut
 verius generatio.

Mes. Viuentem raphanum insertis in eius ra-
in cano dicē fibris aliquot ellebori nigri, purga-
nibus tricem facimus: & fructus arborū purga-
viuer torios scarificato ipsarum cortice, quo tē
salibus. pore saliuā conscendit & immisso in pla-
 gas scammonio, cerâque super vulnus
 data & deligata.

Tempus præterea expectamus idoneū
 donec matura sint vel vigentia, vel sicca
 quæ lecturi sumus, & cælum plantæ pro-
 pitium: sæpè etiam lunæ quadraturas spe-
 ctamus, vt efficacior sit planta tunc colle-
 cta, dum arbores ablaqueamus, dum vi-
 tes putamus, propagamus, sarrimus, deca-
 cuminamus, festucamus: harum planta-
 rum fructus non modò vberiores, sed
 etiam meliores reddimus.

Lib. 3. Idonea victus ratione nutriticis lac præ-
alimē. paramus, vbi nutritius affectu aliquo la-
 borat, quomodo & asininum Galen. lib.
 7. Metho. & vaccinum recessu Tabiarum
 libro Method. quinto. Porcos, capros, a-
 rietes, tauros iuuenes castramus, vt eorū

caro

caro sit suauior, plenioris alimenti, coctu facilior.

Glandulae mammarum praesertim vac- *Ibid.*
cinarum, & suillarum, dum lacte suo tu-
ment, meliores quam exuccae: unde &
fumen porcae recens foetae à ganeonibus
laudatum legimus.

Coagulum in primo vetriculo anima-
lium lacte nutritorum ex lactis corru-
ptione genitum venatu animalis effica-
cius euadit, vt animalium propè omniū,
non solum ferorum caro.

Gallum veterem venatu quoque exer-
cemus, & meliorem ad purgandum ele-
menter suo succo nitroso reddimus.

Vulpes aetate florentes venatu multo
fatigatas, si bene habitas, si oleo incoqui-
mus, multò digerentiùs oleum effici-
mus. Si verò eas vuis impinguatas post
vindemias capimus, esui sunt iucun-
diores.

Porci segetibus nutriti firma sunt car-
ne, glandibus verò praesertim faginis,
laxa & fluxili & promptè liquabili.

Hircum quadrimū dum mensibus ali-
quot antequā iugulemus, herbis nutri-
mus calculum fragentibus, & vino albo
generoso potamus, hoc modo sanguinē
eius ad calculos in renibus praesertim

comminuendos efficacissimum paramus.

Cancros dum Aescrion capiebat & virebat post canis ortum, sole leonem ingressu, die verò Lunæ eius decimo octavo, contra rabiem hac ratione efficaciores sperabat, hocque modo præparabat.

Viperas non mox ubi latebris erepserrant, sed iam exercitas, iam consueto ante hyemē alimento recreatas, iam suo exuvio inter lapidum coagmenta deposito, velut rediuiuas Galenus vult capi, sicque præparare incipit.

Pullas & capos iure & carne viperarum cū pane subactis nutrit Matthæus Gradi, ad vsq; depilationem curaturus horum esu elephanticos.

*Lib. 3.
alim.*

Gallinaceos pane in lac acidum & sero summerso si ante nutritus quā iugulemus, ut testes habeant gratissimos & præstantissimos, & si ante coitum ne virus ex femine oleant. Sic enim boni sunt succi, validè nutriunt, facillè coquantur.

Ibidem

Hepar *οὐκωτερ*, id est ficutum, præsertim suum, ficiis siccis multis nutritorum, est præstantissimum. sic pastum iecur anseris albi, seu iecur anseris nutriti alimentis lacte imbutis suavius, coctu facilius, melioris succi.

Ibidem

Capra aut aliud animal scammoniū aut tithy

tithymalos depastum, lac reddit phlegma
gogum, & quod aluo pituitam deducat.

Stercus pueri ad anginam idoneis ali-
mentis, & stercus canis ad alia esu ossium
in viuis ipsis animalibus praeparamus, & *Ibidem*
alia in his generibus plurima. Sed ad hac *Lib. 3.*
rem hac sufficiant ad probandum qua- *alim.*
dam nos cum natura viuis adhuc medi- *Lib. 2.*
camentis praeparare. Cum vero hac pra- *simpl.*
parandi ratio, licet sit efficacior, tamen
haud ita crebro in vsum venit, vt fortasse
quis etiam praeparationis nomine non ef-
se accipiendam contendere possit: ob id
de altera eius specie agamus, quae omni-
no latissime patet in singulis medicamen-
torum simplicium generibus. Fit autem
haec generatim quidem additione & abla-
tione, nunc substantiae, nunc facultatis,
nunc vtriusque: particulatim vero tritu-
ra, coctione, assatione, vstione, & cæteris
post scribendis.

Ad ablationem vero reduci volo sepa-
rationem partiū nunc simul manentium,
vt in tritura: nunc à se inuicem abeuntiū,
vt in despumatione, destillatione, succo-
rum & liquorum extractione.

In singulis autē differentiis quæ additio
aut ablatio, aut ablatio & additio, vel sub-
stantiae vel qualitatis, & eius vel vnius, vel

multiplicis fiat, abūde postea docebimus.

Nunc hæ omnes præparandi differentia quam facultatem habeant, & quibus modis perficiantur, singulatim dicamus: primūque de tritura omnibus propè communi non simplicibus solis, sed etiā aliis præparationibus, postea de his quæ calore perficiuntur, deinde frigore, post hæc siccatione, hinc humectatione & cæteris post elencho comprehensis.

DE MEDICAMENTORVM

simplicium tritura.

*Mes.
in cano
pib.*

Medicamenta teruntur, hoc est, comminuuntur, percussu vel friatu idoneo, vt simul misceri exactius possint, vel vt facultas ipsis noua conquiratur, vel vt malefica tollatur. Quos tres terendi scopos in methodo medicamenta componendi fusius explicauimus. Terendi autem modus plurimum est varius. Primū quod plurima pistillo ferreo, æreo, plumbeo, vitreo, ligneo, vel alia constante materia in mortario ferè simili materia conflato terūtur: sed pistillus ferreus & æreus mortario ferreo & æreo magis seruiunt: iisdem & lapideo & vitreo mortario etiā ligneus, sed plumbeus plumbeo, vitreus vitreo est aptior.

Sec

Secundo loco multa teruntur diu ducta super lapidem durum & marmoreū, porphyrium vulgò dictum : marinum, quem maris squammam vocant. Ducuntur autem simili lapide, sed paruo, & manu concepto, quem molulam vulgò vocamus, quòd molæ paruae is effigiem habeat, vt lapis suppositus magnæ.

Tertio teruntur medicamenta quædam molis trusatilibus vel versatilibus, vt quædam etiam molettrinarum molis, qui modus Lugduni est frequens in terendis aromatibus, quibus constant puluis minutarum specierum, & puluis selectus, quem finem vocant, & alij permulti suo cuique more commisti. De hoc non sum dicturus, sed de primo præsertim, & pauca de secundo.

Nec omittendum mortarij operculum saltem simplex, aut etiam duplex, quale veteribus in vsu fuisse in nostra componendi medicamenta methodo commemorauimus, præsertim puluerantibus. Nā humida hoc non indigere videntur. Ad trituram quæ præparandi species reducendæ sint, ceu ipsi affines, posterius audies: vt quod quædam rapaci serra comminuuntur, alia minutim conciduntur, vt promptius teri possint, vel humori cui

incoquuntur vires suas tradere.

Non modò autem instrumentis variat terendi modus, sed etiam ipsius percussio nis vigore & tempore, & rerum terendarum situ, & connexionione, & futura consistencia. Quædã enim per se omnino sunt terenda, alia cum aliis quibusdam, ipso- rum trituram sæpè etiam facultatem iuvantibus: alia tum per se, tum cū quibusvis teri possunt: & hæc omnia tenuissimè vel crassius. Item quædam diu terenda sunt, alia trituram breuem vti & decoctionem sustinent. Item alia valenter tundenda, alia tantum clemèter frianda, ducto per mortarium molliter & nunc celeriter, nunc segniter pistillo, interdum & valenter.

Præterea attritu cuiq; moderato, non autem vehementiore aut immodico sunt verberanda. Violento enim ictu, & nimis diuturno exanimantur, viribúsque dissolutis languent, magis tamen tenuia, rara, facultatem imbecillem, aut superficiariam fortita, minus contraria.

De his autem omnibus agam singulatim, vbi docuero quibus horum modis, & quot singula medicamentorum simplicium genera terantur, initio à radicibus sumpto.

Radices, si crassæ sint, nec adeò siccæ, in
parti

particulas sectæ, & aliis siccioreb. particu- *Cōmu-*
latim adiectæ, multis scilicet pauce, pulue- *nis tri-*
rantur cum ipsis: si autē sicciore sunt, aut *tura ra-*
per se, aut simul puluerari possunt, sed an- *dici.*
tè vel cultello concisæ, aut forficibus, aut
manibus fractæ, nisi si quas antè ad siccā-
di necessitatem cōcideramus in taleolas.

Diutius autē terendæ sunt quæ crassæ,
duræ, solide, densæ, nervosæ, membranō-
sæ, & fractu continuæ, si in puluerem
molliissimum comminui consiliū est. In-
terdum enim minus teri volumus, præfer-
tim dum ad coctionem tantum eas appa-
ramus. Tales serè sunt radix acori vtriuf-
que, omnis aristolochiæ, althææ, bryo-
niæ, costi, helenii, gentianæ, polypodij.

Parum diu verò terantur contrariæ, e-
tiā si læuissimum puluerem requiris:
quales sunt radix calami odorati officina-
rum, ellebori vtriusque, hermodacty-
lorum, pyrethri, & mediocriter quæ in ha-
rum sunt medio radices, ut apij, asparagi,
turbit, behen vtriusque, dictamni vulga-
ris, doronici, fœniculi, galangæ, glycy-
rhizæ, graminis, ireos, petroselin, pæoniæ
vtriusque, rha Barbari.

Herbæ item teruntur, nunc virides, nunc *Herbæ*
sicce: & ambæ vel crudæ, vel coctæ, vel cru- *tum.*
dæ semel, iterū post coctionem, idque in
usus

usus varios. Nam virides ferè teruntur in succū vel cataplasma crudum: coctæ verò terūtur, vt vel in apozema exprimantur, vel in cataplasma cernantur, præsertim si quid durum aut lignosum sint sortitæ. At siccæ terūtur nunc in coctionem, sed negligentius: nunc in puluerē, diutius quidē crassæ, duræ, densæ, lignosæ, lentæ minus contrariæ. Quæ dum ad consistentiā, qua cerni possint cribro hoc illo, pro scopis medicorū variis, puenerint, teri desinunt.

Herbæ tamē propemodum omnes antè vel siccantur, vel manibus franguntur quàm terātur: terunturq; ferè mediocriter, & cum foliis interdum, etiam cum floribus. Sed tunc paulò minus diu terendæ, vti & adianta omnia, calaminthe, maiorana, origanum, rosmarinus, thymū, præsertim cum hæc postrema sunt florulēta.

Florū.

Flores propè omnes siccati, parum diu terendi, quia citò puluerantur, & faciliè puluerando examinantur ac exhalant.

Vt crocus, Nymphææ vtriusq;
Epithymum Græco- Periclymeni,
rum & Arabum, Rosarum omnium
Genistæ flos, Schœnuanthos, si
Leucoiorū omniū, ipsum haberi
Meliloti, possit,
Rorismarini,

Si

Si verò cum herbis ipsis expetatur, flores paulò diutius propter herbas & harū surculos, quibus herēt adhuc, terēdi sunt, quàm si ab his essent secreti, vt absinthij coma, anethi coma, abrotani coma, chamædrys, chamepitys, eufragia, melilotus.

Adde quòd floris nomine hoc loco venit non modo quod in medio est, magna ex parte croci capillamentis simile, sed etiam folia id ipsum ambientia, nunc alba, vt in chamæmelo, nymphæa alba, rosa alba & moschata: nunc lutea, vt in nymphæa lutea, chrysanthemo: nunc rubra, vt in rosa rubra, in balaustio, nisi quòd croci nomine tantum capillamenta (quòd ea in vsu sint sola) intelliguntur: vti & Galenus sæpe in compo. ph. p. florem rosarum appellat, non folia illa ampla, sed in medio capillamenta.

Multum autem terenda sunt chamæmelum, quanquam id essentiae tenuis sit, quia tamen densum est, & odore vegeto ac diuturno: ac etiam stœchas Arabica vulgò dicta, vt etiam cum primis, vt Turbith, coëpta teri, ad postremū adhuc semitrita appareat: & item heliochrysos, stœchas citri vulgò appellata, & spica nardi, in quacūq; plantarum partē reponatur, etiam si prius minutissimè incidatur.

Bal

Balaustium quoque, diu teri debet ob lignosa sua folia: quod autem intus est fibrosum, si per se terendum sit, promptius multò dissolvitur.

Capparis flos, siue adhuc gemma sit, siue iam apertus, siue iam in fructum seminis plenum excreuit, ferè muria conditus in usum venit: & eius loco flos genistæ aceto & sale conditus.

Si tamen siccat, mediocriter diu teretur: & flos lupi salictarij foliosus, qualis etiam ymo est.

Caryophylla crassæ substantiæ agrè teruntur, siue flores sint, siue aliud.

Rosæ igni vel sole inter papyros siccatæ, forficibus minutim concisæ, per se aut cum aliis teruntur: cum aliis autem etiam citra siccationem illam, atq; adeò recentes solum sectæ, quomodo & quosdam incidere, non terere tamen, vt saccharum rosatum fiat, scribit Mesues. Cum verò specimen edis, ne sicca: sed cum aliis tere, vt vites calumniam.

*Fra-
Etuum
& se-
min.*

Semina propè vniuersa medio inter radices & herbas modo puluerari desiderant. Ob id cum omnia hæc simul terenda veniunt radicibus iam ceptis cōminui, semina iniiciantur, quibus etiam abundè iam comminutis, herbæ minutim concisæ

adiici

adiiciuntur, & omnia simul conteruntur.

Talia sunt	Eruium
Agnus, Apium,	Erysimum,
Amomum,	Fœnum Græcum
Anisum,	Linum,
Anethum,	Lithospermum.
Ammi,	Lupinus,
Basilicum,	Lens,
Carum,	Melanthium,
Cardamomum,	Psyllium,
Coriandrum,	Papauer,
Cuminum; quâdò autē Sefeli,	
avreticū volumus mul-	Staphis agria,
-tum teritur	Sinapi,
Coëcus baphica,	Thlaspi,
Erica,	Vrtica,

Et ex fructibus pillulæ cupressi, colocythidis medulla siccata, & minutim secta, Carpobalsamum, cubebæ, galla, nux moschata, piper: & præter has dactyli, iuniperi baccæ, ficus, zizipha, myxa, pruna passa, vuae passæ: quanquâ fructus hi molles sint, purgati tamen nucleo, & incisi cū aliis quo dixi ordine teruntur, si in compositionem veniant: & in puluerem abeunt, si pauci siccioribus multis miscentur, aut triti cernuntur per cribrum magnum, aut cochleari ad mollem medicamenti formam, vt dactyli in diaphœnico,

Myrob

Myrobalanos verò omnes multum tenuiter conteri iubet Mesues, quando earum substantiam in corpus rapi volumus, & viscera ipsa astringere, & contrahendo velut obstruere consilium est. Eadem ratione rhabbarum.

Siccata diu in sole semina cucumeris, cucurbitæ, melonũ, & similia, quæ postea cultello concidi docebimus, per se in farinam puluerantur.

Ex seminibus autem coriandrum, cardamomum tam maius, id est, granum paradisi, quàm minus, lithospermum, & cuminum, ut sit vreticũ, & ex fructibus myrobalani Arabum omnes, ut nuper dixi, ac folliculi sennæ tam diu quàm radices ipsæ teri postulât: ob id cū ipsis iniicienda.

Quæ verò seminũ vel fructuum medullæ sunt oleosæ, vel cultello super papyrus identidem mutandâ incidantur, vel cum saccharo purissimo & siccissimo paucò seorsum terantur. Tales sunt medullæ feminis cucumeris, cucurbitæ, citreoli, melonis, bōbacis, cnici, staphydos agriæ, & fructuũ medullæ, amygdalarũ, anacardorum, balani myrsicæ, pineorum nucleorum, pistaciorum, castaneæ, auellane.

Nux autē moschata ferè postrema iniicitur, ut in pulverem minutarũ specierũ.

Nam

Nam si prima iniiciatur, reliqua puluerari prohibet, suo lentore oleagino.

Semina praedicta incidi solita, si humidis miscenda sunt, per se teri possunt: si ficcis, cum horum multa copia semina haec pauca teri possunt, ut succus glycyrrhizae, bdellium, succi. liquores prius particulatim concisi, possunt etiam (ut dixi) diu insolati per se puluerari.

In diaprūno quoque semina frigida maiora & similia si addantur, cum saccharo multo haec pauca teri possunt: sic in diaphoenico amygdalae possunt incidi, vel cum saccharo teri. Sic papaueris semen quidam per se parum prius in mortario quassant, ut verberatum excipiat cultelli. Deinde cultello, ut praedicta, incidunt.

Haec verò medullae si compositis cardiacis sint miscendae, ut edicti tempore incidantur & misceantur potius quam cum aliis terantur. Nam vix bene menssem vnum seruantur integrae, sed rancescunt, & compositum vitiant, nisi parcum sit compositum, & mox absumendum.

Succi ficcati, liquores, gummi, resinae *aliarum* si recentes sunt, ob id humidi & molles, *plantarum* electariis mollibus, catapotiiis, vnguētis, *partium* ceratis, emplastris per se misceri possunt, *tritum* vel cum aliis mollita & subacta, vel aliquo *re-*

his remediis idoneo humore soluta.

Vbi verò iā paulò mediocribus sicciores euaserūt, vt iam comminui possint, in mortario, interdum quidam horū friantur magis attritu blādo pistilli, præsertim calfacti clementérque ducti per fundum & latera mortarij, quàm verberando tundantur. Nam sub violento ictu lateſcunt mortarióq; contumaciter hærent lentore omnibus communi, his tamen maiore quàm illis, ac exhalant, exanimanturq;. Quod si immodicè siccata sint, quanquā tunc facilius puluerantur, tamē velut exanimata, & viribus priuata reſiciuntur.

De moderatè siccis igitur aut paulò siccioribus nobis sermo est futurus.

Scammonium igitur (est enim id aliquando succus, vt etiam Mesues docuit, sed multò inferius scammonio liquore) & si qui similes succi ad consistentiā tam corpulentam siccando ducuntur, per se friando in mortario teri possunt; sed ferè longius requirunt tempus, & si parua sit copia, bonam sui partem mortario affixā relinquūt: quod damnum in magna mole negligimus, tamen multò satius est in eo mortario prius amygdalas triuisse, præsertim vetustate oleaginas, quæ suo lentore liquido succos adhærere prohibeant.

beant. Id quod pistillus oleo intinctus, vel oleum paucum mortario infusum & aliquandiu pistillo ductum per mortarij fundum, & latera præstabit diutius & felicius. Sit autem oleum vel dulce, vel amygdalarum dulcium, nisi succus astringens omphacinum magis postularit. Id verò oleum succos adhærere non modò prohibet, sed virtutè ipsorum exhalare, & pollinem tenuissimū euolare non permittit. Adde quod trituram & breuiorem & commodiorem & faciliorem reddit. Qualem vim Galenus opobalsamo tribuit in terenda Theriace. Acacia tamen nostràs etiā siccior frangi contumax est, vt minutim sit potius concidenda, & particulatim miscenda puluerandis aliis.

Aloë verò cum friando teratur, percutiendo autem hæreat mortario, verum est Mesuæ de ipsa dictum, quòd friabilis sit simul & tenax ac glutinosa, quod etiam digitis explorabis. His enim friabilis est, ac his hæret ante & post friationem.

Succus glycyrrhizæ, & hypocisthis, & lycium nostràs pistillo calfacto siccatur & friatur, nisi admodum sint recentia & præhumida, vel minutim secta, tunc additur & cum aliis puluerisatur, cū ea sunt

iam cerni apta, alioqui semitrita in composito apparent.

Ex liquoribus quoq; qui sunt sicciores ac minus glutinosi, per se friari possunt, ut opus Cyrenaicus, euphorbiū, thapsia, & (ut dixi) scammonium cum oleo amygdalarum dulcium friatur, non teritur.

Opium verò cum aliis siccioribus particulatim iniectum cōmuinuitur, ut cum humidiorib. dissolvitur, quomodo opopanax, galbanum, hammoniacum, sagapenū. si pauca quantitate multis aliis siccioribus particulatim coniiciantur, cum his puluerantur, ut in hiera diacolocynthidos sicca, alioqui humore aliquo idoneo, ut aceto, vino dissoluenda, & calfacta colantur, post percoquantur ad competentem rei propositæ consistentiam.

Purgata eadem à lignis & cæteris excrementis pistillo calido quibusdam molliuntur ad fingenda catapotia, & emplastra: sed hoc modo ferè impuram reddūt compositionem. Vel dissoluuntur humore idoneo, & colantur per stamen. Sed tunc quantum excrementi colando sit abiiciendum coniecta, & ob id largiora quàm scriptura postulabit dissolue.

Lachrymæ denique tam resinosa; ut mastiche, terebinthina, pinea, laricea, abietina,

etina, strobilina, colophonia : quàm gū-
mosa, vt gummi Arabicum, tragacantha,
cancamum, myrrha, bdellium, styrax, sar-
cocolla, thus, succinū, gummi amygdalo-
rum amborum, cerasi, pruni, hederæ, iu-
niperi, multū siccata, friando per se, aut
cū aliis excepta mastiche & pinea, pulue-
rantur: vt caphura quoq;, siue ea sit gūmi,
siue succus, siue factitium aliquid. Egedem
verò lachrymæ recentes aliis liquidiori-
bus excepta mastiche, mistæ dissoluūtur,
vel medicamenta alia paulò sicciora dis-
soluūt. Quod si lachrymarū aliqua suo
lentore mortario hæreant, oleo pauco i-
psū prius illinendū est, vt si myrrhā ve-
ram nec vetustate ita exuccā teris : nobis
enim consuetior myrrha, maximè est per
se puluerabilis. Adde quòd mastichæ sic-
ciori ne exhalet aut euolet, aquæ rosaceæ
paululum affundi potest, & aliis horū ob
siccitatem maximè friabilibus. In empla-
stra tamē satius est mastichen & myrrhā
puluerare.

Ad hæc gummi Arabicum & tragacan-
tha, si prius pistillum & mortarium cale-
feceris, multò promptius friando pulue-
rantur. Citius adhuc si paucum aquæ vi-
tæ immittas.

Thus teritur solum, non resoluitur

quibusdam : sed aqua & aceto resolui in emplastri consistentiam & oleo, sed tunc coalescere grumis non potuit.

Mastiche teritur cum paucio oleo in capotiis Hermetis ex trochiscis colocynthydis.

Myrrha vera primo die crassius teritur, postridie tenuissimè pulueratur : sic bdellium, thus, vtrunque siccius, sarco-colla, styrax, euphorbium, ladanum tempore aut pistillo & mortario calido siccatum pulueratur, recens verò soluitur oleo calente, vel alio liquore idoneo.

TRITURA LIGNORVM

& Corticum.

Ligna vt agallochum, aspalathum, galiacum, santala, xylobalsamum : & lignorum cortices, vt cinamomum, casia, cortex radice oxyacanthæ, tamaricis, caparis, quantum radices teri postulant : stipitum eadem ratio est & malicorij, quod est mali granati cortex lignosus : sed maccis, moschatae nucis cortex mediocriter diu terendus est.

Corticis autem radicum apij, petroselinij, fœniculi, raphani, similia herbarum tritura in herbis ipsis est declarata. Turbith mediocriter terendum Mesuæ est.

Ne

Ne mireris autem cinamomum omnium æquè calidorum tenuissima substantia præditum, diu terendum. Id enim fit, quia interno cortice multum fibroso & nervoso est fractu contumaci.

METALLICORVM ET TER-

reorum Tritura.

Metallica omnia quia terrestris sunt *Lib. 3.*
substantiæ ob id crassarum partium, *c. ph. g.*
in profundum, vt ad punctum nervum penetrare non possunt.

Quapropter illis tenuitatem comparamus, subigentes diu in sole æstiuo cum aceto vetustissimo, acerrimo, tenuissimo (quod fit ex vino non austero) vini qualitatem, nihil vel minimū gustu referent: quæ quanto pluribus diebus teruntur, tanto sunt tenuiora, ob id melius purgant, tenuant, siccant.

Ex vino autem similiter trita, dein siccata sole, vel si aliud est tempus, igni, sunt meliora ducendis cicatricibus.

Lichargyros friatur, non tunditur, ne plumbum eius si chrysitis est parrius, si argyritis largius late scat, quod cernendo per pannum rarissimum remanet: scoria autem eius lotionē separatur, & sic emplastra fiunt alba.

Lapis armenus si inuenitur, ad lotionē

teratur in mortario lapideo, idq; diu sã-
tis: sed lapis cyanus seu stellatus lōgiore
sustinet trituram Mesuæ. Terūtur in mor-
tario marmoreo albo prius per se vnio-
nes, corallia, ne odorē, colorē, saporē a-
lienū trahāt. Lapidū preciosorū saphyri,
hyacinthi, granati, smaragdi fragmenta
postea super lapidem porphyrium affusa
pauca aqua rosarū, vel borraginis vel bu-
glossi tenuissimè friantur. Sic enim fit vt
promptè distribui possint, nec obstruant,
adhæc nullam mortarij partem terendo
deradunt, quæ puluerem augeat. Qua de
causa etiam Gal. simplicia ad theriacam
in pila Ægyptia durissima conteri iubet.
Per se etiam teretur vnguis odoratus.

*Tritu-
ra par
tiu ani-
malis.*

Partes animalium, aut animalia tota si
assatione, vel vstione, vel aliter multū sic-
catae sint, puluerantur aliorū modo: si hu-
midæ & molles sunt, paucae cum multis
siccioribus teri possunt, aut sine his terū-
tur, & per cribrum cochleari cernuntur.
Quædā etiam liquari possunt, vt adipēs,
medullæ, æsypus, deinde colari.

Stercus canum, luporum, infantū sic-
catum etiam puluerabile est, & canthari-
des repositæ & castoriū siccus, sed ineffi-
cacijs, & cancri fluuiatiles vsti, hirūdines
vstæ, lepus vstus, renes scincorum sicci,
iecur

hec lupi siccatus, pulmo vulpis siccatus.

Fel autem ferè alijs ficiioribus dissol-
uendis miscetur, raro siccatus.

De vnionibus qui sunt velut concha-
rum quarundam partes dictum prius est,
& de vngue odorato.

Sāguis hirci siccatus facilè pulueratur.

Dentes apri, lucij, elephantis limādi aut
radendi, post terēdi potius quā vrendi, si
vires eorū integriores postulas: si ossa a-
lia & cornua, vngulæ. Tamen hæc vren-
da interdum, vt in vstione audies.

Ambra interdum minutim concisa in-
jicitur in humorem calidum, vt in eo li-
quetur, vt in Antid. diacoccu baphices: in
terdum teritur, deinde dissoluitur affusa
aqua rosarum, vt in Anti. alepto moscha-
ta, & in alijs multis: interdum prius in
mortario teruntur duæ vel tres amyg-
dalæ, sic moschus, caphura.

Os à corde cerui, ebur, pudendum cer-
ui, tauri, cornu cerui, rhinocerotis, & si-
mililia prius rasa, post concisa minutim
cum alijs teruntur, quædam etiam vsta
promptè puluerantur.

NUNC AD ID QVOD INITIO

proposuimus reuertamur.

PER se terenda sunt primum metalli- *Terenda per*
ca omnia & terrea, vt lithargyros, se.

i s

arsenicon, sandaracha, æs vstum, squam-
ma æris, scoria æris, ærugo, chalcitis, fori,
misy, melanteria, chalcanthum, cadmia,
pompholyx, spodiū, si hæc duo non sunt
satis læuia, plumbum vstum, cerussa, sul-
fur, alumen, nitrum, sal quiuis, stimmi,
chrysocola, gypsum, pumex, cyanus la-
pis, armenus lapis, calx, lapis spongiæ, iu-
daicus, smyris, etites, magnes, hēmarites,
amethistus, amianthus, gagates, iaspis, sa-
phyrus, hyacinthus, pyropus, eranus, sigil-
lum lemnium, terra Cimolia, Cretica, Ar-
menia, corallium quoduis. Potes tamen
simul metallica multa aut terrea terere,
nō autē cum partibus plantarum, aut ani-
malium. Hæc autem ferē teruntur super
marmoreum lapidem, aut porphyrium,
aut marinum, aut alium similiter durum.

Possunt tamen & in mortario teri par-
tes plantarum similiter duræ, anacardi in
confectione anacardina Mesuæ.

Aloë, scammonium, saccharum & sac-
charata penidia: nam alia reddit glutino-
sa saccharū, & ea teri prohibet mastiche.
Rha barbarum.

Spodium Arabum. Caphura.

Gummi Arabicum & sarcocolla.

Tragacantha, thus magis, sed tragacantha
incisa etiā cum aliis teritur ne euolet.

Ambra,

Ambra, moschus, Schœnuanthos & festu-
cago, crœcus.

Semina pusilla, vt papaueris, hyoscyami,
maioranæ, portulacæ, amomi vulgaris.
Hæc enim si cum aliis terantur, pistillum
eludūt, præsertim quæ cum paruitate sunt
læuia, & propè integra manent. Illorum
autē pars bona, si cum aliis durioribus &
teri contumacibus terātur, euolant & ex-
halāt, priusquam sint probè comminuta.

Animalium partes duræ vstæ, vel rasæ
vel limatæ, ossa, dentes, cornua, vngulæ
ebur, spodiū vulgi vel est ebur, vel os ele-
phantis, vel alterius grādīs animalis vstū,
ventriculus interior gallinarum, res Gal-
dānata, cerebella passerum siccata, iecur
lupi siccatum, pulmo vulpis siccatus, ster-
cus canum, & luporū & infantis, mumia,
pissasphaltum Dioscoridis putata, san-
guis hirci siccatus, sanguis draconis di-
ctus, cantharides, sericum vstum, vel inci-
sum, moschus, margaritæ, testæ ouorum,
ostreorum vstæ, vel limatæ per se terūtur.

Cum aliis quibusdam sæpe ipsorum tri-
turam, sæpè etiam facultatem, colorem,
odorem iuuantibus terūtur simplicia plu-
rima, & cōposita quædam, vt moschus,
ambar, mastiche siccior, & alia eiusdē ge-
neris ob siccitatē friabilia: teruntur aqua
rosa

rosacea pauca affusa, ne portio tenuior
euolet. Sunt qui & mastichæ oleum nu-
cum affundunt, vt in catapotiiis Herme-
tis apud Mesuen.

Gummi Arabicum & tragacantha ci-
rius teruntur aqua dulci, rosata, vini seu
vitæ pauca affusa, si affectus non repu-
gnet: aut pistillo & mortario calefactis
ad promptiorem siccationem, hincque
albiora euadunt.

Tragacantha etiam, vt os à corde cer-
ui, rasura eboris, cornu cerui & similia
minutim concisa, etiam cum aliis siccio-
ribus teri potest.

Tragacantha verò & penidia si morta-
rio & pistillo bene siccis cum aliis teren-
tur, minus eorum perit & exilit.

Myrobalani siccæ quales ad nos ferè
aduehuntur, affuso pauco oleo, meliores
redduntur, non exhalant, promptius te-
runtur: vitæ item passæ & mel cum ipsis
tritum ne ventri hæreant & ipsum cor-
rugent, impediunt.

Scammonium cum oleo amygdala-
rum dulcium friatur.

Colocynthis medulla prius modicè
pistillo fracta, vel potius minutim forfici-
bus incisa teritur affuso paulatim oleo
pauco dulci, vel amygdalarū dulciū, vel
rosato.

rosato. Sunt qui ipsum pistillo vel mortario allinunt, alij amygdalas aliquot prius in mortario terūt, alij papyro inuolutam sole ardenti vel igni ē longinquo parum diu siccant, vt crocum, rosas. Postea etiā per se facilius puluerant, vel cum aliis siccis siccata, forficibusq; sectam terunt. Alij in trochiscos prius fingunt, quales alandā Arabes vocāt, priusquam puluerent.

Quæ necessitas agarico adest. prius enim ferra quadam rapaci negligenter separatur, post cum vino albo paucō quo zingiber purgatum sit maceratum in trochiscos formatur, siccatur in vmbra, pyxide viterea reponitur, & cum opus est friando læuissimè pulueratur.

Caphura teritur in mortario, cui duæ aut tres amygdalæ prius fuerint affictæ, aut in eo tritæ, aut ipsarum oleum pistillo & mortario paucum sit illitum, ne terēdo euolet ac exhalet.

Turbith quia per se tritum latefcit (est enim gummosum si legitimum est) vbi est modicè confractum, alia ei sicciōra sunt miscenda cum quibus teratur, vt piper, zingiber, & cætera in diaphœnico & electario Indo vtroque. Per se autem cū amygdalis, vel oleo amygdalino paucō teritur ne exhalet.

Seri

Sericum crudum, incisum faciliè teritur
mistis tribus aut quatuor amygdalis, ip-
sum ne subter fugiat lentore suo conti-
nentibus, & pistillo sistentibus. Sunt qui
papyro inuolutum sole vel igni parū sic-
cant, post minutim cōcidunt: & cum aliis
leuissimè terunt.

Cinamomum cū paucis amygdalis te-
runt quidam in Hippocraticum quod vo-
cant vinum, ne odoris gratia expiret.

Florū.

Rha barbarum cum amygdalis faci-
lius quidē teritur, nec euolat nec exhalat,
sed minus fit purgatorium: vt crocus iura
minus tingit si ex oleo teratur, id quod
quibusdam pro secreto est. Crocū enim
ad iurium, carniū & aliorum ciborum
condimentum, vel etiam ad frōtes libro-
rum tingendas nouo quodā modo terūt.
Papyro enim interpositum, vel sine hac
sartagini impositum igniq; admotum lō-
gulē, sed parū diu, vel soli diutius siccant,
vt villosa eius natura promptius terēdo
rūpatur. Ne verò exhalet, ac vt promptius
teratur, & coloratio euadat, olei dulcis
pauillum vt guttas 4.5. in uncias singulas
affundunt, vel pistillo illinunt interdum
tam largiter vt improbè rubeat, ob idq;
ab archipharmais damnatur. Sed vt sit
coloratio, minus tamen tingere putatur
quām

quàm qui sine oleo tritus sit.

Opulentiſſi verò cum ſaccharo pauco
potius teritur, ſi verò humorem alium
olei loco acceperit, etiam coloratioꝝ eua
dit, ſed humore in vaporem ſoluto flauit
iem natiuaꝝ repetit, & minus vulgo pro
batur. Verumtamen croco noſtrati hoc
mangonio ad coloris gratiam opus eſt,
ceu parum cocto ob ſoli & cæli naturã
frigidiorem. Qui verò crocus à Galeno
laudatus eſt colore flauiffimo, odore ve
getiſſimo, etiam diu poſtquã ſeruari cœ
pit, acquiſitio hoc colore non indiget.
Crocus verò vt ſpica, macis, colocynthis,
ſericum, roſa, & alia plurima ante tritu
ram inciditur.

Euphorbium dum teritur per ſe pului
ſculo acerrimo in nares euolãte & ocu
los, haſ partes valenter mordet, ſternuta
mentòq; implacato hominẽ torquet, ob
id ea moleſtia nouitios fatigat, vt ſæpẽ il
lis nares ſanguine fluant, plurimis caput
vehementer doleat. Haſ autẽ ab euphor
bio noxas prohibebis, ſi oleum paucum
aut amygdalas miſcueris, quæ lêtore ſuo
etiam puluiſculum illigent ac retineant.

Sunt qui myrrham, bdellium, canca
mum, gummi hederæ etiã ex oleo terant,
ne tenuior portio euolet ac virtus ex
halat,

halet, néve mortario hæreant.

Opopanax, galbanum, ammoniacum, sagapenum, bdellium, ladanum, acacia vulgaris, opium, hypocystis, asphaltum, ficcior terebinthina, qualis frequens Venetias conuehitur, & alia non pauca succorum liquorum & lachrymarum genera, vel minus siccata, quam vt per se puluerari queant, vel neruosa & velut membranosa & coriacea, & fractu contumacia cum aliis ficcioribus teruntur, sed prius incisa, vel aliter in portiones paruas redacta, quantitate tamen parua multitudini aliorum ficciorum immista paulatim cum illis puluerantur, vt in hiera diacolo cynthidos, & aliis compositionibus multis. sic Crocus, flores etiam recentes buglossi vtriusque, rosarum & cæterorum. Sic Trochisci Gallie moschatae & alij, sic Dactyli intus & foris purgati, ficus, vuae passae, myxa, zizypha passa, baccæ lauri, myrti, iuniperi, oxyacanthæ, visci quercini, anacardi, amygdalæ, auellanae, strobili, pistacia, nucum reliqua genera & gladium, semen cucurbitæ, cucumeris, melonum, citreoli, citri, cydoniorum, Sinapis, Cannabis, Cnici, Xyli, Cerasi, Psyllij, Lini, & similia. Sic sericum, Lana, Pili minutim concisa cum aliis ficcioribus teruntur

tur potius quàm vsta eadem per se: Nam vrendo vires amittunt priores, & nouas ab igne, & iis quibuscum vruntur acquirunt. ob id non vrenda, nisi medicus doctus iusserit, vti nec ebur, cornu Cerui, caprae rhinocerotis, pudendum Tauri, Cerui, siccatum. Hac enim vel in longū rafa & incisa, vel etiam limata, vulgari lima, aut rapaci ferra cum aliis siccioribus puluerantur.

Adde quòd quædam aut per se, aut cū humore aliquo teruntur, & cum eodem bibuntur vel aliter vsurpantur, vt vinca, coma amaranthi cum vino, seseli, saryrion, pœonia, gnaphalium ex vino austero teruntur & bibuntur.

Aristolochia rotunda lupini ex aqua cum posca bibuntur, aut cum melle linguntur, & alia permulta eius generis exempla apud Diosc. & Galen. in medicamentis simplicibus & compositis inuenies.

Sic bdellium saliuā matutina & hominis ieiuni subactum digitis in emplastri consistentiā vsurpatur, & alia alio modo in vsum veniunt cum humore aliquo trita, vt in compositis latius leges.

Ad aurium vlcera vino, vel dulci, vel *Lib. 3.* austero, vel veteri, vel medio ætate, vel *c.ph.p.* aceto, & eo acido, vinoso, acri, pro scopis

variis ipsorum, remedia non simplicia solum, sed & composita teruntur: sic ad oculorum affectus collyria sicca ex humore idoneo teruntur, & applicantur, & in aliarum partium affectibus similiter.

Clementer frianda in mortario quorum virtus attritu violento promptè exhalat, aut substantia sub ictu valido latefcit & mortario hæret, aut quæ multum sunt friabilia vt caphura, ambra, moschus, mastiche, myrrha, bdellium, thus, gummi iuniperi (verniciem vocant) cancamum, sarco colla, opus cyrenaicum, euphorbiū, aloë, scammonium, styrax calamites, bolus Armenia, terra lénia, & terra propè reliqua, & metallica, amylum, cerussa (quin hæc duo sæpe tantum cribro affricamus) saccharum, sanguis draconis, castorium, radix ari, dracontij, hermodactylorum, ellebori vtriusque, turbith, rhabarbarum, spodium, Arabum, trochisci agarici, dum scilicet quæ aliquando humida fuerunt, iam ficcata sunt.

Quorum si qua adhuc sint paulò humidiora, pistillo & mortario calefactis mox ficcantur, & simul puluerantur, friando continèter. Quod auxilium succis, liquoribus, gummis, resinis etiam mediocriter fluidis confert: sed eò frequentius & diutius

tius calefacienda & terenda quo illa fuerint humidiora, vt spes fit etiam oleum ipsum & terebinthinam venetam hoc ingenio pulueratum iri, atque adeò argentum viuum cum saluæ succo.

Sed lapides pretiosi & metallica foelicius puluerantur super lapidem marmoreum, porphyrium, aut marinum per molulam ducta, liquore idoneo pauco, ne puluisculum euolet, identidem affuso qui postea euaporet.

Argentum viuum sublimatum & precipitatum, cinnabrium vulgare, alumen scissile, quia cæteris tenuius sit puluerantur, vel etiam in mortario metallicorum aliorum modo.

Valenter tundenda reliqua vt quæ ob duritiam, crassitiem, lentorem, densitatē ægrè separantur, vt radicum corticum, lignorum, herbarum seminum plurima.

Qualia sunt radices althææ, apij, asparagi, aristolochiæ, asari, asphodeli, bryoniæ, behen, centaurij magni, cyperi, cyclaminis, costi, calami aromatici, cucumeris agrestis, dauci, doronici, dictamni vulgaris, helenij, eryngij, fœniculi, filicis, galangæ, gentianæ, glycyrrhizæ, graminis, iridis, mandragoræ, nardi, petroselinij, pyrethri, pæoniæ vtriusque, polypodij,

zingiberis, cortex radices capparis & tamaricis, & alij, & ligna omnia. herbae ite omnes praesertim siccae, flores chamemeli, schœnuanthos, & eius festucago nobis consueta pro flore, spica nardi, balauistiū, caryophyllum, & flores reliqui tam recentes quàm sicci, semina anisi, anethi, cari, cumini, coriandri, fœniculi, fœnigræci, lini, lupini, & reliqua, folliculi sennæ & fructus reliqui, succi, liquores gummi, resinae in particulas sectæ, & aliis inter terendum particulatim adiecti.

Limaturæ & rasuræ, & rapturæ ossium, cornuum, pudendorum.

Quædam parum diu sunt terenda, quia rara, tenuia, friabilia, virtutem superficialiam aut imbecillam sortita, quæ paucā sustinere trituram vulgus ait, viribus scilicet integris, de quorum quibusdam sic Galenus scribit lib. 4. c. ph. g.

Quæ ex succis & liquoribus, & lachrymis resiccatis proueniūt, ut myrrha, aloë, acacia (scilicet vera) & quæ his sunt finitima, ἐν λείωσι sunt, & faciliè læuia fiunt, ac promptè in puluerē mollissimum abeūt, ob id non diu terenda, ne ipsorum & virtus exhalet, & substantia tenuior euolet, ut caphura, ambra, moschus, & alia propè vniuersa, quæ clemēter terēda sūt ipsimus.

Quin

Quin & euphorbium parum diu terendum Mesuæ est, & spodium Arabum ex cannarum vstis radicibus: nam ex ebore vsto spodium, quod vocant, mediocriter terendum. Quod autem Græcis est spodiū, id est cinerula, & huic affinis (sed præstantior) pompholyx non teritur, tantum linteo cernitur per lotionem, aut etiam sine lotione.

Adhæc quæ acria & facile inflammabilia sunt, vt resinæ, liquores, gummi, quædam parum diu terenda. Nam tenuem horum substantiam calor motu accensus dissipat, & reliquum inflammat.

Sunt præterea quædam tam friabilia, vt etiam digitis attrita læuigentur: vt agaricus bonus, ari & dracunculi radix sicca, asphodeli radix vsta, quanquam illas multam coctionem sustinere dicat Mesues: Nam recentes intelligit non siccas. Sic amyllum, cerussa, calx ex teneriori lapide. Nam ex duriori vix hora post vna, etiam affusa aqua solui incipit, ea quæ ad lithocollam multò præstantior iudicatur, quanquam minus multò alba est.

Quædam multum diuque terenda sunt, vt compositioni sint apta, vt quæ crassa densa, dura, lenta, virtutem profundā aut validam, & agrè solubilem sortita, quæ

multam sustinere trituram dicimus, viri-
bus seruatis, vt metallica, lapidosa, ligno-
sa, neruosa, membranosa: quæ tamen ob
scopos medici varios nunc crassius, nunc
in pollinem mollissimum terenda sunt, vt
cum oculis applicanda, vel vreticis miscē-
da. Sic enim asarum, cuminum, & alia
permulta læuissimè terenda sunt, cum per
hæc obstructa expedire, distributionem
alimenti in corpus iuuare, vrinas moue-
re consilium est.

Myrobalanos quoque omnes quando
per earum substantiã viscera contrahi &
roborari volumus, mollissimè teri iubet
Mesues. Eadem ratione rha barbarum,
quanquã tunc etiam magis vreticum est,
vt purgatorium magis, si crassius teratur.
Quod autem purum est ac probatissimũ
intellige: nam rarius & laxius à vehemen-
ti & diuturna contritione resolutum exa-
nimatur, virtutẽque perdit Mesuæ. Sic
radices aliæ etiam aromaticæ vt exactè
puluerentur, diu terendæ sunt, acorus, ari-
stolochia, bryonia, centaurium maius, cy-
claminus, cucumis agrestis Mesuæ, co-
stus, cyperus, enula, galanga, iris, pæonia,
pyrethrum, polypodium, zingiber. Pauca
autem tritura fiunt læuia, agaricus trochi-
scatus, & radices aliæ clementer friandæ.

Metal

Metallica quoq; (inquit Galenus lib. 4. c. ph. g.) galla, cytinus, malicorium, Ægyptiæ spinę fructus, & id genus omnia sunt *δυσλειτουργία*, id est ægrè leuia, & tenuia puluerando euadāt. Metallica autem illa intelliguntur, lithargyros, arsenicum, sandarach, æs vstum, ærugo, chalcitis, chalcanthum, cadmia, tam fornacaria quàm lapidosa, plumbum vstum, molybdena, sulfur, alumen, stimmi, chrysocola natua (factitia enim facilius pulueratur) gypsum, cyanus lapis, & armenius: sed ille magis, & lapides reliqui, & bona pars aliorum quę per se terenda diximus.

Colocynthis accuratissimè debet teri ob causam à Mesue dictā, in simplicium purgatoriorum facultatibus, etiam si ea ob valentem vim purgatricem prius vacuari, quàm amaritudo eius agat, & tergeat, dicatur Galen.

Scammonium quoque exactè terendum, nisi cum in catapotia venit. Tunc enim crassius tritum diutius in ventriculo manet, potentiúsque agit.

Sic ossa, cornua, etiam vsta, pili, lana, sericum.

Plenam quoq; triturā sustinet centaurium partium, etiam cum floribus Mesuę herbe, etiam alię quę siccæ seruantur.

Mediocriter puluerando terenda sunt propè cetera, vt radices apij, asparagi, asari, nisi mouendū sit lotium, cichorium, calamus aromaticus officinarū non teredinosus, doronicū, dictamnus vulgaris, fœniculum, glycyrrhiza, gentiana, gramen, hermodactylus, iris Illyrica & Florentina, meū, radix mandragoræ, nardi, cœnantes, petroselinī, plantaginīs, phu, rubiæ, rusci, raphani, rhapontici, zingiber, zurūber: sic herbæ acres & aromaticę, vt hyssopus, thymus, nisi mouere menses, aut viuas volumus, & ob id diutius terimus.

In summa, quæ diu coqui possunt, debent etiam & teri: quæ parum diu coquenda, parum diu terenda: quæ mediocriter illud, hoc mediocriter ferunt, ob id trituram nonnihil clariorem tibi reddet coctionis cognitio.

Nec te moueat quòd quædam andis parum & mediocriter, vel multum & mediocriter terenda. Nam cū huius mediij magna sit latitudo, in ea quædam sunt extremis tam propinqua, vt vix fecerni queant. Sic agaricum medicum sustinere trituram Mesues scribit, aliis placet paucam, non tamen paucissimam. Quæ ratione etiam de primarum qualitatum ordinibus dissidia scriptorum illustrium

con

concilianda scripsimus in methodo medicamenta componendi.

Quaedam tenuissimè sunt terenda, vt promptius id actu fiant quod esse potestate dicuntur, vt quæ celerius in partes omnes affiendi corporis permeent, siue fermentationē (vt dicunt) quærimus, siue firmationem, & robur, siue materiarum incisionem, tenuationem, terfionem, vacuationē per vrinas, menses, sudores, insensilem transpirationē. Sic cordi, hepati, & partibus cæteris internis, præsertim longè ab ore dissitis roborandis idonea, ab his vacatura, obstructiones liberatura, vrinas aut menses motura tenuissimè pulueramus, vt essentia quadā tenuitate inde acquisita, & corporis sui mole exigua, promptius per oscula vasorū angusta, & per corporis habitus poros sensum latentes permeent, agantq; citius quod agere nata sunt: Ob id species omnes in hiera Galeni picra mollissimè terantur, & cribro serico cernantur, vt aloës, & aliorum vis in angustos ventriculi & partium vicinarum meatus penetret. Sic in theriaca, Mithridatio, aurea Alexandri antidoto, & similibus polychrestis cōpositionibus leuissimè terenda, vt promptius in se agendo & patiando, velut fermententur citius,

& sint vsui. Dum enim recentia sunt hæc opiata medicamenta, stupefaciendi vim præpollentem retinent. Non tamen omnino tenuissimè sunt pulueranda: nam sic eorum vis aromatica exhalaret.

Omnia stupefacientia dictis Antidoris, vel aliis miscenda, aut etiam per se vendenda sunt tenuissimè pulueranda, vt in paruos meatus, & longè positas, profundasque partes stupefaciendas penetrare, aut pertrahi possint.

Affectibus hepatis puluerata tenuiter debetur, tenuius lienis, tenuissimè renū & vesicæ affectibus, vt per ora vasorū angusta subeant. Sic thymus, asarum, cuminū, & similia tenuissimè teruntur in aurea, in hēmagogo, in diacurcuma maiore, in diachama maiore, & aliis similibus: in aluum verò subducētibz diospolitico, cōfectio ne Hamech, electario Indo maiore crassius eadē sunt terēda. Omnino etiam tenuissimè puluerentur debita affectibus oculorū, ne si crassiusculus sit puluis, aspera inæqualitate, & attactu oculi tunicas eximie sentientes dolore afficiat: præsertim si metallica sunt, aut lapides, aut similiter dura & sicca corpora. Saccharum enim candidū, bolus Armenia, etiā si minus exactè trita oculo imponūtur, humore ex

re ex ipso delachrymate mox solvuntur.

Terenda quoq; in pulverem mollissimū, quibus crassius tritis vis noxia & malefica inest, vt ea terendo vanescat, vt in colocynthide. Crassius enim trita cū sit spongiosa, humore superfluo imbuta tumescit, negotiūq; tunc magnū facessit pōdere, mole, morsu partibus quibus incubuit. Quę incommoda puluisculis eius accidere nequeunt, quia humoris non sunt capacia. Crassius tamen terēda cū in trochiscos alandal est formāda, sed ter quaterq; puluerandi trochisci & reformādi, vt ea tenuissimē tandem pulueretur. Eadem ratio est de agarico, substantia illi simili. Sed cū sit non paulò clementior, trituram minus accuratam postulat.

Rha barbarum quoque curiosē terendum, quando viscera astringendo robore, aut etiam vrinas mouere oportet, vti & myrobalani.

Quādam crassius terenda, quæ in ventre diutius morari volumus, nec promptē vasorum ora subire: sic purgantia medicamenta crassius teruntur, vt in ventrem partē minus principē, & vacuationi expositissimam ex corpore reliquo trahāt. Nō autem ad partes principes tota ferantur, easque offendant, cū ad has facultate,
aut

aut saltem vapore ferri, vel quod plurimum sit, portione paucissima sufficiat.

Crassius etiam teruntur, quorum virtutem multa tritura dissipari metuimus: sic scammonium vim purgatricem multa tritura perdit.

Eadem ratione stomachica crassius terenda, ut mora in ventriculo longa coctionem facilius iunent, neque cibo facile vis eorum obtundatur. Quæ præterea sunt aromata virtutem colato datura, & odoris ac saporis gratiam, non auctura substantiam: sic cinamomum negligentius terimus, quo quæ colantur aromatizamus: & cardamomum, zingiber, caryophyllum, macis, lignum aloës, spicâ, crocum negligentius teris: per hæc & panum rarum colaturus ænomeli.

Quæ item flatus dissipatura sunt, eadem ratione crassius pulueranda sunt, ut in diosporitico seu diacymino simplicia ut purgēt, & diutius in flatus agāt, licet tardius & imbecillius quam si tenuata magis essēt. Id quod si fieret, parum diu flatus dissiparent, tum quod vires citius eis frangerentur, tum quod per vrinas mox secederēt, easque mouerēt, cum calida sint & tenuia. Quædam præterea tantum crassius sunt frangenda ad vstionem futuram, ut lithargyros

Diosc.

Gal. li.

4.c. ph.

8.

gyros vrendus frāgitur in partes magnitudinis iuglandis: lapis phrygius vrendus in partes nuci auellanae aequales.

Quaedam etiam teruntur vt purius lauentur, de quibus in lotionibus abunde.

Ex his patet eadem medicamenta, nūc tenuius, nunc crassius terenda pro variis medicorum scopis, vt rha barbarum, asarum, nitrum, thymum, calaminthen, irin, hyssopum, pulegium, origanum, cuminum, curiosissime teri volumus cum Galeno & Mesue, quando his vrinas mouere nobis studium est: negligenter verò, cum alium mouere constituimus.

Sic, scammonium, colocinthis, & alia valenter purgātia, nunc crassius cum illud in pillulas, hæc in trochiscos transit: nunc tenuius ob dictas prius rariones. Rha barbarum tamen ferè tenuius teritur, vt colocynthis tenuissime, cum mox & citra aliam per trochiscos trituram sumenda. Scammoniū quoq; crassius teritur, si coquendum est cum aliis, aut diu ante vsum seruari debet medicamentum. Iq; ne vis eius coctione per ignem aut longuā fermentationem exhalet.

Et quæ partes remotissimas petere volumus, leuissime: si eadem ventriculo, intestinis, & primis venis, hære diutius,
cras

crassiusculè terenda sint.

Ex his omnibus simplicium simul terendorum ordo quidam instituitur, vt prima iniiciantur mortario, & terantur crassa, dura, lenta, vt radices, baccæ quædam, Semina propè omnia, vt quæ etiam glutinosa medulla constant. Paulò posterius aromatica etiam æquè teri contumacia, vt iuncus odoratus, calamus odoratus, zedoaria, zingiber, galanga, iris Illyrica & Florentina, seu nostrâs alba, costus, & cardamomum, carpobalsamum, cubebe, piper, nux moschata. Post hæc autem simul cum his xyloaloë, xylobalsamum, cassia, cinamomum, caryophylla.

Deinde succi, liquores, lachrymæ puluerabiles cum aliis de quibus antè, & quæ cū quibus aut per se terèda sint, diximus.

Semina verò oleosa, vt cucumeris, cucurbitæ, melonis, citreoli, cnici, cidonij, pistacia, strobili, amygdalæ, & similia sunt excorticanda, deinde incidenda scalpro, vt mox audies, ne puluerè reliquū glutinēt, & per cribrum transmitti prohibeāt.

Mineralia etiam ferè per se & seorsum teruntur, affusa interdum ob eorum siccitatem aqua pauca, ne substātia eorum tenuior euolet, aut vis exhalet, vt antè docuimus. Chalcitis autem, chalcāthum, & rugo,

rugo, sulfur, sandaracha, & alia quædam adhuc nō nihil humida, humectari nōlūt.

De succis, liquoribus, lachrymis, & animalium partibus abundè prius est dictū.

Mortarium papyro vel corio etiam interdum duplici est regendum (vt in Theriacis compositione diximus) interdum ne pulvis tenuior, præsertim preciosus foras euolet ac pereat: interdum ne is qualitate malefica præditus nares baruentis mordendo malè habeat, vt in Euphorbia & Turbith, & aliis non paucis euenit.

Ad trituram præparant, vel trituræ loco sunt, attritio in cote medica, mansio, sectio, fractio, rasio, limatio, raptura.

Atteruntur in cote medica (qualis est tonsoria) cum albuminis oui liquido, vel lacte, vel succo rosarum, vel seminis fœnigræci, aut cydoniorum, aut maluæ, aut althææ, ipsa collyria sicca, siue iam in pastillos formata, siue adhuc integra: sed tamen atteri apta, vt materia hæc tenuior & mollior contactu suo dolentem oculum non exasperet.

Ad attritionem confricatio amyli, aut cerusæ ad cribrum facta, vt puluerentur, est referenda.

Manduntur ad oris partium, faucium, asperæ arteriæ, pulmonis, œsophagi, ventri

triculi affectus, vt ad dentium dolorem
vinca, ligustri folia & germina, radix che-
lidonij, plantaginis, anemones, Galeno
manduntur in simplicibus.

Secantur radices crassiores, longiores
herbæ, virentes albæ aut siccæ, & flores
magni, vt nymphææ, rosarū, croci, & me-
dulla colocynthidis, & acacia nostrâs, &
troch. Galliæ: & capillaria, vt sericum, pili,
lana: & ligna, vt gaiacum, santala, berfi-
lium: & ramenta & velut bracteolæ ferra-
mento abrasæ, cornuum, vngularum, os-
sium, eboris, pudendorū, coriorum, ich-
thyocollæ, taurocollæ, & similiū.

Secantur autem quouis ferramēto in-
cidente & forficibus: ligna autem etiam
ligneo pistillo acies ferreas acutas haben-
te. Horum verò quædam post sectionem
in decocta & infecturas veniūt, vt gaiacū,
berfiliū, & quæ ex aliis voles. Alia, vt fœ-
licius & citius puluerentur, antè radun-
tur, pōst secātur. Sic de fractione, rasione,
rosione, raptione, limatione cēsendū est.
Ea scilicet nunc ad trituram interuenire,
nunc ad coctionē tantū, vel vsum aliū.

Scalpro autē sutorio huc illuc inclinato
identidem ac reclinato, vel cultelli verbe-
ratu crebro, vel duobus tribusue cultellis
inter digitos manus, vel alterius tantū,
vel

vel vtriusq; præhensis inciduntur minutissimè semina oleosa & maiuscula, quia sub ictu pistilli latefcunt & pinguescunt. Inciduntur autem per se, prius tamen depellata, aut cum paucò saccharo, ne etiã sic immodicè pinguescant & oleosa fiãt: supponitur autè iis folium papyri purũ, saepe mutandũ quãdo scilicet iam discissum est, & huic folio lignũ lque & volitũ.

Sunt verò secanda hoc modo semina cucurbitæ, cucumeris, melonis, citreoli, bombacis, cerasi, pruni, amygdalarũ, nistaciorum, strobilorum, anacardorũ, balani myrepficæ, castaneæ, auellaneæ, iuglãdis, tribuli aquatici, cnici, staphydis agriæ quæ aliter quoque teri posse prius docuimus in seminum tritura vniuersali.

Dactylos quoque intus & foris curiosè purgatos similiter incidimus, si condita cardiaca ingrediuntur.

Est tamen quando eos negligenter incisos cum aliis sicciõribus terendos iniicimus, præsertim si pauci sunt & multum sicci: aliquando tantum aceto horas aliquot vt 12. maceramus, terimus, per cribrum cochleari, vel manu impellente cernimus, vt in diaphœnico, in quo etiam amygdalas cultello depellatas cũ dactylis aceto maceratis quidã terunt & cernunt.

Frangimus manibus tenera & minuta, ut herbarum pugillos intorquendo digitis abrupimus, & radices pusillas & fragiles, cortices parum frangi cōtumaces. Agrē enim fragilia ferramētis secamus, aut pistillis tundimus.

Radūtur ut ante dixi, ebur, cornua, & ungulæ, pudenda siccata, coria siccata, ichthyocolla, taurocolla siccior, lignum gaiaci, berfilium, & quædam alia ut facilius vel coquendo vim suam humori cui incoquantur, impartiantur vel terantur. Raditur & cortex turbiti exterior, donec albū appareat Mes. Sic radix glycyrrhizæ ante triturā raditur, & aliæ radices, & ipsarū ut aliorū cortices, sed id ad purgationem magis pertinet, de qua postea dicemus. Raduntur quoque rapaci ferra, lotus, lignum gaiaci, buxum, suber, ebur, & dura alia quæ etiam dum ferra vulgari secantur, scobem reddunt non dissimilem illi quam rapaces ferræ ac veluti rudēs & crassæ limæ elidunt.

Ferri præterea albi lamina tenui, curuata, foraminibus multis exasperata cōminuimus affricando agaricum, nucem moschatam, zingiber. Mala item cydonia, ut succi hoc plus reddant, quam si in mortario terantur.

Limatur

Limatur præterea aurū, argentum, æs, ferrum, chalybs, plumbum: quædam ut viantur, postea terantur: alia ut etiam citra vstionem in usum veniant, ut aurum, argentum, sed horum duorum limaturæ loco satius est auri & argenti foliis uti. Limantur quoque ligna prædura, gaiacum, santala, berfilium, ossa cranij humani, dentes & maxillæ lucij, dentes apri exerti, & castoris, cornua cerui, capri, rhinocerotis, & ungulæ quorundam ex his, ac ebur. Pudendum quoque tauri, cerui, ichthyocolla, taurocolla, quæ etiam radi & secari docuimus.

Rasio autem limationi finitima est, sed ramēta sunt maiora limaturis, quia horū instrumenta sunt insignius, sed rarius dentata quàm limæ. Radēdi quoque modus est alius in lignis edolandis, qui ad tritram quoque, & coctiones vsui esse possit.

DE CRIBRATIONE.

His terendi differentiis ordine optimo succedit cribratio, qua purū & minutius secernimus, quomodo pistores similaginem, & farinæ florem puriorem ac tenuiorem a fursurea & crassiore separāt. Cribrationis ratio eadē est quæ tritura, ob id quæ tenuiter puluerāda, tenuiore cribro sunt cernenda: quæ tenuissimē,

tenuissimo, vt pulueres dicti cordiales cri-
bro sericeo, tafetum vocat vulgus, inter
manus agitando cribratur metallica, ad
oculos tenuissimè terenda, & cribro te-
nuissimo cernenda: sic vrinas mouentia,
obstructiones liberantia. Cōtrā verò quę
aluū mouere & purgare volumus, cras-
sius terenda, & cribro crassiore ac ratio-
ne cribranda sunt. Et quę per se teruntur
si cribranda sint: per se cribrantur, vt me-
tallica quę aliis mista citius, & ante iu-
stam puluerationem descendunt.

Cribramus autē interdum ad trituram
meliorem, frequentius ad misturā aptio-
rem rerum iam mole minimarum. Quę
enim cribrum non permeauerūt, tritura
reddūtur: quę crassius terenda sunt ratio-
re, vt dixi, cribro cernenda: quę tenuius,
densiore, vnde varia cribrorum multitu-
do fuit necessaria. Quędam enim cortice
tiliaceo, angusto, sed æquali, cancellatim
connexo constant, cribrando scobe gaia-
ci, vel agarico infectorū, & similiter cras-
siusculè tritis idonea. Vidi & ex assiculo
terebella passim pertuso cribrum argillę
colandę idoneum, alia his minus lata ha-
bent foramina, neque vt hæc quadrata
sed rotunda, vel oblonga in pergamena
circulo ligneo subsuta, quibus triticum,
hordeum

hordeum & alia cerealia, sæpe etiam legumina seminibus alienis, sed minutioribus purgamus. Hæc enim per lata foramina ob paruitatem facile descendunt: semina bona foraminibus maiora retinètur.

Alia seta equina in telæ modum cancellatim contexta constant, circulis duobus ligneis vtrinque tensa, quorum inferiore hæc præhenduntur, atteruntur, & impinguntur: superiore verò materiæ cribrandæ continentur. horum verò cribrorum copia & differentia magna est, & usus plurimus. Quædã enim solum in medio ligneorum circularum habent velut telam illam equinam, & his manu tantum molliter succussis, pulvis in subiectum catinum ligneum, vel papyrum descendit, superna eius parte interim papyro tecta ne pulvis euolet. Eoque utimur in pulueribus parum pretiosis.

Alia præterea fundum & operculum habet exemptile, sed vtrunque corio vecino clausum: illo pulvis per cribrum transmissus excipitur, & probè ne exhalet aut euolet cohibetur, hoc ne portio cernenda exhalet, aut euolet prohibet. In his verò multæ sunt in raritate & densitate differentiæ, quarum singularum suus est usus, non modò ad medicamentorum te-

rendorum genera, sed etiam ad componendorum speciē variam constituendā.

In his item quædā telæ equinæ loco fericum habēt (tasetum vulgus vocat) & id vel album pulueribus electariorū alborum, vt diatragacāthi, diairis destinatum vel rubrum debitum, pulueribus electariorum rubrorum, vt diarhodi, dia trium santalorum, diacubebe, diamargariton.

Vsurpatur itaque id cribrorum genus aliis pretiosius, ad pulueres etiam pretiosos, & vt vocant cordiales, neque vt præcedentia setacea lignæ mensæ, aut alteri solido corpori violentius impinguntur succussando, sed manibus tantum mollissimè versantur, vt sine violentia puluis tantum tenuissimus descendat.

Est etiam linteum magis minus, rarū, densum, cribri loco in metallicis præferitum, & terreis corporibus: Latius autē id est, remque cernendā comprehendit, ac inter pyxididis alicuius lignæ vel alterius, sed grandiusculæ operculum & corpus concluditur & constringitur, deinde vna manu ferè violentius succutitur super abacum pharmacarium, vncia vel simili pondere, sed plumbeo in linteum etiam prius immisso, vt id suo motu & pondere res has cerni difficiles acceleret, quem
cernendi

cernendi modum cicotrinizare vulgus vocat, voce ex *λεοντισην*, id est, cribrare corrupta, & in id contorta.

Vt autem radices, herbae, semina, fructus & alia pleraque cruda, & cocta teruntur, etiã cribrantur: sed ferè vi manus aut cochlearis quomodo cassiam & thamarindos sine tritura cernimus: sic radices eryngij, satyriorum, raphani, diaconij coctæ, trita, cribrantur in diafatyrio.

Sed hæc cribratio immoto sit cribro, quæ verò pulverum est cribratio, ferè sit cribris abaco incussis valenter, sed numerose, vt taratantara audire videaris. Alia cribro manu suspensa agitato, alia vt cardiaci cribro inter manus versato, non in abacum incusso, ne etiam horum partes crassiusculæ vi impactæ per cribrum permeent. Alia pyxide duro corpori manu vna valenter allisa.

Cerusa & amyllum, & cerusa serpentaria cribro affricantur manibus: sic quæ citra trituram cernuntur.

Quæ autem cribrũ non superauerunt ob crassitiem, teruntur donec ob tenuitatem tota cernantur: nisi quod dũ paucissimam superat, idq; tenuissimo proximũ, cæteris iam cretis commisceri solet aut seruari, vt aliis eiusdẽ generis, vt postea

terendis & cernendis iterum misceatur.

Colatio cribrationi licet genere & natura sit affinis, quia tamen nō est siccorum, sed magis liquidorum, ob id in alium locū referenda fuit, tanquā dissolutioni, coctioni, infusioni, clarificationi, & aliis ple-
risq; præparationū differētiis necessaria.

DE DISSOLUTIONE.

Dissolutio autem seu dilutio tritura quædam esse videtur, quod per hæc medicamenta tam simplicia quàm composita læuia fiant, sed adiecto humore aliquo, non etiam sicca permaneant si prius erant, ut se ad trituram habeat hæc, quomodo colatio ad cribrationem.

Solutio igitur seu dissolutio, seu dilutio est medicamenti vel simplicis, vel compositi consistentia crassioris in humore quopiam idoneo facta resolutio in consistentiam, vel mediocrem, vel paulò hac crassiorem aut liquidiorē, pro medicamenti soluendi, & humoris soluturi quantitate & consistentia, & aliis medici scopis.

Quod enim minus erat crassum & humore perliquidum, eodēque largo est solutum, erit liquidius, contrarium crassius.

Huius autem dissolutionis multæ sunt causæ. nunc enim dissoluimus ut medicamentum facilius & iucundius deuoretur,

&

& citius distribuatur & subducatur, cum facilius sit & iucundius sumere liquida quàm crassa: vt facilius & gratius est impleri potu quàm cibo. Sic opiatas, castiã & alia plurima quotidie dissoluimus.

Nunc vt aliis ad compositionē promptius misceantur, & vnà cum his aut etiã per se coqui possint, quòd sicciora ipsa promptè vrentur. sic saccos, liquores, lachrymas frequenter dissoluimus, vt euphorbium recens oleo dissoluitur, vetus autem fortasse non dissoluitur Mef.

Nunc vt in partem affectam possit medicamentum penetrare, aut illi applicari & adhærere. Sic in aurem iniicienda, in intestina, in vterum, in vesicam, in sinum aliquem liquidiora reddimus.

Sic ladanum oleo largiore soluimus in capillato aut etiam modicè tonso quàm in raso.

Nunc vt colari & colando purgari ab excrementis possit, vt liquores, aceto vel alio humore idoneo soluti colantur, & purgãtur, Ammoniacum, opopanax, galbanum, sagapenũ: Sic succi siccati, gummi, resinæ recentes aliquãdo & veteratæ ad electariorũ mollium, catapotiorum, linimẽtorum, vnguentorum, ceratorum, emplastrorum missionem, sed lachrymæ

resinosa, oleosis: gummosa, aquosis humoribus melius soluuntur: vel ipsae recentes alia ficciora dissolunt, sed ut dixi similia magis, idque dum molle medicamentum est futurum, in quem usum multa quoque huius generis coquuntur. Eadem portione parua cum multis ficcioribus teruntur, ut in puluere hierae dia-colocynthidos.

- Lib. 8.* Lycium aqua diluitur Galeno ad haemorrhagiam.
c. ph. p.
Lib. 4. Pix liquida cum melle lingitur.
c. ph. p. Tragacantha in oui albumine soluitur in arteriacam.

Fel scari piscis cum myrrha stacte miscetur, stomatica medicamenta dissoluntur aqua vel mulla ad gargarizandum, dissoluntur humore quouis & sine calore, promptius cum calore.

Bolus Armenia vera, terra lemnia vera, calx, sal, saccharum, saccharata omnia, manna, cerussa post longam velut bullitionem, chalcitis, chalcanthum, ærugo, rubigo: sed hæc oleo citius mollescit.

Dissoluntur aceto forti, præsertim destillato vel succo limonum vniones seu margaritæ testæ ouorū, lapides renū, vesicæ, coralliū vtrunque, eaque post siccata promptè friantur. Præcipitatu & sublimatum

tū & cinabriū, in argentū viuum redeūt.

Etiā aurum & argentū & metalla alia suis valentibus aquis dissoluūt chymistę.

Soluuntur ergo simplicia quidē ammoniacum, sagapenum, galbanum, opopanax, thus masculum, opium, scammonium, aloë, hypocistis, succus glycyrrhizæ, pissasphaltum, mumiam intelligo, aqua simplici, aqua vini, vino, aceto, similibus & his frigidis, sed longiore tempore quàm calidis. Feruentibus enim his humoribus prædicta citò soluuntur: priora quinque in lacteum quēdam succum, posteriora totidem in nigrum.

Opium soluit sapa Galenus in trochiscis dia opiu.

In oleo frigido prædicta etiam horis 6. non mollescunt quidem, in calente opium, scammonium, aloë, hypocisthis, succus glycyrrhizæ, etiam soluuntur: cætera mollescunt tātum, postea durantur, præsertim Ammoniacum. In eodem oleo & prædictis humoribus etiam calentibus ladanum, mastiche, myrrha, bdelliū, sarcocolla, styrax, gummi arabicum. Sarcocolla in aqua rosarum dissoluitur in pilulis sarcocollæ.

Castorium, mumia, mollescunt statim: tragacantha tardius, sed in oleo hæc mol
lita

lita non multò post durefcunt præter maftichen, quæ foluitur in oleum: nec ad naturam redit nifi igne valentiore coquatur, vt docet oleum maftichinum.

Acacia noftiâs, fulfur, gagates in his omnibus humoribus etiam feruentibus, nihil mutantur, fed acacia paulatim piftillo ex humore aliquo friata foluitur, vt fucci alij & liquores, fulfur & gagates igni liquâtur, vt liquores omnes, opium, ladanum, chalcitis, chalcanthum, alumen omne, xylaloë vera, vnguis odoratus.

Soluuntur humore quouis calido chalcathum, chalcitis, & hæc etiâ aceto frigido.

Ærugo, fori, nitrum, alumen, in aceto frigido non liquefcunt, vt nec creta: fed hæc multum diùque feruet, fitque multò fragilior, vt & prædicta.

Saccharum, māna, quouis humore foluuntur. Saccharū autem ad fyrupos, iulepos, apozemata, electaria folida, penidia, trochifcos, & alia opera plurima variè foluitur vt in antidotis Mefuæ leges, Saccharum aqua & melle foluitur Mefuæ in diazingibere: Manna verò fere foluitur iufculo calente, & colatur ad foliorum larcis in qua frequentior colligitur, & aliorum excrementorum feperationem.

Māna, caffia, thamar indi in succis purgatis

gatis dissoluuntur & colantur in diamāna, & in aliis, melius sic miscentur quā coctione. Manna dissoluitur in succo rosarum rubrarum in electario mānæ. Moschus, ambra, caphura, ferè humore aliquo soluta aliis miscentur.

Tartarum vstum, in oleum vi frigidi soluitur, alio solutionis modo.

Sed vide ne dum acetum vel humorē alium quo ammoniacum vel alium liquorem soluisti, coquendo consumis, salaris. Nam sæpe humorem alium ex se remittunt: quem si consumere pergis, ipsorum liquorum humidum consumis: fiuntq; hi siccissimi, & exucci, & emplastro ob id inepti.

Quæ verò composita quibus humoribus soluantur, non est operis præsentis docere, sed ad modum componendi singula medicamenta pertinet.

Composita tamen plurima, vt electuaria purgatoria, cū aut ingrata sint aut egrè deuorantur, aut citius descendere volumus, neque nausea metuitur, prissanæ aqua, hydromelite, vino, vel alio humore idoneo dissoluimus. Trochiscos in cote medica ex humore idoneo etiam in collyria humida sæpè dissoluimus. eclegmata in ore salua soluantur.

Ex

Ex his constat solutionis nomen hic minus latè patere quàm cap. 6. libr. 4. metheororum, vbi ad mollitionem & liquationem quoque extenditur.

DE MOLLITIONE.

MOLLITIO solutioni & liquationi proxima, fit cum medicamenta tã simplicia quàm composita redduntur molliora, idq; vel affuso humore aliquo sed pauco, vel solo calore nostro, solis, ignis id vulgus malaxare vocat, verbo de torto ex futuro *μαλάξω*, verbi *μαλάγω*, id est mollio & subigo: quæ duo per malaxare etiam intelligunt, nec eo libenter vtuntur alibi quàm tum in catapotis cū succo aut syrupo aut humore alio remolliendis & subigendis, tum in emplastris oleo, adipe, vel simili emolliendis.

Calore mollescunt cornua, vngulæ, piluli, succi, liquores, lachrymæ, vt etiam digitis calentibus tantum tractatæ, ceræ modo ductiles fiant tanquam à frigido concretæ non solū sicco duratæ. Calore modico mollescit ferrum, & alia metalla immodico liquantur.

Zitho (qui potus erat Alexandrinorū, nostræ ceruisiæ similis) ebur mollescit.

Vniones, corallia aceto destillato mollescunt, & vt dixi, soluuntur.

DE DVRATIONE.

DVRATIO mollitioni contraria nobis interdum est in vsu in cōditis, electariis, ceratis, emplastris, gelatinis vt vocamus. Ea autem fit nunc mistis siccioribus, nunc multa coctione, nunc frigore coagulante. De siccatione autem postea fusius agemus adhibenda medicamentis plurimis, non vt durecant, sed vt seruari possint, & ob causas alias inibi dicendas. De calfactione quoque & refrigeratione paulò post dicemus, quarum tractatio durationem abundè illustrabit.

DE LIQVATIONE.

LIQVATIO seu fusio est eorum quæ à frigido cōcreuerunt in liquidiorè & fluxilem consistentiã à calore facta resolutio: ita, vt quæ à frigore imbecillo aut non diuturno sunt concreta, vt mel, cera, oleum hybernium, butyrũ, adipēs, medullæ, resinae à calore moderato glaciei, niuis & grādinis modo liquētur. Quæ verò à vehementi & diuturno frigore concreta obriguerūt, ægrè multo calore funduntur, vt aurum, ferrum ægerrimè, argentum, æs facilius, stannum his facilius, facillimè plumbum, stibium, arsenicum, sandaracha, sulphur, alumen omne (quauis scissile tantum mollescere videatur
non

non etiam liquari & fluere) chalcitis, chalcanthum, misy & ærugo tardius, tardissimè fori (quia terreum & saxum) vt lithargyros. Is tamen cum ærugine vel oxaleo duplo citius liquefit quàm cum hydro-læo duplo.

His promptius liquantur gagates, succinum, vnguis odoratus, id est blatta bizantia, asphaltum, pissasphaltum (mumiã intelligo) xylaloë.

His promptius, ladanum, Oesyphus, castorium, sanguis hirci, gummi arabicum, tragacantha, cancamum, caphura, myrrha, bdellium, styrax, mastiche, sarcocolla, gummi hederæ, iuniperi, cerasi, pruni, amygdalarum.

Resinæ his facilius. Acquẽ autem facillè liquores, opium, euphorbiũ, ammonia cum, sagapenum, galbanum, opopanax, scammoniũ & succus glycyrrhizæ, hipocisthis, aloë, elaterium, lycium nostrãs.

Cera omnium facillimè: Mel, aëromeli seu manna, saccharum, humore etiam frigido vt sal soluuntur.

Acacia nostrãs & sæpe non liquantur, sed humore aliquo cum pistillo, aut cochleari aut manu paulatim soluuntur.

Prædicta quoque omnia) succos, liquores, gummi, resinas intelligo) calenti humore,

more, vt dixi mollescunt: quædam etiam soluuntur: nonnulla item liquantur.

Ambra minutim concisa liquefcit Me sua in E. diacocubaphices.

Porro liquationis necessitas magna est ad miftionem electariorum, catapotiorum, vnguentorū, ceratorum, emplastro- rum, & reliquorum propè compositorū.

Quoniam in superioribus præparandi diffi- ciliis virium caloris, frigoris, hume- ctationis, & siccationis meminimus, & in sequentibus eorundem mentio frequens nobis est futura, prius de his est nobis a- gendum, quàm ad infusionem, coctionē, affationem, ystionem & alia multa, calo- ris & aliarum primarum qualitatū ope- ra transeamus.

DE CALFACTIONE.

DE calfactione autē agemus, nō qua- tenus soluit, mollit, liquat, coquit, affat, vrit, vel aliud insigne opus præstat, sed quatenus calorem rebus præbet mo- deratum, miftioni necessarium, vel etiam alicui præparationum differentiae, vel ipsi denique medicamentorum simpliciū, vel compositorum vsui dextro.

Calefit in sole meridiano acopum Gal. populeum lib. 4. sanat. tuendæ, vt fermententur & probius misceantur eorū vires.

In sole teri vult Galen. metallica, vel lauanda, vel in aliud vtenda.

Colanda calfactione tenuatur, vt promptius permeent: frigida enim velut cōcreta non percolantur, nisi sint multū aquosa & liquida, vt oxymeli Galeni, calidiora autem cum sordibus tota colum penetrant, nisi sint glutinosa. Talia enim multum calida colanda. Tepidam damus aquam, vt sit vomitoria.

Calidas modicè damus potiones medicas, non solum purgatorias, sed etiam corpus firmaturas, vreticas, mēses aut sudores moturas, obstructionem viscerum aperturas, præsertim cœlo frigido & ventriculo frigidiorē natura, aut ex morbo.

Calefacimus aquam & alia omnia quę aqua fluente, aut niue circumposita volumus frigidiora reddere, quòd in humorem calore rarefactū frigus se altius insinuat, vt ferrum candens aqua frigida & astringente temperatur, vt sit durius.

Calefacimus modicè infundenda, vt vires suas promptius in humore, cui infunduntur, transmittant. Calfactus enim humor tenuatur & infusa res rarefit, quibus fit, vt eorū vis calore promptius trahatur. Alia propè innumerabilia calfactione egent, sed admonēdi gratia magis quàm docen

docendi calfactionis, refrigerationis & humectationis meminimus: siccationis autem maior est necessitas.

Refrigeramus aqua fluente, aut niue, aut glacie etiam prius calefacta, quæ febriū vehementia, aut aëris intēperiei calide opponimus pocula medicamentosa. Et quæ à frigido cogi volumus, vt ius carniū glutinosarū in gelatinā vulgò dictā.

Refrigeramus omnia calore preparata priusquam reponamus.

Refrigeramus quæ calore soluta frigore volumus concrefcere, & durescere, vt electaria sicca, cerata, emplastra.

Quæ calfaciunt, & refrigerant etiā per accidens siccant, ob id ordine bono iam de siccantibus agamus.

DE SICCATIONE.

SICCATIO est consumptio humiditatis, aut noxiæ, aut excrementosæ, ob id nauseabundæ, vel promptè putrentis, vel puluerari prohibentis, vel caliditatē quæ sitam obruentis. Absumitur interdum, & naturæ humiditatis aliquid, plurimum autem in assatione & vstione.

Scillæ partes maximè mediæ direptis viuo tenuis tunicis, frustatim confectæ coquantur, mutata sæpe aqua, donec ipsa nec amaritudinē, nec acrimoniam habeat,

traiectaque lino frustra illa sic, vt se non contingant, siccantur in vmbra dies 40. His segmentis ad oleum, vinum, acetum scillinum, vtimur. Hæc Dios. vbi neque cultri ex ligno pini vel cupressi scillam diuisuri meminit, neque acus lignæ, cum Mesue in aceto scillite, nec medium eius abiiciendum iubet, (quod hodie solenni quodam more fieri ab omnibus video) sed tantum tunicas externas ad vsque viuas & integras.

Triticum electum negligenter tritum aqua per noctem maceratum, post die manibus expressum reddit cremorē: qui dū resederit, inclinato vase quod superna tat sensim effundendum, reliquum bombace vel sole æstiuo mox siccandum, ne accescat: repositum operculetur metu vermiū: hoc amylū, hyeme igni siccetur. Sic ex oriza & hordeo, & aliis fieri potest.

Rosæ mediocriter apertæ sereno cœlo mane lectæ eodem die vt sunt siccantur sole, si potes, sæpe vertendo. Nam vix vmbra siccauerit, quanquam id esset optatius, siccatas auelle, & reconde vase vitreo operculato, vt odor & color perseuerent. Meliores montanæ cāpestribus & minus minuūtur siccando, cum ex harū libris decē siccatis lib. vnica supersit quibusdam,

busdam, idem de violis. Scilla siccatur in eclegmate Mesuæ ad asthma, ad saccharum rosatum & violatum, rosas & violas *Lib. 4. sanat.*

modicè siccatur Mesues: hyssopus in eclegmate sano, mētha in eclegmate aromaticum, ruta in altero diacymino Mesuæ, ut in Galeni diospolitico, sed modicè. Nam supra modum siccata, acrior, amarior, calidior euadit, non siccata flatus minus discurrit, quia humorem quendam excrementosum nondum percoctum retinet.

Herbæ itē reliquæ umbra siccantur, nisi utendi necessitas cogat te quasdam igni vel sole siccare. Nā in manipulis ligatæ in granario pensæ siccantur: ubi siccatae sunt, sacculis cannabinis ibidem reponuntur.

Radices herbarum lotæ, à lignosa matrice secretæ, mox insolentur, nocte in aëre sicco perflatili seruentur, iterum soli reddantur, donec erunt probè siccatae. Quod si cælum est nubilum, sicca fumo, aut potius prope ignem, in calatho stramētito, vel saligno: aut si utendi celeritas urget, sartagini calfactæ, & ab igni remotæ ipsas toties impone identidem vertendo, & sartaginem recalsaciendo exemptis tunc radicibus, donec abundè erunt siccatae. sic radix enulæ, valerianæ, acori nostratis siccatur. Idem in radicibus quorundam fru-

ticum, vt capp. tamaricis : & arborum , vt fraxini, mori, faciendum est.

Radices iam siccatae si aegrè puluerantur, papyro insertae igni siccantur, vel calidae sartagini imponuntur, & igni exponuntur: igni autè vel in sartagine vel papyro, vel furno, vel supra, aut intra furnum, à quo panis extractus est. Radices eadè, & aliae magnae recètes, lotae, radiculis purgatae, ac per tessellas incisae, filoque transfixe paruis interuallis, ne se tangant, in aëre ventoso & perflatili siccantur, vt radices ireos, aristolochiae rotundae & longae, bryoniae, & similia: quae tamen etiam citra diuisionem probè siccantur, vt radix ari, dracunculi, cyclamini, asphodeli, vt eliginatae prius istae, mandragorae, eryngij apij, petroselini, foeniculi, rusci, turbith, ellebori vtriusque, dictamni vulgaris, thapsiae. Paruae radices aliae citra eligationem in umbra quoque siccantur, vt asari, asparagi, graminis.

Mes. Colocynthis septembri legitur dum flauescit, maxima, & cum aliis multis producta: insolatur diu, quia aegrè siccatur, & nocte in aëre perflatili reponitur, aut si caelum est nubilum, filo transfixa fumo siccatur, post excorticatur, vt teratur, item quarta parte horae inuoluta papyro insolatur,

latur, vel igni, aut fumo admouetur.

Aloë decocto aromatum imbuta sicca- *Ibidem*
tur, primo in umbra, deinde in sole: sic
myrobalani trita oleo amygdalarū dul-
cium, æstate triduo conficata, & quoties
opus erat irrigata siccantur primū in
umbra, deinde in sole. Trochisci tamen
ex his facti in umbra tantū siccantur.

Pulmo vulpis sana, venatu capta, iuue-
nis, aqua abluatur, incidatur secundū ar-
teriam venosam, & magis multo secundū
venam arteriosam, sanguine purgetur, vi-
no albo, odoro, modicè calido lauetur, ol-
læ impositus clibano parum calido sicce-
tur, refrigeratus, & foliis absinthij inuolu-
tus reponatur. Plura de his leges in fine,
in his quæ pluribus modis præparantur.

Amygdalæ & nuclei pinei cortice re-
nui ablato in pelui super prunas ignitas
per se, vel potius cum furfure ducatur, &
succutiatur donec humiditas rancida, aut
excrementosa cōsumatur, alioqui pecto-
ri nocent, & tussim excitant qualitate ran-
cida. Pruna, ficus, vua, zizipha, myxa, py-
ra, & alij fructus multi sole feruidissimo,
aut eius penuria igne siccantur: sed vua
oxyacanthæ umbra siccat.

Fructus quoq; rubi immaturi clibano
siccantur ad maiorem astrictionē, & mo-

ra viridia, aut subrubentia. Fella in folliculo parum cocta ex aqua calente in umbra siccantur. Coagula animantium parum salita insolatu siccata servantur.

DE HUMECTATIONE.

Humectantur nunc aqua, nunc lacte, nunc aëro; nunc oleo, vel alio humore medicamenta, nō modò simplicia, vř felicius & innocentius in compositionem vel vřum veniant, sed sępe etiā composita, vt cū crassa humore diluimus, quò facilius & iucundius deuorentur.

Caryophyllū, zingiber, myrobalanos, cepulas, & emblicas ad condituram, qua industria humectes, docet Mesuēs initio libri sui de antidotis, & in simplicibus.

Mastiche, moschos, ambra, terendo humectantur aqua rosata.

Gummi Arabicum, eragacantha, aqua etiam vini, myrobalani, scammonium, colocynthis, caphura, turbith, sericum, crocus, euphorbium, & alia pleraque, terendo humectantur oleo amygdalarum dulcium.

Amygdalę, strobili, pistacia, parum humectantur aqua dulci aut rosata ad meliorem trituram & saporem delicatum, si emulsionem, amygdalarum, marcipanes, facturus es, alioqui pinguescunt, & palato
ingr

ingrata fiunt & ventriculo, vt etiam nau-
seabundæ fiant.

DE INFUSIONE.

Hvmectationi proxima est infusio: in
hac enim medicamenta parum trita
aut concisa, nisi minuta sint, macerantur,
& temperantur humore aliquo scopis no-
stris apto, eo magis minus calido à sole
vel igni potius quàm frigido. Tēpus au-
tem quo id fit varium est. Nam nunc in-
funduntur semihoram, nunc horā, nunc
horas plures, dies, mēses, pro varia medi-
camenti natura, & aliis medicorum sco-
pis. Vt enim quēdam parum diu terenda
& coquenda, sic infundenda, quòd virtu-
tem habēt vel imbecillem, vel superficia-
riam, & rara sint admodū. Contraria diu-
tius infundenda. Varij præterea scopi me-
dicorum faciunt, vt nunc minus diu, nūc
diutius quēdam sint infundenda, & quē-
dam (vt nuper distinxī) minimo aut me-
diocri, aut valido calore in id fouenda.
Medicamenta infundimus, vt facultatem
eorum maleficam quidē auferamus vel
castigemus: bona verò augeamus vel in
humorem ipsam vtendam transferamus,
quos tres infusionis scopos præcipuos à-
bundè Mesues docuit lib. I. & nos lib. 3. de
ratione componendi medicamenta.

m s

Infunduntur autem hodie potissimum purgantia medicamenta, sed etiam alia in apozemata, syropos, olea, & alias compositorum medicamentorum differentias.

Humor verò cui infunduntur maximè varius est, pro scopis variis, purgantia tamen frequenter sero lactis infunduntur, quia purgatorium, & ori iucundum, alia humoribus aliis, ut post audies.

Mes. Thymelææ fructum aut folia, & tithymalorum, & similiter lactariarum aceto infundimus.

Turbith lacti recens mulso infusum & siccatum ventrem turbare desinit.

Aloë decocto aromatum vel specierum hieræ, & aliorum quorundam calidorum macerata, citius etiam in ventriculi tunicas altè recepta vacuat: illi autem decocto si colocynthis aut turbith addatur, etiam à longinquo trahet aloë facultate acquisititia, non insita.

Ibidem Myrobalani obstruere desinunt si infundantur in serum lactis vel succum fumarie, addito præsertim absinthio, vel agarico, vel rha barbaro.

Senna cōtrita horis vigintiquatuor in succis maceratur, semel aut bis feruescit, colatur, exprimitur in syrup. Saporis.

Manna maceratur succo intybi, feruescit,

fit, manibus fricatur, colatur in syrup. acido ex manna.

Rha barharum infunditur aquæ cichorii, vel intybi, vel apij, vel pantaginis, adiecto interdum vino albo pauco, & cum Mesue spica, pro variis medici scopis. Id autē ante infusionem scalpro aut cultello in tenuia velut in folia incidatur, potius quā vulgi more teratur, ne vis eius exhalet.

Ibidem

Thamar Indi infunduntur sero caprino, aut succo fumarie, vel lupuli: modos eorum infundendo varios lege in simplicibus Mesuæ.

Ibidem

Rosæ & violæ infunduntur aquæ aliquoties, vt syrupus inde purgatorius coquatur: infunduntur & aceto, quod ab his rosatum & violatum appellatur.

Ibidem

Alia propè omnia simplicia purgantia variè infundi docet Mesues in simplicibus.

Cyminū in diospolitico seu diacymino maceratur vigintiquatuor horis aceto, deinde vase terreo bene cocto frigitur, & siccatur: id autem fit vt citra calorem altius penetret ac incidat.

Lib. 4.

sanita-

tu tuē.

Radices vreticæ calentes eadem ratione aceto 24. horis ante vsum macerantur: si autem postea sint coquendæ ex aqua, satis est prius horas sex aceto macerasse. Eadem ratione semen anisi, anethi, apij, ameos

ameos, amomi, cari, fœniculi.

In oxymelite melanogogo simplicia macerat Mesues horis vigintiquatuor acetato albo, aqua, succo buglossi.

Coriandrū acetato cui incoctus sit sam-
pſuchus maceratum rectè corrigitur.

Gal. li. 6. simp. Dactyli acetato macerantur triduo in dia-
phœnico Mesuæ.

Semen erysimi aqua macerandum est, ad obtundendam igneam eius caliditatē, priusquam eclegmatis misceatur.

Nuclei pinei virides aqua macerandi, ut acrimoniam in ea exuāt. In E. Hamech simplicia infunduntur sero lactis quinq; dies Mesuæ. Lupini aqua fluuiali diebus 6. 7. 8. macerati mitescunt & dulcescunt, uti aqua priore abiecta cocti.

Cicera, triticum, hordeum lacte aliquoties infunduntur Mesuæ, & siccantur in puluere impinguate. Cicera aquæ incoquantur in diasatyrio secundo, utrunque sit ut pars eius nitrosa & tergens, in lac & aquam transferatur, reliqua eius substantia seruetur.

lib. 4. sanit. Semen abietis & flores populi macerant dies quadraginta oleo Galenus, sæpē tres, quatuor & plures menses, postea exprimit oleum digerens & acopum.

Sericum crudum cocco baphica tin-
ctum

Etum maceratur succo pomorum, succo granatorum, decocto corticum citri & aliis syrupis ex succis simplicibus & compositis, donec ij succi rubeant, & serici simul & cocci facultatem acceperint.

Infusio hæc dum facultatem medicamento vel maleficam emendauit, vel bonam auxit, aut in humorem transtulit, finem suum assequuta est: sæpe tamen fit, vt præparatio quædam sit coctionis, sic ante coctionem simplicia aliquādiu macerata passim reperiēs, imò & post coctionem, ante ipsam colationem, præsertim dum vis quæsitæ agrè in humorem trahi potest ex materia dura, crassa, densa. Sic lignū gaiaci, ebeni, buxi, fraxini, genistæ, iuniperi etiam tritum aut limatum diu, etiam ad triduum ante coctionem humore aliquo idoneo maceramus, vt vires eius incidentes, tenuantes, tergentes tandem in decoctum trahantur.

Quin & medicamenta nodulo ligata, iusculo vel alteri leuiter incoquimus infusionis loco: & quæ infudimus sæpe semel aut bis seruefacimus ante expressionem aut colationem.

Infunduntur præterea quædam tantum, vt tenerescant, idque ad condituram vel coctionem celeriozem.

Sic

*Mes.in
simpli.*

*& con
ditis. li.*

7.c. ph.

p. &

*Mes.in
antido-
tis.*

Sic Mesues myrobalanos ad condituram aqua & hydromelite humectat, & dies octo fero caprino macerat, post semel feruefacit.

Capita papaueris forficibus minutim concisa macerantur cum semine aqua pluuiæ vel fontana die vno: vel si iam sicciora sunt, etiam biduo & triduo, ut tenerescant ad diacodij compositionem.

Myrobalani oleo amygdalarum dulcium, vel violato, vel rosato, vel sesamino imbuuntur & irrigantur, postea siccantur: id quod ipsis infusio, seu affusio, seu perfusio quædã est. Dum item hæc trita oleo amygdalarum dulcium triduo per æstatem confricantur affuso oleo quoties opus est, deinde siccantur. Altero autem triduo similiter in sole confricantur ex aqua saccharata, vel fero saccharato, ut postea formetur in trochiscos Mesuæ, nisi nutritionem esse mauis, de qua mox dicemus, uti & dum species hieræ Hermetis tritas inuoluit bis succo cucumeris agrestis, & siccatur, ut eius succi vires pulvis in se trahat.

Alia infunduntur, ut dissolui possint: sic Ammoniacum, opopanax, galbanum, sagapenum, & liquores alij aceto vel humore alio super cineres calidos ferè infunduntur, ut soluantur. Fractos eosdem hydro

hydromelite infundit in hiera Archigenis ex Paulo, vino autem infunduntur in hiera Hermetis, in hiera autem diacolocynthidos Rufi, myrrham solam vino infundit. sagapenum & opopanacem cum aliis terit, vt nos hodie in hiera diacolocynthidis Pacciij facimus: in qua tamen Scribonius opopanacem & sagapenum in mortario terit, adiecto melle tenui, id est quàm liquidissimo. Infunduntur eadē ratione gummi & ichthyocola, vt dissolui possint, vel vt in mucaginem abeāt, quo sine etiā semina & radices lentore aliquo præditæ, humore calfacto macerātur. Sed de his in succorū extractiōe mox audies.

Ad infusionē reducitur infectio seu tinctura, vt sericū succo cocci baphicę tinctū ad cōpositionem cardiacā celebrem diacoccu baphices, & in syr. de pomis, & de granatis, & de corticibus citri. Quinquā idem sericum tinctum præterea succis illis infundatur, donec succi rubeant, & serici atque cocci vires in se traxerint.

Filum purpura marina tinctum, si postea viperam strangularit, ad paristhmia est efficacissimum Gal.

DE NVTRITIONE.

Nutrino quoque quam vocant, fuerit infusionis species: sic autē est appellata

pellata hæc præparationis differentia lo-
quentibus abusiue, quòd quemadmodum
per veram nutritionem fit vacuati reple-
tio, & etiam incrementum, quandiu scili-
cet id fieri ex partiũ sequaci mollitie po-
test: sic medicamenta quę humore aliquo
imbuta, macerata, tribulata, confricata,
præsertim calfacto velut augentur.

Sarcocolla alba, magnis glebis con-
stans, lacte muliebri nutritur, sed pauco:
Nam multo lacte operta liquefcit, & lac
ipsum priusquam sarcocolla siccetur, a-
cescit: paucũ igitur ex māmīs ipsis irrigā-
dum cōfestim sole siccetur, iterum & ter-
tio, quarto, quinto similiter irroretur & sic-
cetur, & tandē reponatur. Aspergi etiā asi-
næ, capræ, equæ lacte vel alio potest. Se-
mē cari calfactũ lacte caprino horas duas
quidā nutriunt in vase mūdo, exemptum
siccatũque reponunt ad fluorem alui.

Myrobalani oleis, sero saccharato, buty-
ro vaccino, succo cydonioũ, vel alio hu-
more dũ irrigat, macerat, fricat, frigit. Me-
sues clementer, & his humoribus imbuit
vel ad condituram, vel ad noxas earum
castigandas, siue solæ vtendæ, siue in cō-
posita veniant, vt trypheram sarraceni-
cam persicorũ, trypheram Galeni, elect.
stomachicum Mesuæ, & elect. alhari & se-
quens

quens, quodammodo nutrit. Sic & species omnes elec. Indi maioris, dum oleo amygdalino confricat idem.

Colocynthis quoque seminibus solis extractis, si impletur aqua cum pauca spica & mastiche, & coquitur in cinere calido ad partis tertiae consumptionem, hocq; decocto paulatim affuso sagapenum irrigetur, donec pinguescat, nutriri dicitur sagapenum: eodem modo & opopanax. Decocto myrobalanorum, vel succo enulae campanae, aut rutae, aut foeniculi cum felle pauco autum rapacium, & spica & mastiche ad dimidium cocto & colato idem fieri potest.

Folia etiam thymelaeae aceto nutriuntur in elec. diaphysalidon. Eadem in aceto infundit, & siccat in pilulis thymelaeae, ut eadem sint vel saltem omnino proxima infusio & nutritio. Ambae enim humore sunt & calore blando, qualis ad nutritionem veram est aptissimus, cum immoderatio vrat, imbecillior sit inefficax.

Metallica ferè in aëre calido non tamen super ignem nutriuntur.

Metallica etiam saepe nutriuntur humore aliquo, ut dissoluantur promptius, vel etiam liquentur, vel pinguescant, & velut aucta tumescant.

Scoria ferri in aceto dies quinque in

n

tryphera minore Mesuq, & tryphera moschata, & tryphera Galeni.

Lithargyros nutritur ex oleo sic, vt vncie eius triti quatuor tãdem olei libram vnã, aceti quartaria quinque ac eo plus ebibant, idq; omnino sine igne, multum disq; pistillum per mortarium ducendo. Nam lithargyro etiam vncia vna corpus dat plurimum, vt etiam sine cera emplastrũ perficiat: sed initio diu tere primum cum paucò oleo, postea affuso vicissim paucò aceto. Nam multo sic mergitur, vt corpus non assequatur. Vbi autem initio paulatim nutrita est, & consistentiã crassio rem friando assecuta, tum largiorem vtriusque copiam ebibit. Continenter autem friatur ad horas duas, tres, nisi quòd per initia potes aliquantisper cessare, vt interim velut in otio largius cõbibat. Sic & chalcitis, & scoria ferri, & crugo, & metallica cetera ex oxoleo in vnguẽti formã diu friãdo duxi, sed bibacissima est lithargyros: opinor, q̃a siccis. & rara modicẽ.

DE EXPRESSIONE.

EXpressio est humidæ & tenuis substantiæ separatio, à sicca & crassa duro aliquo & valido compressu facta. sic autẽ sæpe torculari & eo multiplici, quale vinum ex vinaceis exprimunt, & quale pinxit

pinxit Mesues in oleo amygdalarum dulcium, quale item vsurpamus in exprimendis oleis, & succis aliis, & decoctis, & carnibus, & similibus: siue id torcular est, siue prælum librariū, vt in oleo amygdal. dulcium Mesuæ diximus. Ferè autem exprimenda, ne diffuant, aut dissiliant, inuoluimus panno forti, vt cannabino, caprino, setaceo. Est quando tantum caprino aut lineo inuoluimus, & manibus ac digitis prælorum loco vtimur, vt dum medicamenta purgantia infusa exprimimus. Adde quod nunc densò, nunc raro panno exprimimus, interdum clementer, interdum valenter pro scopis medicorum variis: quædam item frigida exprimimus, alia etiam calida: quædam solum calida exprimi possunt, vt oleum amygdalarum dulcium, & similia in Mesue. Sic portulacæ, cõtyledonis, semperuiui, buglossi succum exprimimus calètem, aliàs humore aliquo liquidiore affuso, vt dicemus in succorum extractione.

Expressionis vsus igitur latissimè patet in infusis, apozematibus, & coctionibus: propè omnibus, in syrupis, in oleis, & id genus aliis: quo autè instrumento & quatenus calidū, aut frigidū vnū quodq; est exprimendū, in singulis compositorū re-

mediorum differentiis melius cōdisces.

Neque solum colationi succedit expressio, imò eam sæpe præcedit: & quando eam sequitur, blāda admodum est faciēda, ne quod crassum & terreum color adheret, id torum vi in subiectum humorem colatum elidamus.

DE CONFRICATIONE.

Confricatio rerum infusarum, aut etiam coctarum manibus facta colationem & expressionem adiuuat, ob id ante has sæpe obitur: interdum expressio nis vice est: sic crocus panno lineo ligatus inter coquendum, infricatur in syr. Saporis, de pomis & quibusdam aliis compositis.

Manna succo intybi macerata fricatur manibus ante colationem in syrupo acido ex manna.

Rha barbarū pāno lineo ligatum fricatur, & exprimitur in syr. cichorij cōposito. Scammoniū panno tenui ligatū sæpe confricatur in syr. aceto cholagogo.

Elleborus niger nodulo lineo ligatus in oxymelite melanogogo sæpe confricatur.

Medulla cnici, turbith, zingiberis, panno lineo ligata confricantur sæpe in oxymelite phlegmagogo.

Ellebo-

Elleborum nigrum, agaricum, salem
Indum fricat Mesues in apozemate epi-
thymi: cassiam verò manibus fricat ante
colaturam in apozemate adianti: colo-
cynthis forficibus incisa in oleo rosato
fricatur ad componendos ex ipsa trochi-
scos. Mesuæ in trochisc. & simpl.

Sic manibus fricantur, & post dolan-
tur simplicia in electario Hamech. Sim-
plicia in succis macerata fricantur & co-
lantur in elec. diaphysalidon. Simplicia
pilularum aromaticarum post coctionē
fricantur & colantur.

Ferè autem hic nodulus in medica-
mento humido manet. Sic scammonium
panno lineo raro ligatum suspenditur in
syropo fumarie, & noduli aromata con-
tinentes, & compositum condientes in
ipso suspensi manent, ut post leges, titulo
de aromatizatione. Quam consuetudi-
nem hodie plerisque seruari video in sy-
rupis purgantibus, præsertim contra mor-
bum longum, aut in hominis delicati
gratiam compositis.

Aliquando tamen ubi vis eius noduli *Gal. li.*
tota in compositum confricando est ex- *7. c. ph.*
pressa, abiicitur. Sic Soranus cum melle p.
& capitibus papaueris myrrhā, crocum,
hypocisthidē, acaciam nodulo ligata in-

coquebat, post ubi vires suas diacodio
imprefferant, tollebat. Quod exemplum
eò ascripsi, ne id nouum putes, & Arabi-

In sim.

Mes.

Alia tamen est conficatio, quæ ad in-
fundendum, imbuendum, molliendū, &
humectandum magis pertinet, vt cum
myrobalani omnes butyro vaccino fri-
catur, cæteræ species oleo amygdalarum
dulcium inuoluuntur in tryphera sarra-
cenica, & Phenonis. easdem ne partes
nutritorias valenti astrictione sua exaspe-
rent, oleo amygdalarum dulcium vel ro-
sato, vel violato, vel sesamino, vel aliis le-
nientibus tritas mergit, confricat, & lu-
bricas facit. Possis tamen non modò ma-
nibus fricare, sed etiam in sole aut igni
clementiore frigere, cū alioqui nec ipsæ
rarefient, nec butyrum, aut oleum quod-
uis liquabitur, vt ipsas promptè totas per-
meet, ac imbuat. ob id in tryphera mino-
re Phenonis, myrobalani assentur in bu-
tyro vaccino, legimus. & nos in tryphera
sequente: hæ butyro vaccino inuolutæ
frigatur, vertimus, ubi legebatur, fricen-
tur, & alibi aliquoties. Vbi (vt dixi) etiam
fricentur legere possis, cum vtrunque pa-
tiantur, hoc est manu fricentur, & sarta-
gine, aut vase alio blandè frignantur.

E:

Et in Elec. à nobis inuento, frige bis
vertimus pro frica: tamen potes si libet le-
ctionem priorem retinere: vel istam, præ-
fertim cum in simili Elec. alcanzi, myro-
balanos, & simplicia alia bis feruefaciat.

Friguntur tamen verè quædam, vt cu-
minum aceto maceratū frigitur Gal. lib.
4. sanit. tuēdæ, in vase terreo bene cocto.
Plura huius exempla leges in assatione.

DE SVCCORVM EX-

tractione.

Q Vanquam loco hoc coctionem in-
fusioni (vt ante memini) viribus &
preparationis modo proximam, docere
exigit ordo rei: quia tamen rerum ante
tractatarum cōsecutione quadam in ex-
pressionem transuimus, succorum autem
extractio tritura cōstat & expressione, iu-
re optimo succos exprimēdi modum hic
interferimus. *χλ&* autem (vt in simplici-
bus ex Galeno abūdè docuimus) nunc is
est humor, qui virentibus herbis, aut fru-
ctibus humidis, aut seminibus oleaginis
trititis exprimitur, & viscago ceu mucago
quædam ex glutinosis seminibus, radici-
bus, gūmis, partium nervosarum ramen-
tis, humore aliquo calfacto maceratis ex-
tracta. De his omnibus hoc loco agam.

Succus ex omnibus foliis virētibz per

se tritis exprimi potest, præter quã quòd quædam ob siccitatem vix succum aliquem reddunt si per se terantur, vt folia lauri, saluix, thymi, rorismarini, fabinæ, & quæ plantarum sunt syluestrium, & ex locis editioribus ac siccioribus, & æstate calida sicca, atque adeò post meridiem succum parciorem reddunt: aliæ ob lentorẽ, vt buglossum vtrunque, cotyledon, & aliæ quædam pòst dicendæ: sed vtrunque genus misto eger humore liquido, ad succi expressionem.

Ad varios verò auriũ & partiũ aliarum affectus adhibet Gal. in simplicibus, & li. c. ph. p. succos recentes hippuris, cucurbitæ, cãnabis viridis, hederẽ, polygoni maris, prasilij, stœbes, absinthij, fœniculi, dracõtij, lactuæ agrestis, fumariæ, centaurij parui, chelidonij, libanotidum, anagallidum, anemonarũ, peucedani, betæ, brassicę, calaminthes, foliorũ ficus, cynoglossi: floribus populi albæ, floribus spondylii, floribus rosarum, violarum: radicibus cæpæ, allij, porri, cyclamini, scillæ.

Ex fructibus etiam vt pomis cydoniis, granatis, vuis, & aliis permultis: de quibus abundè nobis dictum ex Galeno in Mesue est, sectione prima & secunda.

Quo autem modo aloë, scammonium, glaucium,

glaucium, hypocisthis, acacia & externi alij plantarū succi extrahantur, cum plantas ipsas nō habeamus, didicisse parui est momenti, cum praesertim ex Dioscoride repetere possis: quāquam aloë nobis iam frequens satis est, sed pēsilis ferē ad pomam, altilis nulla, propterea non quavis aloë succum laudabilem reddit, vt Dioscorides & Gal. edocuerunt.

Acacia verò nostrās fit ex prunis agrestibus aqua maceratis, igni lento coctis ad dissolutionem: colatum ex his siccatur igni vel sole, complanatum in tessellās secatur, rubentes & astringentes magis, si immatura erant: nigras & dulces magis, si matura.

Lycium nostrās sic fit in libello, cui titulus est de dynamibus, id est, facultatibus, & Gal. tribuitur. Periclymeni (quod caprifoliū vocant) baccas mense Septembri tere, torquendo exprime, in solatu sicca, reponere. Alterum autem verum hodie desideratur.

Radices glycyrrhizæ recentes, præhumidæ, Iulio mense tritæ ex aqua coctæ, ad crassitiem colantur & exprimuntur: expressum igni vel sole siccatur.

Oleum omphacinum ex oliuis immaturo: dulce, ex maturis exprimere in Gal

lia Narbonensi vulgare est.

Sicomphacium, ex vuis immaturis & natura acerbis: vinum, ex maturis & dulcioribus exprimere cuius notum est. Pomorum agrestium tritorū succo expresso parum salso vtuntur Septentrionales omphacij vice.

Ex siccioribus verò foliis seu natura seu cœli & soli ratione, vt succū aliquem extrahas, vinū aqua vel humor alius proposito, idoneus (vt dixi) miscetur intertundendum: qui propè totus cum succi portione aliqua exprimendo reddetur.

Eodem modo ex portulaca, cotyledone, semperuiuo, buglossō vtroque, & similiter glutinosum succum sortitis, Galeus docet succū illū affuso humore idoneo extrahendum. Ex his tamen sine externo humore succum extrahis, si parum calescunt ipsæ, mortariū, pistillus, succus, prælum, vel si tusæ citra calorem calathosaligno impositæ, loco frigido, vt in cella vinaria repositæ sint. Nam in catinū subiectum humor satis multus paulatim defluet. Portulaca tamen erratica & quæ vitibus est familiaris quàm hortensis, & buglossum tenerū quàm vetustate iam pinguius, & folia borraginis quàm caulis succum facilius remittunt.

Cucurbi-

Cucurbitam maza pinsita inuolutam
clibano coquit Mesues, deinde succum
exprimit in syrupum cucurbitæ.

Ex scilla succus extrahitur optimè die-
bus canicularibus 40. quibus ea particu-
latim digitis discerpta vasi mellario im-
ponitur, operculato, & pelle circumdato,
deinde loco meridiem spectante contra
boream lecto insolatur sepe vertendo, vt
vndique solem sentiat: post hos scillæ eli-
xæ similis succum in fundo imponit mel-
le condiendum. Alij scillam inter multas
collectam cultello, ligneo corricibus ex-
ternis purgatam, maza inuolutam, cliba-
no mediocriter calido coctâ, exemptam,
vt calet tusam in mortario lapideo cali-
do, pistillo ferreo calido, panno lineo, te-
nui, calido inuolutâ valenter exprimunt.
Sic autem assat Dioscorid. vsq; crusti fru-
mentacei vel lutei coctionem, tamen suc-
ci eius non meminit. Alij sine assatione
foris & intus purgatam multum calido li-
gneo aut lapideo mortario & pistillo tu-
sam mox calido linteo, torculari calido
exprimunt, & succum multum facilè red-
dit, & purum atque clarum Quod si frigi-
da scilla frigido mortario & pistillo trita
sit, in sartagine terrea parum frigatur, ili-
côq; exprimatur inter asseres calidos vel

torc u

torculari calido ac aëre calido. Quæ omnia Gal. innuit, cum succū hunc diebus canicularibus, nepe omniū calidissimis, si suam seruāt naturam, optimè extrahit.

Quædā minutim concisam exprimūt, quòd tusa pinguescat, succūque ægrè remittat, nisi vt dixi, calefiat: alij tusam calathio sparteo imponunt aut saligno, in cellaque vinaria aut similiter frigido loco collocant, distillātque in vas subditum. Liquores, & gummi, & resinæ: castrata, rebrata, secta, scarificata, plantæ radice, trunco, ramis, calice destillantes, raro à nobis colliguntur, sed ferè ab externis mittuntur, à quibus qua ratione elician- tur, docet in horum singulis Dioscorid. succum tamen ex incisa salice dum florer distillantem colligere possumus ad vsus à Galeno scriptos, & opium ex capitibus papaueris nigri mense Iunio aut Iulio & ex aliis nostratibus plantis. Elaterium autem ex fructu cucumeris agrestis quomodo extrahendum, lege Diosc. & in his vide ne succū pro liquore supponas, cum sit multò ignauius scammonium succus, quàm liquor, & in aliis ad portionem, vt Diosc. & Gale. abundè docent. Sic ex mandragoræ radice incisa, forata, cauata liquor emanat valentior succo, & iisdem radi

radicibus tritis expresso, & ex ficu, lathyride, chelidonio, foliis aut surculis anulsis, lac emanat, ex illis & tithymalis albū, ex hoc luteum.

De secundo succi genere qui ex oleaginis seminibus tritis exprimitur, vt amygdalis ambabus, auellanis, iuglandibus, pistaciis, strobilis, balano myrepfica, nucemystica, semine cucurbitæ, cucumeris, melonis, citreoli, cannabis, napi, sinapi, ricini, cocci gnidij, lini, papaueris, hyoscyami, pomorū, pyrorū, & id genus aliis abundè cum Mesue diximus sectione nona de oleis, quod hunc succum etiam Dioscorides & Galenus oleum sæpe vocant, potestque hic ex omnibus seminibus medullatis extrahi, vt etiam ex vuarum seminibus tritis exprimitur igni in lucernis durantissimum.

Mel quoque ab anacardis extrahes, si eos ablato pediculo coquas ex aqua. tūc enim quod supernabit melleum cochleari colligendum est, & aliter.

svcci genus tertium ex glutinosis seminibus & radicibus & alijs in humore calfactum aliquandiu infusis extrahitur. Semina ferè sunt cydoniorum, marrubij, vrticæ, lini, fœnigræci, psyllij, maluæ, altheæ, citri.

RADICES sunt malua, althea, symphyti, periclymeni, scille, gummi arabicu, tragacatha, minutim incisum, sic ichthyocolla, taurocolla, ficus, vuc, horum vncias tres aqua calida libra vna macerabis nocte vna, postridie recalfactu sacculo aut mantili ex tela noua forti impone, intorquendo exprime, virga lignea aut ferrea gracili percutere succum eadem derade. id fac donec succus effluere desinat, & semine exuccum & siccum euaserit, vel radix.

Alij aqua libras tres, vni seminum aut radicum libra imponunt, alij libram vna aqua communis vel humoris alterius si requiratur, dant, vncijs quatuor seminum vel aliorum. Si autem succum vis liquidiorem, aquam auge, vel semen minue: si crassiolem, contra.

Interdum etiam triduo macerantur, vt in diachylo comuni, quod a *χρῆσις*, hoc est succus seu muccago, est appellatum: vt in sectione 12. Mesue diximus, & libr. 3. metho, medicamenta componendi.

Quoniam vero Arabibus psyllij interior medulla calet, cortex friget, vbi refrigerandi consilium est, per succum psyllij, neque diu, nec multo calore macerant, neque valenter exprimunt: ne substantiam calidam foras extrahant, quam nonnulli

in

in vlcere, ad moto psyllij succo, cum aqua dulci extracto manifestè affirmant se deprehēdisse, & morsum in vlcere calorēq; excitatum, quem succo alio ex psyllio clementissimè expresso, postea compescuerunt, sed sola refrigeratrix facultas toti semini à Græcis tribuitur. Sic semen psyllij cum aqua fontis frigida tribulat Mesues, & eductum succum dat potui ad aluum soluendam. Decocto semen psyllij macerat horis viginti quatuor in singulas rudicula agitando, deinde totum succum exprimit in oleo de psyllio: vbi nō videtur timere venenosam virtutem occultam in parte seminis eius interna & calida quarto ordine: fortè ob id quod ipso decocto obtunditur & emendatur.

Ex taurocolla, & ichthyocolla, & coriorum tamentis, & partibus omnibus nervosis particulatim sectis mucago quoq; extrahitur, sed in vsu medicis frequentiore est, quæ ex ichthyocolla, id est pisciū, præsertim quos moruas vocamus, fit. Satius autē est hæc rasa aut limata ex aqua lento igni coquere, donec tabescant. Qui autem valido igni primò coquere aggre diuntur, vrunt, & incoctilem reddunt.

Soluitur quoq; ichthyocolla hæc lotio, aqua salsa, aqua extinctionis calcis, aceto.

In

In emplastro diachylo magno, ichthyo colla aqua communi igni lēto, aut super cineres calidos diu macerata & paulatim cocta, tota abit in cremorem.

Pellis arietina ad dissolutionem dum coquitur in emplastrū, contra rupturam, mucago quoque ex ea extrahitur.

Ex gummis quoque mucago frequēter extrahitur potissimum arabico & tragacantha, vt horum drachmis duabus in aque rosate vnciiis 5. 6. 7. solutis, vt in ecle-gmate sano, vt sit albius & leniēs magis. Muccagine ex gummi tragacanthi drac. duabus aquæ rosarum vnciiis 7. vel 8. solutis liquantur sacchari libræ quatuor ad hypoglottidum (quas pilulas albas sub lingua vocant) compositionem.

Ex drachma autem vna tragacāthi potes vnc. tres, quatuor, plures mucaginis extrahere : si multum & diu baculo aut cochleari percutias.

Ad mucaginem hanc reducenda est congelatio lentorum in sculorum à frigo re facta.

Pedes enim vitulorum, colla veruecū, capi, perdices, & carnes aliæ præsertim neruolam multam substantiā sortite coquantur ex aqua igni primū lento, deinde mediocri vsq; ad carniū dissolutio-

nem,

nem, seu donec iuscūli portio exigua cochleari exempta & refrigerata inter manus conficata, ipsa suo lentore velut fer ruminet. Tunc omnia in mantile munda, mediocriter rarum coniiciuntur, catio lato supposito, in quem humor defluat, ossa cochleari vnco, furcella eximuntur, reliquum mantili mediocriter intorto exprimitur. Nam valens expressio turbidam faceret gelatinam, vt pedes veruicini nigram, nisi exactissime lauentur & purgentur. Mox adeps flauus deturbatur, & cochleari deraditur, iniectis postea albuminibus clarificatur. Additur sacchari libra vna, cinamomi boni crassius triti vnctia vna, in cremoris libras quinq; aut sex, & crocus si flauum vis, aut linteolum succo florum cichorij aut alio quouis imbutum: vnde opinor id linteolum torrefactum vocant, vti & florem cichorij solsequium, & gyra solis & sponsa solis vulgo dicitur, quia cum sole vt alij flores multi circum agitur. Mox calidum adhuc per manicam, vt vocant, Hippocratis colant prope ignem, ne ante tempus, frigore concreseat: neque per colum transfluat. Vbi sponte sua fluxit, quantum erat fluxile ac liquidum, in patinas distribuitur: loco frigido, vt concreseat, reponitur.

Sunt qui ichthyocolle portionem cum prædictis incoquunt, vt citius lentescat, & magis glutinosus cremor euadat.

DE DESTILLATIONE.

DESTILLATIO humoris è succo tenuiori extractio vi caloris, ad hęc locū omnino pertinet. Quæ verò ad eius rationem, vires, instrumenta, ignem pertinent, fusissime libr. 3. Methodi componendorum medicamentorum docuimus: Hoc autem loco lectorem tantum exercere statui in quibusdam destillatis paulò difficilioribus.

Eodem loco & sectione nona Mesuæ, de oleorum genere quarto egimus, etiā de destillatione per ascensum, sic dicta, quòd vapores sursum elati, ibi concreti, in aquam distillant: cuius nunc vsus est longè frequentissimus. Segmentis pinì latifoliæ vas impletū, aqua rosarum affusa, si vase duplici destillas, succus emanās oleosus est odoratissimus, qui caphuræ aqua vulgo dicitur.

Si rosæ quas incarnatas vocamus siccatæ, vapore aquæ calētis humectatæ destillantur, aquam rosarum bonam reddent.

Destillata vapore aque calētis vires & qualitates plantarum integrius retinent, sed quia excrementosa sunt parum diu serua

seruari possunt. Diutius quę cinerum aut arenę aut scorię pulueratę calore destillantur in vasis lapideis, aut vitreis, quantumlibet multis super longam aut rotundā fornacem tegulis intectam, quę sustineant arenas altas plumbo alto circumdatis: sed vase hęc paulatim calfacienda & refrigeranda sunt, priusquam aëri frigido aperiantur: alioqui mox rumpuntur. quę autem plumbo destillantur, omnino improbāda censeo, propter cerusam & qualitates alias plumbi maleficas, cum & aquam per tubos plūbeos deductam dānarit Gal. quōd dysenteriam excitat.

Destillatio per descensum nobis dicta in tertio genere oleorum Mesuę, & quę per hęc destillantur. Scillę etiam recētes incisę vasi infernē foraminulēto sursumque lutatō impositę, si flamma circumdatur, aqua in ollam aliā subiectam, simul cū huius fundo lutatam defluer, quę cū farina vel pane mista, gustata mures citō necare quibusdā creditur, citius si lithargyri paucū miscueris. Rosę recentes linteo super peluim tenso impositę, si vas carbonibus ignitis plenum acceperint: destillant aqua multa & odora in eam peluim. Eodem modo flores reliqui. Quę etiam per descensum est destillatio.

Si duę matulę sibi applicentur, & superior rosas impleatur, & insoleatur, distillat aqua odoratissima in subiectam.

DE COCTIONE.

CUM in omni distillatione coctio quędam fiat, per quam etiam aqua distillata succo est tenuior, & in omni coctione fieri distillatio possit, ut ollę operculum aqua excoquendorum vapore plenum indicat. Cum prætereā ambo calore fiant ordine optimo nunc dicendum nobis de coctione est, cuius partem maximā lib. 3. de ratione cōponendi medicamenta scripsimus, ac identidem tibi repetendū est, ne bis de re eadem frustra sit agendum.

Coctio medicamentorum ferē fit eligendo in humore calido, rarius assando in calore sicco. Coquuntur autem simul, aut per se simplicia frequentissimē, interdum & composita quędam.

Humor cui incoquuntur magna ex parte aqua est, ac ea vel simplex, vel medicamentosa. Simplex item vel pluuia vel fontana, vel distillata: medicamentosa verō est salsa, marina, aluminosa, sulfurosa, bituminosa, chalcantodes, carbonosa.

Ad aquam compositam reducuntur, lixiuium, lotium, vinum, acetum, omphacium, ceruisia, hydromeli, ænomeli, apomeli,

meli, oxymeli, oxycraton, lac, serum, succi plantarum liquidi, oleum, resinae recētes, adipēs, butyrum, mel, saccharum humore pauco solutū, & varia in vnoquoque horum generum species, pro variis medicorum scopis, ut etiā interdum humores duos, plures miscere sit opus. Secundum cicerum decoctum, lac vaccinū vel ouinum ad coquendas radices eryngij sativi, raphani, dracontij, in Mesue. Quantitas verò huius humoris varia est, pro scopis variis, ut in diasatyrio lac vaccinum vel ouinum sit quantum duobus digitis supernatet, quod si coquendis radicibus id non sufficit, novum affundendum sed calidum, ut in bis coquendis omnibus sepe admonet Galen. in alimentis, quod & coqui observant. In syrupis, & aliis coctionem requirentibus, quātus humor requiratur, libr. tertio audies.

Color autē coctionis autor esse potest quivis rebus coquendis moderatus (nā à solo calore mediocri fit coctio) nō ignis solius, sed solis, animalis: calcis verò & fumi, & putredinis fimi aut corticum calor admovendis vsui esse potest, ut psorico Galen. fumendis verò noxius fuerit, ut *Lib. 4.*
ex carbonibus non ignitis nec semiustis, *Simp.*
ex lignis putribus. Calor enim huiusmo-

di, vti & fumofus qualitatem alienā cum empyreumate rebus coctis imprimit.

Electarium rofatum flamma lenta coquit Mefues, & fyrup. omnes igni lento.

Sint igitur ignis alimenta ficca & odorata, vt farmentum vitis, quo theriacen coquit Galenus: vel carbones femiufti, & qui tetram qualitatem iam exalauerūt. fit autem primū blandus, & paulatim fi res postulat, intendatur: coctioni enim vehemens & repentinus nocet, quòd vrat, facultatem diffipet, empyreuma multum in re vfta non cocta relinquat.

Nec folū ignis calore, vt dixi, fit coctio medicamentorum, fed folis, vt fcille, & ex ea acetū fcillites dies 40. Mefuæ infolantur, ſæpe mouendo: & hydromeli, & fyrupus alter calaminthes totidem dies, vel etiam duos, tres, plures menses flores populi, & abietis ſemen oleo macerat Ga-

*Lib. 4.
ſimp.*

lenus, coquit quodammodo, multò magis ſi ſoli exponantur: quanquam quouis anni tempore fiat, vt pſoricum ex chalciti dupla & lithargyro olla noua incluſum ſimo, æſtate media diebus canicularibus quadraginta ſepelit, ſic dum theriaca & ſimiles antidoti opiata menses, vel etiam annos aliquot ſeruantur ad ſui coctionem, quam fermentationem vocant.

Coq

Coquimus medicamenta, vel vt eorum *Galien*
vires imbecillas augeamus, incoctis si *theria-*
mul his, quæ sunt valentiora, vel validio- *ca &*
res minuamus, vel alienas in totū abiga- *antid.*
mus, vel vt ex omnibus facultate diuersis
& sæpe contrariis simul coquendis facul-
tas vna concreseat & coalescat. Adhæc ob
destinatam medicamenti formam, aut su-
mentis palatum, ob simplicium naturam,
ob custodiæ diuturnitatem etiam quæ-
dam coctione longa siccamus, vti ob æ-
ris humidioris conditionem.

Præterea vt purgētur, multa coquimus.
Ignis enim vt calida cætera homogenea
cogit, & heterogenea separat, vt simpli-
cium vires in humorem cui incoquuntur
transeant, quo fine sunt syrupi, apoze-
mata, oleorum quartum genus.

Horum exempla aliquot fuerint hæc.
- Brassicam, lentem, ostrea bis coquimus
aqua scilicet priore abiecta, & noua ca-
lente affusa cum aluum per hæc sistere vo-
lumus, semel verò cum mouere. Sic al-
lium, capa, porriū, ampeloprasum, & quic-
quid à veteri natura ad contrariā traduci-
tur, bis coquendum: sic tamen, vt nec æ-
rem, nec aquam frigidā attingat. Nā pla-
nè tabescere & percoqui amplius nō po-
terit etiamsi diutissimè coxeris. Quod

Lib. 2. præceptum etiã medicamentis commu-
alim. ne est, quibus liquor nouus consumpto
Lib. 6. priore est affundendus. Althæa adipibus
simp. incocta subigitur ad abscessus coctu dif-
 ficiles, aqua mulsa viribus varia Gal. &
 Mes. pro coctionis quantitate.

Oxymeli quoque valde coctum flatus
 dissipat.

Ex Ramenta loti arboris in aqua aut vino
Galen. coquuntur ad capillorum defluuium, Gal.
simpl. in simplicibus.
c. ph. p. Melli alumen idem incoquit, radicem
 tithymali, vel phlomi, vino vel aceto ad
 dentium dolorem.

Omphacium, succũ mororum, vel bati-
 norum, vel granatorum, vel rhu, vel cydo-
 niorum, vel pyrorũ agrestium, nucum vi-
 ridium cum melle coquit in stomatica re-
 media, radicem & semen arctij ex vino.

Dracontij radicem bis, ter ex aqua co-
 quit, vt acrimoniam deponat, & sit apta
 eclegmatibus.

Asphodeli radicem, vt amaritudinem
 perdat, quam scilla difficillimè amittit.

Bulbi radix cruda, vel semel elixa bona
 eclegmatibus, bis elixa amaritudinem to-
 tam deponit, & fit eclegmati inepta, cæ-
 pa, allium, porrum, ampeloprasum, cocta
 bis aut ter acrimoniam deponunt, adhuc
 tamen

ramen thoracica sunt.

Ari radix in aqua, aut sub cineribus cocta mitescit, lib. 2. aliment.

Buglossum in melicrato coctum arteriacum est.

Brassicæ succus cum melle coctus e-clegma est.

Dactyli etiam in mulso aut passo cocti.

Serosa & eadē acris substantia lactis coctione, vel immixtis lapidibus, aut circulis ferreis ignitis consumitur ad dysenteria.

Hippuris ad eandem coquitur in aqua, si febris adest: in vino austero, si abest.

Faba oxycrato incoquitur.

Instrumenta coctionis sint vasa omnis generis, aurea, argentea, ærea, stannea, stannata, ferrea, terrea: sed hæc bene cocta ne qualitatem malam medicamento largiantur: & ea vel filicea, ut vocamus, seu cum Mesue lapidea, vel blombata, præstantissima sunt vitrea.

Sunt ea autem vel simplicia, vel composita & duplicia (balneum mariæ vulgò dicta) qualia ad olea etiam calida, & alia permulta Galenus commendat. Quæ tamen hodie ob avaritiâ, negligentia, malignitatem non vsurpantur. Fiant igitur vasa sibi incumbentia, sed interuallo ubi que digiti vnus distita, quod aquâ conti-

neat saepe sufficiendam, nisi maior vas mi-
nus quod medicamentum coquendum
continet, in maius aqua feruenti plenum,
& igni contiguum immittere, Galeni mo-
re. In vase lapideo, id est siliceo, ut voca-
mus, coquitur miua simplex, & citra con-
dita Mesuæ. Eidem vase duplici coquun-
tur, oleum rosatum, violatum, nymphaea-
tum, melinū, papaveris, myrteum, ex po-
mis mandragoræ, & anethinum, chama-
melinum, sicyonium, irinum, rutaceum,
nardinū, mastichinum. Sicq; reliqua co-
quenda putem, quod oleum simplici vase
coctum assequitur odorem tetrū & in-
gratum, ut interim vires frigidas frangi,
calidas intendi taceam, diaco dium in du-
plici vase coquit Heras igni fumi experti.

Crustum ex maza vel luto circūdatum
scillæ vel scammonio, & aliis eius generis
vasis locum obtinet, uti crustum idem &
malum acerbum aliquod vel cydonium
ipsi scammonio est tanquam vas duplex.

Finis coctionis est, cum scopum nobis
propositum attigimus, vel simplicem, vel
etiam multiplicem, ut si medicamentum
coquimus ad vires eius augēdas, vel mi-
nuendas, vel abigendas, dum quātum sa-
tis est auximus, minuimus, abegimus, sa-
tis coximus. eodem modo in scopis aliis.

Sic

Sic quædam coquimus ad dimidias, tertias, quartas, librarum duarum, trium cōsumptionem, dum omnia sunt propè vnita ad iustam crassitudinem, aut mellis sordium, cerati liquidi, emplastri consistentiam, Sapas coquendo siccamus, donec crassam assecutæ sint consistentiâ, vt seruari possint: sic & syrupos, eclegmata, electaria, vngueta, cerata, emplastra. De quibus singulis accuratius in modo singula hæc genera componendi, libro 3. dicitur.

Diamorum cum melle coquimus donec gratum erit, & absorpta humiditate excrementosa feruoris & putredinis effetrice seruari annū vnum possit: id quod mel citra idoneam coctionem succo mororum præstare non potest, licet fructus integros cum pediculo certis interuallis ne se tangant, in se mersos loco frigido integros in annum seruet.

Testiculi ad Elect. diasatyrion.

Gal.

Mes.

Capita papaueris ad diacodium, capita ranarum ad oleum ranarum, vulpes ad vulpinum, viperæ ad pastillos theriacos & oleum viperinum coquuntur, donec ipsa coquendo in aqua intabuerint: stomatica & stomachica coques ad mellis, aut sordium crassitudinem.

Electaria mollia ad similem consistentiam

tiam, solida verò coctum magis saccharum requirunt:

Syrupos cum saccharo, aut melle, aut utroque coquimus, donec lentore tenaci & crasso inter extremos digitos explorato humorem excrementosum propè consumptum coniectabis.

Cocti sint syrupi quando incipiunt filum facere, siue cochleari effundatur paulatim, siue inter dignos eius portio tractetur. Vel quādo marmori, aut vngui imposita eorum gutta non diffunditur, nec aqua modo diffluit, sed concreta manet.

Quæ plena sunt meliora, coctione deteriora euadūt: vt cassia nigra, thamar Indii. Mesues mannam, thamar Indos, medullam cassiæ in succis quibusdā depuratis dissolutā coquit cum aliis semicoctis ad mellis spissitudinem in diamāna, & in tryphera Persica, & in cōpositione alkekēgi. In cōfectione hamech eadē tria in infusione colata dissoluit, fricat manibus, colat, cum saccharo coquit ad mellis spissitudinē. In cōfectione mānæ Galeno tributa, mannā succo rosarum suffiēti coquit igni blando ad sufficientem coctionem, teromatum in aqua rosarū, & cōpositione sequenti, coquit eandem cum saccharo ad mellis consistentiam.

Emp

Emplastra coquimus, dum manus tactu non inquinant adhæsu tenaci.

Coctū mel cum aqua, vino, aliis, in antidotos, & alia composita, tunc est quando marmoripropemodum nihil adhæret.

Coctionis & trituræ ratio propè est eadem in medicamentis, ut scilicet quantum hæc trituram viribus integris ferunt, tantam quoq; & coctionem. Quæ enim magna, crassa, lenta, sicca, dura, densa, nervosa, membranosa, virtutem firmā, & valenter ac penitus mistam fortita longiorem sustinet coctionem, ob id prima vasi coquenda immittuntur: qualia sunt metallica, terrea, styptica, quatenus styptica sunt (rosæ enim, absinthium, rha barbarum, aloë, myrobalani, agaricus, amaram quoque qualitatem in superficie habent, & eam purgatoriam, ac facilè resolvablem, ob id minus coquenda quam styptica substantia postulat) radices ob id propè omnes, quia terreæ magis: incisæ aut contractæ, ut aristolochia, cucumer agrestis, hermodactylus, polypodium, & cetera, etiam post coctionem terendæ, ut prius cribrentur in diasatyrio, Mes.

Sic rha barbarū quando astringere consiliū est, ac myrobalanos omnes diu coqui oportet: si verò purgare, tergere, aperire

Mes. rire, parū coquēda, aut potius infundēda.
 Glycyrrhiza tamē parum diu coquēda,
 opinor, ne cūm admodum sit dulcis, co-
 ctione longa, dulcium ceterorū modo, a-
 mara euadat: præsertim cūm iam vetusta-
 te amaricat, cūm verò recēs est humidita-
 tem excremētosam nacta, cum aliis radi-
 cibus initio coquitur, vt in syr. hyssopi, zi-
 ziphorū, glycyrrhizæ, & thoracicis aliis.

Acrida quoque diu coqui possunt si eo-
 rum acrimoniam obtundi volumus, nisi
 virtutem imbecillem, & facilē resolubi-
 lem sint sortita.

Mes. Colocynthis, cētaurium parū cū flori-
 bus & semine, plenā coctionem tolerant.

Quæ cōtrā sunt minuta, tenuia, fluxilia
 & friabilia, humida, mollia, rara, virtutem
 imbecillam, superficiariam, malē permi-
 stam sortita, parū diu coquēda sunt, ob id
 postrema sunt percoctis propē aliis ini-
 ciēda, qualia sunt rosæ & violæ recentes.
 Siccæ enim & harum succus magis coqui
 possunt. Gingidiū elixationem diuturnā
 non sustinet Gal. lib. 2. alimentorum.

Bulbi exigua admodum elixatione sunt
 contenti: Daucus autem ad esum diutius

Paulus elixandus quān pastinaca.

lib. 7. c. Nullus florum coctionem recipit, ob
 20. id olea cum floribus facienda insolantur.

Si

Si autem flores valida sint odoris gratia, ut rosa, chamamelum, quæ pluribus diebus constet, insolatu tenuius, & vtilius oleum euadit. Qui verò flores sunt inualidiores, & facilius diffillantur, minus diu insolantur, quia eorum virtus promptè vanescit, ut lilium, violæ.

Parum diu integris viribus coqui possunt epithymum, flores stœchados Arabica, diutius folia. *Mes.*

Quæ verò has qualitates adhuc infiores habent, coctionem nullam sustinent: sed sublatis ab igne aliis miscentur, vel adhuc calentibus, quando firmiora sunt: vel iam refrigeratis plurimum, quando ne vis eius tenuis & lubrica calore soluta in aërem exhalet metuitur.

Quæ purgant lubricando coctione non admodum inuantur, Mesuæ: tamen cassia, manna, thamar Indi interdum ab coquuntur, sed parum, nec adeò, ut vis eorum lubrica perdatur. *Mes.*

Quæ in horum sunt medio coctionem tolerant mediocrem, ut absinthium, asarum, agaricus, coccum gndium, fumaria, fenna, scilla, iris, hyssopus, thymus, turbith, semina omnia præterquam cucumeris, cucurbitæ, melonis, citreoli.

Rha barbarum exquisitū multam satis *Mes.*
coctio

coctionem & trituram sustinet, raro autem & laxo etiam mediocris coctio est vehemens, & eius virtutem resoluit.

Ibidem

Thamar Indi coctionem ferunt medio cre: multa enim vires eis omnes adimit. Ob id ipsi & cassia liquore idoneo soluta, colata melli aut saccharo ad humoris consumptionem cocto adduntur, & ad iustam consistentiam percoquuntur, igni ablatis, & parum refrigeratis pulueres miscentur.

Coquenda igitur in plantis radices prima, ut dixi, concisae, vel confractae, quibus coqui coeptis semina sunt iniicienda, exceptis seminibus cucumeris, cucurbitae, melonum, citreoli, substantiam tenuiorem vreticam fortiter tunc etiam cortices & ligna modice confracta. Post haec herbae siccae parum concisae, aut si crassiores sunt, confractae, deinde virentes, incisae minutim, aut manibus torquendo confractae, excepto omni adianto, & lactuca agresti, quam endiuia vocant.

Deinde fructus exollati, & semine purgati, excorticati, & (si magni sint) incisi, ut pruna, ficus, myxa, zizypha, vuae passae.

Postremi flores, epithymum, stoechas: sed chamamelum licet tenuis sit essentiae, quia tamen fortiter mistam habet facultatem, longule coqui potest, ut schoenuathos

thos, si haberi potest, heliochrysum, stœchas citrea vulgò dictum.

Succi quoque siccati, liquores, gummi, resinæ, manna, cassia, liquore aliquo soluta, sub finem iniiciuntur. Liquores enim vino vel aceto soluti, colati, cocti, ad humoris additi consumptionem, aliis extra ignem miscentur, rudicula semper moti.

Moschus, ambra, caphura, lapides preciosi, pulueres aromatici, & cordiales ab igne depositis, aliis etiam repentibus iniiciuntur.

Rosæ autem, rha barbarum, aloë, agarius, myrobalani, si purgatoriū vis medicamentum, parum diu, vt dixi coquenda. Nam vim eorum purgatricem superficiariam, parū firmiter mistam ab his corporibus raris coctio multa facilè dissipat. Si verò astringitorium vis medicamentū, diu coquenda, vt dissipata vi purgatrice, terrea & astringens tandem foras eliciatur.

Violæ etiam parum coquendæ, quando purgare lubricando consilium est : si *Mes.* attrahendo, multū, vt facultas ea in ipsarum ceu centro posita foras trahatur, coctionis vehementia.

Scammonium si in pomo est præcoctum, absoluta coctione iniicitur: si crudum est, crassius tritum miscetur in me-

dia coctione. non autem tenuius, ne etiam vis eius purgatrix exhalet, id quod & accidit coctione vel vnica, sed longa, vel duplici, vel si medicamentum diu ante vsum seruandum est, vel si accuratius ante coctionem teratur.

Scammonium autem si calorem sentit, in grumos coagulatur: qua re fit vt in terdum, in vna dosi alicuius medicamenti plurimum sit scammonium, in alia minimum: sicque inæquale est medicamentum, ob id ad finem iniicitur.

Quod autem tritura similem esse viribus coctionem dixi, rectè accipiendum.

Calor enim ab igne vehementior, & tenuior, quàm ex attritu pistilli, mortarij, durorum terendorum: ob id etiam medicamentorum vires citius dissipat coctio, quàm tritura.

Quapropter aromata teruntur quidem, quanquam minus quàm alia: sed tamen quantum teri est necesse, non coquuntur autem, sed reliquis iam percoctis, & ab igne depositis, vt dixi, miscentur antidotis, vel mollibus, quales veteribus in vfu fuerunt, vel siccis & solidis nobis vfu frequentissimis, vt cinamomũ, agallochum. Sic aurum & argentum bonum & foliatum, quanquam diu coqui sustinet, vires
tamen

tamē nullas coctū tradit maiores quā
crudum. sic margaritæ, cyanus præpara-
tus, ambra, moschus non coquenda.

Coctio facta ad dimidias, tertias, quar-
tas, vel aliam consumptionem, postea re-
sidendo, & albuminibus sæpe purgatur &
colatur, deinde percoquitur, quod in sy-
rupis frequēter obseruabis. Multis etiam
coctio duplex debetur, vt vtrique antido-
to, alcanzi, catholico, diasatyrio vtrique.

Ad coctionem multis sæpe aliis medi-
camenta paramus. Quædam ante intus
& foris purgamus, terimus, lauamus, as-
samus, vrimus, infundimus.

Quædam aliis iuncta illorum coctio-
nem accelerant, sic vrticæ, radices carni-
bus incoctæ eas coqui celerius iuuant:
vt contra nymphææ radix incocta pisif,
ea ad vnum olla velut eiaculatur.

Ichtyocola cum calce viua cito cocta
mox dissoluitur. sed vide an affectus cal-
cis viuæ vires requirat.

DE DESPVMATIONE.

Despumatio est spumæ detractio, cu-
ius materia hoc loco est non solum
succus quidam lentus includens flatum,
vt Galeno in Aphorismis docetur, sed
sordes omnis leuior à calore ignis ex-
purgata, vel etiam grauior albuminibus

coacta & colligata. Despumamus autem nūc simplicia, vt succos, saccharum, mel: nunc composita, vt apozemata, syropos.

Mel cū aqua, aut vino, aut aceto, aut humore alio pro variis medici scopis despumatur. Nam per se coctū mox immodicè effernesceat, & derepente exundat, & flāmis cōceptis incendij periculū affert. Adhæc cū sit dulcissimū, euaderet amarum, si per se coqueretur donec despumatum esset.

Mela- Mel humore æquali hodie quibusdam
qua du despumatur, aliis duplo. Spuma autē in-
pla de- terea dum igni lēto coquitur, cochleari
spuma- pertuso deraditur. Adhæc cū ad dimidias
tur, si est coctū, & multum feruet, adduntur al-
alius hu bumina singulis libris singula. Deinde ca-
mor nō lidū colatur, post percoquitur per se, aut
expri- cū condiendis & incoquēdis medicamē-
mitur. tis. spuma quoq; tunc sicca emicat curio-
se detracta, si per se seruādum est. Vel in
rem præsentē paratur ad pulueres cōpræ-
hendendos, qualia sunt antidota omnia
melle excepta, opiata & sine opio. Si pu-
rius est mel, sufficit aqua æqualis, nec tan-
tum albuminis requiritur: quod si purissi-
mū est, nec despumandū, nec clarificādū.

Sed huius regionis mel cū sit crudum
& impurum, multam reddit spumam, ita
vt despumando & colando ad dimidias
minuatur.

minuatur. Quapropter pondus duplum ei quod cōpositio exigit initio tibi immittendum, si cum aliis despumandū incoquis: sin minus, despumato vtendū. Finis despumationis quibusdā est tempus horarū circiter duarū cū igni lento. Aliis rectius cū spumare desinit, aliis donec aqua erit cōsumpta (quæ res bullis cognoscitur) & mel idoneū lētorē acquisiuerit.

Non autē probo cum Seruitore mellis libram vnā coqui in aquæ libris decem, continenter despumādo, & aqua hac propè consumpta libras alias quinq; addi, & his propè consumptis alias quinq;. Hoc enim modo mel aut vri, aut totū vanescere est necesse, etiam si aqua adsit largior.

Sape autem mel per se despumatur & purgatur, cum tam longam non sustinet coctionē quā aliorū natura, cum quibus mel coquendo despumaretur. Interdum cum his despumatur, cum s. multam coctionē viribus integris sustinere possunt, vt in diacydonio mel coquitur cum succo cydoniorū, & coquendo frequenter despumatur, & aliis passim. Frequētius tamē per se (vt dixi) despumatū miscetur conditionis, syrupis, antidotis: rarius crudum, præsertim nostrās. Quod autem album Gallia Narbonensis thymo passim

luxurians mittit, est præstantissimum: nec Attico aut Hyblæo inferius, cum regionis temperatura & thymi larga luxuries utrobique consentiant.

De saccharo idem quod de melle dicendum, cum sit ipsum mellis species etiam Dioscoridi & Galeno.

Impurum enim & nigrum, aut nigricans in triplo humore despumatur. cum ad dimidias est coctum & valde feruet, adduntur albumina singulis libris singula, colatur calidum, post percoquitur studiose: interim etiam despumando si spuma aliqua appareat.

Si autem purius est, satis est dupla aut æqualis (ut ferè fit) aqua, & pauciora albumina, si purissimum nec despumandum, nec clarificandum.

Succi fluxiles recipiendi in syropos, apozemata, electaria. quædam igni despumantur, residendo clarescunt, & in colo laneo terreum excrementum relinquunt, interim verò etiã additis albuminibus, & melle aut saccharo purgantur, quoties in syropos, vel apozemata coquuntur, ut in syr. bizantino, & aliis, & in elec. psyllij. Qui verò succi in emplastra recipiuntur, vel sole, vel igni post mitionem siccantur, non despumantur.

Liquores

Liquores verò solum colo purgantur post dissolutionem, nō etiam despumantur, tantum abest, vt clarificētur. Idem de metallicis & animalium partibus cōstitue.

Quod si simplicia omnia sunt pura aut purgata, satis est horum decocta per colum laneum aut telalaneum: sed modicè densum semel aut bis trāsmittere sine vlla expressione, colo, si opus est, mutato, deinde ipsum immitte in saccharum, si impurum erat clarificatum. Si autem purum est, clarificatione non egetur, & percoque donec humoris, seu decoctum est, seu succus, seu aliud, vnciae tantum circiter duę: aut si succi sunt glutinosi, etiā tres & quatuor in sacchari libra supersint. Si succi acidi, percocto iā saccharo, ppè toti inuoluuntur, vt dicemus initio syruporū.

DE CLARIFICATIONE.

Clarificationis obiter in despumatio ne memini. De ipsa autem nunc pauca mihi sunt dicenda, quòd hæc rerum liquidarum decoctis debeat expurgandis, vti & despumatio & colatio, vt sorde crassiori purgata, sint gratiora palato, & in corpus facilius distribuantur & salubrius. Clarificantur autem quædam per se, dum quod fœculentum est subsidet: vt succus rosarum, limonum, cydonio-

rum, citrorum, ribes, oxyacanthæ, granatorum, siue mox reponatur loco frigido, siue in officina aliquandiu seruetur. Quædam interueniente coctione à sole, vel igni, vt succus pomorum dulcium & acidorū ad dimidias coctus dies duos quiescere permittitur, donec clarescat, vt syrupus de pomis Mesuæ fiat. sic succus acidus citri ad partis tercię consumptionem coctus & colatus quiescere permittitur, donec clarescat, & succus granatorū ad partis tercię consumptionem coctus, biduum quiescere finitur, vsque dum clarescat in syrupo ex succis fructuum acidorum. Tamen acidi succi hodie in syrupos aliter, vt dixi, & in syrups dicturus sum, recipiuntur. In his autem coctio ratione optima adhibetur, vt calor homogenea in vnum cogat, & separet heterogenea: quomodo vrinæ in nobis cœptæ coqui turbidæ si reddantur, postea tenuantur, & clarescunt, subsidente crasso.

Cum verò calor ignis sordes in succis exquisitè separare non possit, vt noster calor natiuus aliena. coctione perfecta se gregat, cūque metuimus ne coctione tam longa succorum facultates corrumpantur, Satius putauerūt medici cœptam ab igni sordium secretionem arte alia iuuare,

iuuare, & ea multiplici, nunc quiete succi post coctionem, vt nuper dixi, nunc aceto simul incocto, nunc agitatis diu albuminibus: vt interim despumationem omittam & colationem à nobis adhiberi solitas ad perfectionem succorum, vel decoctorum purgationem.

De ea autem clarificatione, quæ fit per se, & post coctionem residente, satis est dictum. de ea quæ fit per acetum & albumina iam nobis dicendum est.

Decocta & syrupi, si acetum recipiant per se, vi aceti nonnihil purgantur: melius autem si etiam albumina accedant, etiam si post colaturam acetum recipiāt: quando nihilominus continenter est despumandum, quòd acetum etiam ex purgato iam decocto spumas & spurcitiam quandam iaculetur.

Oui albumen ex aqua frigida scopulis agita, donec in spumam abeat, quam par ticutatim syrupo, vel alteri decocto feruēti inspergas, & vbi nigruerit, cochleari foraminulento deradas, nouam inspergas: id fac donec erit syrupus clarior. Alij vbi ex bullis clarius decoctū vi ignis factum animaduertunt, in id tepidum (nam calidius albumen coqueret, in frigidior minus promptè & parcior spuma elicitur)

*Nico-
laus in
syr. rosa
to.*

albumina singulis libris singula, sed etiam pluribus pauciora iniiciunt, scopulis agitant, vt spumescat, saccharū in particulas contractū coniiciunt, recoquunt: vbi spuma subsedit, igni auferitur, calidū, si crassum est & vix colabile, colatur: si facile colatur, sed turbidum, tepidum vel frigidum colatur per manicā Hippocratis, melius autem per pannum clauis quatuor, angulis quatuor firmatum. Colatur autem ter, quater, si non satis claruerit: si ne sic quidē albumen separatim in aqua agitatū, scopulis inspergitur decocto igni reddito, spuma illa vsta, alia iniicitur, idque toties donec bullæ clarū satis produnt. Tunc colatur quoties est necesse.

Cribrationi colatio, vt ante dixi, est per similes: sed illa ferè siccorum est, hæc humidorum. Illa corpora grādiora foraminibus cribrorum non transmittit, hæc sordem humore crassiorē transitu prohibet.

Eius differētiæ ex eo sumuntur, quòd quædam calidissima colantur, quædam frigida, quædam tepida. Item quòd quædam vno, alia duobus, alia tribus colis egent. Item quædā colis lineis, alia cannabinis, alia telalaneis, alia setaceis & stamineis, vt vocant, alia nouis, alia detritis, alia raris, alia densis: alia bis, ter colanda donec

donec nobis propositam perspicuitatem
sint assequuta, vt in syrupis, ex succis fru-
ctuum & herbarum, & ex decoctis leges.

Quæ crassa sunt aut lenta calidissima
sunt colanda, & humore ampliore vel tū
diluenda sunt, vel initio coquenda, vt fa-
cilis transmeēt. Colo eadem raro & de-
trito promptius colantur, non tamen pu-
rius, sed frequens colatio coli densitatem
supplet, ac raritatis incōmodum redimit.

Oenomeli colatur panno raro.

Tenuia vt succus limonum, citri, semi-
frigida, colo dēso, & nouo colari possunt:
aut si tribus colis ea vis purgare, summū
sit stamineum, medium panneum: sed
vetus infimum, panneum & nouum, vel
aliter densum.

Sacchari libra si aquæ tantum vncijs
octo sit soluta, cocta, clarificata, panno ra-
riore colanda est.

Colis tribus vsi sunt maiores nostri,
summo, minimo, & rarissimo: infimo, ma-
ximo & densissimo, tertio horum medio
magnitudine, raritate, situ, vt tamen ab
vtroque digitorum 4. interuallo distaret.

Magnitudinis autem & texture horum
ratio erat, vt primum sordes tantum cras-
sas transitu prohiberet, secundum etiam
mediocres, tertium etiam tenuissimas, vt
scilicet,

scilicet quod ad hoc transmittebatur esse illime, & sordis omnis expers. Si verò solo raro vsi fuissent, colata fuissent impura & nō colatis similia, vt si per linteum colas aliquod decoctum: si solo denso, id à crassis sordibus statim obstructum aliis viam negasset, ob id vel mutandum, vel sæpe abluendum fuisset. Quod si vnico voluissent vti medio, rationabilius & facilius vsi fuissent. Minimū verò primū, quia in eo humor incipit latius spargi versus panni ambitum, vt vides non in la-
neis tantum, sed etiam lineis. Gutta enim medio infusa se in vicina spargit.

Ex omnibus autem partibus quas imbuit, defluit, ita vt in secundum influat latius, q̃ in primo humor cōtētus cernitur. Secundū item latius imbuitur, q̃ quibus partibus humorē à primo excipit, & pluri-
bus partibus stillat in infimū quā sit cō-
tactum à defluente ex primo humore.

Malè igitur primum statuas maximū, quanquam ex hoc nullum sequetur in-
cōmodum aliud, quā quod otiosa est hæc capacitas: Satis enim est si capiendo humori sit satis: quantum intelligi volo-
dum minimum requiro. Non enim mini-
mum absolurè volo, sed aliis duabus an-
gustius: si verò infimum sit minimum,
multus

multus humor ab hoc non colatus prope
ipſius oras in vas ſubiectum deſluet.

Nunc vnico vtimur colo magnitudine
& textura mediocri, ſed eius actionem
ante iuuamus clarificatione per albumi-
na omnem ſpurcitiem cogente, adiuuante
id frigido. Quæ enim clariora volumus,
frigida colamus: aut ſi talia non permeant,
tepida. quæ ſi ſemel colata non ſunt pura
ſatis, iterum & tertio colamus, & rectius
colū aut lauamus aut mutamus. Id quod
etiam facimus dum tardius humor per-
meat: ſi autem tardius tranſſuat ob deco-
cti craſſitiem aut lentorem, vel calidius
colamus, vel per colum rarius, vel ſi com-
poſiti natura patitur, liquidius aliquid &
tenuius miſcemus: vt dum cremori hor-
dei colando, aut piſorum, aut fabarum,
aut ſimilium decoctum ipſum affundi-
mus. In tarda autem hac colatura, caue,
rudicula vel digitis fundum coli ſcalpas,
vt colationem celeres. Sic enim turbidū
erit colatum: ſed vt dixi muta colum aut
laua, aut humorem redde liquidio-
rem, vel igni, vel miſto humore aliquo.

Colamus quoque etiam citra coctio-
nem quædam, vt lac recens mulctū, vt pi-
los & ſordes alias foris illaſas ſepare-
mus, quæ uſum ruſticis, & paſtoribus præ-
ſtat

stat interdū aparine. Sic hodie vinū cum saccharo & cinamomo per cola lanca oblonga pyramidis figura (quę caligas & manicas Hippocratis appellant) colamus ter, quater, donec omnino clarum erit, idque Hippocraticū quoque vocamus, tāquam inuentore Hippocrate dignum.

Aliter etiam cum melle, & ceteris colamus ad claritatem, & œnomeli id, ac melites vocamus claretum.

Modo persimili gelatinam quā vocant colamus, vt ante à nobis est scriptum.

Quedā his citius clarificandis miscentur, vt si vni quartæ vini albi duos lactis digitos misceas ante colaturam, ipsum mox clarissimum reddunt.

Aliter quoque res turbidæ colantur aut mistæ: sic in Ægypto aquam Nili turbidā vasis figulinis crudis colari docet Galen. vt tantum quod clarissimum est per vasis poros, aut etiam teneram & mollem substantiam perfluat. Parisiis autem Sequanæ aquam, & Romę Tyberinam, vasis figulinis coctis probè & siliceis præsertim, aliquandiu in cella vinaria deponunt, vt refrigeretur, & simul residendo sordem terream in fundum deponat.

Aquam quoque turbidam colabis per arenas puras vasi immittas inferne pertu-

so,

fo, foraminibus exiguis aquæ peruiis, in-
uiis arena.

Vinum quoq; aqua mistum per cissim-
bium, id est, vas hederaceum tenue, citò
perfluit: aqua autem in eo retinetur, vt
sæpe sumus experti, ex Catonis doctrina.

DE AROMATIZATIONE.

AROMATIZATIO nobis vocatur
conditura quædam, compositis ferè
ad odoris spiritum animale simul & vi-
talem, & cor ipsum recreantis gratiam,
adhibita mistis rebus aromaticis.

Simplicibus, vt moscho, ambra, caphu-
ra, zingibere, cinamomo, macis, croco,
calamo aromatico, spica, pipere albo, lō-
go, nigro, caryophyllis, mastiche, xylaloë
cortice citri, fantalis: vel compositis, vt
Gallia aromatica, Gallia sebellina.

Mesues aromatizat moscho diasatyriū
aqua rosarum soluto, & aliis misto electa-
rium, sarboteng diasatyrium, secundum
aromaticum rosarum stomachicum.

Syrupus ex corticibus cytri, cydonia
condita. Citra autem condita, moscho &
ambra aromatizat.

Caphura autem syrupum acidum de
pomis, Trochisco Gallie Sebellinæ, mo-
scho, ambra, caphura.

Hydromeli quidam aromatizant spe-
ciebus,

ciebus, vt zingibere, croco, cinamomo, macis, & similibus.

Nodulus ex panno lineo raro continens croci, cinamomi, calami aromatici, spicæ, zingiberis, piperis nigri & longi, ana drachm. i. & dimidiam syrupo stœchados immittitur, & suspensus manet ad condiendum, seu aromatizandum. sic miua aromatica nodulo aromatum pleno in ipsa suspenso & sæpe confricato, vt ante in confricatione diximus.

Syrupus de mentha aromatizatur Gallia aromatica.

Conditum citri Gallia, moscho, croco, mastiche.

Conditum buglossi, moscho & gallia.

Syrupus ex omphacio, caryophyllis.

Syrupus intybi compositus fantalis, cinamomo, xylaloë, cortice citri.

Sic alia multa præter consistentiæ & saporis gratiam, odoris quoque iucunditatem, sed etiam coloris, de quo mox, requirunt. De quibus abundè à nobis scriptum est in methodo medicamenta componendi, dum hæc rationem in compositis habere docebamus, interdum sine qua medicamenti actio nõ fiebat, & per quam melius fiebat. Iulepos ex syrups & aquis destillatis hodie misceri solitos,

apo

apozemata, cinamomo, & santalis aromatizamus, immixtis colo horum drach. circiter duabus in humoris libras singulas, aut pluribus, aut paucioribus pro vario medici scopo. Et vinum aromates, & quod Hippocraticū vocant, & alia multa aromatibus condimus.

DE COLORATIONE.

COLORATIO quoque multis medicamentis acquiritur ad gratiam magis & iucunditatem, & terrorem auferendum, & causas alias, quod etiam lib. 2. methodi medicamenta componendi docuimus. Sinopidem aliqui, alij ochram cerato Galen. dia euphorbiū miscuerunt, ut hoc colore fucatum ceratum, unde componitur, lateret: misceri potest floris salis aliquid, aut simile quod colorē eius mutet, neque vim eius minuat.

*Gal.
Lib. 6
metho.
Idem
Ibid.*

Quę Galeni verba diligenter sunt observanda, ne scilicet coloris mutandi ratio vires novas medicamento acquirat, aut priores augeat, vel diminuat, siue colorem mutare libet nova re mista, ut in oxycroceo: siue vno aliquo simplici aliter atque aliter preparato, ut ceratum Galen. ex æruginē cruda viride est, ac terrens ægros: ex eadem vsta est melinum, ut Galenus docet lib. 2. c. ph. g.

Sic ex cerusa cruda emplastrum est album, ex ochra pallidum, ex iisdem probe vstis rubrum.

Solus quoque motus colorem questitū saepe medicamento acquirit, vt ex lithargyro nutritum longo pistilli attritu fit albius.

Penidia quò diutius rudicula, & manibus tractantur eò albiora euadūt, etiam si ex vili & impuro saccharo fiant: sic pilulae albae, diatris simplex, diatragacanthū frigidum, sic saccharum rosatum, & saccharata reliqua.

Mel crudum & coctum in antidotis diu commiscendo albius euadit, & cetera mellita.

Iulep coctum ad succorum in syrupis cōprehensionem, baculo diu versandum vt albescat, & alia multa simili agitato albescent, fortè quòd aër multus in commiscendo receptus alborem conciliat.

Sic album Rasis vnguentum & citrinū, & emplastra diachylon, & ceratum Gal. refrigerans album, de cerusa, gratia dei multum diūque subigendo, trahendo albescent, & oxycroceum pallefcit.

Oesypus quamuis niger est, multa agitatione album facit emplastrum, vt glutinosa alia.

DE EXCEPTIONE.

EXCIPIUNTUR & comprehenduntur colliganturque, seu ut vulgo loquuntur incorporantur medicamenta humore aliquo ad saporis gratiam diuturnitatem, virium conseruationem, fermentationem, medicamenti constituendi formam, vsum dexteriore.

Eclegma ad asthma melle excipitur, ut sit suauius & vsui aptius.

Eclegma amygdalatum excipitur melle, & succo foeniculi.

Electaria propè omnia, praesertim mollia melle excipiuntur ob dictas causas, sic ea saccharo humore aliquo soluto, pulueres succo cucumeris agrestis comprehenduntur in hiera Hermetis.

Pilularum materia excipitur vino, succo absinthij, solani, foliorum citri, brassicae, apij, inrybi: pilulae aureae muccagine tragacanthi, coctiae Rasis & Mesuae succo absinthij.

Pilularum Hermetis species ladano excipiuntur cum pistillo calido.

Trochisci galliae moschatae comprehenduntur muccagine tragacanthi in aqua rosarum soluti, vel ambra oleo balanino soluta.

Mel, quo solutiua excipiuntur, vino

quam aqua potius coquendum & despumandum, nisi aliquid prohibeat.

Exempla alia ipsius, vt sic dicam, incorporationis in electariis Mesuæ, antidotisque aliis & ceratis, & emplastris tam sunt multa, vt nemo desiderare possit. nec plura describere libuit, ne oratione prolixia displicerem.

DE FORMATIONE.

ORDINE rerum gerendarum succedit medicamentorum comprehensioni ipsa eorum formatio cuiq; composito sua: cum scilicet vnumquodque formam habet idoneam, quæ in quibusdam à consistentia differre non videtur, vt in conditis, sapis, syrupis, eclegmatis, apoze matis, antidotis mellitis, pilulis, trochiscis, vnguentis, ceratis, emplastris. Forma ipsius compositi est cōsistentia liquidior, crassior, mediocris. Sed in multis præsertim siccis, præter hanc consistentiæ formā alia quædam nostris manibus, aut alia re apprimitur, vt saccharum in vasa dum recens coctum est coniectum, illorum formam, pyramidis scilicet ac metæ cuiusdā retinet, & quæ ex saccharo imagines formatur, aut cera, aut alio dum calet liquido, ob id terminum alienū facilè induēte, dum refrigeratū coiuuit duro, ob id formā

tunc

tunc assumptam pertinacius retinente: sic electaria solida & tessellas, nunc rhomboides, nunc quadratas, nunc quadrangulas: sed altera parte longiores, quales manus Christi vulgo dicuntur, nunc triangulas: sic pilulas fingimus orobeas, id est, magnitudine & figura orobi, vel ciceris, scilicet orobei, non arietini quod inæquale cum sit & acuminatum, figuram habet pilulis ineptam, sic & *νόμικια*, id est granula seu pilulas paruas (vnde ut dicemus lib. 3. pilulae cocciae Rasi, & vulgo dictae videtur) granorum scilicet paruorum magnitudine & forma fingit Paulus.

Trochisci quoque complanantur, & in medio cauantur, & ferè postea sigillo aliquo pressi notantur. Qua de re mox quoque dicturi sumus, vnde & à forma hac, ut pilulae à paruae pilae effigie, nomē sibi adoptauerunt, & præter id aliae quoque. nam cyclisci, id est, parui circuli, & artici, id est pastilli, seu parui panes etiam Græcis appellatur. Sunt enim velut circuli, hoc est, superficies planae una circumferentia à centro æqui distante, conclusae, non autē sphaerica sunt corpora, ut pilulae.

Cerata & emplastra formamus in offas, quae apud Galenum *μαρμαίαι* vocantur (vnde vulgo corruptum puto vocabulum

magdaleones) hoc est, cylindraceæ quædam figuræ.

Quædam trahendo manibus ex vnco ferreo producuntur, interquuntur, & in quamlibet figuram mutantur, vt penidia, & quæ alpheni vocant.

Qualiter quibusdam quoque trahuntur emplastra, diachylon, gratia dei, sed post in magdalias componuntur.

DE SIGILLATIONE.

SIGILLATIO quoq; (vt vocant) seu sigilli alicuius impressio, inter præparationis differentias numeranda est. Quæ quâuis haud ita magnarum virium esse videatur, vt cum ex pilulari forma per sigillum ligneum fingis trochiscos, tamen & per se veteribus magni momenti fuit, & per accidens sigillatio. Per se quidem, cum terram Léniam sigillo Dianæ imaginem habenti notabant, à qua facultatē aliquā his trochiscis imprimi putabant, vti & Nichepsos rex anulis insertū iaspidem viridem draconis radios habentis imagine scalpi volebat, quod tamen ceu vanum reiciēdum censet Gal. Quanquā & illa Dianæ imago in sphragide lemnia, hoc est in sigillo, seu sigillata terra Lemni insulæ, etiam per accidens proderat, quòd pastilli hac notati planè veri significaban

cabantur, non quo hodie modo omnes adulterinae nostrates terræ sigillatae. Iidem ad me Constantinopoli sunt delati, characteribus variis à Turca obsignati.

In pastillis quoque Theriacis, & medicamentis omnibus, quæ ab exteris corrogamus, utinam vel characteres aliqui, sed certi fide, vel publica, vel principum apprimerentur, quòd pannis laneis, & sericis gentes multæ etiam hodie factitant. Non enim toties grandi pecunia adulterata & spuria pro veris reciperemus, aut saltem qui vendunt primis institoribus, & hi deinde aliis chirographo, aut sacramento aliquo cuiq; verendo vera se vendere affirmarent, sed nostra opinor socordia illos efficit audenter furaces. Cum enim vera ignoremus, neque illa nouisse multum hætenus sit à nostris pharmacopolis laboratum, faciliè illis imponitur. Incumbite igitur, incumbite modis omnibus, ut vera deinceps habeantur. Homini elephantico dedi, nō multis antè mensibus trochiscorum theriacorum libras propè duas, quibus non est mutatus magis quàm si terram sigillatam nostratam deuorasset: tamè qui vendidit affirmabat è monte Pessulano allatos & veros. Quod tamen falsum illi ex Galeno.

probaui, tamen quia egebatur, & veròs affirmabat, grandi pecunia emimus, nullo tamen, vt dixi, successu. Quæ fraus in cæteris quoque medicamentis, nisi diligenter cauerur, latè patet, magna animadversione coërcenda.

DE REPOSITIONE.

Repositio medicamentorum tam simplicium quàm compositorum in locum aliquem, tum communem, tum proprium ad conseruationem (de qua mox dicam) magni est momenti, & item quòd quædam per se reponuntur, alia cum aliis ipsorum virtutem conseruantibus, vel etiam augmentibus, aut saltem quàm minimum fieri potest minui permittentibus. De hac generatim quædam diximus libro tertio methodi medicamenta componendi, sed hic paulò fufius dicendum.

Reponimus quæ seruari volumus, conseruationem verò nihil tam variat quàm putrefactio: quam ambiens calor, aut frigus, aut aër corruptior, aut excrementosa rei seruandæ humiditas, & calor imbecillus accersere solet. Ob id quæ integra diu seruari volumus, omnino siccamus, tum absumpta ipsorum superflua humiditate, tum mistis siccantibus: sæpe etiam astringentibus: sic condita, sãpas, syrupos, antidota

dota ex humidis praesertim temperata, pilulas, trochiscos, & vnguenta quaedam, & cerata, & emplastra igni, vel sole siccamus, misto his quae sumuntur etiam melle, aut saccharo, aut utroque remedio siccante: aliquibus, & acetum, & sal profunt, aliis metallica, & terrea ob siccitatem putredini diu resistentia.

Ergo quae reponenda sunt simplicia, & composita omnino quantum opus est sint sicca: sic & vinum feruendo in lacu, aut dolio humiditatem corruptionis sui, & feruoris ardorem si validum est, nec ea tam multa consumit. calorem externum vitamus fuga solis, & res ipsas in loca minus calida, aut etiam frigida seponendo. Frigus immodicum & gelu ab his tantum prohibemus, quae humida cogi possunt, ut aquis distillatis.

Calorem internum imbecillum fouemus, prohibita eius exhalatione. ob id quae seruamus omnia loculis clausis, & vasibus obturatis reponimus, nisi valentissima sint: theriacales enim vas saepe detegi vult Gal. ut expiret. Ad haec rha barbarum, ut viribus integris diutius feruetur, vel cera sola, vel cera cum terebinthina, aut melle albo circumlinit. Mel, vel psyllio, aut milio mergit. Agaricum idem cum zingibe-

re, dauco, ligustico, polypodio querno
seruat, vt eius actio vegetior reddatur. A-
loë seruatur cum aromatibus aut bdellio,
& alia similiter in Mesuæ simplicibus.

Cassia verò in fistula sua felicius serua-
tur, nec purganda ante vtendi tempus. Fi-
stula autem in sabulo cellis vinariis in-
fossa, siccari præproperè prohibetur.

Colocynthis integra diutius seruatur
quàm emedullata, & melior ac salubrior
euadit cum mastiche, galanga, & aliis sto-
machicis, hepaticis, cardiacis.

Phialæ succo rosarum, granatorum, li-
monum, cydoniorū, & similibus seruando
destinatae habeant in fundo emissarium,
ne inuertendo fuga olei superfusi succus
turbetur, & sex cum tenui misceatur, & sic
turbidum pro puro succum vsurpes.

Crusta quæ melli & medicamentis qui-
busdam tempore accrescit, integra & im-
mota seruanda est, si vis pharmacum diu
manere integrum & immutatum. Gal. lib.
2. alimentorum. Quæ prouidentia succis
prædictis, vino quoq; & cæteris est com-
munis. Diabesasa stanneo vase reponi
vult Heras lib. 8. comp. ph. p. Gal.

Medicamentum stomachicū vase cor-
neo reponitur, eodem libro.

Terebinthina vase ex ferro albo, aut vi-
treo

treo, aut siliceo seruatur melius quàm ligneo, aut terreo, nisi sit vitreatum. Vase vitreo, vel plumbeo hieram reponit Paulus.

Theriacen vase non ligneo, vt hodie fit, sed pretioso reponit Galenus.

Oleum vasi siliceo, lapideo, plumbeo in cella vinaria probè diu seruatur.

Pulueres cardiaci vase vitreo stricti oris operculato reponuntur.

Flores & omnia iucundum odorem reddentia arculis tiliaceis.

Semina etiam chartarum inuolucris, & suis folliculis vtilius, & innocètius interdum seruantur. Liquida medicamenta seruantur, densiore materia, vt argentea, vitrea, cornea. Fictili etiam, modò nò rara: interdum & lignea, præsertim buxea. Ocularia medicamenta, & alia quæ acetum, picem liquidam, cedriam recipiunt, æneo vase seruanda. Adipem & medullas vasis stanneis, seu ex plumbo albo reconde, hæc Diosc. Herbæ igitur siccentur, & fasciculis aut manipulis colligatæ.

Quæ componendo cocta, aut aliter calfacta sunt, nò nisi refrigerata sunt reponenda.

Diacodium refrigeratum reponit Damocrates, apud Gal. lib. 7. c. ph. p. & similiter composita propè omnia Mesues.

Loco

Loco non vliginoso & madente reponantur medicamenta, exceptis paucis, sed ædium parte sicciore. Quæ reponuntur, si præterea feruere debent, vas nō repleāt, vt sit locus & spaciū quo perspirent: sic vina doliis non plenīs reponūtur primò: sic conseruæ insolatu coquendæ, vasis non plenīs coquuntur: sic theriacen vasis non plenīs reponit Galenus, quo tempore adhuc à suo calore coquitur & feruet.

DE CONSERVATIONE.

HÆc de repositione sufficiant, in quibus tamen ob rei affinitatem conseruationis quoq; obiter coacti meminimus, sub qua & medicamentorum simplicium & compositorū durationis tempus comprehendimus. Vt enim nō minor est virtus quàm quærere, parta tueri, sic non satis est medicamenta probè delecta esse, sed ad conseruationem cōmodè reposita esse, & quādiu integra cōseruari possunt, sciendum est. Nam si mors etiā saxi numinibúsque venit, omnia tam simplicia quàm composita aliquando corrumpuntur, hæc citius, illa tardius: idq; vel ob peculiarem cuiusq; naturam, vel aëris constitutionem, vel repositionis differētiam.

Herbæ quotannis sunt mutandæ, & flores, & quæ ex his distillantur aquæ præsertim

ferim quæ vase duplici, aut vapore aquæ feruentis distillantur. Humidiores enim sunt quàm quæ ignis flamma, & carbone, etiam per cinerem, scorie ferri puluerem, sabulum distillantur.

Aqua tamen vini quæ frequēti distillatione est purgata, diutius seruatur vase vitreo cera obturato. Seruantur autem herbarū siccatae sacculis cannabinis rarè textis ne putreant, nève puluerulentæ euadant.

Radices multæ diutius seruari possunt, vt in delectu diximus lib. i. vbi & de reliquorum quoq; duratione quantum sufficit, scripsimus. seruantur siccatae per se aut conditura ex saccharo, aut melle per se suspensæ in aëre libero si magnæ sint, in sacculis cannabinis si parua, fructus in melle conditi sic, vt se non tangerent, & loco frigido repositi annum seruantur recentibus simillimi.

Idem & flores vasi inclusi aqua fluente recti annū seruantur. Vinum musteum dolio picato impositum, & eodem bene operculato sepultum dies quadraginta aqua fluente, vel aliter pura, annum totum dulce permanet Catoni. Idem cera inuoluti, farragini impositi, aut furfuri, diu seruantur recentibus similes.

Herbarū quoq; folia citra siccationem sibi

sibi simillima diu seruantur inter papyri folia: sic tamen vt non premantur presertim quæ succulenta sunt. Nam hæc mox mucida & putrida euadunt si premantur.

Aloë etiā solario appensa tres, quatuor annos viua, & germinans seruat, & aizoon, & telephium ob succi crassi copiā.

Quin & cæpe, allij, scillæ, ari, dracontij, cotyledonis, satyrij, & aliorum quorundam radix bulbosa succo crasso lēto plena diu seruat, citra vllam à nobis, aut aliundē siccationem manifestam.

Metallica & lapides vbilibet probē seruantur, si sordes & puluerem vitabis.

Cōposita autē medicamenta nobis hodie variē seruātur: nam condita humida, eclegmata, syrapi, electaria mollia, vase vitreo, vel siliceo, vel terra dēsiore potius quā stāneo plumbi vitium retinēte seruāda. Electaria autē sicca arculis faginis, aut pixidibus vitreis, vt pulueres & trochi sci. Catapotia aut ferē aluta inuoluta, pyxi de stānea includūt. Olea, vnguēta, cerata liqda vitreis, lapideis, stāneis: emplastra verò in magdalias formata, papyro vndiq; præterquam extremi medio integuntur.

DE CONDITURA.

DE cōditura nūc dicēdum, q̄ ea sæpe coctio quædā est (de qua & præparatione

tion

tionibus aliis ipsam coctionem sequēti-
bus abundē diximus) & cōditura cōserua-
tioni non parū confert. Cōditura fera est
radicum, herbarū, cauliculorum, aut ger-
minum, florum, fructuum, seminū, inter-
dum & corticū. Fit item ferē saccharo, vel
melle, vel utroq; interdū syrupis, iulepis,
sale, aqua falsa, aceto & aliis quæ siccādo,
& humiditatē superfluam absumendo, a-
stringendōq; à putredine res vindicant.
Cōdiuntur enim prædicta ferē ad cōser-
uationem tutiorem, sæpe tantum ad sapo-
ris gratiā, sæpe ad utrunq; ut succus mo-
rorū in diamoro melle cōditur. Possisq;ue
cōditura generatim dicta etiam syropos,
& antidota plurima, & pillulas, & trochi-
scos comprehendere, quod hæc humo-
re aliquo iucundo cōprehendūtur, ut sint
iucūdiora, & facilius sumi possint: sic rosę,
violæ, & flores alij melle, aut saccharo cō-
diuntur, & fit mel rosatū, violatū, ut in cō-
ditis Mesuæ diximus, & lib. 3. dicemus.

Conditura fit humore hoc iucundo
per totum corpus condiendum insperso,
ut dum flores & fructus condimus, &
corticem citri, & cucurbitæ, lactuæ, cau-
les, & alia plurima: sic myrobalani recētes
condiuntur, aut humectatæ prius si erant
sicciores, ut docuit in simplicibus & con-
ditis.

ditis Mesues, interdum tanquam crusta quadam saccharo integimus magis ad saporis gratiam quàm ad vires, vel augendas, vel conseruandas, vel minuendas: sic semen coriandri, papaueris albi, absinthij marini, anisi, fœniculi, apij, & nucleos persicorum, strobilorum, pistaciorum, amygdalarum dulcium, & si libet amararum saccharo integimus, & cortices aranciorum, cinamomi.

Interdum condimus additis quibusdam medicamentis aromaticis, vt emblicas myrobalanos aromatibus cōdiri Mesues scribit, & alia etiam composita: sed condiri, tunc aromatizari potius significat, quanquam & ad saporis gratiam id etiam fiat, vt in fartura mox dicam.

Condienda si magna sunt, ferè in particulas secantur, vt condituram promptius vbique sentiant: sic cydonia, sic persica, & radices magnæ sectæ condiuntur.

Tamē fistula cassiæ tenera conditur integra, & nux moschata cum cortice viridi, qualis nostrarum nucum integra conditur, & parua citrea, arantia, melones parui adhuc & teneri.

Quanto autem melle, saccharo, vel alia condiente materia sit opus, & quis modus condiendi, hoc est incrustandi, præsert

praefertim semina, & nucleos, leges lib. 3.
seccione prima.

Flores capparis nondum apertos inter-
perso sale cōdimus: nam si soli reponan-
tur, putrescunt. Eodē modo & in eisdem
vsus flores genistæ, & his odoratiores
sparti flores, quibus tamen pōst acetum
affundimus quantū omnia tegere possit.

DE FARTURA.

FArtura condituræ quædam differen-
tia est: fit autē ferē dum cavitās quæ-
dam manifesta odoramētis, vel aliis sco-
po proposito idoneis impletur: quomo-
do & coqui pullos, anseres, porcellos, &
alia quædam herbis nostratibus aroma-
ticis, & floribus, & lactuca, & appetitis a-
liis, interdum additis etiam aromatibus
farciant ventrem totum inferiorem, &
sæpe etiam spacia inania inter carnem &
cutem vi deducta.

Sic elignatæ radices eryngij & sectæ lo-
co matricis (cor vocant) caryophyllo, & ci-
namomo humectatis farciuntur à Mel.

Anserem exenteratum carnibus felis
annosi, & herbis nervosis facimus, vt in
de eliquatus adeps sit medicamentosior.

Farcitur pileolus ex bōbace, aut aliud
epithema cephalicū, vel stomachicū aro-
matib. & aliis cephalicis, stomachicisq;

Præterea vt coqui carnes auium torrendas, caryophyllis, & frustulis cinamomi configunt ad odoris & saporis gratiã: sic nuces virides maceratas, & coquendo teneras redditas, & radices satyrij, ex secundo cicerum decocto ad iustam tene-ritudinẽ coctas, caryophyllis, & cinamomi frustillis configimus, & cydonia in particulas condienda. Quæ res ad farturam, vel vnà cum fartura ad aromatizationem reduci potest.

DE PUTREFACTIONE.

Putrefactio coctioni simillima est, præsertim de qua nunc agimus: non enim de absoluta putrefactione, sed mutatione aliqua à calore externo, etiam rerum putrescentium vt fimi corticum facta. Vt oleum in folliculis vlmi inuentũ, phialæ forti impositum cum folliculis si operculetur, & dies quindecim fimo equino multum ob putredinem vigentem ca- lenti obruatur: deinde insoletur, & quod eius clarum supernatabit transuasetur, omnium vlcerum remedium est præstantissimum.

Sic ex vino facimus acrum tenuius, & acre magis ac mordax. Facimus autẽ vel insolatu, vel immisso aceto valentissimo in vinũ, vel foliis, surculis & ramentis sor-
bi, vel

bi, vel parte acida citri immiffa Gal. lib. 2.
alimentorum. Sunt qui linguas lampetæ
noſtratis ea cauſa inmittunt.

Ex maza item fermentum, & ex lacte
in primo animalium lacte nutritorum
ventriculo corrupto fit coagulum: omnia
ob putredinem acrida, & caliditatem no-
uam adepta, amiſſa autem naturali.

Sic chalciteos partes duas lithargyri,
vel cum Dioſcoride cadmiæ partē vnā
aceto acerrimo ſoluit Galenus, ac æſta-
te media, ſeu diebus calidiſſimis quadra-
ginta in olla noua ſimo obruit, vt fiat pſo-
ricum. Talis putrefactio in vſu eſt maxi-
mo chymiſtis.

Sic adeps vetuſtate putris Galeno ex-
petitur ad emplaſtrum diachalciteos, &
oleum vetus ac ita ſemiputre, vnde &
grauelentiam acquirit: ſic vetuſtate pu-
trefactum caſeum decocto pernx ſalſæ,
coquit Gal. ad tophos.

Quid quod vinū & ſucci reliqui dum
ab humiditate excrementoſa feruēt, quo-
dammodo putrent, & flores ſaccharati,
aut melliti dum inſolantur, & antidota
melle addito cum feruent.

Acopa item ex ſemine abietis, & flori- *lib. 4. ſa*
bus populi dum menſes plures maceran *nir. tuē*
do perficit Gal. etiā putrefacere videtur. *de.*

Coctioni non modo affines sunt fri-
xio & assatio, sed frequenter etiam,
vt in alimentis, coctionis differentiæ: ta-
men quæ medicamentis adhibentur co-
quere raro videntur humiditatē crudam,
aut excrementosam, sed magis absumere.

Frixio autem ferè in sartagine fieri in-
telligitur, quæ à frigendo etiā frixorium
dicitur. Hæc autē in sartagine parata suæ
qualitatis vehementiā deponūt. Gal. lib.
2. alim. in dracontio. Assatio autē seu tor-
refactio super regulam ignitam fit: vel in
clibano, vel in carbonibus ignitis. Hæc
quoniā tenui discrimine distant, & ambo
à calore fiunt, simul tractanda duximus.

Semen melanthij frigitur Galeno con-
tra catarrhos. semen agni frixum minus
tentat caput eidem lib. 2. alim.

Semen lini & nasturtij torrefiunt in e-
clegmate Phthysicorum, Mesuæ.

*Mes.
Ibidē.*

Semen porri & nasturtij in E. nostro.
Cuminum pridie aceto maceratum sic
catur, & frigitur in vase fictili bene cocto
Gal. in diospolitico lib. 4. sanit. tuendæ.

Coriandrū aceto infusum assatur pas-
sim: sic enim calorem eius in superficie
vehementem extingui volunt, vt tantum
refri-

refrigeret. Granatorum acini assantur in E.altero Mesuæ. & semina vuæ, portulacæ, psyllij, plantaginis, althææ, anisi, marubij, ad fluorem alui assantur. Gal.

Baccæ myrti, gallæ in quinque aut sex partes contractæ, oleo hora vna infusæ assantur ad capillum fluentem sistendum. Sit autem oleum astringens aut succus alius, si magis astringendum.

Myrobalani omnes succis astringentibus variis maceratæ, linteo siccatae assantur, sed antequam nigrescant, & vrantur eximendæ, ne vires amittant. Si insigniter, scilicet vrentur, vt cinefiant. Nam hæ & rha barbarum, assa coctis, vsta assis magis astringunt Mesuæ.

Balanus myrepfica assando deponit partem humiditatis excrementosæ, & partem coquit. ob id assata deiectoria tantum est, non amplius vomitoria.

Auellanæ assantur in eclegmate pineo.

Gummi Arabicum, tragacantha, succinum, & gummi alia ad magnitudinem orobi contracta, cum opus est assantur donec albefcant.

Amylū assatur in trochiscis terræ sigillatæ, & trochiscis spodiatis secūdis Mesuæ.

Modus autem frigendi & assandi prædicta est huiusmodi. Sartago, vel aliud

vas ferreum vbi admodum calet. ac si opus est cander, ab igni tollitur in hanc semina, fructus, radices & alia immittuntur, continēter rudicula ferrea versantur, ne vrantur. Sartago, si opus est, his exemptis recalefit, & quantū opus est assantur.

Quæ autem sunt magna, crassa, humida, glutinosa, diutius assanda, contraria minus, vt semen anisi, cymini, nasturtij: Semen verò lini & psyllij, quia humiditatem lentam satis multam sortitum est, paulò diutius assari sustinet.

Possunt quædam etiam in clibano, aut super eius testudinem, aut sub cineribus assari, & ea vel nuda, vel olla noua cōclusa, & si mediocria sunt integra: si magna, confracta, quædam etiam maza intēcta clibano assantur.

Scilla per assationē multi fit vsus Dioscoridi, quia per eam vel elixationē, eius vehementia obtunditur Galeno. Quæ enim nō assata sumitur, interaneis maximè noxia est Mesuæ. Illa autem delecta, purgata farina, pinsita, aut (id sordidum videtur Galeno in Theriace) luto, & argilla circumdatur in digiti crassitiem, sub cinere calido, vel carbonibus, vel clibano assatur. Sunt qui in olla operculata in furnum demissa assant: sic enim celerius & clemen-

elemētius purgat. Sic elleborus albus, & scammonium in maza pista, vel cydonio preparatur Diosc. & Gal. vt ipsa & panis, & cydonium moderatius purgent. In vas calefactum quoq; , & ab igni depositum opium mox immittunt: vbi est liquatum, eximunt priusquā siccetur, & friabile fiat.

Acaciā nostratem factitiā super prunas ignitas assat Bulcasis in Seruitore. Est quādo vt alimenta sic medicamēta ex humore frigūtur: nā castaneæ sine humore: fabæ, pisa, carnes, fungi, cū humore, vt oleo, butyro. Sic myrobalani, flauæ, cepulæ nigræ friguntur & fricātur in oleo violato, aut amygdalarū dulcium in tryphera Persica & in simplicib. Omnia probè trita frigūtur in omphacio, vel succo myrti, & aceto, & siccātur in stomachico electario quodam Mes. Omnia in vino odoro frigātur, deinde in succo cydoniorum in E. nostro Mes. Addit in sequenti, & feruefiant, vt intelligere possis, hæc frigēda super ignē semper mouendo, & confricando: non solum fricanda, cum his humoribus, vt diximus prius in confricatione.

DE VSTIONE.

Vstio assationi finitima, vt ratione maioris, & minoris tantū differant:

assata enim largius vrūtur, & infra modū
vsta, tantū assantur. Vruntur plantarū par
tes ac animalium, & animalia tota, metal
lica item & terrea. Horum autē medica
mentorū vrendorū scopi medicis sunt
varij. Quædam enim vruntur vt puluera
ri facilius possint, vt pili, lana succida, se
ricum, testē ostreorum, buccinorum, pur
purarum, vngues asini, cornua caprarum
& ceruorum, ossa, coria, & alia quæ ob
terrosam, & duram, & crassam corporis
consistentiam & cōcretionem densatam,
vel ob lentorem immodicum vel humi
ditatem aliquam puluerari nequeunt.

Alia vt essentia crassitiem deponāt, &
tenuitatem, aliāsque facultates igneum
colorē sequentes induāt. Id quod quam
uis omnibus vstis accidat, non ob id ta
men omnia vruntur. Sic metallica omnia
& terrea vrendo tenuiora euadunt, & quæ
acria erant, mitiora fiunt, quæ non acria
erant, acrimoniam vrendo assumūt Gal.
lib. 4. & 9. simp. in chalciti.

Ex quo patet vstione etiam facultates
quasdam mitescere, vt ærugo, chalcitis,
misf, sorī, chalcāthum, melantheria fiunt
moderatiora: quasdam acquiri, vt vim te
nuandi & ea efficiendi, quæ saporem a
crem sequuntur.

Alia

Alia vruntur, vt vis quædā nostro proposito aliena, ex profundo in superficiē trahatur, postea lotionē separetur: sic lapidem phrygium, vstum lauat Galenus, & lapidem hematitem ad oculorū affectus.

Alia vruntur, vt colorē nouum acquirant ægro gratiorem, vel ad dissimulanda simplicia, quibus constat medicamentum. sic ærugo vsta modicē quidem, rufa facit emplastra, immodicē verò, nigra.

Cerusa trita, rudicula ferrea mota vrendo fit rubra, vt ochra, & auripigmentum. Ossa & testæ vrendo primum nigricant, deinde albissima euadunt.

Quædā vruntur, vt in aliam transeant speciem, vt vipera vsta trāsit in salem theriacum, cerusa vsta vt rubeat in sandyca, thus in fuliginem, sulfur in oleum, cadmia lapis in cadmiam fornacariam, & pompholygem & spodium.

Vrendi modus non est omnibus vnus. Quædam enim humore pingui prædita per se vruntur, vt pili, lana succida, sericū, cornua, vngues, coria, hirūdines, motacilla, galerita, & aliæ quædam auiculæ, cica de, scorpiones, vipere, lepores, & alia quædam pedestria. Hæc verò in olla noua operculo foraminulento recta sunt vrenda carbonibus vel clibano, præsertim

quæ propè cinefacta disperire possunt. Quæ verò post vstionem integra manēt, vt ossa, vngues, cornua, testæ ostreorum, lapides ad gypsum vel calcem coquendam & similia: hæc etiam viuis carbonibus obruta vel superposita, aut etiā flammæ luculentæ immissa, vri possunt: nisi quædam sint addenda, quæ vim eorū mutant. Tunc enim etiam in olla noua vruntur. Sic viperas cum substratis quibusdā medicamentis Galenus vrebat ad salem theriacum: sic fictili nouo inclusa vel patellæ ferreæ, aut sartagini imposita vruntur, cerusâ, chalcitis, misy, fori, calcâthū, auripigmentum, sandaracha, plumbum.

Alia fictili crudo vrūtur, donec id perfectum sit, vt cadmia, æs.

Alia etiam olla ænea aut ferrea, vt plumbum.

Alia in patina vruntur, vt ærugo, chrysocolia, lithargyros.

Alia in olla ex cinerib. ossū (crucibolum vocāt) in fornace aurifabrorū, alia in foco, alia in clibano panis, alia in furno figulorum, alia in fornace chymistarum.

Quædam (vt dixi) tam carbonibus obruta quàm olla vel noua, vel cruda, vel patina excepta per se vruntur, nulla addita inflammabili, aut vires mutante materia,

ria, vt ossa, cornua, testæ ostreorum.

Alia materiam requirunt inflammabilem, vt sulfur, alumē aliquod, salem, hordeum, vt in plumbo vsto & aliis docuit Dioscor. Vas item quo excepta vruntur si fragile est, vt vitreum, ex terra bellouaca & alia lapidea & silicea luto chymistarum prius totum paulatim oblinimus, & paulatim siccamus, quàm igni committamus. Eodem luto vasi operculum saepe agglutinamus, ne inter ipsa hiatus viam faciat carbonibus, aut cineribus illapsuris, aut effluxuræ materiæ.

Lutum autem id fit ex terra figulina aqua macerata cum stercore equino, & si vis pilis animalium multum diùque subacta, quod & lutū sapientiæ vocant chymistæ. Eius loco interdum est terra figulina sola, vel gypsum aqua solutum, vel farina albuminibus subacta.

Vas quoque chymistæ operculant labris ipsius colli per fusionem coalescentibus, dum materiæ sunt pretiosæ, & quas exhalare nolūt. Id autem in matulis tantum vitreis longo collo efficiunt, sigillumque Hermetis vocant.

In aliis fictile apertū esse nihil nocet, si clibano vrēda sunt: si verò cineribus aut carbonibus obruēda, operculatur vas, ne
aliena

aliena materia quod vrendum est, vt dixi, conspurcetur, vel ne materia ipsa exiliat, vt in sale & lapidibus quibusdam.

Operculum autem nūc solidum est, & integrum, nunc multis locis foratum, vt fuliginosi effluxus exhalent liberius, à quibus est cauendum, præsertim si à vipers, scorpionibus, aut similiter venenosis attolluntur, item si à metallicis.

Vrantur materiæ carbonibus perustis, præsertim pretiosæ, & quæ oculis sunt adhibendæ, vt nihil fumidum habeant, vt Galenus vrebat lapidem phrygium.

Carbones quoque follibus vel flabellis excitari interdum oportet, vt citius vstio absoluator, vt Galenus in vstione lapidis phrygij iubet. lib. 4. c. ph. p.

Quædam ad idoneam magis vstionē puluerentur, alia frangantur tantum in frustula magnitudinis nucis iuglandis, vt lithargyros: vel nucis auellanæ, vt lateres in oleo philosophorū, & lapis phrygius à Galeno in suo remedio oculari.

Alia etiam in sole æstiuo ex vino vel aceto pluribus diebus teruntur, priusquā vrantur, in c. ph. g.

Plantæ Quæ omnia his exemplis ex Dios. Gal.
ru par- Mesue, & aliis fient notiora, folia oliuæ
tes. syluestris in olla fictili cruda, lutata, fur-

no

no figulino, per coctionem vasis vsta, lota, ex aqua in sole siccata, albuginem oculi & panos potentius omni pompholyge delent, Albucasi.

Sarmenta ligna, cortices & partes aliquae plantarum vruntur relicto tamen foramine in operculo, vt fumus exhalet.

Abrotani, asphodeli, ari, arisari, dracō-
tij vstiorum, cinis Gal. passim vsurpatur.

Brassica non transplantata, à terra expurgata, minutim concisa, in ollam coniecta, foraminulento operculo tecta clibano vratur in carbones, qui triti ollæ alteri impositi, operculati, vruntur donec in album cinerem abeant.

Myrobalani & rha barbarum vsta valentius astringunt quàm assata Mesuræ.

Aloë quibusdam in olla noua super prunas vratur in diamoscho amaro, vt assumpta glutinosa substantia aluum ducere desinat, & magis roboret, ob quam causam etiam abluatur.

Fæx vini siccata vratur igni, donec albescat, & linguam multum mordeat & vrat.

Succinum fictili olla clausum, operculatum nocte igni vratur Bulcasi.

Thus vstum scribitur in Iside cephalica, lib. 4. c. ph. g.

Vsto thure fuligo qua ratione colligenda

*Animalia
et ipsa
rū par-
tes.*

genda docet Diosc.

Lepus viuus iugulatus cum sanguine & pelle vasi fictili nouo traditur, operculatur, in clibano vritur donec puluerari possit ad calculum frangendum.

Sic hirundines, ranæ, cicadæ, erinaceus, vritur Gal. lib. 11. simplic.

Æschion caneros viuos in patella æris rubri vsit donec in puluerem mollissimū redigi possent contra rabiem.

Gal. li. II. simpli. Teste ostreorum, limacum, ouorū exclusis pullis, sericum, ossa, cornua, vngulæ, vel prunis ipsis vel tegulæ aut ollæ imposita in clibano. vel foco vritur, donec albescant, & puluerabilia sint. Hæc tamē non vrenda, nisi medicus iusserit, quia vires vsitione mutant. Possunt enim tenuissimè limari, aut radi, vt cornu rhinocerotis, pudendum tauri, cerui, & puluerari, vel probè limata propinari. sericum similiter cardiacis miscendum sit crudū, minutim concisum, cum aliis pulueratū, vsitum autem medicamentis materias cōsumpturis miscetur, vt diasenne Nicolai. Spongia bitumine, vel eius penuria pice illita vritur. lib. 11. simpl.

Gal. li. 6. c. ph. Lana succida largo vasi figulino latioris imponitur, operculatur gypso, vel glutine: vel terra figulari subacta cū aqua illini

illinitur, vritur fornace, vel camino. Scorpiones viui olla noua inclusi, & operculati, maza vel luto circumlita vruntur igni ex sarmentis vitium in clibano, vt eius pulueris grana sex cum syrupo radicum quinque; pota renum calculum frangant.

Sic vruntur viperæ & colubri, ambo- *Metallica & terrea.*
rumque cinis ex oleo illitus scrofulas liquefacit. Lithargyros chrysitis, grauis, pura à plūbo, & omni aliena materia in particulas magnitudinis iuglandis confecta, prunæ superponitur, & ita follibus accenditur, vt conflagret: vbi refrigit, abstergitur insidens spurcitia, & reconditur: alij ter aceto aut vino restinguentes rursus vrunt, & reponunt.

Cadmia vritur carbonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferreæ scorriæ modo bullet, mox vino extinguitur aminæ, si ad emplastra paratur: aceto autem, si ad pforicum medicamentum. Sunt qui sic vsum, ex vino quique tritum, iterum crudo fictili torrent, donec pumicosa videatur: iterumque ex vino tritam vrunt tertio, donec prorsus in cinerem redigatur, nihil scabritiei retinens. *Diof.*

Plumbi laminæ quàm tenuissimæ, aut *Ibid.*
plumbi limatura & sulfur alternis vasis imponuntur, donec plenum sit, operculatur.

tur, sed relicto exili spiraculo succēditur. dum plumbum ardet, rude ferrea versabis donec tantum perfectè in puluerem redigatur. dum eximes, obstrue nares quòd eius halitus sit noxius.

Ibid.

Stibium pinsita farina circumlitum, & carbonibus obrutū torretur, donec ipsa crusta carbunculetur, exemptūque extinguitur lacte mulieris, quæ marem peperit, aut vetere vino, vel vritur carbonibus succensis, efflatum quo ad ardeat. Si enim paulò magis cremetur, fit plūbum.

Cerusa trita in fictili nouo, flagrantibus carbonibus assiduè versando vritur, donec cinereum colorem traxerit, vel patinis nouis super prunas tritavritur, & ferulacea rude mouetur, donec coloris sit sandarachæ: sandyxq; tunc appellatur, refrigerata reponitur. sic trita chrysocola vritur. Sunt qui vrēdo acetum affundunt, vt rubeat: si flaua est, macicot vulgò dicitur.

Ibid.

Æs fit vstum ex clauis æreis solutarum nauium fictili crudo compositis superparso sulfure cum sale pari. Quibus vicissim inspersis fictile semiplenum operculatur, & figulari creta circūlinitur, fornaci inditur donec fictile percoquatur. Modos vrendi alios docet Dios.

Ærugo fracta minutissimè in fictili patina

tina flagrantibus prunis superposita versatur, donec mutata colorem cinereū cōcipiat: refrigerata reponitur. Si cruda olla vratur, eundē prorsus colorē nō reddet.

Chalcitis fictili nouo viuis carbonibus superposito vritur, donec bullas excitare desierit, & perfectē inaruerit, si humidior est: sin alia est, dum mutata in floridū colorem sanguineum aut miniatum cōtraherit. Eximēdo insidens spurcitia tergeatur. Vel vritur perflatis carbonib⁹, donec luteo colore palle scat. Sic misy, fori, chalcanthum vruntur. Chalcanthum autem vrendo suapte natura colorem rubescen tem sortitur. Dioscor. in arugine.

Auripigmentum vritur testa noua viuis carbonibus subiectis assiduē versando, donec igni flagret & mutet colorem. fit enim foris argenteum, intus rubrum: refrigeratum & tritum recōditur. Sic vritur sandaracha, alumen.

Lapidem phrygiū in particulas magnitudinis auellanæ fractum vres in olla recenti luto circumlita, tecta operculo perforato vel in solo vertice, vel (quod melius est) in pluribus partibus, vt fuliginosi fumosi que eorum quæ vruntur effluxus faciliē per ea efferantur. deinde perustis carbonibus perflatis vre, donec ignitus

*Gale.
libr. 4.
c. ph. p.*

f

fit, cætera ex Galen. repete. Sic cyanus lapidis vritur, & alij.

Dios.

Sal vritur fictili, diligenter opertus, ne exiliat, conditúsque prunis, donec effervesceat vritur. Sic nitrum & spuma nitri, si inueniuntur vrenda sunt. Vitrum tritum interstrata pice vritur, & aqua frigidissima extinguitur, Auëzoar tamen friabile non fit. Alia plura ex Dioscoride, & aliis huc transcribi potuissent, nisi hæc etiam multa huic ætati omnia hæc negligenti existimassem.

Vstionis terminus in quibusdam est, dum ignitum id abúde fuerit, vt in vstione triplici lapidis phrygij: in quibusdam dum nihil fumidum amplius expirat, nullaque fuligo præterea emergit.

In aliis dum bullas edere desinent. In his quæ fictili crudo vruntur, fictilis illius percoctio.

In his quæ farina pinsita circumlinuntur aut luto, crustæ vstio.

DE EXTINCTIONE.

EXTINGVNTVR vel vsta, vel solum ignita quædam non modo, vt empyreuma ipsum dissipetur, sed etiam, vt in corpus vstione rarefactum vis quædã humoris aut frigoris penetret, vt ferrum cædens

dens aqua pilosellæ, vel alia astringenti
extinctum euadit solidissimum.

Extinctio fit interdum ad purgationē,
vt plumbum liquatum succo mercurialis
calido saepe extinctum, & tribulatum, itā
ni puritatem, & soliditatem assequitur.

Fit item extinctio, vt vires humoris quo
extinguitur in se trahat, sic cadmiam vino
aminco ad emplastra, aceto ad remedia
pforica extinguit Diosc. sic Galenus lapi- *Lib. 7.*
dem phrygium extinguit primū buty- *simp.*
ro recenti, secundò vino falerno, vel alio
fuluo, odoro: tertio melle Attico, ne me-
dicamentum sit aridum, sed viscosi cuius-
dam particeps. Gallæ ad sanguinis sup-
pressionem carbonibus impositæ, donec
vndique candeant, aceto, aut vino auste-
ro extinguendæ sunt.

Stibium lacte mulieris marem enixæ
extinguitur.

Limatura chalybis saepe ignita aceto
extinguitur, & pulueratur.

His exemplis medicamenta humore ex-
tincta ab illo aliquid virium in se trahūt.
Interdum autem ignita humore extin-
guimus, vt humoris naturam mutemus,
vt dum lapides vel circuli ferrei igniti la-
cte aliquoties extingantur, vt serosam &
mordacem eius substantiam absument,

fitque tunc lac dysenteriiis salubre.

Aqua chalybem vel aurū ignitum sæpe extinguimus, vt ipsa minus humectet, sed sit terrea magis absumpta tenuiori substantia.

Argentum viuum, etiam si non sit ignitum, tamen & salua hominis ieiuni, & succo saluix, aut limonum extingui dicitur, quòd vis eius malefica, & omnia exedens, vt à Plinio rectè dicitur, cum his agitando mirescit.

DE SUFFITV.

SUFFITVS seu euaporatio vi caloris excitata sæpe medicamētis adhibetur præparandis & vrendis. Suffitus aromaticum muliebria ducit, & vterum infernè re trahit si infernè adhibetur, vel sursum si naribus, suffitus plumarum perdicis, corij veteris, vel aliorum tetro odore præditorum, naribus exceptus vterum sursum ruentem deturbat, Suffitus radices & seminis pgonix, melanthij, styracis, mastiches rosarum, ad capitis affectus pituitosos. Iisdem vel aliis stuppæ suffitu capiti circumponuntur.

Frōtalia ex rosis, violis, flore nymphææ semine, lactucæ, portulacæ, & similibus: vapore aquæ rosarum, verbenæ, betonica,

nicæ, & similium suffiuntur ad varios capitis affectus.

Et epithemata ventriculi ex bombace aromatibus farto, vapore stomachico præterea suffiuntur.

Suffitus per infundibulum ex radice, aut foliis bechij super tegulam ignitam impositis, ad tussim adhibetur.

Suffitus ex sulfure purgato, & auripigmento vsto & loto, probè à practicis quibusdam asthmaticis adhibetur.

Suffitu & vapore aceti acerrimi necantur cantharides Diosc.

DE PURGATIONE.

VStioni ordine optimo succedit lautio, quæ empyreuma, & acrimoniâ vstione acquisitam, vt & natiuam tollat, & vsta expurget: sed cùm illa sit purgationis species, satius mihi visum est de purgatione prius agere, quòd eius cognitio lucem magnam sit allatura lotioni. Purgatio medicamentorum hic accipienda passiue, non actiue: seu quatenus purgantur, non quatenus humores sibi familiares ex corpore nostro trahunt.

Purgantur enim medicamenta sordibus, & aliena quauis materia per despumationem, clarificationem, colationem,

residentiam, coctionem, lauationem, excisionem, depellationem, & modos alios post scribendos.

Radices erutę radiculis circuncisis, aliquoties abluuntur potius quàm abraduntur: deinde si magnę sint & matrice intus lignosa, parū contractis lignū id eximes, deinde siccabis, & repones: sic radicem cichorij, apij, petroselini, fœniculi purgamin^o, & eryngij, sisari, cari, dauci, pastinacę.

Est quando putre etiam aliquid excidendum est à radice iridis, enulę, bryoniae, sigilli beatę Marię, rha barbari.

Radicem ari, dracūtij, asphodeli, satis est excisis radiculis lauasse, cū cortice consistent tenuissimo, vti & radix chelidonij parui, cotyledonis, satyrij.

Scilla cultello ex cypresso quibusdam desquamatur, in qua mirum est ferrum vitari, cū pistillo ferreo teratur ad succū extrahendum.

Herbæ raro purgandę nisi aridis foliis, aut stipite lignoso, quanquam & ablui debeant, si terreno aut luto sordidę sint, vt iussit Dioscorides.

Seminibus sæpe duplex, interdū triplex debetur purgatio. Vt legumina siliquis, cerealibus glumis, baccae halicacaborum vesicis, semina fructuum carne, semen
rici

ricini, vrticæ maris, castanea echino, semen papaueris, hyoscyami, lathyridis, paliuri calice, & alia ad portionem. Quæ omnia iterum cortice tenui & interiore sepe purgatur, vt post audies. Nux iuglās, & auellana, & amygdala carne viridi, deinde cortice duro, postremo pellicula, & alia plurima similiter. Hic autem de tertia purgatione agendum, quod alia à vulgo fiant, & purgata hæc vendere consueuerint, & zeam, oryzam per moletrinas gluma purgant, & vendunt.

Cortice ergo seu pelle purgantur semina cnici, cucurbitæ, cucumeris, melonis, citruli, citri, vt solæ supersint medullæ, idque multis modis. Quidam enim hæc insolant, deinde cortices in mortario leuiter frangunt, manibus fricant, donec à medulla cortex separetur. Cribro tunc idoneo medullas transmittente, & cortices retinente cernunt. Alij etiam solis loco, igni leuiter frigunt: sed medullæ sic extractæ graue olent, & sunt ingratae sumentis, vt calfactum oleum. Forficulis alij singula semina purgant, quod operosum est, vt vnguibus & dētibus quod impurius est, qui mod⁹ hodie est cōsuetior. Sunt qui hæc sole siccata in magna quantitate friant pistillo ligneo, cribro raro cer-

nunt, iterum terunt & cernūt: si corticum particulæ simul transeunt, vāno euolant. Semen sesami purum aqua modicè salsa irrigatur, manibus confricatur, iterum irrigatur, donec madefiat: extensum linteolo siccatur, modicè assatur, sacco aspero immittitur, fricatur multum donec depelletur, cortices vento aut halitu expurgātur, vel in aquam frigidam iniectis cortices supernatātes deraduntur. Sic semina cucumeris, cucurbitæ, melonis, citreoli, ad olea ex his facienda excorticantur Mesuæ, non autem ad vsus alios.

Amygdalæ, pistacia, strobili, nuces, & similia aqua frigida per noctem, vel tepida parum diu macerata corticem mox remittunt. Item si in sartagine assentur igni donec depellentur, sed hoc modo malè olent, & oleagina magis euadunt. Sunt qui recentes hos nucleos palea frumenti obruunt, sicq; cadit cortex: alij cultello malunt depellare: præsertim cū oleum amygdalinum recens exprimendum est in potum colicorum, aut nephriticorum. Alij etiam non depellatas terunt, & exprimunt oleum purum, & iucundum.

Hordeum, triticum & cerealialia alia, & legumina depellari possunt, affusa identidem aqua calida: pistillo ligneo batuntur,

tur, siccantur, parum nisi æstas est ventila-
ntur, persiccantur, reponantur.

Est tamen quando corticis vsus est ma-
ior, vt in pisib; & fabis, & aliis. Est quando
solus expetitur, vt in rhoë, radice apij, fœ-
niculi, ellebori, turbith, cinamomi, & a-
liis corticibus dictis lib. I. methodi medi-
camenta componēdi. Ricini semen echi-
no insolato, vel frixo per se, aut confrica-
tu facilè exilit: depellatur autem quomo-
do dictum est terendo, sed mitius ne ob
multam humiditatem cohæreant: sic bac-
cæ lauri. Vel ex non excorticatis, sed per-
trititis oleum extrahatur.

Colocynthis cortice & semine purga-
tur, solâq; pulpa in vsu est medicorum.

Cydonia & fructus alij condiendi in-
tus & foris purgantur.

Cassia corticibus & membranis ligneis
exempta seminibus purgatur per cribrū
setaceū rudicula, vel cochleari, vel manu:
sunt qui efficiunt fœlicius cum vapore
ex decocto aliquo medicato subeūte. In-
terdum humore aliquo soluitur, vt in dia-
manna Mesuæ. Sic thamar indos purga-
mus, sed hi ferè humore postulant, vt per
cribrū transmitti possint, vt manna humo-
re calente soluta in cribro folia ilicis, cui
fœlicius insidet, & sordes alias dimittit.

Dactyli cultello intus & foris purgantur, vt abundè diximus libro tertio methodi medicamenta componendi.

Succi purgantur feruore, residendo, clarificando, colando, vt in syrups dicemus, & in clarificatione & colatione diximus.

Gummi Arabicum, tragacanthū, & similia trita negligēter si sunt sicca, in vase vitreo aqua pura vel rosata merge nocte vna, misce manu postridie donec liquefat, cribro puro cola, etiam manibus deducendo: vtere, vel siccatum repone.

Galbanum etiam laudatissimum retinet aliquid adiecti seminis, & ferulæ: id ante vsū sic purgabis. In aquam feruentem dimitte: cū liquatum fuerit, linteo puro, raro cola, aut sordes supernatantes concha detrahe.

Sic liquores alij humore idoneo soluti colando purgantur à feminibus stiptum fragmentis, & cæteris excrementis, quæ per negligentiam, aut institutorum malitiam ipsis accreuerunt.

Adipes, cerebella, sanguis, & aliæ animalium partes medicamentosæ, qua ratione purgandæ sint, paulò post audies inter ea, quæ pluribus præparationum differentiis simul à nobis parantur.

DE

DE LAVATIONE.

Lauatio purgationis, vt dixi, species
ferè fit ad sordium aliquarum separa-
tionem: abusiue tamen etiam imbuere,
medicato humore medicamenta aliqua
lauare Mesues, & alij vocant. Lotionis vi-
res ex Mesue repetit. Lauantur aqua for-
is radices, herbæ, fructus, semina, si lu-
to, puluere, vel re alia sunt contamina-
ta: aqua ex ea toties mutata, donec pura
maneat, & sordes omnis ab his deterfa e-
rit, etiã si sint rosæ, violæ, intybus, & aliud
cichorij genus, & adianta: postea autem
siccantur pannis, vento, sole, igni, sed mi-
tissimo, ne medicamenti vim dissipet. Hęc
autem lotionis differentia omnibus con-
suetissima, quia paruarum est virium, si al-
teri mox dicendæ conferas, pluribus ob
id declaranda non est. Lotio alia intus &
simul foris fit, seu per totam rei lauandæ
substantiam.

Lauantur tota seu intus & foris pluri-
ma propter causas quatuor à Mesue lib. 1.
scriptas, & alias quasdam hic scribendas,
& paucis perstrictas lib. 3. methodi medi-
camenta componendi.

Vt autem humor omnem lauandi corpo-
ris partem quantumuis exiguum attingat,
& lauet ac purget aliqua substantia no-
stro

stro proposito aliena, si id est durum, aut lapidosum, ante lotionem est tenuissimè puluerandum: si est citò liquabile, calfaciendum: si per se est liquidum, quale est lauabitur: ac etiam si per se in aqua, aut humore alio promptè dissiliat ac dissoluatur, vt bolus armenia, calx.

Quæ igitur promptè liquantur, vt oleum, cera, pix, resina, modicè calefiant, & mox infundantur in vas magnum oris latius, semiplenum aqua purissima, experte omnis odoris, coloris, saporis, quem sensus percipere possit, quæ ex sole vel igne tepeat. Tunc manibus multum diuq; agitentur, ab agitâdo deinde quiescatur, donec id pingue totum quod lauas superna tet. Id quod talibus promptum est ob innatam leuitatem, præterquam oleo nemiù multa agitatione valentiù confuso cum aqua, vt mox dicam. Tandem aqua illa abiecta, similis affundatur, idque tertio & quarto, ac toties reperatur donec medicamentum in aqua illa deposuerit omnem illam vel substantiam, vel qualitatem nostro proposito multum alienam, seu quoad aqua nullam ex loto medicamēto talem substantiam vel qualitatem, vt colorem, odorem, saporem amplius recipiat, quam visu, olfactu, gustatu deprehendas.

Effun

Effunditur autem aqua per foramen aliquod subiectum, quod interim dum las uas luto obturaueris, aut vase inclinato pingue in vas aliud effunditur, & aqua abiicitur. Alij aquam pingui miscent in vase vtrunque habente foramen angustū, operculandū digitis inter agitandū, dum verò per horam resederit, aqua effunditur, noua infunditur: idq; fit toties, donec acri, & flaua olei humiditate deterfa, oleū dulcius, & album euadat.

Oleum tamen lauando minus est verberandum, ne adeò aquæ misceatur, vt post ægrè possit separari: sed ita verbera, vt dum quiescere paulisper permiseris, ipsum totum innatans detrahare possis. Lotum id oleum componendis oleis, & medicamentis aliis albis, aut frigidis est optimum & vsurpandum.

Dura autem & lapidosa, vt metallica, lapides, ossa, testæ, succi siccati, lachrymæ siccate, antè leuissimè sunt terenda, deinde aqua pura subinde mutanda, manibus vel rudicula agitètur, quoad nihil sordium medicamenti aquæ innatet, maneátq; aqua medicamenti qualitatam, vt coloris, odoris, saporis omnino expers. Non antè verò aqua est effundenda, quàm lauandū corpus quiescendo in fundum vasis sub-

sede

federit: quod metallicis, & terreis corporibus ob insitam grauitatem facillè accidit, vt prædictis innatare, ob naturalem ipsorum leuitatem. Effunditur autè aqua per os vasis paulatim inclinati, ne motus vehemens corpus lotum aquæ iterum cōmisceat, & cum ea effundatur: satius enim est aquæ prioris aliquid remanere quàm lauandum corpus effundi.

In his autem vas in fundo pertusum, in liquabilibus prædictis vtile, damnatur, quòd ad id grauià hæc repant, quæ si per foramen id vacuare tentes, aut ipsum obstruent, aut aqua penetrare habilior cum ipsis vacuabitur. Possis & per licia panna, philtrea vocant, distillando aquam paulatim vacuare, præsertim dum corpus lauandum est preciosius. Nam sic nihil, aut minimum eius cum aqua vacuatur, sed illa vacuatur purior, & corporis lauandi substantiæ expers magis.

Sic lauatur plumbum, cerusa, lithargyros, scoria plumbi, æs, ærugo, chalcitis, & congeneria, cadmia, spodiū, pompholyx, stibiū, cyanus, calx, & metallica cætera, ac lapidosa, ossa, os sepiæ, cornu cerui, capræ, ungula capræ, testæ ostreorum, & similia. Cum verò dura illa teri antè mollissimè debeant quàm lauentur, teri autem non possint

possint citra vstionem, antè, vt prius est dictum, sunt vrenda: quanquam horum multa citra vstionem teri possunt, vt cadmia præsertim lapidosa, chalcitis, chalcanthum, cerusa, pompholyx.

Adde quòd liquabilia promptè, & dura, & horum media, si humore medicamentofo lauantur, etiam per noctem in illo resideant, vt plus virium eius in se trahant: interdum enim lauanda sunt, ac potissimum in sole feruidissimo: præsertim si qua sicciora, tenuiora, albiora volumus. Lauantur enim non aqua fontana, & pura solum, sed marina, sulfurosa, bituminosa, vino, aceto, lacte, muccagine, succis plantarum, decoctis aromatum, vel aliorum medicamentorum etiam purgantium, vt ex Mesuæ simplicibus patet: omni deniq; humore, sed quem doctior medicus iusserit, ne sibi hanc deligendi humoris potestatem pharmacopœus arroget. Est enim quando calida humore aliquo calidiore vult intendere: vel remittere frigidiore: est quando vires alias mutare instituit.

Quæ verò est in colore solo medicamenti mutatio, esse possit in pharmacopœi arbitrio, modò vires nihil mutet. Vt si medicus impauit, hoc vino aliquo austero abluendū, pharmacopœus autē velit albius,
& ele

& elegantius reddere medicamentum, lauare id potest vino aliquo albissimo, modò id sit, vt iubet medicus, austerum. Odorem similiter diligere illi non permitto, quòd ea cui odor inest substantia, maiorum est virum: ad hæc quòd odor additus, vel huic hominum proprietati, vel cerebri, cordis, vteri affectibus curandis nõ conuenit. Multò minus saporem medicamento hunc vel illum, vel qualitates alias insignes per humorem à se delectum ad lauandum, dederit pharmacopœus.

Gal. in fine lib. p. c. ph. g. Metallica itaq; curiosè læuigata, lauantur ex aceto, vel marina, si vlcera sunt tumida, cum oris crassis, & callosis, attenuationem multam requirentibus: aqua autè, si humores in vlcus affluentes sint acres & mordaces: vino, si humor vlceri largior affluit. Ex his humoribus per plures dies tribulentur metallica, donec erunt pura, candida, perspicua.

Quæ ex metallis ad punctos nervos, aut aliter vulneratos, partibus nervosis adhibentur, omnia esse elota oportet, si modò citra morsum sint siccatura. Cera quoq; & terebinthina, si his medicamentis miscenda est, sit elota, & multò magis reliquæ resinae, si immittendæ sunt. Nam medicamentis omnibus quæ laueris, acris
&

& mordens sanies eluitur & abstergitur.

Hæc in vniuersum de durorū, & mollium, & mediorum lotionē sufficiant: nunc particulatim de quibusdam agendum, primum plantarum partibus reliquis, deinde metallicis.

Aloë optima, trita creta, ex aqua fontana purissima dupla aut circiter, agitur aliquandiu rudicula ferrea aut lignea in vase lato stanneo, vel terreo, vel alio. tecta sinatur horæ quarta parte, aut paulò diutius subsidere: tunc quod clarius supernatat, inclinato vase in aliud simile, sed minus, per colum setaceum transusetur: aut si puriorem, sed parciorem vis aloë lotā, licio aut filtro excoletur, aut diutius residere permittatur in vase præsertim vitreo, interuallis paruis foramina habente, spina, aut cera obturata, per quæ quantum videris clarum sine effluat, ne scilicet inclinato vase turbari queat: aquam nouam affunde, subige, sine, elutria: id fac quater, quinquies, donec arenosā, & terrea tantum sex superfit. Primā omnium præstantissimam per se insolatu sicca, alias omnes simul. Si autem hyems est, aut lora aloë in rem præsentē egetur, igni lento siccare potest. Dum autē siccata iam aloë est ex vase ipso eximenda: ca-

lesiat vas parum, vt promptius ab eo aloë
separetur, & imam eius partem, in quam
quod crassius est subsedit, cultello dera-
de, vt in panibus cereis fieri solet.

Quod si nondum pura & perlucens sa-
tis appareat, iterum teratur, & lauetur vt
prius, idq; si libet, tertio, quarto, fieri po-
test, si medicus iusserit. Nam toties lota

Gal. li. aloë acrimoniam & vim purgatricē pro-
7. met. pē totā amittit & calorificam, licet in ea
portio aloës tenuior cōtineatur, quæ his
qualitatibus exuta roborat magis, soluit
minus. Hæc eius lotio magni æstimanda
est, qualis dum fēcē vini vltam, & calcem
viuam lauas, dum subsedit, aqua hæc effu-
sa siccatur in cauteriū omnium præstan-
tissimum. Quæ lauandi ratio planè est ab
aliis diuersa, in quibus aqua ipsa abiici-
tur: in hac lotionē sola seruatur. Aloën
verò si laues, ter, quater, & dum resederit
aquam abieceris, quod relinquetur ama-
ritudinem quidē exuerit post aliquot lo-
tiones, sed impura & fæculenta tantū a-
loës pars fuerit. Si autem aloën leuissimè
pulueratam, & cretam aqua pluuiæ, tan-
quam magis aloën permeante ob tenui-
tatem, vel intybi, vel rosarū, vel alia sim-
plici, aut composita imbuas, deinde in so-
laru aut igni siccēs: idem secundo, tertio

repetas

reperas, lotio nō est nisi abusiue loquentibus: sed verius, vt sic dicam, imbutio. In quo genere præparationis est, quæ à Mæsiue in simplicibus scribitur aloës maceratio ex decocto aromatum, vel specierum hieræ picræ Galeni: lotio enim non est, vt nec quæ Albucasi in Seruitore multiplex describitur, quia nullam ipsi aloë aufert aut substantiam, aut qualitatem, sed suas illi facultates impertit. Fuerit igitur verius infusio, maceratio, & (vt sic dicā) imbutio. Quæ quibus & quādo facienda sit, medici solius est instituere. Ob id hoc loco de his agendum fufius non putauī.

Nec sarcocollæ, aut cancamī est lotio, dum ea trita, lacte asinæ, vel capræ, vel potius mulieris recēssimō humectatur, non autem mergitur, ne lac ante acefcat quā scicetur, deinde insolatu mox scicatur, idem opus quinquies repetitur: sed infusio, aut nutritio magis fuerit.

Nec cardamomi aut cumini in aceto maceratio rectē cū Bulcasi, & aliis lotio vocetur, nisi, vt dixi, abusiue loqui se fateatur. Sed hæc de nominibus nō de re disceptatio finiēda est, ad remque propositā nobis redeundum. Cancamum tritum aqua fontis, cui aristolochia, & schœnanthum aqua incocta fuerint, lauat pistillo sem-

per agitando Pandectarius, quoad aqua clarescat, quod resedit coletur, & siccetur. Tenuius sic euadit, & magis aperit.

Acacia vera Galeno lauatur ad tollendam ipsius acrimoniā: nobis prætereunda, quia desideratur, & eius loco succus prunorum agrestium, acrimoniæ expers substituitur, qui lauatur tamen aliorum succorum modo, ex aqua dulci, aut lacte, ut sit anodyna magis. Nā valenter astringentia exasperant non leniunt, ut in remediis ophthalmiæ docet Gal. lib. c. ph. p.

Tragacanthum tritum aqua pura aut rosata macerāt nocte vna: postridie mucaginem colant, & nisi mox vtenda sit, siccāt ac reponunt pro lotāque vsurpant practici quidam.

Ga. ini Lithargyros, chrystitis, aut eius deside-
tio lib. rio argyritis, aut alia, multis modis ab-
4. c. ph. luendo albat Diosc. lib. 5. Potest autem
g. lauari, ut metallica cætera trita creta, ex aqua pura aliquoties mutata: tribuletur, resideat, aqua paulatim effusa noua indatur, ut antè dixi.

Cadmia lapidosa, ut siccet magis Galeno lauatur per æstatem in sole pluribus diebus terēdo in aceto acri, aut vino plannē fuluo, & substantia perlucido quale in Gallia, Aurelianense & Belnense, quod multò

multò maximè siccare natum est, deinde
 siccatur & reponitur, ac vlceribus mali-
 gnis inspergitur. Cadmia autem Diosc.
 in mortario trita lauatur, effusa subinde
 aqua dum sordes nulla emergat: deinde
 coacta in pastillos reponitur. Sunt qui la-
 uant, vt pompholygem. Scoria ferri trita
 diebus octo maceratur aceto, quotidie
 mutando, die nono imponitur laminæ i-
 gnitæ, vt torrefiat. Sic præparata valet
 compositioni Rasis ad omnem sangui-
 nis fluorem immodicum.

*Lib. 9.
 ad Al-
 manso-
 rem.
 Diosc.*

Plumbū post vstionem lauatur modo
 omnibus duris cōmuni, vel etiā hoc mo-
 do. Aquā paucam in mortario plumbeo
 agita pistillo plūbeo, donec nigrescat &
 crassescat, tunc per linum aquam cola ter-
 quater, sine subsidere: laua subsidentiam
 aqua pura donec ea amplius nō nigretur.

Vel plumbi limaturam cum aqua cre-
 bra tere in mortario, donec aqua sæpe
 mutata nigrari desinat.

Pompholyx linteolo modicè raro liga-
 ta in vase aqua pluuiæ vel fontana pleno
 huc illuc ducitur & tribulatur, vt pars eius
 utilis & tenuior in aquā effluat, & omne
 excrementum in linteo remaneat: reside-
 re sinas, & effundas, noua deinde aqua
 affusa idem opus repete, idque donec in

lineteolo nihil vtile maneat. Modos eius abluendæ alios lege in Dioscoride.

Sic spodium lauatur, excrementosum tamen magis est: Sic interdum & cadmia lapidosa. Nam fornacaria (quæ vulgo tuthia & male pompholyx dicitur) modo aliorum metallicorum lauanda est, & scoria plûbi in mortario lauatur aqua pura toties mutata, dum à scoria luteo colore amplius non inficitur, digeritur in pastillos Diosc. Stibiũ, cerusa, æs vstum eidem lauantur, vt cadmia, vel plumbi scoria.

Abluitur lapis cyaneus, vt Armenius Alexandro Tralliano, in aqua cõmuni trigies, vel qua dragies mutata: deinde aqua buglossi, vel rosarũ decies lauatur, vt in antidoto cocci baphicæ, & in catapotiiis ex his lapidibus.

*Gal. li.
6. met.
Diosc.*

Calx aqua marina bis tẽrve lota per æstatem sub æstu caniculę puncto neruo medicamentum est vtile, cum oleo.

Chrysocollã tufam infusa aqua mortario, expansa manu eidẽ vehemẽter affrica, & vbi cõfederit cola, altera quoq; affusa aqua rursus tere. Hæc vicissim prosequere, donec pura sincerãque spectetur, deinde siccata in sole, ad vsus reconde.

Terram Lemniam sic lauabat Dianæ sacerdos in Ephestiade Lēnij. vrbe. Hanc
aqua

aqua macerabat, & in lutum redactā valenter conturbabat, deinde paulum quiescere sinebat, tunc aquam supernatātem auferebat, & mox quod sub ea erat lutū, tollebat relinquens tanquam inutile lapidosum & arenosum illud, quod in imū subsederat, lutum illud pingue siccabat, dum mollis ceræ consistentiam acquirerebat, tunc in paruas huius portiones sacrum Dianæ sigillum imprimebat Gal. lib. 9. simpl. & paulò post. Terra autem omnis lauatur eodem modo: primum enim maceratur aqua nullam qualitatem medicamentosam habente. Vbi lutum consedit, effunditur quæ innatat aqua, quod lutosum est separatur à lapidosis & arenosis, quæ ad imum resederūt. Gustatus autem tibi index est accuratus, quam oporteat terram lauare, & quam non.

Quædam enim non solum terra, sed alia quoque corpora lauari non postulant: quædam semel, vt terra Lemnia, quædam bis, vt quædam terra Eretriensis.

Bolum Armeniam similiter lauabis. Sunt tamen qui aqua rosarum ter lauant, totiesque siccant. Potest sine lotionē usurari, cum nullam qualitatem manifestam præ se ferat: sed facultate occulta valeat, & vi siccatrice.

DE PLVRIBVS SIMVL PRAEPARATIONUM differentiis.

Q Vanquam in prædictorū plurima, multæ simul præparationum differentiae cadunt, tamen visum est seorsum de his quæ multis præparationum modis egēt. Lapis, quo vitra dicta lapidea fiunt, concretus ex cineribus herbæ (quam vulgus sodam vocat) in fossa terrea vstæ, tritus, cribratus, aqua tanta mergatur, vt digitis duobus aut tribus superet, misce, permitte fæces residere, clarā partem per filtrum, vel liciū destilla: quod clarum est clibano, vel igni sicca. Salem coagulātū, alkali Arabibus dictum, albissimum, inuenies multis medicamentis vtilem.

Eryngium intus & foris purgatur, in frustra secatur, caryophyllis, & cinnamomo farcitur, percoquitur. Sic enim satyrij radix quibusdam.

Amylū ex tritico delecto, crassius confrecto, nocte vna macerato aqua pura, quod postridie exprimes: cūque amy lū subsederit, inclinato vase aquā clemēter effunde, sicca cito, igni, vento, sole, gossio, præsertim hyeme, ne acescat: siccātū repone vase mundo operculato. Paulō diuersius hodie fit, sed nulla virium differentia. Ex hordeo, oryza, & aliis similiter fieri

fieri potest. Agaricus tritus cum vino, cui zingiber infusum sit, in trochiscos fingitur, siccatur, reponitur, vtendi tempore teritur, aliis miscetur. Sic colocynthis, scilla in trochiscos formata mitescunt.

Myrobalani multiplicem habent præparationem Mesue in simpli. & in E. alharil. liquores, ammoniacum, galbanum, sagapenum, opopanax, & liquores alij acgumi aceto, vino, vel alio humore, quem medicus iusserit nocte vna macerantur; dissoluuntur, cribro setaceo percolantur, vt semina, & ligna, & excrementa eorum alia colo remaneant, percoquantur ad humoris illius consumptionem: aliis extra ignem miscentur.

Gossapium, bombacem & cotonem vocant, vino cui incocta sint aromata cephalica, aut stomachica, vel parti alij familiaria per noctem maceratur, siccatur, carpitur, applicatur loco pñi quisquilii, vel eius tomenti, quòd hæc ad infectionem aliena quædam recipiant.

Sunt qui hæc epithemata similibus quoque medicamentis facta, & vtrinque recta densius interurunt.

Cerebella passerum vere occisorum lauantur, purgantur. Ex his decem cum vitello oui subacta, parum igni friguntur,

deinde sole vel igne siccantur, adiecto si libet pauco melle ad venerem incitandam parantur: alij vt adipēs, & medullas parant. Pulmo vulpis lauatur à sanguine, clibano siccatur, reponitur, teritur, cum aliis miscetur vtendi tempore.

Tunica interior gallinarum lixiuio calido hora vna maceratur, ter lauatur, deinde vino ter maceratur, & ter lauatur: iterum lixiuio, post vino, & siccatur clibano ex quo panis extractus est. Viribus tamē nullis valet Galeno in simp. lib. ii.

Hepar lupi ad hepatis affectus quosdam vino albo optimo lauatur, inspergitur puluere tenuissimo santali flauī, siccatur, absinthio in scutella inuoluitur, octa uo quoque die mutatur, absinthium reponitur loco sicco.

Intestinum lupi ad colicam efficacissimū vino albo optimo lauatur, inflatur, siccatur, extra fumum & puluerem, absinthio inuoluitur.

Obserua hic & mox in coagulo inuolutionem, & in Mesue simpl. & compositis sæpe præparationis quandam speciem: quam sciens omitto, quia rarior est aliis.

Cutis pedum & rostrorū bouis & ouis igni lēto diu coquūtur, donec veluti coagulum remittat. Id exemptū siccaturūque

in

in aëre perflatili, ad hernias cōmendatur.

Coagulum ex recens occiso animali, te-
nello, sale inuoluatur, insoletur, seruetur.

Hircus quadrimus, sanus, bene habitus
canicularibus diebus saxifragia, apio, pe-
trofelino, fœniculo, pulegio, hederâ, schē-
nantho, genista, adiantis, lupulis, & cæte-
ris calculum frangentibus nutritus, vino
optimo & tenui potatus, in sole dies 40,
versatus, donec urina nigrescat: tunc de-
colletur, & sanguis non primus nec po-
stremus, sed medius excipitur olla pura,
aut patina. foliis prædictis instrata: dum
cōcreuerit, incidatur per latum in partes
duas. Siccetur sole vel luna tectus reti aut
panno raro, vitetur ros & pluuia.

Adipes recentes aqua pura aliquoties
loui in vase semipieno, liquantur sole vel
aqua calida in vase duplici, tepore, aut ci-
neribus: & quod liquatū erit, sensim effun-
datur in vas aliud. Vel igni liquetur & co-
lo tenuissimo trās fusi seruentur. Sic adi-
pes liquatos colādo à membranis & aliis
purgat Gal. in emplastro diachalciteos.

Cātharides vere forficulis præhensas, &
immissas phiale oleo obrue, & insola, do-
nec putrescant: vel vase fictili non picato
cōde linteo raro, yasis os subliga, eoque
deorsum verso excipe halitum aceti
quām

Dios.

Dios.

quàm acerrimi feruentis, donec æstu exa-
nimentur, postea lino trāsfixę reponūtur.

Transfixio hic & in scilla, in radicibus
elignatis seruandis, etiam est præparatio
nis species: sed cuiq; perspicua, & sæpe ad
ficcationem & repositionem necessaria.

Carnes ericij, leonis & aliorum quo-
rundam animalium seruandę in vſus me-
dicos, ante quater, quinquies, semper ta-
men per horam lauandę vino calido dul-
ci, in furno leuiter ficcatae seruantur.

Caro cancrorum ad antidota analepti-
ca secreta, ter lixiuſo, vel aqua salsa lau-
atur, donec odor teter abierit. ex aqua hor-
dei, aut fero butyri coquantur.

Ceram in aqua liquabis, extrahes autē
impositis ipsi phialis vitreis aqua prius tin-
ctis, quibus quantum adhærebit for-
ma scintillę, in sola Iulio mense, do-
nec albefcat. Vel ceram ex
aqua dum nigruit mu-
tanda, coque do-
nec sit al-
ba.

Hęc de medicamentorum præ-
parationibus suf-
ficient.

DE