

Tab. 202.



Salvia officinalis. L.

GEWOONE
S A L I E.S A L V I A
O F F I C I N A L I S.

De IIde C L A S S E.

C L A S S I S N a g.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IVde St., bl. 58.Conf. LINNÆI Stijst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
Ima pag. 45.SALIE met Lancetswijs ovaale on-
verdeelde gekartelde Bladen, de
Bloemen Aairswijze, met gespi-
ste Kelkjes.a. De eenbladige Pijpachtige Spits-
bladige Kelk.b. De Gaap, erachtige Bloem geopend,
met de twee Meeldraadjes.

c. Een Meeldraadjje afzonderlijk.

d. Het vierdeelig Frugbeginzel,
met den Draadachtigen Stijl en
den dubbelden Stempel.SALVIA Fol. Lanceolato-ovatis,
integris crenulatis, Floribus in-
terrupte spicatis, Calijcum Den-
tibus acutis.a. Calijx monophyllus tubulatus
acuminatus.b. Corolla monopetala ringens
aperta, cum duobus Staminiibus.

c. Stamen unum separatum.

d. Germen quadrifidum cum Stijlo
filiformi & Stigmate bifido sive
duplici.BLOEITIJD. Het is bij ons een
zeer gemeen Gewas, uit de Zuide-
lijke deelen van Europa afkomstig,
dat in groote en kleine onderschei-
den wordt, beiden Heesterachtig,
bloeijende in de Nazomer.TEMP. FLOR. Fruticulus apud
nos valde communis, ex Australio-
ribus Europæ oriundus, major &
minor, perennans & floridus æstate
profecta.

GEBRUIK. Wegens de ongemeene heilzaame kragten, schijnt dit
Kruid van ouds zijnen naam bekomen te hebben. Het heeft een
sterken Kruidigen Reuk en een scherpen bitteren Smaak. De Bloe-
men groeijen wel Aairswijze, doch afgebroken en als in Kransjes,
gelijk de Afbeelding vertoont. Van de Bladen wordt doorgaans
gebruik gemaakt, met dezelve als Thee te trekken, en dan heeft
het Afrekzel eene aanmerkelijke Zweetdrijvende kragt. Ook is de
Salie tegen Zenuwkwaaen en Verlammingen dienstig, en wordt in
Gorgelwaters en uitwendig tegen Keelkwaaen, die uit Koude ont-
staan, gebruikt. In 't bijzonder is 'ereene Koortsverdrijvende, Worm-
doodende en Borstheelende kragt aan toegeschreeven.

A 2

EDELE