

E D E L E
S C L A R E IJ.S A L V I A
H O R M I N U M.

De IIde C L A S S E.

C L A S S I S IIde.

Zie' LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIIde St., bl. 159.Conf. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
Ipag. 45.KLEURTOP met stompe gekartelde
Bladen en toppen van grootere
gekleurde onvrugtbaare Blikjes.a. De eenbladige Pijpachtige wat
samen gedrukte Kelk.b. De eenbladige Gaaperachtige
Bloem.c. De Bloem geopend met de twee
Meeldraadjes.

d. Een derzelven afgezonderd.

e. Het vierdeelig Vruchtbeginzel,
met den Stijl en dubbelden Stempel.HORMINUM Fol. obtusis crenatis,
Bracteis summis sterilibus, ma-
joribus coloratis.a. Calix monophyllus, tubula-
tus, parum compressus.

b. Corolla monopetala ringens.

c. Eadem aperta cum duobus Sta-
minibus.

d. Stamen unum separatum.

e. Germen quadrifidum, cum Stijlo
& Stigmate bifido.BLOEITIJD. De natuurlijke
Groeiplaats is in de Zuidelijke deelen
van Europa. Het wordt in onze
Tuinen gezaaid, groeiende ander-
half Voet hoog en bloeiende in
Augustus.TEMP. FLOR. Locus natus
hujus Plantæ est in Australioribus
Europæ plagis. In nostris hortis
sata sesquipedalem altitudinem at-
tingit, florens in Augusto.GEBRUIK. Dit Kruid heeft eenige bitterheid in de Bladen, doch
weinig of geen Reuk. Hierom is het Aftrekzel eenigzins Maag-
sterkende, doch komt bij de Salie veel te kort. De Zaden gee-
ven, gelijk die der Kwee-Peeren, eenige Slijmigheid uit, welke
in Oog- Ontstekingen van dienst kan zijn.

TAM.

Tab. 203.



Salvia horminum. L.



