



Salvia sclarea, L.

T A M M E
S C L A R E I J.

De IIde C L A S S E.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIIde St., bl. 173.SCLAREIJ met gerimpelde langwer-
pig Hartvormige, Haairige,
Zaagswijs getande Bladen, de
Bloem-Blikjes gekleurd, langer
dan de Kelken.

a. De eenbladige Pijpachtige Keik.

b. De eenbladige Gaaperachtige
Bloem.c. Dezelve geopend met de twee
Meeldraaies.

d. Een Meeldraadje afzonderlijk.

e. Het vierdeelig Vruchtbeginzel,
met den Draadachtigen Stijl en
dubbelen Stempel.BLOEITIJD. In Sijrie en Italie
is ingetijks de Groeiplaats van
deze Tamme Sclarey, die in onze
Tuinen geteeld wordt en in Julij
bloeit, groeiende ongeveer twee
Voeten hoog.S A L V I A
S C L A R E A.

C L A S S I S IIIa.

Conf. LINNÆI Syst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
Imæ pag. 47.SCLAREA Foliiis rugosis Cordatis
oblongis villosis ferratis, Bra-
cteis Floralibus coloratis, Calij-
ce longioribus.a. Perianthium monophyllum tu-
bulatum.

b. Corolla monopetala ringens.

c. Eadem aperta cum binis Stami-
nibus.

d. Stamen unum separatum.

e. Germen quadrifidum cum Stijlo
filiformi & Stigmate bifido.TEMP. FLOR. Ut præcedentes in
Australioribus sponte crescens hæc
Salvia species, in Hortis nostris
colenda, altitudine circiter bipe-
dali, florens in Mense Julio.GEBRUIK. De Sclareij, van ouds onder den naam van *Hor-
minum* of *Orvala* bekend, heeft de onderste Bladen wel een Hand-
lang en breed. Het is over 't geheel een ruuw Kruid in 't aantasten,
van eenen Kruidrigen Reuk en bitteren Smaak, weshalve het dien-
stig geacht wordt tot verdunning van koude Slijmerige Vogten, als
ook tegen de Opstijging en Moederkwaalen, wanneer men deszelfs
Aftreksel in Wijn of Bier gebruikt. Uitwendig wordt het voor een
Wondzuiverend en Pijnstillend middel gehouden.

A 3

ZAK-