

ZAKJES-BLOEM P L A N T.

De Vde C L A S S E.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IVde St., bl. 304.

ZAKJES-BLOEM PLANT met drie-
ribbige Bladen.

- a. De vijfdeelige Kelk nog geslooten.
- b. Dezelve geopend, met de vijf Zakswijze Bloemblaadjes, op Nagels staande, en de vijf Meeldraadjes.
- c. Deee Bloemdeelen aanmerkelijk vergroot.
- d. Een gedeelte van den Kelk.
- e. Een Bloemblaadje met een Meeldraadje daar aan.
- f. Het Vruchtbeginzel met den half drieadeeligen Stijl en stompe Stempels.
- g. De driezaadige Besie.
- h. Dezelve doorgesneeden.
- i. Het Zaad.
- A. Een vrugtdraagend Takje.

BLOEITIJD. Deeze Heester, die in de Tuinen hier, doch zeldzaam, voorkomt, worat omtrent vier Voeten hoog, bloeiende in Julij en dikwils nog eens in de Herfst. Virginie en Karolina is zijn Vaderland.

CEANOTHUS AMERICANUS.

C L A S S I S Vta.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat.* Ed.
GMELINI, *Tom. II* di Part.
Iuxta pag. 402.

CEANOTHUS Foliis trinerviis.

- a. Perianthium quinquepartitum nondum apertum.
- b. Idem apertum cum Petalis quinque subrotundis, faccatis, Unguibus insidentibus, & Stamimbus quinque.
- c. Eadem partes magnitudine multum auctæ.
- d. Lacinia Perianthii.
- e. Petalum cum Stamine adherente.
- f. Germen cum Stijlo semitrifido & Stigmatibus obtusis.
- g. Bacca tricocca.
- h. Eadem disfecta.
- i. Semen.
- A. Ramulus Fructifer.

TEMP. FLOR. Hic Frutex, qui aliquando occurrit in nostris Hortis, altitudine quatuor Pedum circiter, floret in Julio & nonnunquam secundâ vice in Autumno. Virginiam & Carolinam Patriam agnoscit.

GEBRUIK. De Wortel, die van buiten rood is en den Ingezetenen tot Verwen van Stoffen dient, zou bij dezelven in gebruik zijn, tegen Venus-Kwaalen. Over dit Onderwerp is, niet lang geleden, te Brunswijk een Verhandeling uitgegeven.

ON.



Ceanothus americanus, L.

