



Tragopogon pratense L.

BOKSBAARD,
ST. JOSEPHS-BLOEMEN.

De XIXde CLASSE.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN. IIde
Deel Xde St., bl. 345.BOKSBAARD met de Kelken zo lang
als de Bloemkrans; de Bladen
onverdeeld en gestrekt.a. De gemene lange Rolachtige
Kelk, dikwils een derde korter
dan de Bloem

b. De samengestelde Bloem.

c. Een der buitenste twee slagtige
Blommetjes.

d. De Geslachtsdeelen afzonderlijk.

e. De vijf Meeldraadjes te samen
gegroeid.f. Het Vruchtbeginzel met het Zaad-
pluis.g. Hetzelfde met den dunnen Stift en
twee omgekrulde Stempels.

h. Een Kelkblaadje van binnen.

BLOEITIJD. Overvloedig groeit
deze Plant in de Velden en Dui-
nen, komende bijna in alle onze
Provinciën voor, twee Voeten hoog
opshietende en in Meij bloeiende.TRAGOPOGON
PRATENSE.

CLASSIS XVIIIa.

Conf. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
IIde pag. 1168.TRAGOPOGON Calicibus Corollæ
Radium æquantibus, Foliis in-
tegris strictis.a. Calix communis longus Cylin-
draceus, sæpius tertiam parte bre-
vior Corollæ

b. Flos compositus.

c. Corolla hermaphrodita ex Ra-
dio.

d. Sexuales partes separata.

e. Stamina quinque coalita.

f. Germen cum Pappo Seminali.

g. Idem cum Stijlo filiformi &
duobus Stigmatibus recurvatis.h. Foliolum Calicis ab interiori
parte visum.TEMP. FLOR. Planta hac abunde
crefcit in nostris Pratis & Dunis,
fere in omnibus Provinciis, ut
alibi, reperiunda. Altitudine duo-
rum Pedum excrefcit, florida
Menfe Majo.GEBRUIK. De Wortels van dit Boksbaard zijn niet alleen een
lekkernij voor de Zwijnen, die dezelve om die reden opwroeten,
maar ook voor de Menschen, bij welken zij gestoofd op Tafel ko-
men en gegeten worden, onder den naam van *Salseti* of *Sasfeti*. Men
achtze gezond voor de Borst, gelijk Aspergies en afzettende in 't
Wateren. De geheele Plant bevat een Melkachtig Sap, als de Paar-
debloemen en wordt overal van het Vee gretig afgeschooren.

ROO-