



Buxus sempervirens. L.

TUIN-PALM,

BOOM-PALM.

De XXI^{ste} CLASSE.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIde St., bl. 224.

PALM die altijd groen blijft.

Mannelijke Bloemen.

- a. De driebladige Kelk.
- b. De tweebladige Bloem.
- c. Beiden bij elkander.
- d. Met de vier Meeldraadjes.
- e. Een daar van afgezonderd.

Vrouwelijke Bloemen.

- f. De vierbladige Kelk.
- g. De driebladige Bloem.
- h. Beiden te samen.
- i. Het driehoekig Vruchtbeginzel
met de drie Stijlen en Stempels
in de Bloem.
- k. Hetzelfde daar buiten.

BLOEITIJD. 't Is bekend, hoe de
Palm in onze Tuinen geschooren
worde tot omvatting der Bedden en
versiering der Bloemperken; doch
vrij gelaten groeit zij hooger op, en
wordt Roomachtig, gelijk zij dus
wild voorkomt in de Zuidelijke dee-
len van Europa, ter hoogte van
vijf of zes Voeten, bloeiende in
Meij.

GEBRUIK. De Bladen van de Palm, scherp, bitter en onaange-
naam van Smaak, werden als Zweet- en Pisdrijvende, doch inzon-
derheid als Borstmiddelen aangemerkt, inzonderheid dienstig tegen
't Zijdewee. Het Hout heeft veel naam gehad, in Aftrekkel met
Wijn, tegen Kolijk en Afloopende Koortsen, en de Olie, daar uit
gedestilleerd, als een zeer kragtig Pijnstillend en Wormdoodend
Middel; men stelde het bijna gelijk met Pokhout: maar hedendaags
heeft het in deelen weinig achting, en wordt bijna alleen in de
Werktuigkunde gebruikt.

D

BAUXUS

SEMPERVIRENS.

CLASSIS IVa.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. I Ildi Part.
Imæ, pag. 286.

BUXUS Fronde semper virente.

Flores Masculi.

- a. Perianthium triphijllum.
- b. Corolla dipetala.
- c. Ambo conjuncta.
- d. Cum quatuor Staminibus.
- e. Stamen separatum.

Flores Feminei.

- f. Perianthium tetraphijllum.
- g. Corolla tripetala.
- h. Ambo apud invicem.
- i. Germen trigonum cum tribus
Stijlis & Stigmatibus in Flore.

k. Eadem partes separatæ.

TEMP. FLOR. Buxum continua
abscissione in Hortis nostris ad
distinguendos Lectulos itemque
ad ornamentum Arearum Flora-
lium adaptari, ut cuius notum,
ita videmus hanc Plantam, liber-
tate data, in Arbustum excrescere;
uti spontanea occurrit in Auftra-
lioribus Europa, altitudine quin-
que vel sex Pedum, Majo mense
florida.

VOOR-