

S O R B E N -
K R U I D.

De IVde C L A S S E.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIIde St., bl. 332.SORBENKRUID met Eijronde Bloem-
Aairen.

- a. De tweebladige Kelk.
- b. De eenbladige vierdeelige Bloem-
krans.
- c. Dezelve van onderen gezien, met
den Kelk.
- d. De vier Meeldraadjes.
- e. De Zaadknop met zijn korten
Stijl en stompen Stempel.
- f. Dezelve overdwars doorgesneden.

BLOEITIJD. Dit Kruid, bloei-
jende in 't midden van de Zomer,
groeit op drooge magere Velden,
in de meeste deelen van Europa.
Het word bij ons ook hier en daar
gevonden, en veel in Duitschland,
wordende aldaar Wiefenknopf ge-
noemd, dat is Weidenknop, we-
gens de Knopachtige Bloemen. Het
heeft de hoogte van twee en som-
tijds drie Voeten.

SANGUISORBA
OFFICINALIS.

C L A S S I S IVa.

Conf. LINNÆI Stijst. Nat. Ed
GMELINI, Tom. IIde Part.
Imc pag. 255.

SANGUISORBA Spicis ovatis.

- a. Perianthium diphijllum.
- b. Corolla monopetala quadripa-
rita.
- c. Eadem a parte inferiore cum
Perianthio.
- d. Quatuor Stamina.
- e. Germen cum Stijlo brevi &
Stigmate obtuso.
- f. Idem transverse dissectum.

TEMP. FLOR. Hæc Herba, me-
diaestate florens, crescit in Pratis
aridis & macris plurimarum Euro-
pæ partium. Apud nos etiam ali-
cubi reperitur & copiose in Ger-
mania, ubi *Wiedenknop* appella-
tur, id est *Weidenknop*, propter
formam quam affectant Capitella
Florum. Altitudinem habet duo-
rum & nonnunquam trium Pedum,

GEBRUIK. Weleer werdt aan dit Kruid een Bloedstempende
kråg toegeschreeven, waar van, als ook van de gelijkenis der
Bladen, naar die van den Sorbenboom, het den naam zou heb-
ben. Het wordt, om die reden, ook wel *kleine Pimpernel* ge-
noemd, doch is hedendaags in weinig gebruik. Het werdt van
PALMARIUS tegen de Watervrees (*Hijdrophobia*) aangeraden.

ZWART-



Sang uisforba officinalis. L.



