

K E N D E L I S C H . F O E T I D I S S I M A .

De IIde C L A S S E .

C L A S S I S II^{ta}.

Zie LINNEUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, IIde
Deel XIIde St., bl. 78.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, Tom. II^{di} Part.
Imæ pag. 115.

LISCH met ongebaarde Bloemen, de
binnenste Blandjes zeer uitge-
breid, de Steng eenhoekig, de
Bladen Degenvormig.

a. De tweekleppige Bloemscheede.

b. b. De drie uitwaardse nederge-
flogene Bloemblandjes.

c. c. De driedeelige Stempel.

d. Het driehokkige, driekleppige
Zaadhuisje, de rondachtige, als
zij rijp zijn, Bloedkleurige Zaa-
den, uitstrooiende.

e. Een dier Zaa den in natuurlijke
grootte.

IRIS Corollis imberbibus, Petalis
interioribus patentissimis, Cau-
le uniangularato, Foliis Ensisfor-
mibus.

a. Spatha bivalvis.

b. b. Petala tria extantiora reflexa.

c. c. Stigma tripartitum.

d. Capsula trilocularis, trivalvis,
matura Semina subrotunda San-
guinea jam excludens.

e. Semen unicum magnitudine na-
turali.

BLOEITIJD. Dit Kruid, dat
men wel Wandluiskruid noemt,
wegens den Stank der Bladen; komt
in verscheidene deelen van Europa,
bij de gele Lisch, ja zelfs in ons
Land voor, bloeiende in Junij.

TEMP. FLOR. Hæc Planta, quæ
a Foliorum contritorum vel affric-
torum foetore etiam appellatur,
occurrit in plurimis Europæ par-
tibus, inter *Acorum adulterinum*,
etiam in nostra Regione, florens
in Junio.

GEBRUIK. Men noemt het ook wel *Gladiolus fætidus* wegens
de Gestalte, en bij den naam van *Xijris S. Spathulæ fætidæ Rad.*
is het in sommige Apotheeken bekend. Oudtijds schreef men 'er
aanmerkelijke kragten aan toe, doch hedendaags is 't in weinig
gebruik. De Wortels der Jonge Planten gelijken veel naar de
bolletjes van Knoflook.

GE-



Iris foetidissima L.

