

K L E I N E , RANUNCULUS
VELD-RANONKEL. F L A M M U L A.

De XIIIde CLASSE.

CLASSIS XIIIa.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IXde St., bl. 223.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. I I di Part.
Imæ, pag. 877.

RANONKEL met Eijronde-Lancetvor-
mige gesteelde Bladen en een
hukende Steng.

- a. De vijfbladige Kelk.
- b. De vijfbladige Bloem.
- c. Een afgezonvierd Bloemblaadje.
- d. De talrijke Meeldraadjes.
- e. Een afgezonderd.
- f. De Vrugbeginzels samengegroept.
- g. Een afgezonderde Stamper.
- h. Het Zaadhoofdje.
- i. Een Zaadje.

RANUNCULUS Folii ovato-Lance-
olatis petiolatis, Caule decli-
nato.

- a. Calix quinquephyllus.
- b. Corolla pentapetala.
- c. Petalum separatum.
- d. Stamina numerosa.
- e. Unum separatum.
- f. Germina congesta.
- g. Pistillum separatum.
- h. Capitulum Seminale.
- i. Unum Semen.

BLOEITIJD. In vochtige Weid-
landen en Moerasige plaatsen
groeit deeze Soort van Ranonkel
of Veld-Haanevoet, zo hier te
Lande als elders; ontrent een Voet
hoog, vloeiende in 't midden van
de Zomer.

TEMP. FLOR. In pratis humidis
& locis Paludosis, tam nostra-
rum Provinciarum quam alibi,
crescit hæc Species, circiter alti-
tudine Pedali, medio Æstatis vel
Mense Junio florida.

GEBRUIK. Om dat 'er dergelijke Vuurige hoedanigheid in dee-
ze Haanevoet plaats heeft, noemt het Landvolk dezelve *Egelkolen*;
ook wel, tot onderscheiding van anderen, *Kleine Egelkolen*. Men
kan 'er het zelfde gebruik van maaken als van de Boterbloem-Plant.
hier voor beschreeven.

SAS.



Ranunculus flammula. L.

