

H O U T - L A U R U S
C A S S I A C A S S I A.

De IXde CLASSE.

CLASSIS IXna.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IIde St., bl. 327.

Conf. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. II di Part.
Imo pag. 649.

LAURIER met drievoudig geribde
Lancetswijze Bladen.

LAURUS Foliis triplinerviis Lanceo-
latis.

a. De zestandige Kelk.

a. Perianthium sexdentatum.

b. De zesbladige Bloem met de
negen Meeldraadjes en Stam-
per.

b. Corolla hexapetala cum novem
Staminibus & Pistillo.

c. De onrijpe Vruchten.

c. Fructus immaturi.

d. Een rijpe Vrucht.

d. Fructus maturus.

e. De Pit of Kern daarvan.

e. Nucleus ejusdem.

BLOEITIJD. Deze Boom groeit
op Sumatra, Java, Malabar,
Martinique, en verscheide andere
plaatsen van Oost en Westindie, al-
waar hij van sommigen voor den
echten Kaneelboom gehouden wordt
die, zo anderen wel meenen te
weeten, nergens valt dan op Cey-
lon.

TEMP. FLOR. Hæc Arbor cre-
scit in Sumatra, Java, Malabar,
Martinica, aliisque locis India-
rum, ubi ab aliquibus pro vera
Cinamomi Arbore habetur, quæ
secundum alios non crescit nisi in
Ceylona.

GEBRUIK. De Hout Casfie (*Cassia Ligna*) in de Apotheeken
zeer bekend, is een Bast, van dergelijke gedaante, doch wat dik-
ker, harder en bruiner dan de echte Kaneel, meer gelijkende naar
die, welke onder den naam van *Engelsche Kaneel* verkogt wordt,
veel sloopwer van Reuk en Smaak en eenigzins lijmerig, wanneer
men ze kaauwt. Deze Hout-Cassia wordt gezegd van een Ma-
labarsen Boom afkomstig te zijn, wiens Bladen een sterken Kaneel-
reuk hebben, of van andere Wilde Kaneelboomen, hoedanigen 'er
veelerleij in Oostindie voorkomen, die meer of min naar den ech-
ten Ceijlonen gelijken; zie mijne *Natuurlijke Historie* als boven.

KA.



Saururus

cassia, L.

