



Anchusa tinctoria . L.

V E R W. A N C H U S A
O S S E T O N G. T I N C T O R I A.

De Vae C L A S S E.

C L A S S I S V i a.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIIde St., bl. 431.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. II di Part.
Imæ pag. 317.

OSSETONG met *flomp* Lancetvormige
Bladen, de Meeldraadjes korter
dan de Bloem.

a. De vijfdeelige Kelk.

b. De eenbladige Trechtervormige
Bloem, aan den Rand half
vijfneedig.

c. Dezelve open gesneden, om de
vijf korter Meeldraadjes te ver-
toonen.

d. Een Meeldraadje afgezonderd.

e. De vier Vruchtbeginzels, de
Draadachtig dunne Stijl en de
flompe Stempel.

ANCHUSA Foliis Lanceolatis obtu-
fis, Staminiibus Corolla brevio-
ribus.

a. Perianthium quinquepartitum.

b. Corolla monopetala Infundibuli-
formis, Limbo femiquinquefido.

c. Eadem aperta, ut quinque
Stamina brevia appareant.

d. Unum Stamen seorsum.

e. Germina quatuor, Stijlus Fili-
formis & Sigma obtusum.

BLOEITIJD. Bij Montpellier is
de voornaame Groeiplaats van deeze
Soort, die ook in Spanje en Frank-
rijk voortkomt, groeiende omtrent
twee Voeten hoog, met leggende
Stengen, en bloeiende in Augustus.

TEMP. FLOR. Circa Monspeliam
locus crescendi naturalis est hujus
Speciei, quæ etiam crescit in
Hispania & Gallia, Caulibus
longitudine bipedali, sed procum-
bentibus, & florida in mense
Augusto.

GEBRUIK. Dit Ossetong, dat te Montpellier l'Orcanette ge-
noemd wordt, staat sierlijk in de Tuinen, wegens de blijvende hoog-
roode Bloemen. De Wortel, die men ook wel *Basterd-Alcanna*
noemt, wordt tot rood verwen, en tot rood maaken van Medicinaa-
le Tinctuuren en Dranken, gebruikt.