

BOOMACHTIGE

RHODODENDRON

ROOZELAAR.

MAXIMUM.

De Xde CLASSE.

CLASSIS Xma.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *IId*e
Deel *Vde* St., bl. 77.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIdi Part.*
Imæ. pag. 694.

ROOZELAAR met glanzige ovaale
flompe geaderde Bladen, die een
spitsen omgeboogen rand hebben,
de Steeltjes éénbloemig.

a. De vijfdeelige Kelk.

b. De eenbladige Rod-Trechtervor-
mige Bloem, met de tien Meel-
draadjes en den Stamper.

RHODODENDRON Foliis nitidis ova-
libus obtusis Venosis, margine
acuto reflexo, Pedunculis uni-
floris.

a. Perianthium quinquepartitum.

b. Corolla monopetala, rotato-
infundibuliformis, cum decem
Staminibus & Pistillo.

BLOEITIJD. De Groeiplaats is in
Noord-Amerika, voornaamelijk in
Virginie, alwaar het een Boom
wordt wel twintig Voeten hoog,
bloeijende in de Zomer en van de
volgende verschillende, inzonderheid
door de Kleur der Bloemen.

TEMP. FLOR. Locus crescendi
est in America Boreali, speciatim
in Virginia, ubi ad altitudinem
viginti Pedum exsurgit, in æstate
florens & differens a sequenti spe-
cie, præsertim colore Florum.

GEERUIK. Virginische is de bynaam van deeze geweest, om
dat men ze allereerst in Noord-Amerika heeft waargenomen,
groeiende als de andere in de Kloven der Bergrotsen. De steelt-
jes, hoewel Eenbloemig, maaken door hunne vergaaring ook
Eind-Trosfen uit. De kragten, waarschynlyk in gedagte Bals-
Geur bestaande, die mischien tot eenig Geneeskundig gebruik
strekken, worden zeer opgevyzeld.



Rhododendron maximum. L.

