



Trifolium arvense L.

RUIGE KLAVER, TRIFOLIUM

HAAZEPOOTJES. ARVENSE.

De XVIIde CLASSE.

CLASSIS XVIIa.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel Xde St., bl. 295.

Conf. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
IIde pag. 1142.

KLAVER met Pluizige Ovaale Aai-
ren, de Kelktanden Borstelig,
ruig en van gelijke langte.

2. De eenbladige vijfstandige Kelk.

b. Dezelve geopend.

c. De Vlinderachtige Bloem.

d. De negen samengevoegde Meel-
draadjes.

e. Het tiende enkeld.

f. Het Eijronde Vruchtbeginzel, met
Stijl en Stempel.

TRIFOLIUM Spicis villosis ovali-
bus, Dentibus Calicinis Seta-
ceis, villosis, æqualibus.

a. Perianthium monophyllum
quinquepartitum.

b. Idem apertum.

c. Corolla Papilionacea.

d. Stamina novem coalita.

e. Decimum simplex.

f. Germen Ovatum, cum Stijlo
& Stigmate.

BLOEITID. Dit Kruidje groeit
op drooge Zandige Weidlanden, zo
van Europa als van Amerika, ko-
mende bij ons ook in de Duinen
voor en langs de Zandige Wegen.
Zelden vindt men 't hooger dan een
Voet, bloeiende den gantschen Zo-
mer.

TEMP. FLOR. Hæc Herbula
crefcit in Pratis ficcis Sabulosis,
tam Europæ quam Americæ, apud
nos sæpe prodeuns in Dunis &
ad Vias Arenofas. Raro Pedis
altitudinem excedit & floret per
totam Æftatem.

GEBRUIK. Het is, zo men zegt, van een famentrekkende
aart, en wordt in Sweeden veel gebruikt tegen de Galziekte van
het Rundvee. Men vindt 'er Verscheidenheden van, die allen oud-
tijds bekend waren onder den naam van *Lagopus*, dat met *Haa-
zepootjes* strookt. Ook noemt men het, in het Hoogduitsch, wegens
de ruigte der Aairen, *Haafenklec*, *Katzenklec*.