



Convolvulus Turbethum.

L.

T U R B I T H -

W I N D E.

De Vde CLASSE.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIIde St., bl. 547.

WINDE met Hartvormige gehoekte
Bladen, de Steng Vliezig vier-
kantig, de Bloemsteeltjes veelbloe-
mig.

a. De bloeiende Plant, of de klim-
mende Stengen met Bladen en
Bloemen beladen.

b, c, d. De verscheiderlei gedaan-
te der Wortelen, zoals die overge-
gebracht worden.

BLOEITIJD. In Oostindie is de
Groeiplaats, inzonderheid op Ceijlon
en Malabar, op donkere vogtige
plaatsen, aan de kanten der Ware-
ren. Hier te Lande houdt menze
in de Winter-Huizen. Zij klimt,
als de andere soorten van Winde,
in Haagen en Boschagie bij 't Ge-
boonte op, bloeiende, in Junij en
Julij en overblijvende.

CONVOLVULUS

TURBETHUM.

CLASSIS Vta.

Conf. LINNÆI Sist. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
Imæ pag. 341.

CONVOLVULUS Foliis Cordatis an-
gulatis, Caule Membranaceo
quadrangulari, Pedunculis mul-
tifloris.

a. Stirps florida, five Caules scan-
dentes Foliis & Floribus onusti.

b, c, d. Radices variæ formæ,
quemadmodum nobis afferun-
tur.

TEMP. FLOR. Habitat in In-
dia Orientali, præcipue in Ceijlo-
na & Malabaria, in locis opacis
humidis, ad latera Aquarum. In
nostra Regione in Caldariis seu
Hijbernaculis aservanda. More
nostrorum Convolvulorum, in
Sepibus & Sijlvis ad Arbores &
Frutices adscendit, in Junio &
Julio florida & perennans.

GEBRUIK. De Wortels of wel de gedroogde stukken daar
van, gelijk hier afgebeeld, worden ons uit Oostindie toegebracht
en kunnen tot een Purgeermiddel gebruikt worden; dat echter
niet veel plaats heeft, wegens haare scherpte, waar in zij met
die van het Scammoneum veel overeenkomst hebben. Oudtijds ge-
bruikte men 'er de Harst en Extrakten van, gelijk nog de *Vinum*
de *Turbith* FALLOPII bekend is; doch hedendaags worden zij zelden
dan met andere dingen gemengd of in de aloude samenstelzels der
Winkelmiddelen, onder den naam van *Turpethum*, gebezigd.