

KLEINE WILDE
MALUWE OF
KAASJES-KRUID.

De XVIde CLASSE.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel Xde St., bl. 58.

KAASJES-KRUID met een hurkende
Sieng, Hartvormige ronde
flaauw vijfkwabbe Bladen,
de Vrucht dragende Bloemsteeljes
neergeboogen.

- a. De dubbelde Kelk, de buitenste
driebladig, de binnenste eenbla-
dig, half vijfneedig.
- b. Dezelve van onderen te zien.
- c. De vijfbladige van onderen sa-
menegroeide Bloem.
- d. Een Bloemblaadje.
- e. De menigvuldige tot een Rol sa-
mengevoegde Meeldraadjes.
- f. Een afgezonderd.
- g. Het schijfronde Vruchtbeginzel,
met den Rolagtigen Stijl en weete
Borstelige Stempels.
- h. De Zaaden in 't ronde geschikt.
- i. Een afgezonderd Zaadje.

BLOEITIJD. Aan Dyken en We-
gen, inzonderheid op Steenige plaat-
sen, die dor en droog zijn, komt dit
rondbladdige Kaasjes-Kruid in ons
Land en elders overvloedig voor;
ter hoogte van twee Voeten bloeiende
verscheiden Maanden in de Zomer.

M A L V A
ROTUNDIFOLIA.

CLASSIS XVIa.

Conf. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIIdi Part.
IIde pag. 1055.

MALVA Caule prostrato, Foliis
Cordato - orbiculatis, obsolete
quincquelobis, Pedunculis Fruc-
tiferis declinatis.

- a. Perianthium duplex, exterius
triphyllum, interius monophyl-
lum semiquinquefidum.
- b. Idem ab inferiori parte conspec-
tum.
- c. Corolla pentapetala basi coalita.
- d. Petalum unum.
- e. Stamina numerosa in Cylindrum
conjuncta.
- f. Stamen separatum.
- g. Germen orbiculatum cum Stijlo
Cylindraceo & Stigmatibus nu-
merosis Setaceis.
- h. Semina in orbem disposita.
- i. Semen separatum.

TEMP. FLOR. Ad Aggeres Vias-
que, præsertim in locis Lapidosis,
Siccis & aridis, plurimum hæc
Malva rotundifolia in nostra Regio-
ne & alibi occurrit, altitudine
bipedali. pluribus Mensibus in
Æstate florida.

GEbruik. Deeze Kleine Wilde Maluwe komt, gelijk de volgende,
in kragten veel overeen met de Heemst *Althæa*, die in 't I. Deel
van dit Werk op Plaat XLII is afgebeeld en bladz. 43 beschreeven.

GROO.



Malva rotundifolia. L.

