



G R O O T E M A L V A
WILDE MALUWE. S I J L V E S T R I S.

De XVIIde C L A S S E.

C L A S S I S XVIIa.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIda
Deel Xde St., bl. 58.

Conf. LINNÆI Sjfst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIdi Part.
IIda pag. 1056.

KAASJES-KRUID met een opgeregte
Kruidige ruuwe Steng, vijf of
zeventandige Bladen, Haairige
Bloem en Bladsteelen.

a. De buitenste driebladige Kelk.

b. De binneste eenbladige halfvijf
spleetige.

c. De vijfbladige Bloem.

d. Een afgezonderd Bloemblad.

e. De talrijke Meeldraadjes, van on-
deren Rolachtig te samen gegroeid.

f. Een Meeldraadge afgezonderd.

g. Het Schijfronde Vruchtbeginzel,
met den Rolachtigen Stijl en veele
Stempels.

h. De Vrucht.

MALVA Caule erecto Herbaceo
Scabro, quinque vel Septem-
dentatis, Pedunculis Petiolis-
que Pilosis.

a. Perianthium exterius triphyl-
lum.

b. Interius monophyllum semi-
quinquefidum.

c. Corolla quinquepetala.

d. Petalum separatum.

e. Stamina numerosa, inferius in
Cylindrum coalita.

f. Unum Stamen separatum.

g. Germen orbiculatum, cum Stij-
lo Cylindraco & Stigmatibus
plurimis.

h. Fructus.

BLOEITIJD. De Groeiplaats van
deze Groote Wilde Maluwe is
meer in Boschen en in Grasvelden,
alwaar zij somtijds wel opschiet tot
drie Voeten hoogte, bloeiende in de
Zomer-Maanden, gelijk de voorige.

TEMP. FLOR. Crescit hæc Mal-
va, major Sijlvestris sæpius in Sijl-
vis, & in Pascuis, alibique, ali-
quando altitudine trium Pedum
reperta, florensque in Mensibus
æstivis ut prior.

GEBRUIK. Beide deze Soorten van Kaasjes-Kruid, doch in-
zonderheid de Groote, zijn zo in als uitwendig verzagtende, en
worden derhalve de Wortels, Bladen, Bloemen en Zaden aange-
merkt als Winkelmiddelen, die men in de Apotheken houdt.
De Bladen zijn inzonderheid in Klijstereen in gebruik. Op som-
mige Plaatsen kookt men 'er Moes van, dat eetbaar is, doch wat
laf van smaak.