



OOSTERSCHE ARTEMISIA

BIJVOET. JUDAICA.

De XIXde CLASSE.

CLASSIS XVIIIa.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIde St., bl. 46.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINNI, *Tom. II di Part.*
Imæ pag. 1210.

BIJVOET die Heesterachtig is, met
stomp Eijronde gekwabde kleine
Blaadjes, en Pluims wijze ge-
steelde Bloemen.

ARTEMISIA Fruticosa, Foliis obo-
vatis, obtusis lobatis parvis,
Floribus paniculatis pedicellatis.

- a. De algemeene Kelk.
- b. De samengestelde Bloem.
- c. Een enkel Blommetje.
- d. Hetzelve geopend.
- e. Deszelfs deelen der Sexe.
- f. De vijf samengevoegde Meel-
draadjes, uit hetzelve.
- g. Het kleine Vruchtbeginzel, de
Draadachtige Stijl en tweedeelige
Stempel.

- a. Calix communis.
- b. Corolla composita.
- c. Flosculus simplex.
- d. Idem apertus.
- e. Ejus partes Sexuales.
- f. Stamina ejusdem quinque con-
juncta.
- g. Germen parvum, Stijlus fili-
formis & Stigma bifidum.

BLOEITIJD. In het Foodsche
Land, Arabie en daaromstreeks,
groeit dit Heestertje, dat in een
Pot ruim twee Voeten hoog is opge-
schooten, met menigvuldige Zijtak-
jes, bloeiende in de Maand Au-
gustus.

TEMP. FLOR. In Judæa, Ara-
bia & circumforaneis, crescit hic
Fruticulus, qui in Olla altitudinem
ultra duorum Pedum acquisivit,
cum Ramulis numerosis, Augusto
Mense florens.

GEBRUIK. Deeze Plant zou de Moeder zijn van het gemeene
Wormzaad, dat men Semen Zedoaria of Santonici noemt, het welke
ons uit de Oostersche Landen wordt megebragt, zijnde Kruiderg
en bitter. Men is taamelijk verzekerd, dat hetzelve van een derge-
lijk Kruid ingezameld worde.

ZEE.