

Z E E.

ARTEMISIA

A L S E M.

MARITIMA

De XIXde C L A S S E.

C L A S S I S XVIII^a.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel Xde St., bl. 576.

Conf. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. II^{de} Part.
Imæ. pag. 1211.

ZEE-ALSEM met veeldeelige Wollige
Bladen, knikkende Trosfen en
drie Vrouwelijke Blommetjes.

- a. De algemeene Kelk.
- b. Een tweeslagtig Blommetje.
- c. De vijf samengegroeide Meel-
draadjes daar uit.
- d. Het Vruchtbeginzel, de Stijl en
dubbeld Stempel.
- e. Een Vrouwelijk Blommetje,
waarvan 'er drie in de Straal zijn.
- f. Het Vruchtbeginzel met den Stijl
en dubbelden Stempel, hier in ver-
vat.

BLOEITIJD. Deeze komt aan on-
ze Zeedijken en Stranden overvloei-
dig voor, doch ook in Duitschland
en aan de Oevers der Noordelijke
Gewesten. Zij wordt met gemak in
onze Tuinen voortgeplant, ter hoog-
te van twee of drie Voeten, bloei-
jende in de Herfst.

ARTEMISIA Foliis multipartitis to-
mentosif, Racemis cernuis,
Flosculis Fœmininis ternis.

- a. Calix communis.
- b. Corollula Hermaphrodita.
- c. Ejusdem Stamina quinque coæ-
lita.
- d. Germen, & Stigma bifidum seu
duplex.
- e. Flosculus Fœmineus, quorum
tres in Radio.
- f. Germen, cum Stiflo & Stigma-
te duplici seu bifido, in illo.

TEMP. FLOR. Hæc abunde oc-
currit ed Aggeres & Littora Pa-
triæ nostræ, sed & in Germania
& ad Littora Regionum Borea-
lium & facile colitur in Hortis no-
stris, altitudine bi-vel tripedali,
in Augusto & Septembri florida.

GEBRUIK. De Wollige Witheid onderscheidt voornaamelijk
deeze Soort van Bijvoet of Zee-Alsem, die, in 't Wilde, een ster-
ken Mariolein of Kamfer-Reuk heeft, dat een bijzondere nuttig-
heid, naar die van Alsem gelijkende, zou kunnen aanduiden.

ROOM-

Tab: 283.



Artemisia maritima. L.

