



R O O M S C H E

A R T E M I S I A

A L S E M.

P O N T I C A

De XIXde C L A S S E.

C L A S S I S XVIIIa.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel Xde St., bl. 578.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. II di part.
IIde pag. 1211.

ALSEM met veeldeelige van anderen
Wollige Bladen, de Bloemen rond-
achtig knikkende, den Stool naakt.

ARTEMISIA Foliis multipartitis sub-
tus tomentosis, Floribus subro-
tundis nutantibus, Receptaculo
nudo.

- a. De algemeene Kelk.
- b. De samengefelde Bloem.
- c. Een tweeſlagtig Blommetje daar
uit.
- d. De vijf ſamengevoegde Meel-
draadjes.
- e. Het Vruchtbeginzel met den Stijl
en dubbelden Stempel.
- f. Die zelfde deelen uit het Vrouw-
lijk Blommetje.

- a. Calix communis.
- b. Corolla composita.
- c. Corollula Hermaphrodita ex
eadem.
- d. Stamina quinque coalita.
- e. Germen, Stijlus & Stigma bi-
fidum.
- f. Eadem partes ex Corollula Fœ-
minea.

BLOEITIJD. Deeze Plant, die
natuurlijk groeit in verſcheide Lan-
den van Klein Aſie, en elders,
wordt bij ons in de Kruidhoven ge-
kweekt, twee of drie Voeten hoog
en bloeit in Augustus.

TEMP. FLOR. Hæc Planta,
ſponte creſcens in pluribus Re-
gionibus Aſiæ minoris & alijs, co-
litur in noſtris Hortis Herbarijs,
altitudine duorum triumve Pe-
dum, florens in Menſe Auguſto.

GEBRUIK. Men ziet, waarvan zij den naam *Pontia* heeft,
doch men wil, dat het de *Pontiſche Alſem* der Ouden niet zij,
maar wel de *Roomiſche*, bij welken naam zij ook bekend is onder de
Geneesmiddelen. Het *Abſjnthium Romanum* is Kruidiger dan de
gewoone Alſem en minder bitter, wordende wegens de fijnheid
zijner deelen dezelve voorgekoozen, en tot Geneezing van de
Waterzugt geroemd.

N

ROTS-