

R O T S-

A R T E M I S I A

A L S E M.

R U P E S T R I S.

D E X I X d e C L A S S E.

C L A S S I S X V I I I y a.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel XIIde St., bl. 577.

Conf. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.
GMELINT, Tom. IIde Part.
Imæ. pag. 1211.

ALSEM met gevindte Bladen, opstijgende ruige Stengen, en Kogelronde knikkende Bloemen met een Pluizigen Stoel.

- a. De algemeene Kelk.
- b. De samengestelde Bloem.
- c. Een tweeslagtig Blommetje.
- d. De deelen der Sexe daar uit.
- e. De vijf samengegroeide Meeldraadjes.
- f. Het Vruchtbeginzel, de Draadachtige Stijl en dubbelden Stempel.
- g. Een Vrouwelijk Blommetje uit den Omtrek.

BLOEITIJD. Op de Roysen der Alpen of hooge Gebergten door geheel Europa, zelfs ook in Siberie is deeze Soort gevonden, groeijende ongevaar een Voet hoog, en in Julij bloeijende.

ARTEMISIA Foliis pinnatis, Caulibus adscendentibus hirsutis; Floribus Globosis cernuis, Receptaculo papposo.

- a. Calix communis.
- b. Corolla composita.
- c. Corollula Hermaphrodita.
- d. Sexus partes ex illa.
- e. Stamina quinque coalita.
- f. Germen, Stijlus filiformis & Stigma bifidum.
- g. Flosculus Fœmineus ex ambitu Floris.

TEMP FLOR. In Rupibus Alpium vel Montium excelsarum per totam Europam, imo & in Siberia hæc Species reperta est, altitudine circiter Pedali, Julio Mense florida.

GEBRUIK. De breedte der Bladen onderscheidt deeze wel voornaamelijk van de andere Soorten van Wilde Alsem, zijnde anders dezelve ook grijsachtig wit van Kleur en aangenaam van Reuk; doch zij wordt in de Tuinen donker groen en minder geurig. Het Afkookzel, evenwel wordt tegen het Zijdewee, tegen Afloopende Koortsen, tot afzetting der Stonden, en tot Wondheeling aangeprezen.

E R-



Artemisia rupestris. L.

