

D R U I V E N .

CHENOPODIUM

K R U I D .

B O T R I J S .

De Vde CLASSE.

CLASSIS VIa.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIIde St., bl. 777.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat.* Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
Imæ pag. 449.

GANZEVOET met langwerpige uit-
gehoekte Bladen en naakte veel-
deelige Trosjes.

- a. De vijfbladige Kelk.
- b. Dezelve met vijf Meeldraadjes.
- c. Een Meeldraadje afgezonderd.
- d. Het Vruchtbeginzel met den twee-
deeligen Stijl en dubbelden stom-
pen Stempel.

BLOEITIJD. Overvloedig groeit
dit Kruid in de Zuidelijke deelen
van Europa, ja het komt ook wild
voor, in Zandige Bouwlanden,
Boomkweekerijen en in sommige
Moeshoven van ons Land, groeijen-
de omtrent een Voet hoog en bloei-
jende in Augustus.

CHENOPODIUM Foliis oblongis sti-
nuatis, Racemis nudis multifidis.

- a. Perianthium pentaphyllum.
- b. Idem cum Stamimbus quinque.
- c. Unum Stamen separatum.
- d. Germen cum Stijlo bipartito &
Stigmate duplici obtuso.

TEMP. FLOR. Abunde crescit
hæc Herba in Regionibus Australi-
oribus Europæ, imo & Sponte
provenit in Agris, Arenosis, in
Arboretis & Herbarum Hortis,
nostrarum Provinciarum, altitu-
dine circiter Pedali, florens in
Augusto.

GEBRUIK. 't Gewas wordt DRUIVENKRUID (*Botrijs*) geheten,
om dat de Takken, met de Bloem- en Zaad-Trosjes, zig als een
Ros Druiven vertoonen, en *Botrijs Ambrosioides* wegens den aan-
genaamen Geur. Het heeft een verwarmende kragt en wordt des-
wegen onder de Medicijnen geteld. Droog bij de Kleederen ge-
legd, kan het dezelve voor de Mot bewaaren, weshalve het ook
den naam van *Mattenkruid* voert.

STIN.



Chenopodium betrys. L.

