



Chenopodium Vulvaria. L.

STINKENDE
M E L D E.

De Vde C L A S S E.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIIde St., bl. 779.GANZEVOET met geheel effenrandige
Ruitswijs Eijronde Bladen en
Klowenswijze Bloemen in de
Oxelen.

- a. Een klein bloeifemtakje.
- b. Een Takje met Zaaden.
- c. Een Bloempje met vijf Meeldraadjes van ter zijde.
- d. Een zelfde van vooren; beiden vergroot.
- e. Het Zaad met den aanblijvenden Kelk.
- f. Het zelfde van den Kelk, ontbloot, van vooren of van boven gezien.
- g. Het zelfde van ter zijde. Dit beide in natuurlijke Grootte.
- h. Rijpe Zaadjes.

BLOEITIJD. Dit komt, als een Onkruid, menigvuldig voor in Moeshoven, op woeste plaatsen en op de Mesthoopen van geheel Europa, bloeiende eenige Maanden in de Zomer.

CHENOPODIUM
VULVARIA.

C L A S S I S Vta

Conf. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
Imæ pag. 449.CHENOPODIUM Folii integerrimis
rhombéo. ovatis, Floribus conglomeratis Axillaribus.

- a. Ramulus Glomerulis Florigeris.
- b. Ramulus Glomerulis Fructiferis.
- c. Corolla cum quinque Stamimbus lateraliter.
- d. Eadem a parte antica utraqueâ magnitudine auctâ.
- e. Semen cum Calijce persistente.
- f. Idem a Calijce denudatum, anterne vel superne conspectum.
- g. Idem a facie laterali. Hæc duo in magnitudine naturali.
- h. Semina matura.

TEMP. FLOR. Hæc ut zizania in Europa cultis Oleraceis, in locis desertis & in Fimeticis frequens occurrit & per aliquot Menses florens conspicitur.

GEBRUIK. Het heeft een bijzonderen Stank, welke van somigen bij dien van rottige Zoute Visch vergeleeken wordt. Anderen noemen het, om die zelfde reden, *Vulvaria*; maar *Stinkende Melde* is de gewoone naam. In Engeland wordt van het Sap dezer Plant een Sijroep gekookt en tegen de Opstijging (*Hijstetrica Passio*) gebruikt.

BAL.