



KROONTJES

I B E R I S

SCHEEFBLOEM.

UMBELLATA.

De XVde CLASSE.

CLASSIS XVIIa.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *IIde*
Deel IXde St., bl. 638.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIdi Part.*
IIdæ. pag. 976.

SCHEEFBLOEM dat Kruidig is, met
Lancevormige gespitste Bladen,
de onderste Zaagtandig, de bo-
venste effenrandig.

- a. De Vierbladige Kelk.
- b. De vierbladige misvormige Bloem.
- c. Een grooter Bloemblad.
- d. Een kleiner dito.
- e. De vier lange en twee korte Meel-
draadjes.
- f. Een afgezonderd.
- g. Het rondachtig platte Vruchtbegin-
zel, met den Stijl en stompen
Stempel.
- h. De Tros van Haarwijjes.
- i. Een Haarwijje opart.
- k. Het Zaad.

BLOEITIJD. In de Zuidelijke dee-
len van Europa komt dit Kruidje van
zelf voort, groeiende anderhalf Voet
hoog en bloeiende in Augustus.

IBERIS Herbacea, Folii Lanceola-
tis acuminatis, inferioribus Ser-
ratis, superioribus integerrimis.

- a. Perianthium tetraphyllum.
- b. Corolla tetrapetala inæqualis.
- c. Petalum majus.
- d. Minus Petalum.
- e. Stamina quatuor longiora & duo
braviora.
- f. Stamen separatum.
- g. Germen subrotundum compres-
sum, cum Stijlo & Stigmate ob-
tuso.
- h. Corimbus Solicularum.
- i. Silicula una separata.
- k. Semen.

TEMP. FLOR. In Australioribus
Europæ, Hispania, Candia spon-
te crescit, hæc Herbula, ad altitu-
dinem Sesquipedalem, florens Au-
gusto.

GEBRUIK. Men noemt het in 't Fransch en Engelsch, *Creti-
sche of Kandiasche Thlaspi*, dan of het in eenig opzigt naar de *Thlaspi*
gelijke, wat de hoedanigheid betreft, vind ik niet gemeld. Een
Soort van dit Geslacht voert den bijnaam van *Amara*, om dat zij uit-
munt in bitterheid: een andere, die *Nudicaulis* heet, noemt men
Klein Tasjes - Kruid en deeze groeit hier te Lande.