



Lagoecia cuminoides. L.

KOMIJNACHTIG
HAAZEN-LEGER.

De Vde C L A S S E.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIIde St., bl. 690.HAAZEN-LEGER, en algemeen en
een bijzonder Omwindfel, de
Bloemblaadjes in twee gedeeld
en een enkel Zaad onder ie-
der Bloem.

- a. Het algemeen achtbladig Omwindfel.
b. Het bijzondere vierbladige Omwindfel.
c. De bijzondere vijfbladige Kelk.
d. Hetzelvz van boven met de Bloem en vijf Meeldraadjes.
e. De vijfbladige Bloem.
f, f. Het Vruchtbeginfel, de Stijl en eenvoudige Stempel.
g. Het enkele Zaad.

BLOEITIJD. Groeit algemeen in
Creta en Spanjen enz., 't word in
onze Hoven omstreeks een voet hoog
geplant, en bloeit in Julij.L A G O E C I A
C U M I N O I D I S.

C L A S S I S Vta.

Conf. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. II di Part.
Imæ pag. 422.LAGOECIA *Involucrum universale &
partiale, Petala bicornia Semina
solitaria infera.*

- a. Involucrum universale octophyllum.
b. Involucrum proprium tetraphyllum.
c. Perianthium proprium pentaphyllum.
d. Idem a parte superiore cum Corolla & quinque Staminibus.
e. Corolla pentapetala.
f, f. Germen, Stijlus & Stigma simplex.
g. Semen solitarium.

TEMP. FLOR. Sponte crescit in
Creta, Hispania &c. Colitur apud
nos in hortis altitudine circiter
pedali atque Julio floret.

GEBRUIK. *Cuminum fistulosum* werd deeze Plant wel eertijds genoemd. Het Kruid en vooral het Zaad heeft eenige mediceinale waardij. Het Zaad is kruidig en scherper van Smaak en Reuk dan de gemeene Komijn en niet minder krachtig. Het is zeer Maagsterkend, en werd eertijds tegens Spijswalging, Winden, Buikpijnen, Opzetting en de Hik geroemd. Uiterlijk gebruikten men het tegens Kneufing en Ontsteeking, maar thans word het in 't geheel niet meer gebruikt.