

MOERASSIG PEDICULARIS!
L U I S K R U I D . PALUSTRIS.

De XIVde CLASSE.

CLASSIS XIIIa.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IXde St., bl. 469.

CONF. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIIdi. Part.
IIIda pag. 925.

LUISKRUID met een Takkige Steng,
de Kelken gekamd en eeltig ge-
slippeld, de Bloemen scheef ge-
tipt.

PEDICULARIS Caule ramoso, Ca-
licibus cristatis calloso puncta-
tis, Corollis Labio obliquis.

a. De eenbladige buikige Kelk, met
vijspleetige opening.

a. Perianthium monophyllum ven-
tricosum, Ore quinquifido.

b. De eenbladige gaapende Bloem.

b. Corolla monopetala ringens.

c. Derzelver Bovenlip.

c. Ejus Labium superius.

d. Derzelver Onderlip.

d. Labium inferius.

e, e. De gedeelde Bovenlip met twee
lange en twee korte Meeldraad-
jes.

e, e. Labium superius divisum cum
Staminibus duobus longioribus
& duobus brevioribus.

f. Het rondachtige Vruchtbeginfel,
draadswijze Sijl en ingebogen
Stempel.

f. Germen subrotundum, Stijlus
filiformis & Stigma inflexum.

BLOEITIJD. Groeit in zompachtige
Weiden en Weilanden. In Ne-
derland op Turfgrond, omstreeks
Harderwijk en Waverveen, enz.
't Word een a twee voeten hoog en
bloeit in Julij.

TEMP. FLOR. Crescit in sylvis
& pratis Paludosis. In Belgia in
locis turfosis circa Harderovi-
cum, Waverveen &c., altitu-
dine pedali vel bipedali Julioque
floret.

GEBRUIK. *Pedicularis aquatica*. Hanekam. Deeze Plant is van een
zeer onaangename Smaak en Reuk. Men meent dat zij Wond-
heelend zij, en zij word bij Fistels, Donkerheid der Oogen en bij
de Hoest geroemd. Sommige oude Apothekers bewaaren ze nog
als Winkelnegten. De Beesten vermijden het Kruid, en zo zij
het uit honger eeten, worden zij ziek, en uit dien hoofde kan
men het met recht onder de vergiften tellen. Dit was aan de Ou-
den ook niet onbekend.

BOSCHIG



Pedicularis palustris L.

