

W I N K E L C I J N O G L O S S U M
H O N D S T O N G . O F F I C I N A L E .

De Vde CLASSE.

CLASSIS Vta.

Zie LINNÆUS. Nat. Hist.
door HOUTTUIN, IIde
Deel VII St., bl. 433.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. II di Part.
Ima pag. 318.

HONDSTONE met de Meeldraadjes
korter dan de Bloem, de Bladen
breed Lancetvormig, wollig en
ongefield.

CIJNOGLOSSUM Stamimbus Corolla
brevioribus, Foliis lato lanceo-
latis tomentosis sessilibus.

a. De vijfdeelige Kelk.

a. Perianthium quinque partitum.

b. De eenbladige trechtervormige
Bloem met een half wijspleetigen
Rand.b. Corolla monopetala, infundi-
buliformis, cum limbo semi-
quinquesido.c. Dezelve geopend met vijf Meel-
draadjes.c. Eadem aperta cum quinque Sta-
minibus.d. Vier Vruchtbeginselen, Stijl en
uitgeculpte Stempelen.d. Germina quatuor, Stijlus &
Stigma emarginatum.

e. Het Zaad.

e. Semen.

f. De Pit.

f. Nucleus.

BLOEITIJD. Groeit op onbebouw-
de Wegen. In Nederland aan de
Maas, in de Duinen door gantsch
Holland, bij Harderwijk enz.,
word twee Voeten hoog en bloeit in
Maj en Junij.

TEMP. FLOR. Crescit ad Vias in
locis incultis. In Belgia ad flu-
vium Mesæ, in Duinis, per uni-
versam Hollandiam, prope Har-
derovicum &c. altitudine bipedali
1 Majo vel Junio floret.

GEBRUIK. Cijnoglasse Radix & Herba. Hondstonge. De Plant
heeft een stinkende bokkige Reuk, en die der Bloem is bedwel-
mende. De Smaak is zoetachtig bokkig, even zo de Wortelen,
behalven dat deeze slijmig en meer zoet zijn. De kracht is samen-
trekkend, Krampstillend en bedwelmend, en men gebruikt ze bij
de Hoest, Verkouwendheid, de Persloop, en uitwendig tegens
Krop- en Kliergezwellen. Men maakt van de Bladen een Stroop
die men bij Borstziektens en de Hoest gebruikt. De Mass. Pil, de
Cijnoglosf. is zeer bekend. Sommigen houden de Plant voor versif-
tigd, anderen spreken dit tegen: ondertusschen is het waar dat
het de Beesten vermijden.

GE.

Tab. 466.



Cynoglossum officinale L.

