

ALPISCHE

THIJM.

De XIVde CLASSE.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IXde St., bl. 394.

THIJM met zes bloemige Kransjes
en stompachtige holle Bladen, die
eenigermate zaagtandig zijn.

a. De eenbladige gepijpte tweesplee-
tigit Kelk, de Bovenlip drie, de
onderste tweetandig.

b. De eenbladige greinzende Bloem.

c. Dezelve van boven geopend.

d. De Bovenlip met twee lange en
twee korte ingekromde Meel-
draadjes.

e. Het vierdeelige Vruchtbeginsel,
de draadsvijze Stijl en dubbelde
Stempel.

BLOEITIJD. Groeit algemeen in
Europa, op de Gebergten van Tij-
rol en Zwitserland. Word omstreeks
eene voet hoog en bloeit in Julij.

THIJMUS

ALPINUS.

CLASSIS XIIIa.

Conf. LINNÆI Stijst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
IIde pag. 914.

THIJMUS Verticillis sexfloris, Fo-
llis obtusiusculis concavis sub
ferratis.

a. Perianthium monophyllum tu-
bulatum bifidum, cujus Labium
superius tridentatum, inferius
bidentatum est.

b. Corolla monopetala ringens.

c. Radem aperta ex parte superiore.

d. Labium superius cum duobus
Staminibus longioribus & duo-
bus brevioribus incurvis.

e. Germen quadripartitum, Stijlus
filiformis & Stigma bifidum.

TEMP. FLOR. Sponte crescit in
Europa, montibus Tijrolensibus
& Helvetiæ altitudine vix semi-
pedali. Julio floret.

GEBRUIK. De Thijmsoorten hebben allen eene sterk ruikende
aangenaame, het hoofd aandoende kruidige Reuk, en kruidige
Smaak, en zijn oplosfend, opwekkend en prikkelend, de Maag
aanzettend en de Maandstonden drijvend en worden vooral bij Ze-
nuwziektens gebruikt. Deze *Alpische Thijm* is in geen bijzonder
gebruik, meer de navolgende.

GE.



Thymus alpinus. L.

