

EGIPTISCH
MIDDAGBLOEM.

De XIIIde CLASSE.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IXde St., bl. 6.

MIDDAGBLOEM met half spilronde
Tepelige onderscheiden Bladen;
de Bloemen ongesteeld in de Oxe-
len, de Kelken vierdeelig.
a. De Bloem in haare natuurlijke ge-
daante.
b. Dezelve vergroot.

BLOEITIJD. Groeit in Egipten.

MESEMBRIJANTHEMUM
COPTICUM.

CLASSIS XII.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. II di Part.*
Imo pag. 344.

MESEMBRIJANTHEMUM Folis fe-
mitertribus papulosis distinctis.
Floribus sessilibus axillaribus,
Callicibus quinquefidis.
a. Flos in statu naturali.
b. Idem aucta magnitudine.

TEMP. FLOR. Crescit in Aegijpto.

GEBRUIK. Deze Plant geeft gelijk alle Eisplanten, water en zoutachtig vogt, en wel in groote hoeveelheid. Zij bezit vooral Zeezout en uit dien hoofde gebruikt men ze in *Alexandrie* tot de bereiding der *Soda*, en dit is al haar mediceaale waardigheid. Voor 't overige word zij nog in de Apotheeken bewaard of gebruikt. Het *Mesembrianthemum cristallinum* is voor korten tijd bij uitstek, bij de *infaretus*, bezwaarlijke Pislossing, de Kramp der Urinblaas en als specifiek bij de Kinkhoest geroemd. Anderen haar gelijkkomende Planten die een waterachtig, zoutig, verkoelend en overvloedig vogt hebben, schijnen hetzelfde te doen, denkelijk ook andere soorten der *Middagbloem* en mogelijk de Egiptische insgelijks.

ARA-

Tab. 470.



Mesembryanthemum copticum L

