



G E M E E N
BORSTELKRANS.

De XIVde C L A S S E.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IXde St., bl. 379.BORSTELKRANS met rondachtige ste-
kelige Hoofdes en borstelige
Blikjes.

- a. De geheele Bloem.
- b. De eenbladige en gekromde Kelk,
met een gedeelte van het borstelige
Blikje.
- c. De geopende eenbladige greinzen-
de Bloem met twee lange en twee
korte Meeldraadjes.
- d. Het vierdeelige Vruchtbaginzel,
draadswijze Stijl en wat samen-
gedrukte Stempel.

BLOEITIJD. Groeit op de Heuvels
en steenachtige Plaatsen van Euro-
pa, Canada en Aegijpten. Ook
wordt het in onze Tuinen twee
voet hoog geplant, en bloeit in
Augustus.CLINOPODIUM
VULGARE.

C L A S S I S XIIIte.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GEMELINI, Tom. IIde. Part.
IIde pag. 912.CLINOPODIUM Capitulis subrotun-
dis hispidis, Bracteis setaceis.

- a. Flos integer.
- b. Perianthium monophyllum in-
curvum, cum parte Bractearum se-
tacearum.
- c. Corolla monopetala ringens
aperta, cum Stamimbus duo-
bus longioribus & duobus bre-
vioribus.
- d. Germen quadripartitum, Stijl-
lus filiformis & Stigma com-
pressum.

TEMP. FLOR. Crescit ad colles
& in locis lupidosis Europæ, Ca-
nadæ & Aegijpti. Colitur quo-
que in hortis nostris altitudine
bipedali. Augusto floret.GEBRUIK. Het afkooksel van dit Kruid werd eertijds tegens
stuipen, scheuringen, bezwaarlijke waterloosing, bij de doorloop,
ter bevordering der Maandstonden, de zwaare geboorte gelijk ook
tegens de beet der Slangen geroemd. Heedendaagsch komt het in
geen aanmerking.