

Z A G T A C A N T H U S
BERENKLAUW. M O L L I S.

De XIVde CLASSE.

CLASSIS XIIIa.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel IXde St., bl. 587.

Conf. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde Part.
IIde pag. 964.

BERENKLAUW met uitgeloeke on-
gedoornde Bladen.

ACANTHUS Foliis senuatis inerimi-
bus.

a. De Kelk.

a. Perianthium.

b. De eenbladige Bloem met twee
lange en twee korte Meeldraad-
jes.

b. Corolla monopetala cum duo-
bus Staminiibus longioribus &
duobus brevioribus.

c. Een afgezonderd Meeldraadj.

c. Stamen separatum.

d. Het Kegelswijze Frugtbeginsel,
draadswijze Stijl en twee spitse
Stempels.

d. Germen conicum, Stijlus fili-
formis & Stigmata duo acuta.

e. Het Zaaddoosje.

e. Capsula seminalis.

f. Hetzelfde geopend.

f. Eadem aperta.

g. Het Zaad.

g. Semen.

BLOEITIJD. Deze Plant groeit
in Italien en Sicilien, maar zij
word ook in onze Hoven getweekt,
word vier a vijf voeten hoog, en
bloeit in Augustus.

TEMP. FLOR. Sponte crescit hæc
planta in Italia & Sicilia, sed co-
litur quoque in hortis nostris, ubi
altitudinem attingit quatuor quin-
queve pedum, atque Augusto
flore.

GEBRUIK. *Herba Brancæ Ursinæ*. De Bladen hebben een laffe
grasachtige slijmige Smaak en swakke Reuk. Zij hebben weekmaa-
kende, verzachtende en verdunnende krachten, en worden bij
bloedspuwingen, buikontlastingen en brandingen als weekmaakende
en verzachtende gebruikt. Zij komen de *Malvæ* zeer nabij, en
worden gelijk deeze onder clijstereen en de *Herb. quinque emoll.*
gemengd. Vermits wij veele andere Middelen hebben, die de-
zelfde en nog beter werking doen, zo is het thans buiten ge-
bruik geraakt. Men verwisfeld het Kruid dikwijls met het Plaat
421 aangehaalde *Herac. Sphond*, of dit word dikwijls in plaats van
Acanth. Mol. gebruikt.

EU.



Acanthus mollis. L.

