

GEMEEN
SMEERBLAD.PINGUICULA
VULGARIS.

De IIIde CLASSE.

GLASSIS IIda.

Zie LINNEUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *IIda*
*Deel VIIde St., bl. 128.*Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIde Part.*
*Ima pag. 39.*SMEERBLAD met een cilindrisch
Honingbakje van langte als het
Bloembladje.PINGUICULA Nectario Cylindraceo,
longitudine Petali.

- a. De gaapende Kelk.
- b. De eenbladige greinzende Bloem.
- c. Dezelvde geopend.
- d. Het gehoornde Honingbakje.
- e, e. Twee Helmdraadjes.
- f. Een afzonderlijk Meeldraadje.
- g. Het Klootronde Vruchtbeginfel met
een korten Stijl en twee gelipte
Stempels.

- a. Perianthium ringens.
- b. Corolla monopetala ringens.
- c. Eadem aperta.
- d. Nectarium corniculatum.
- e, e. Filamenta duo.
- f. Filamentum separatum.
- g. Germen globosum cum Stijle
brevis & Stigmate bilabiato.

BLOETIJD. Groeit op vogtige
Plaatsen van Gelderland, vooral in
het Graaffchap Zutphen, ter hoogte
van de hier afgebeelde Figuur, en
bloeit in Junij.TEMP. FLOR. Crescit in locis
uliginosis, in Gelria, præcipue
comitatui Zutphanienfi, altitudi-
næ Figuræ depictæ, Junioque floret.GEBRUIK. *Pinguicula*. Botterwortel, Bergsanikel, Kiewietswort,
word voor een wondmiddel gehouden. Ook zegd men dat de daar-
van gemaakte stroop, de slijm uitvoere. Is buiten gebruik.

OVER-



Pinguicula vulgaris. L.

