



Scleranthus perennis. L.

OVERBLIJVEND SCLERANTHUS
HARDBLOEM. PERENNIS.

DE Xde CLASSE.

CLASSIS Xma.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN. IIde
Deels VIIste St. bl. 566.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIde part.
IIde pag. 708.

HARDBLOEM met gesloten Vrucht-
kelken.

- a. De eenblindige half vijfspleetige
Kelk of Bloem
- b. Dezelve van het bovenste gedeel-
te.
- c. Dezelve geopend met tien Meel-
draadjes.
- d. Een afgezonderd Meeldraadje.
- e. Het halfronde Vruchtbeginsel met
twee Stijlen en eenvoudige Steen-
pelen.

SCLERANTHUS Calicibus Fructus
clausis.

- a. Perianthium monophyllum fe-
miquinque fidum, vel Corolla.
- b. Idem a superiori Parte.
- c. Idem apertum cum decem Sta-
minibus.
- d. Stamen separatum.
- e. Germen subrotundum, cum
duobus Stijlis & Stigmatibus
simplicibus.

BLOEITIJD. Groeit op drooge
Zandgrond, een voet hoog. In Ne-
derland op de Velden van Harder-
wijk, omstreeks Haarlem en Utrecht,
in de Duinen bij 's Hage, enz. en
bloeit in Junij.

TEMP. FLOR. Crescit in locis
siccis arenosis altitudine pedali.
In Belgia in agris Harderovici,
circa Harlemum & Ultrajectinum,
in Duinis Haganis &c. Junioque
flore.

GEBRUIK. *Alchemilla graminifolia*. Het wierd eertijds als op-
droogende, samentrekkende, en als wondmiddel geroemd, en voor-
al bij alle soorten van Vloeijingen gebruikt. Thans onbruikbaar.