

R A P P I G C O N I J Z A
T O N D E R K R U I D . S Q U A R R O S A .

DE XIXde C L A S S E.

C L A S S I S XVIIIa.

Zie LINNEUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN. IIde
Deel Xde St. bl. 612.

Conf. LINNEI Sj. Nat. Rd.
GMELINI. Tom. III. part.
IIde pag. 1220.

T O N D E R K R U I D met Lancetvormige
spijse Bladen, een kruisige Steng,
en rappige Kelken.

- a. De gemeenschappelijke Kelk.
- b. De samengestelde Bloem.
- c. De tweeflagtige Bloem.
- d. Dezelvde geopend.
- e. Vijf samengelegte Meeldraaisjes.
- f. Het Vruchtbeginsel, Stijl en dubbelde Stempel.
- g. De Vrouwelijke Bloem uit de Straal.
- h. Dezelvde geopend.
- i. Het Vruchtbeginsel, Stijl en dubbelde Stempel.

BLOETIJD. Deze Plant groeit
op drooge steenachtige Plaatsen twee
a drie voeten hoog. Zij groeit ook
overvloedig omstreeks 's Hage Haar-
lem en Overveen, en bloeit in Julij.

C O N I J Z A Follis lanceolatis acutis,
Caulis herbaceo corijmboso,
Calycibus squarrosis.

- a. Calix communis.
- b. Corolla composita.
- c. Corollula hermaphrodita.
- d. Eadem aperta.
- e. Stamina quinque coalita.
- f. Germen, Stijlus & Stigma bifidum.
- g. Corollula foeminea ex ambitu.
- h. Eadem aperta.
- i. Germen, Stijlus & Stigma bifidum.

TEMP. FLOR. Crescit hac Planta
in locis aridis lapidosis, altitu-
dine bi vel tripedali. Abunde
circa Haganum atque Haerlemum
prope Overveen, Julioque floret.

GEBRUIK. Conijza pulicaria. Donderkruid, is een vloijend doo-
dend middel, en dit is de eenige kracht die aan hetzelfde in den
ouden tijd toegelegd wierd, en wie haakt 'er thans naar zulke raa-
fernijen?



Conyza squarrosa. L.





