



Pastinaca opopanax L.

GOMDRAAGENDE
PINSTERNAKEL.

DE Vte CLASSE.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.* door
HOUTTUIJN, IIde Deels
8ste St. bl. 200.PASTINACA
OPPOPONAX.

CLASSIS Vta.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat.* Ed.
SMELINI *Tom. Ildi part.*
Ima pag. 490.

PINSTERNAKEL met gevinde bla-
den, de blaadjes aan den voor-
sten grondsteen uitgesneeden.
NB. dit ziet op de wortelblad-
den, welke in deeze plant niet
zijn afgebeeld, van wegen haa-
re grootte.

- a. a. De algemeene bloemtrosfen.
- b. b. De bijzondere Bloemtrosjes.
- c. Een enkel bloemetje van vooren te zien.
- d. Hetzelfde bloemetje van achteren.
- e. Een der helmstijltjes met zijn rondachtig meelknoofje.
- f. Het algemeen bekleedzel bestaan-
de uit twee blaadjes.
- g. Het vrucht beginzel met de
beide omgekromde stijltjes.
- h. De onrijpe vruchten, na het af-
vallen der bloemerjes.

BLOEITIJD. Deeze plant, die
voornaamelijk groeit in Sijrien en
in het zuiden van Europa, bloeit
in den Voorzomer.

PASTINACA foliis pinnatis, folio-
lis basi anticâ excisis. NB. Hoc
pertinet ad folia radicalia,
quæ in hac tabulâ non exhi-
bentur, propter nimiam ipso-
rum magnitudinem.

- a. a. Umbellæ universales.
- b. b. Umbellæ partiales.
- c. Simplex corollula antice con-
spicua.
- d. Eadem corollula a parte pos-
tica.
- e. Unum staminum cum anthera
subrotunda.
- f. Involucrum universale diphyl-
lum.
- g. Germen, cum duobus stijlis
incurvatis.
- h. Fructus immaturi post floscu-
lorum delapsum,

TEMP. FLOR. Planta hæc,
quæ imprimis in Sijria atque in
Europa australiore crescit, floret
in principio æstatis.

GEbruik. Uit den Wortel van dit gewas, wanneer dezelve
wordt doorgesneeden, vloeit een zap, 't welk verdikt zijnde, is
de Opoponax der Apotheeken, eene zelfstandigheid gedeeltelijk
van een gomachtigen, en gedeeltelijk van een harstachtigen aard.
Niet zelden wordt dit verdikte zap in de Geneeskunde gebruikt,
met andere middelen van dien aard, tegen allerlei slijmerige en
koude verstoppingen: vooral in verlammingen en borstkwalen,
uit zodanige oorzaken ontsiaande.