

GEMEENE

KARWEY.

DE Vde CLASSE.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN IIda
Deels 8fte St. bl. 271.

DE GEMEENE KARWEY is tot hier
toe de eenige bekende soort van
dit geslagt.

- a. a. De algemeene Bloemkransen,
wier eene de plant in bloei ver-
toont, terwijl de andere de half-
rijpe vruchten met de overblij-
vende stijlen afbeeld.
- b. b. De bijzondere Bloemtrosjes
in volle bloei.
- c. Een der bloemetjes, vertoonen-
de de twee verheven ronde zaad
beginzels, en de omgebogene
randjes der bloembladen.
- d. Een blaaije van het algemeen
Inwindzel 't geen dikwijls een
bladig is.
- e. De onrijpe vruchten zelve.
- f. Het bolvormig, langwerpig rond-
de zaad, aan de eene zij gestreept
en aan de anderen plat.
- g. De getimpelde spilformige wor-
tel.

BLOEITIJD. Deze plant, bloeit
in den Voorzomer in overvloed in
onze weiden.

CARUM

CARVI.

CLASSIS VIa.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI Tem. IIdi part.
Ima pag. 491.

CARUM vulgare est unica hujus
generis species hactenus cog-
nita.

- a. a. Umbellæ universales, qua-
rum una plantam florentem
exhibet, altera fructus semima-
turos cum stijlis persistentibus.
- b. b. Umbellæ partiales inflo-
rescentiæ tempore.
- c. Unus flosculorum, exhibens
duo germina convexa, stami-
na quinque et limbos petalo-
rum inflexos.
- d. Folium involucri universa-
lis soepe monophylli.
- e. Fructus in maturi ipsi.
- f. Semen convexum ovato-oblon-
gum, hinc striatum inde pla-
num
- g. Radix fusiformis, Rugosa.

TEMP. FLOR. Planta hæc
in pascuis nostris abundanter flo-
ret in aestatis principio.

GEbruik. Het Karweijzaad wordt geteld onder de vier groote
verwarmende zaaden. Het is inderdaad zeer heilzaam voor de
Maag, en neemt dikwijls, door zijne verwarmende kragt, de
buikpijn weg: wordende het ook aangepreezen in koude hoesten
en andere slijmerige borstkwalen. Voorts wordt dit zaad gebruikt,
om eene geur aan het brood en aan de kaas te geven; gelijk ook
zomwijlen in soepen.

GOM-



Carum carvi L.



