

TAMME
SORBENBOOM.

DE XIIde CLASSE.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.* door
HOOUTTUIJN, IIde Deels 2de
St. bl. 598.

SORBENBOOM met gevinde bladen,
die van onderen ruig zijn.

- a. Een noch ongeopende bloem, ver-
toonende de bloemkrans, zo als
dezelve door de kelk wordt om-
vat.
- b. De geopende bloem, aanwijzende
de plaatsing der bloembladen en
der helmstijltjes.
- c. De overblijvende bloemkelk, ver-
toonende de stijlen en het begin-
zel der vrucht.
- d. De rijpe vrucht, in de midden
doorgesneden, om de zaaden te
doen zien, in hunne natuurlijke
plaatsing.
- e. Een der zaaden, die langwerpig
en kraakbeenig zijn.

BLOEITIJD. Deze Boom komt
overvloedig voor in 't Oostenrijks
gebied, gelijk ook in Italie, alwaar
hij in 't Voorjaar bloeit. De bla-
den van deezee boom hebben veel
overeenkomst met die van den Lijs-
terbezieboom. De vruchten zijn
veelal langwerpig, als kleine pee-
ren, doch worden ook dikwijls rond
gevonden, in de gedaante van kleine
appeltjes of mispelen.

SORBUS
DOMESTICA.

CLASSIS XIIa.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI *Tom. II di part.*
I^{ma} pag. 834.

SORBUS foliis pinnatis, subtus vil-
lofis.

- a. Flos nondum apertus, exhi-
bens corollam calice cinctam.
- b. Flos apertus, monstrans situm
petalorum & staminum.
- c. Perianthium persistens floris
delapsi, cum stilib & fructus
principio.
- d. Fructus maturus, per medium
dissectus, monstrans semina in
situ nativo.
- e. Unum seminum, quæ sunt
oblonga & cartilaginea.

TEMP. FLOR. Frequenter hæc
arbor in Austriaca ditione repe-
ritur, nec non in Italia, ubi vere
floret. Folia hujus arboris mul-
tum conveniunt cum illis forbi-
aucuparii. Fructus sunt oblongi,
ut plurimum magnitudine piri
minoris, licet & subrotundi re-
periantur, imitantes figuram po-
molorum vel mispilorum.

GEBRUIK. Het vleesch is, onrijp, ongemeen wrang, doch
rijp zijnde, eetbaar en minder zamentrekkende; doch best doet
men, de Sorben te laten rotten gelijk de mispelen, wanneer zij
goed van smaak worden. De rijpe vruchten gekookt, en in zu-
iker geconfijt, zijn niet minder hartsterkende, dan het kweeën-
vleesch. Onrijp zijn de Sorben, door hunne zamentrekkende
kragten, goed in de buikloopen.

FRAN-

Tab. XIV.



Sorbus domestica L.

