

STERANYSBOOM. ILLICIUM ANISATUM.

DE XIde CLASSE.

CLASSIS XI^{ma}.

Zie LINNÆUS Nat. Hist. door
HOULTUIJN, IIde Deel
2de St. bl. 520.

Conf. LINNÆI Syst. Nat. Ed.
GMELINI Tom. II di part.
1^{ma} pag. 867.

STERANYSBOOM, met bloembladen,
wier binnenste zijn lineaal el-
vormig.

ILLICIUM petalis interioribus li-
neari-subulatis.

a. De gekleurde bloemkelk van ach-
teren te zien.

a. Perianthium coloratum a pos-
tica parte.

b. De bloemkrans van vooren in 't
midden van den bloeitijd.

b. Corolla ab antica parte in me-
dio florendi tempore.

c. De bloemkrans van ter zijden,
vertoonende derzelver klokvormige
gedaante.

c. Corolla a latere, exhibens ip-
sius figuram campanulataam.

d. Het binnenst fraai gestraald ge-
deelte des bloems.

d. Interior floris pars pulchre ra-
diata.

e. De stampertjes in hunne natuur-
lyke plantzing.

e. Pistilla in situ naturali.

f. f. De einden der bloembladen af-
zonderlijk.

f. f. Extrema petalorum seorsim.

g. Een der onrijpe zaadbeginzels.

g. Unum germinum in maturorum,

h. De vrucht, zamengesfeld uit acht
zaadhuisjes, in het rond geplaatst,
openstaande, zamengedrukt, ei-
rond, lederachtig en in tweeën
opensplijtende.

h. Fructus, constans e capsulis
octo in orbem digestis, paten-
tibus, compressis, ovatis, co-
riaceis, bivalvibus.

i. De zaaden zelve, welke zijn ei-
rond en zeer welruikende.

i. Semina ipsa, ovata, odora-
tissima.

BLOEITIJD. Deze boom, die
in 't midden van den Zomer bloeit,
groeit overvloediglijk in China,
groot Tartarijen en in de Philip-
pijnsche Eilanden, waarom ook het
zaad van aenzelven genoemd wordt,
Chineesche of Siberische Anijs.

TEMP. FLOR. Arbor hæc, quæ
media æstate floret, crescit abun-
danter, in China, Tartaria magna
& insulis Philippinis. Unde se-
men hujus & appellatur Anisum
Chinense vel Sibiricum.

GEBRUIK. De Steranijs bezit uitmuntende windbreekende en
Maagversterkende krachten. Doch de Zaadhuisjes bevatten door-
gaans meer van die kracht, dan de Zaaden zelve.

HOF

Tab. XXII.



Illicium anisatum L.

