

Taf. XXVII.



Pyrus communis L.

G E M E E N E
P E E R E N B O O M .

D E X I I d e C L A S S E .

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN IIde
Deel 2de St. bl. 604.OORTBOOM, met gekartelde bla-
den, de bloemtroosjes gesteld.a. De vijfbladige bloem van den
Peereboom, van ter zijden, te
zien.b. Dezelfde bloem geopend, ver-
toonende de talrijke helmstijltjes,
die een weinig korter zijn, dan
de bloembladen.c. Een uitgebloeide bloem, wiens
bloembladen zijn afgevallen. Hier
valt in het oog de plaatsing der
Helmstijltjes die op de kelk vast-
zitten; teffens met dien der vijf
enkelvoudige stijlen.

d. De wilde of Boschpeer.

e. De Muscadelline Peer, onder
welke soort de Kaneelpeeren be-
hooren.

f. De Bon Cretien Peer.

BLOEITIJD. Hier in is een groot
verschil, naar maate van het on-
derscheid der soorten, van deezen
boom. Sommige soorten bloeijen
reeds in 't vroege Voorjaar; terwyl
andere haare bloemen eerst in 't
begin van den Zomer, openen.P Y R U S
C O M M U N I S .

C L A S S I S X I m a .

Conf. LINNÆI Sijst. Nat. Ed.
GMELINI Tom. IIde part.
I m a pag. 841.Pijrus foliis serratis, pedunculis
corijmbosis.a. Flos Pijri pentapetalus a latere
conspicuus.b. Flos idem apertus, monstrans
stamina numerosa, petalis pau-
lulum breviora.c. Flos effoetus, cujus petala de-
lapsa sunt. Apparet jam situs
staminum Perianthio adnato-
rum, simul cum illo stijlorum
quinque simplicium.

d. Pijrus Pijrafter sive sijlvestris.

e. Pijrus Favonia sive Muscatel-
lina, cujus varietas est Cinna-
momea.f. Pijrus Pompejana sive boni
Christiani.TEMP. FLOR. Quam plurimum
hoc differt, pro diversitate varie-
tatum hujus arboris. Quædam
species jam primo Vere florent;
aliæ flores tantum aperiunt, in
æstatis principio.

GEbruik. Zappige en geurige Peeren, die volkomen rijp zijn geworden, verschaffen een zeer goed en aangenaam voedsel, doch wrange en onrijpe Peeren bezwaaren de maag, en verwekken buikpijnen, winden, enz. De gewoone kleine wilde boschpeer is wrang, hard en bijna oneetbaar. Intusschen heeft dezelve ook al zijne soorten, wier eene beter, dan de andere, is. Door de cultuur deezer wilde boomen zijn zekerlijk allengskens gebooren die meenigvuldige Peerensoorten, die wij thans bezitten, en die mogelijk honderd en meer in getal zyn. Gewoonlijk verdeelt men de Peeren, naar den tijd van het jaar, waar in zij rijp worden, in Zomer, Herfst en Winterpeeren: ook, naar hun aard, in Tafel- en Stoofpeeren.

D 2

VEEN-