

## VEENBESSEN.

## DE VIJFTE CLASSE.

Zie LINNÆUS Nat. Hist. door  
HOOUTTUYN, 11de Deel  
4de St. bl. 494.

BOSCHBESSEN, met effenrandige  
omgekrulde eironde bladen en  
kruipende, draadachtige, naakte,  
takjes.

a. De eenbladige klokvormige, in  
vierenge-deelde bloemkrans, voor-  
zien met omgekrulde puntjes.  
Van achteren ziet men den klein-  
nen overblijvenden, in vieren  
verdeelden Bloemkelk.

b. Het zaadbeginzel met twee  
eenvoudige stijlen. Gewoonlyk  
vindt men maar een stijl; doch  
meermaalen speelt de Natuur in  
dit geslacht door de deelen der be-  
vruchting te vermenigvuldigen.

c. Het klein ongeveer hartvormig,  
zaad.

d. De Bes, die rood of geel is, met  
purperkleurige punten, gekroond  
met een overblijvenden Kelk.

e. Dezelfde Bes, dwars door ge-  
sneeden, op dat men zal kunnen  
zien haar vierovakkig maakzel.

GMELIN heeft deeze soort in  
zijn *Syst. Nat.* vergeeten.

BLOEITIJD. Deeze Heester bloeit  
in het midden van den Zomer. DO-  
DONÆUS en andere noemen deeze  
soort *Vaccinium Palustre*, om  
dat dezelve alleen in de moeras-  
geplanten gevonden wordt. *Oxy-*  
*coccus* word zy genoemd van we-  
gens de ongemeene zuurheid der  
vrucht.

VACCINIUM  
OXYCOCCUS.

## CLASSIS VIIva.

CONF. LINNÆI *Spec. Plant.* Ed.  
C. L. WILDENOW *Tom. 11di*  
*part. 1mæ pag. 554.*

VACCINIUM Foliis integerrimis  
revolutis, ovatis, caulibus re-  
pentibus, filiformibus, nudis.

a. Corolla monopetala, campa-  
nulata, quadrifida, laciniis  
revolutis. A postica parte ap-  
paret Perianthium minimum,  
persistens.

b. Germen cum duobus stylis sim-  
plicibus. Ordinarie unus tan-  
tum stylus adest, sed sæpius in  
hoc genere ludit natura, par-  
tes fructificationis multipli-  
cando.

c. Semen exiguum, subcorda-  
tum.

d. Bacca rubra, sive flava, cum  
punctis purpureis, calyce per-  
sistente coronata.

e. Eadem Bacca, transversim  
secta, ut appareret ipsius fa-  
brica quadrilocularis.

GMELINUS hanc speciem in suo  
*Syst. Nat.* obliis fuit.

TEMP. FLOR. Frutex hic floret  
media ætate. DONONÆUS &  
alii appellant hanc speciem, *Vac-*  
*cinium palustre*, quia tantum, in  
locis paludosis, reperitur. *Oxy-*  
*coccus* autem dicitur, propter in-  
signem baccarum aciditatem.

GEBRUIK. Deeze Besen zijn, van wegen haare overmaatige  
zuurheid, niet eetbaar; doch het zap derzelve met zuiker gekookt  
geeft eene aangename Geleij, in heete ziekten. De Zilvermee-  
den gebruiken zomwijlen het zap, om het Zilver wit te maaken.

CHA-



*Vaccinium oxycoccos* L.





