

GEWOONE ROG. SECALE CEREALE

DE IIIde CLASSE.

CLASSIS IIIa.

Zie LINNÆUS Nat. Hist. door
HOUTTUIJN, IIde Deel
13de St. bl. 392.

CONF. LINNÆI Syst. Nat. Ed.
GMELINI Tom. II di part.
I mae pag. 198.

Rog die de kanten der Kaffjes
ruuw gehaaid heeft.

SECALE Glumarum ciliis scabris.

a. De uitgedroogde wortel, zoda-
dig als dezelve, na den Oogst,
met de stoppels der halmen over-
blijft.

a. Radix exsucca, uti, post mes-
sem, cum Culmorum stipiti-
bus, remanet.

b. Een Halm met een blad en een
halfrijpe Aair.

b. Culmus, cum foliis & Arista
semimatura.

c. Een Aair, die noch voor een ge-
deelte in bloei is, gelijk blijkt,
uit de nederhangende Helmknop-
jes.

c. Arista adhuc pro parte florens,
uti ex Antheris dependentibus
patet.

d. Een gedeelte van het knobbelach-
tig zaadbed, aan het welk de zaa-
den vastgehegt zijn.

d. Portio nodosi thalami, cui se-
mina adnata sunt.

e. Een der noch niet geopende bloe-
metjes afzonderlijk.

e. Unus flosculorum, nondum
apertorum, separatim.

f. Twee geopende bloemetjes, met
de nederhangende Helmslijtjes
en Helmpjes, en met de gepluim-
de Stamperjes.

f. Duo flosculi aperti, cum Fil-
amenti Antherisque dependen-
tibus, pistillisque plumosis.

g. Het vrouwelijk gedeelte des
bloems afzonderlijk.

g. Pars floris feminina separa-
tim.

h, h. De halfrijpe Roggekorrels.

h, h. Grana secalina semimatura.

BLOEITIJD. Deze alomme voor-
komende plant; uit welks zaad ons
gemeen Roggenbrood gebakken
wordt, groeit natuurlijk in Siberien
en in 't Zuiden van Frankrijk. Zij
bloeit in 't begin van den Zomer.

TEMP. FLOR. Planta hæc fami-
liaris, e cujus semine panis se-
calinus paratur, naturaliter oc-
currit, in Siberia & Gallia meri-
dionali. Floret in ætatis prin-
cipio.

GEBRUIK. De Rog verschaft een versterkend, doch voor
veele maagen bezwaarlijk verteerbaar, voedsel. Zomwijlen wordt
de Longtettering, door enkel brij van Roggenmeel, geneezen.

Tab. I.



Secale cereale. L.



