

2171. *Lycoperdon*. Bovist.

Saccatum, cinereum, polline obscure viridi.

Von diesen Gewächsen findet man außerordentlich viele Spielarten. Sie wachsen insgesammt auf magern Boden; in Feldern, Wiesen, in wüsten Gegenden an den Alpen u. s. w.

Lycoperdon Bovista. LINN. Gewöhnlicher Bovist.

Lycoperdon aurantium. LINN. Orangen-Bovist.

Der Staub des Bovists brauset weder mit laugenartigen, noch mit sauren Salzen auf, auch färbt er den Beilchenshrup nicht grün. Das mit kochendem Wasser, gemachte Extract ist bitter. Die Alten, besonders in Deutschland, brauchten diesen Staub zur Stillung der Blutflüsse; man legte auch den ganzen Schwamm auf die Wunde. Rau bediente sich dessen häufig, rath aber, man solle ihn nicht eher von der Wunde nehmen, bis er von selbst abfiel, weil es schädlich wäre, wenn man ihn abrisse. Ich will nicht läugnen, daß er nützlich seyn könne, wenn der Blutfluß nicht beträchtlich ist (Craton empfiehlt ihn auch wider die heftigsten Blutflüsse.) In unsern Zeiten macht man nicht mehr Gebrauch davon. (Le Cat sagt, er bediene sich dieses Schwammes in kleinen Stücken bey Blutflüssen, aber nicht bey Ablösung großer Gliedmaßen. Wurz bediente sich nicht des Lerchenschwammes, sondern ebenfalls dieses Bovists. Nach Vitter hat der Staub dieses Schwammes oft die Blutflüsse schneller gestillet, als Brossards Schwamm. Bisset legt ihm ebenfalls großes Lob bey).

Die

Die Italiäner essen den jungen Bovist, und sogar die große Spielart die auf den Alpen wächst; er wird in kleine Stücken geschnitten, gebraten und mit Salz und Del gegessen. Die Schweizer machen keinen Gebrauch davon.

In England zerquetscht man den großen Bovist unter einer Presse, trocknet ihn im Ofen, nachdem das Brod herausgenommen ist, und macht daraus einen Zunderschwamm, der sich entzünden läßt, und dessen Rauch die Bienen vergiftet.

* 2177. *Lycoperdon*. Trüffeln.

Subterraneum, conglomeratum, cortice nigro exasperato.

Tubera. TOVRNEFORT. t. 333. etc.

Lycoperdon Tuber. LINN.

Ich habe sie niemals gefunden, aber gemeinlich findet man sie in großer Menge über Genouvilly. Nach Divernois giebt's auch dergleichen bey Fontaine-André.

Sie haben einen faulen Geruch, der dem menschlichen Saamen ähnlich und flüchtig ist; denn wenn man sie einem gelinden Feuer aussetzt, geben sie eben eine harnartige Feuchtigkeit. Viele Leute essen sie als Leckerbissen, und so waren sie schon den alten Römern bekannt. Man hält sie für ein zum Bey Schlaf reizendes Mittel; man schält sie ehe man sie isst, und zwar nicht eher als bis sie schwarz geworden, weil sie, wenn sie noch weiß sind, nicht schmecken. Die italiänischen Trüffeln haben mehr Geschmack und Geruch, als die, welche in Deutschland wachsen; sie riechen so stark, daß die darzu abgerichteten

richteten Hunde sie dadurch entdecken, und sie aus der Erde ziehen.

2201. *Clavaria*. Ziegenbart, Corallenschwamm.

Caule crassissimo, ramis innumeris, cespitosis, breviter dentatis.

Corallofungus flavus. VAILLANT. t. 8. f. 4.

Clavaria Coralloides. LINN.

Man findet diesen Schwamm in Menge in Fichtenwäldern und auf abhängigen Boden, bey Bern; im Sedelbach, Siechenhölzlein und Breimgarten; nach Gesners Berichte, um Gundeldingen, im Käferhölzlein, bey'm Ragenssee und um Wyl, sehr häufig auch um Ferrieres.

Dieser Schwamm wird für einen der besten unter den eßbaren Schwämmen gehalten.

2220. *Peziza*. Judasohr.

Bracteata, cespitosa, plana, sericea.

Agaricum Auriculae forma. MICHELL. p. 124. t. 66. f. 1.

Tremella auricula. LINN.

Man findet das Judasohr an verschiedenen Orten, z. B. an alten Bäumen, besonders an alten Fliederbäumen und weissen Fichten.

Es ist in den Apotheken zu haben, schmeckt wie Schwamm, wird aber wenig gebraucht. Der Ausguss davon dient zum Gurgelwasser bey der Keßlsucht. (20.) bel giebt dieses Gurgelwasser für ein sehr zuverlässiges Mittel

Mittel aus), und bey einfachen Flüssen an den Augen.
Es würde besser seyn, wenn man gar keinen Gebrauch
von dieser verdächtigen Pflanze machte. Zill sagt, man
verkaufe einen falschen Schwamm unter diesem Namen.

* 2246. *Boletus*. Morchelschwamm.

Capitula explanata laciniata.

a) *Fungoides fungiforme, crispum et varie complicatum, pediculo tenuiori non fistuloso*,
MICHELL. p. 204. t. 86. f. 9.

b) *Fungoides fungiforme crispum, laciniatum et varie complicatum, pediculo crasso, striato, ramoso et fistuloso*. MICH. ibid. f. 7.

Helvela mitra. LINN.

Ich habe diesen Schwamm an verschiedenen Orten
in Wäldern gefunden, Stäbelin hat dergleichen
zur Herbstzeit in der Garte und bey Hundsdin-
gen wachsen sehn. Es giebt auch dergleichen zu la
Ferriere.

Er ist eßbar.

2247. *Boletus*. Morchel.

Capite terete reticulato.

Die vielen Varietäten hiervon findet man in dem
Werke des Micheli. t. 85. f. 2. et 6.

Phallus esculentus. LINN.

Die Morchel erscheint im Frühjahr in den Wäldern,
und wächst gerne unter Ulmenbäumen. Man findet
welche in den Wäldern von Vervay u. s. w.

Die Morcheln haben einen feinen Geruch, wenn sie aber trocken sind, schmecken sie angenehm, und werden daher häufig gegessen. Sie sind nicht gefährlich, wofern sie nicht durch Insecten verderbt werden.

Dieser Schwamm ist nicht der Boletus der Alten.

* 2260. *Agaricum*. Wachholdergallerte.

Gelatinosum, flavorubrum, superne tuberculosum.

Fungi Juniperini. HOFMANN. Delic. flor. Altdorf.

Tremella Juniperina. LINN.

Sie wächst häufig auf den Wachholdersträuchern; ich habe sie in Emmenthal bey Vienne u. s. w. gefunden. Sträbelin fand solche bey Dornach, und Gagnebin auf den Eibenbäumen in den Gärten.

Einige brauchen das destillirte Wasser davon wider Augenkrankheiten und wider die Lähmung, welche die Sicht nach sich läßt.

* 2261. *Agaricum*.

Gelatinosum, intortum et mesenteriforme.

Nothoch luteum, Mesenterii forma. VAILLANT.
t. 14. f. 4.

Dieses Gewächs findet sich auf abgestorbenem Holze nicht selten. Man trifft dergleichen um Binningen an.

Es ist ebenfalls essbar.

* 2276. *Poly-*

* 2176. *Polyporus.*

Frondosus, cespitosus, imbricatus, spadiceus, poris albidis.

Florum fasciculus, STERBEEK. p. 269. n. 130.
t. 28. A.

Dieser Schwamm sieht sehr schön aus, ich habe ihn an verschiedenen Orten gefunden, besonders an dem Wege nach der neuen Brücke.

Gagnebin sagt, man esse denselben in Elßaß.

2284. *Polyporus.* Lerchenschwamm.

Sessilis, convexo planus, anulis discoloribus fulvis, poris ochroleucis.

Agaricus f. Fungus Laricis. C. B.

Ich habe ihn auf den Lerchenbäumen in Torogne gefunden, obgleich Bellonius sagt, er sey sehr selten, so, daß man unter zehn tausend dieser Bäume kaum auf einem einzigen dergleichen fände.

Zum medicinischen Gebrauch nimmt man gewöhnlich denjenigen, welcher im Valtelin, in Piemontesischen, im Graubünden, im Trienter und Nürnberger Gebiete gesammelt wird: Doch hat man auch einen weissen Schwamm, der purgirt, und der auf der Steineiche wächst. Lietaud sagt, daß der aus diesen Ländern nicht so wirksam sey, und daher von den Apothekern aus der Levante verschrieben werde. Sallop glaubt, der, welcher auf der Eiche wächst, sey ein tödtliches Gift.

Der unsrige verwandelt sich, wenn er trocken wird, in ein so scharfes Pulver, daß es Niesen erregt. In diesem trocknen Zustande erhält er, wie viele andere scharfe Pflanzen

Pflanzen, einen mehligten und saden Geschmack; doch läßt er auf der Zunge einen ekelhaften Geschmack zurück, den man lange Zeit nach empfindet. **Bellonius** sagt, daß, wenn man ihn sammle, ehe er reif ist, er einen giftigen Geruch verbreite; daher rath er ihn im Herbst abzunehmen und nicht im Frühjahr, wenn er noch voll Saft ist. Mit Weingeist giebt er eine rothe Tinctur, die den Geschmack des Lerchenschwammes besitzt; diese Tinctur zerrinnt im Kalten und wird einem geronnenen Oele gleich, am Feuer zerfließt sie, und macht, wie ich glaube, das harzige Extract dieses Schwammes aus, das bis zur Hälfte seines Gewichts steigt. Diese Tinctur erregt Erbrechen und ist allezeit gefährlich, (nach **Neumann** macht ein einziger Tropfen von derselben Erbrechen); das wässerige Extract ist bitter, (aber man erhält es nach **Neumanns** Beobachtungen in weit geringerer Menge,) es ist nicht so scharf, abführend, und wenn man es mit Weinstein Salz bereitet hat, so öffnet es den Leib gelind. Wenn man die geistige Tinctur destillirt, so steigt daraus eine große Menge Harz auf, das dem von der Jalappe gleicht, und sehr flüchtig ist; **Gmelin** schreibt es mit guten Gründen dem Serpentin zu.

Neumann erhielt aus einem Pfund Lerchenschwamm sechs Unzen harziges Extract, und dasjenige was übrig blieb, gab, als ers mit Wasser kochte, zwey Quentchen und zwey Scrupel wässeriges Extract. Ebenso viel Lerchenschwamm mit Wasser gekocht, gab drey Quentchen wässeriges, und das in Weingeist aufgelöste Rückbleibsel sechs Unzen harziges Extract. Beym Sammenfeuer gab er zwey Unzen Geist, ein und zwanzig Quentchen stinkendes Oel und drey Gran feuerbeständiges Salz.

Die Bewohner der Alpen haben aus Erfahrungen bemerkt, daß der Lerchenschwamm purgirt und daraus
ein

ein gewöhnliches Mittel bey Viehkrankheiten gemacht, (man braucht es, spricht Boccone, bey kranken Kühen.) In Piemont giebt man den trocknen Lerchenschwamm mit Pfeffer, um dadurch den gefährlichen Folgen zu begegnen, welche die Blutigel der Alpen denen verursachen, die sie verschlucken; diese Thiere schaden so schnell, daß man ohne diese Hülfe binnen vier und zwanzig Stunden stirbt. Dieser Schwamm macht auch Erbrechen.

Die Alten rechneten ihn zu den Purgirmitteln, und brauchten ihn, wie Rufus sagt, um die Galle abzuführen bis zu zwey Quentchen auf einmal. Doch hat schon Mesue bemerkt, daß dieses Purgirmittel nur schwach wirke. Neuere Schriftsteller, z. B. Ludewig und Neumann rathe[n] sogar den Lerchenschwamm gänzlich aus den Apotheken zu verbannen, auch braucht man ihn wenig, ausgenommen die Seide damit schwarz zu färben. Man hat ihn für ein giftbrechendes, herzstärkendes, und schweißtreibendes Mittel gehalten, deswegen, weil er in einigen Fällen die Wirkungen der aus Unvorsichtigkeit genommenen giftigen Pflanzen gehoben hat. Einige Schriftsteller haben ihn bey Versioppungen der Eingeweide, bey gichtartigen Zufällen, und wider die saure Schärfe empfohlen. Dioscorides handelt von den guten Eigenschaften dieses Mittels weitläufig.

Den sogenannten männlichen Lerchenschwamm braucht man in der Färberey, nicht aber den weiblichen, welcher sehr stark riecht. Man bedient sich dieses auch zur Scharlachfarbe. Der europäische Lerchenschwamm soll nach den Schriften der Berliner Akademie nicht von guter Beschaffenheit seyn.

2288. *Polyporus*. Feuerschwamm.

Sessilis, convexo planus, durissimus, cinereus, inferne albidus.

Fungi arborei ad ellychnia. I. B. III. p. 840.

Boletus igniarius. LINN.

Es wächst dieser Schwamm auf den Stämmen der Bäume, und man verfertiget aus selbigem den Luntenschwamm; am schicklichsten hierzu ist derjenige, so auf den Linden wächst, und alsdenn der an dem Buchbaume; der auf den Nußbäumen befindliche ist nicht so gut.

Der Luntenschwamm wird auf folgende Art gemacht. Man nimmt die Rinde, wie auch den fleischigen Theil, welcher der Oberfläche des Schwammes am nächsten ist, hinweg, das übrige schlägt man, zerschneidet es in Stücken, oder kocht es auch wohl ganz mit Lauge oder Asche, schlägt es nochmals mit dem Hammer und läßt es trocknen, alsdenn ist er zum gewöhnlichen Gebrauche, nämlich zum Feueranschlagen, fertig. Man kann denselben auch zur Stillung der Blutflüsse anwenden. Die Wundärzte bereiten ihren Schwamm etwas anders zu, nehmen aber immer diese nämliche Art dazu, und der Eischenschwamm ist von diesem nicht verschieden. Man hat sich geschmeichelt, durch die Anwendung dieses Mittels, die gefährlichen Abseugungen der Glieder vermeiden zu können, und es war desto natürlicher solches zu hoffen, da die in vielen Fällen durch die Ablösung verursachten Blutflüsse durch die Auflegung dieses Schwammes gestillet worden sind, welches berühmte Wundärzte bezeugen. Pallas empfiehlt den Schwamm des Buchbaums, und nach den *Philosophical Transactions* hat man das Blut nach einer Abseugung durch die Anwendung des in Weinkellern gefundenen Schwammes glücklich gestillet. Auch bey Wunden, wo man wegen der überhand genom-

menen

menen Fäulniß nicht unterbinden konnte, und bey Schlagaderbrüchen hat dieser Schwamm erwünschte Dienste geleistet. Zudem sagt man, daß er die Verwundungen schnell heile.

Doch muß man das Lob dieses Mittels nicht zu weit treiben, denn dieser Schwamm ist nur in so weit wirksam, als man ihn auf die Wunde legt, und alsdenn ist er unzulänglich, wenn man das Blut bey beträchtlichen Verwundungen und bey Ablösung des Fußes stillen will; auch haben berühmte Wundärzte sich noch nicht entschließen können, ihm ihr gänzliches Zutrauen zu schenken. Man hat sogar einige Beyspiele von Fällen, wo der Kranke starb, weil sich der Wundarzt zu sehr auf diesen Schwamm verlies. Daher kommt es, daß dieses Mittel seinen erlangten Beyfall allmählig wieder verlohren hat, ob es gleich bey geringern Blutflüssen gar nicht zu verachten ist. Wenn man dieses Mittel zu Heilung einer Wunde brauchen will, so bereitet man es etwas anders. Man zerschneidet es in drey oder vier Stücken, schlägt sie mit dem Hammer, bis die holzigen Fasern zu Pulver geworden, und der Schwamm weich wird, kocht ihn aber nicht in Lauge.

Nachdem Treccourt die Unzulänglichkeit dieses Schwammes, das Blut nach der Ablösung des Schenkels zu stillen, erwiesen hat, so sagt er etwas von der Zerlegung desselben, nach welcher er gefunden hat daß er keinen Vitriol enthält. Im Journal des Savans finden sich einige Zeugnisse zu Gunsten desselben. Der Herausgeber des Londner Apothekerbuchs sagt das nämliche, und Plenck versichert, es sey bey Anwendung desselben kein allzu starker Druck nothwendig. Nach Lissot besteht dieser Schwamm aus vier Theilen die sich nach und nach zeigen; erstlich aus der Haut, die man wegwerfen kann; zweytens aus dem Theile, der auf

die

die Haut folgt, der das beste ist. Man schlägt ihn mit einem Hammer bis er gelind und weich wird; man legt davon ein Stück auf offene blutende Wunden. Der darauf folgende dritte Theil kann bey Blutflüssen aus kleinen Blutgefäßen gebraucht werden, und aus dem vierten Theile kann man Pulver machen. In den Schriften der Akademie zu Bologna findet man viele Fälle, wo derselbe bey Geschwüren und langwierigen Blutflüssen nützlich gewesen ist. Ferrein gab ihn im Absud bey innern Blutflüssen.)

Man sagt auch, daß sein innerer Gebrauch in der Ruhr heilsam gewesen sey. (Nach Montet braucht man ihn zur schwarzen Farbe.)

* 2310. *Polyporus.*

Carne secedente, petiolatus, pileo ovato miniato, poris ochroleucis.

Fungus aurantius pileolo longo STERBEEK.
p. 119. t. 16. f. A.

Er ist zu Anfange des Herbstes in den Wäldern nicht selten.

Man ißt ihn und er wird nicht leicht faul.

* 2317. *Echinus.*

Ramosus, aculeis parallelis.

Agaricum esculentum, cespitosum album, multifidum et denticulatum, denticulis asperis. MICHEL. p. 172. t. 64. f. 2.

Diesen schönen Schwamm habe ich nicht gesehen, aber Scäbelin hat mir die Zeichnung von dem geschickt, den

den er auf dem Berge Muttentz gefunden hatte. Nach Gagnebin trifft man ihn zu Chaux d'Abelle an.

Er wird als eine Speise gebraucht.

2326. *Merulius*. Pfifferling, Eyerschwamm.

Flavus, oris contortis et laceris.

Fungus angulosus et veluti in lacinias dissectus.

VAILLANT. p. 60. t. II. f. 14. 15.

Agaricus cantharellus. LINN.

Man findet ihn in Fichten und Tannenwäldern häufig.

Er hat einen angenehmen pflaumenartigen Geruch. Sein Fleisch ist derb und von sehr gutem Geschmack, aber etwas scharf; ich habe ihn oft, in Brühe gekocht, gegessen, ohne davon Beschwerden zu empfinden.

2338. *Amanita*. Pfefferchwamm.

Umbilicatus, albus, lacte acri manans.

Fungus piperatus albus, crassus lacteo succo turgens. I. B. III. p. 823.

Agaricus piperatus. LINN.

Man findet ihn zeitig in allen Wäldern.

Der fleischige unter der Haut dieses Schwammes befindliche Theil ist mit einer scharfen, beynahe ägenden, Milch angefüllt, die sogar scharf bleibt und safranartig wird, wenn sie getrocknet worden: er ist dies der Fungus vesicus IX. Loesel, pag. 82. Ohngeachtet dieser Schärfe ist man ihn in Preussen, so wie auch in Russland, wo man ihn in großen Sonnen sammlet, und bis zur Fastenzeit aufbehält. Doch schreibt ihn Boyle gefährliche Zufälle zu, und auf den americanischen Inseln wächst

wächst ein solcher weißer Schwamm, der giftig und flebrig ist.

Loesel empfiehlt den Gebrauch der scharfen Milch dieses Schwammes mit dem Eibischsyrop wider den Blasenstein.

Da man überall Beyspiele von den traurigen Folgen findet, die der Genuß der Schwämme nach sich gezogen hat, so hat es mir schicklich geschienen, einige davon in diesem Artikel anzuführen, ob es gleich nicht wohl möglich ist, genau zu sagen, welcher Art von diesen Schwämmen man den großen daher entstandenen Schaden zuschreiben soll.

Alle Schwämme haben etwas rohes, ob sie gleich fast alle in wenig Tagen entstehen und reif werden: sie sind auch sehr der Fäulniß unterworfen, denn die meisten verwandeln sich in kurzer Zeit, in einen verdorbenen schwarzen giftigen Saft, dessen Gestank schon Ekel und Beängstigung verursacht. Ueberdies wohnen und nähren sich darinne unter andern Insecten auch gewisse Schnecken. Ueberhaupt pflegt man hier zu Lande unter den Schwämmen diejenigen zu essen, die einen vollen und derben Stiel haben, und enthält sich derer, die hohle Stiele haben. Die Russen aber sind nicht so sorgfältig und bedienen sich auch derjenigen, die wir für die giftigsten halten, ja sie nehmen sogar diejenigen, womit man die Fliegen tödtet. Doch wird es allzeit besser seyn, sich einer so verdächtigen Speise zu enthalten, da man auch von den besten Schwämmen schlimme Wirkungen gesehen hat.

Die meisten sind so wässerig, daß ihr fester Theil kaum den achten Theil ihres Gewichts ausmacht. In der Destillation geben sie einen gelben Geist, der dem Hirschhorngeiste ähnlich ist, auch geht ein gelbliches und ein empyreumatisches Del, ein flüchtiges trocknes und
crystal.

crystallinisches Salz über. Aus diesen Producten kann man sehn, daß die Schwämme von laugenartiger Beschaffenheit sind.

Ueberhaupt scheinen sie schwer zu verdauen zu seyn, weil man sie nur trocken gerne ißt, und weil der Magen ihre Fasern nicht gehörig auflösen kann, und zu dem das drauf getrunkne Wasser sie wie einen Schwamm aufschwellet; auch hat man gesehen, daß diese Speisen drey Tage im Magen gelegen haben, und alsdenn siengen sie erst an, schlimme Wirkungen hervorzubringen. Sie erregen fast eben die Zufälle die sonst von der Aufschwellung des Magens entstehen; z. B. Beängstigungen, Spannung um den Magen, Erbrechen, Colikschmerzen, Schlucken, Erstickungen, mit Stuhlzwang verbundenen Durchfall und Anzeigen vom Brande im Magen. Die Schärfe der Schwämme kann auch zur Erzeugung dieser Beschwerden etwas beytragen, denn sie ist so groß, daß die Lippen bloß von der Berührung entzündet werden, und Guisard hat nach dem Gebrauche deroelben bey einigen Personen mit den Harne und Stuhlgang Blut abgehen sehen. Endlich auch besitzen wenigstens einige Schwämme gewiß eine trunkenmachende Eigenschaft; daher verursachen sie Wahnkinn, Zittern, Irreden, Schlagflüsse, kalte Schweiß, und andere gefährliche Zufälle, und endlich sogar den Tod; etwas, das besonders in heißen Ländern häufiger erfolgt.

Es ist zwar wahrscheinlich genug, daß ein Theil vom Gifte der Schwämme bey'm Kochen verfliehet, indessen konnte bey so vielen bekannten Fällen weder das Del, womit man sie ißt, noch dieser Vortheil hinlänglich seyn, die schädlichen Wirkungen davon zu verhindern. Die gewisseste Hülfe ist Erbrechen oder Ausleerung durch den Stuhl. Sanctorius sagt, eine Frau sen dieser Gefahr dadurch entgangen, daß sie Citronöl

II. Theil.

2

dagegen

dagegen einnahm; aber ich habe zu diesem Mittel nicht viel Zutrauen. Andere Schriftsteller führen andere Mittel an, wodurch Personen, die durch die Schwämme vergiftet waren, gerettet worden sind. In den Schriften der Pariser Akademie wird erzählt, daß das Wasser eines Brunnens dadurch, daß es durch eine mit Schwämmen angefüllte Röhre geflossen war, vergiftet worden sey.

2344. *Amanita*. *Mayenschwamm*.

Albus, siccus, cute coriacea.

Omphalomyces nanus albidus BATTARAE.

Man findet ihn gegen das Ende des Sommers.

Er hat vor andern Schwämmen einen vorzüglich guten Geschmack. Diese Schwämme wachsen im Herbst, aber öfterer noch im Frühjahr.

* 2358. *Amanita*.

Pulvinatus, pileo cervino, lamellis albis undulatis.

Dieser Schwamm ist ganz trocken und gut zu essen.

2373. *Amanita*. *Fliegenschwamm*.

Petiole annulato, sanguineus, lamellis albis.

Mel muscarum venenosum STERBEEK. p. 214.
t. 22. A.

Agericus muscarius. LINN.

In den Wäldern Enge, Breimgarten u. s. w. ist er sehr gemein.

Dieser Schwamm ist scharf, sinkend, und kann ohne Gefahr nicht gegessen werden, denn er hat sechs Litzhauer getödtet. Auch in Kamtschatka hat er tödtlichen Wahnsinn, Schwermuth, welche bis zum Selbstmord brachten, nach

nach sich gezogen. Drey oder vier Schwämme dieser Art sind zu vertragen, steigt man aber damit bis zehn Stück, so machen sie trunken. Die Kamtschadalen bereiten mit diesem Schwamme und dem kleinen Oleander einen Liqueur, der in geringer Menge genommen, muthig macht, Erschütterungen der Nerven verursacht und freudige oder traurige Schwärmerey und Trunkenheit erzeugt. Selbst der Urin, welchen man läßt, nachdem man von diesem Schwamme gegessen, hat eine trunkenmachende Eigenschaft. Er betäubt vielmehr die Fliegen, als daß er sie tödtet, wenn sie von dem Wasser trinken, worein man ihn geweicht und zerrieben hat. Man reibt auch die Jugen der Wände und Bettgestelle damit, um die Wanzen dadurch zu tödten. Dem allen ohngeachtet sagt man, er werde von den Franzosen gegessen.

2375. *Amanita.*

Petiole annulato, pileo viridi, striato, lamellis albis.

Fungus magnus viridis. STERBEEK. p. 65. t. 5. E.

Dieser Schwamm wächst um Göttingen und Bern. Stäbelin hat mir eine Zeichnung von dem Basler gesendet; man sehe auch die Basler Merkwürdigkeiten. pag. 272.

Er ist gut zu essen.

* 2419. *Amanita.* Breitling.

Fulvus, lacte croceo.

Omphalomyces acris lateritii coloris. BATAARRA
t. 16. H.

Agaricus deliciosus *

Agaricus lactifluus. LINN.

Er wächst häufig in den Wäldern, aber nicht immer an eben demselben Orte. Man findet ihn in dem
2 2 Walde

Walde Bremgarten, nicht weit von der Papiermühle.

Er ist essbar. Wegen seines starken Geschmacks heißt er auch Reizkr.

* 2430. *Amanita*.

Flavus, vulvatus, annulo latissimo.

Fungus planus orbicularis aureus. MICHEL. pag. 186. t. 77. f. 1.

Ich habe ihn noch nicht in der Schweiz angetroffen, aber Stachelin fand ihn zu Münchenstein, und hat mir eine Zeichnung davon geschickt.

Man rechnet ihn dem Geschmack nach zu den angenehmsten Schwämmen. Wahrscheinlich ist dies der *Boletus* des Plinius, welcher nach dieses Schriftstellers Versicherung in einer Bekleidung erzeugt wird, womit er wie das Gelbe eines Eyes mit den Weißen umgeben ist.

* 2438. *Amanita*.

Man findet ihn um Basel im Bräuderhölzlein und um Bern.

Wahrscheinlich gehört er zu den essbaren Schwämmen.

2443. *Amanita*. Egegürtel.

Petiole annulato, pileo campaniformi, albido, laminiis roseis.

Fungus campestris, albus superne, inferne rubens
l. B. III. p. 824.

Agaricus campestris. LINN.

Er wächst an trockenen Orten auf dem Rasen, z. B. um Sisseck; nach Gagnebin zu la Serrière, wie auch häufig um Göttingen.

Er

Er hat einen faden Geschmack, der sich durchs Kochen verbessern läßt, und für eine sehr angenehme Speise gehalten wird. Von diesem Schwamme haben die Pflanzgen dieser Klasse den Namen Champignon erhalten.

* 1455. *Amanita*. Violenschwamm.

Violaceus, petiolo bulboso, annulato, pileo plano.

Fungus ceruleus maior. BVXBVM. Centur.
IV. t. 9.

Agaricus violaceus. LINN.

Dieser Schwamm ist in dem Siechenhölzlein, Sedelbach, Burgdorphölzlein, u. s. w. gar nicht selten.

Ende des zweeten Theils.