

Drittes Buch.

Naturhistorische und physikalische Beschreibung des Fürstenthumes Pyrmont.

Cap. XXIII.

Vielfältigkeit des naturhistorischen und physikalischen
Interesses von Pyrmont.

§. 106.

Die unerschöpfliche Natur scheint Pyrmont und dessen Umgegend, durch die Fülle und Mannfaltigkeit ihrer Gaben, vorzüglich ausgezeichnet zu haben. Für alle Zweige der Naturkunde gewährt diese Gegend ein viel höheres Interesse, als man es bei einem so kleinen Lande erwarten sollte. Erde, Luft und Wasser sind reichlich mit den Kindern des Faunus und der Flora ausgestattet; aber vorzüglich, in ihren Abwechslungen und ihrem Reichthume, merkwürdig und wunderbar erscheint die Erde selbst. Hier schöpft man das schwarze unbiegsame Eisen, als ein flüssiges Metall, aus dem krystallhellen Born; dort sprudelt eine salzgeschwängerte Quelle aus der Erde hervor, hier droht, in einer Grotte, ein unsichtbarer Geist dem kühn Herzutretenden Erstickung und Tod; dort sperrt die Erde ihre Schlünde auf, und zeuget von gewaltigen Umwälzungen, die in ihr vorgingen: und alle diese merkwürdigen Naturerscheinungen fast gleichsam Ein Sammelplatz in sich.

Welch' eine manchfaltige Zerstreuung muß hierin nicht Jeder finden! Die Beschäftigung mit diesen Gegenständen ist daher um so mehr auch den Curgästen anzuempfehlen, als sie zugleich für Geist und Herz genussreich ist, Belehrung und Ermunterung gewähret, und also auch auf den Körper die wohlthätigsten und heilsamsten Wirkungen äußern kann, mithin bei dem Gebrauche der Cur eine der zweckmäßigsten Unterhaltungen darbietet.

Cap. XXIV.

Fauna von Pyrmont.

§. 107.

Bei den vielen Wäldungen, Bergen und Sümpfen, welche unserer Gegend eigen sind, kann es ihr auch nicht an lebendigen Bewohnern derselben fehlen. Unsere Wälder hatten ehemals einen Ueberfluß an Wild und Raubthieren, die dann den Aeckern und Gärten manchmal beträchtlichen Schaden zufügten; allein durch eine fleißige Jagd hat dieß, seit einer Reihe von Jahren, bedeutend abgenommen. Wilde Schweine und alles zur hohen Jagd gehörige Wild trifft man kaum mehr an. Rehe sind schon selten, halten sich indeß hier noch als Standwild auf. An Hasen liefert die Jagd reiche Ausbeute. Füchse werden jährlich noch viele geschossen. Auch Dachse halten sich an den Abhängen unserer Berge auf, wo diese von Dammerde und Mergelgrus bedeckt sind. Im Herbst 1817 wurden in der Langen Grund einige Gänge aufgegraben, und ein Dachs von 44 Pfund Schwere hervorgezogen. An der Emmer lassen sich zuweilen Fischottern (*Lutra vulgaris*) sehen, von 5 bis

6 Fuß Länge. Der Steinmarder (*Mustela Foina*) ist schon nicht mehr ganz häufig bei uns, aber doch seltener noch der Baummarder (*M. Martes*); das große (*M. erminea*) und das kleine oder gemeine Wiesel (*M. vulgaris*) sind auch wol schon in Rattenfallen gefangen angetroffen worden.

Von den kleineren einheimischen Säugethieren verdienen die Spitzmäuse noch die besondere Aufmerksamkeit des Naturforschers. Die gemeine Spitzmaus (*Sorex araneus*, L.) kommt in Ställen vor; die Faserspitzmaus (*Crocidura leucodon*, Wagl., *Sorex leucodon* Herrm.) an kleinen Wassergräben, in Gärten an der Neustadt; die Wasserspitzmaus (*Crossopus fodiens*, Wagl.) in der Nähe des Buntensandsteinbruches bei der Saline. Die Mollmaus oder der Siebenschläfer (*Myoxus glis*, Schreb.) ist hier zwar nicht eigentlich einheimisch, jedoch am Königsberge, bei Holzhausen und Schwabenberg angetroffen und eingefangen worden. Selten kommt auch die große Haselmaus (*Myoxus nitela*, Schreb.) vor; die kleine Haselmaus (*Myoxus muscardinus*) ist schon mehrmals, in ihrem Winterschlaf, in hohlen Baumstämmen, zumal am Hermansberge, aufgefunden worden. Die hier sogenannte Ritt- oder Hamstermaus (*Hypudaeus arvalis*) thut nicht selten in Gärten und Feldern Schaden.

§. 108.

Nicht weniger Befriedigung wird hier der Vogelfreier finden. Von den Sangvögeln ist unserm Thale besonders der Nachtigall gewogen, der sich nach Mitte Aprils einzustellen pflegt. Sein lieblicher Gesang ertönt im Frühjahr

Menke, Pyrmont. 2. Aufl.

aus allen Büschen. Auch Grasmücken, Buchfinken, Stieglitz und Lerchen sind hier einheimisch. Der Dompfaff nistet häufig in unseren Wäldern. Die Bauern des oberen Fürstenthumes fangen deren viele ein, lehren sie zu, und bringen sie, bei Dutzenden, nach großen Städten (Hamburg u. s. w.), wo sie nicht selten mit Golde bezahlt werden.

An nutzbaren Vögeln macht man hier Jagd auf Kerpzhühner, Waldschneppen, Heerschnepfen u. a. Letztere, welche auch gemeine Becassine und, wegen ihrer besonderen Stimme, auch Himmelsziege (*Scolopax Gallinago*) genannt wird, läßt sich häufig bei uns hören; selten wird die Moorschnepfe oder kleine Becassine (*Scolopax Gallinula*) geschossen. Seltener kommt der Kybix vor, weil uns große Heiden und Torfebenen fehlen. Die Wachtel ist nicht gar gemein. Wilde Tauben, sowohl die Holz- als Ringtaube (*Columba Oenas* und *Palumbus*) sind unseren Wäldern gar nicht fremd. Der eigentliche Krametsvogel (*Turdus pilaris*) fällt hier selten ein; wahrscheinlich weil seine Hauptnahrung, die Wachholderbeere, bei uns nur sparsam wächst. Statt dessen speiset man hier, wie in anderen Gegenden, Drosselarten, die bei uns gemeiner sind, namentlich die Zipdrossel oder Blutdrossel (*T. musicus*), Weindrossel (*T. iliacus*)⁹⁶), die Amsel (*T. merula*), die Meer- oder Schildamsel (*T. torquatus*), wovon die Weindrossel und Meeramsel nur Strichvögel sind. Von Schwimmvögeln

⁹⁶) Die deutschen Namen sind die hier zu Lande gebräuchlichen; die lateinischen sind die, unter welchen sie im Systeme vorkommen.

wird, unter den wilden Enten, zuweilen auch die kleinere Kriekente (*Anas Crecca*), seltener die Löffelente (*An. clypeata*), die Schallente (*An. Clangula*) und Spießente (*An. acuta*), die Reiherente (*An. fuligula*), die Ringelgans (*An. Bernicla*) geschossen. Wilde Gänse werden selten schußmäßig, wenn sie nicht ermattet oder verirrt herunterkommen. Obgleich unsere Fischteiche viele Sumpfvögel herbeiziehen, nistet doch der Storch gar nicht oder nur höchst selten auf den Dächern unserer Bauernhäuser. Fischreiher (*Ardea vulgaris*, Bechst.) aber lassen sich hier täglich erblicken; selten, bei den Fischteichen, der große Rohrdommel (*Ardea stellaris*). Von Raubvögeln erscheint nicht ganz selten, als ein gefährlicher Feind unserer Karpfenteiche, der Fischgeier, Fischaar oder Fischhabicht (*Falco Haliaëtus*); der Mäusegeier, Mäusebussard (*F. Buteo*) ist hier gemein, auch der weißliche Bussard (*Falco albidus*) wird hier zuweilen gesehen, öfters der Hühnerhabicht (*Falco palumbarius*).

Von solchen Vögeln die nicht überall gemein sind, haben wir ferner: Buntspechte (*Picus maior* und *minor*), den Grünspecht (*P. viridis*), den Wendehals (*Jynx Torquilla*), Wiedehopf, Baumläufer (*Certhia familiaris*), die Schwanzmeise oder den Teufelsbolzen (*Parus caudatus*), Blaumeise (*P. coeruleus*), den Eisvogel (*Alcedo Ispida*), den Holzheher (*Corvus Glandarius*), der sich zuweilen in den Krammetsvogelschlingen erbroffelt, wenn er die Beeren naschen will; an den Teichen und an der Emmer den kleinen Taucher (*Podiceps minor*, Lath.), Rallus aquaticus, Gallinula Porzana, Bechst. u. m. a.

§. 109.

Von Amphibien finden sich hier, nicht ganz selten, der Laubfrosch, in kleinen stehenden Wässern die Feuerkröte (*Bombinator igneus*, Merr.); der Brunnenröhrling (*Triton igneus*, Laur.) und der, auch im Erdsalle lebende, Sumpfröhrling oder Wassersalamander (*Triton cristatus*, Laur.) gar nicht selten. Der Erdsalamander kriecht auf dem Königsberge und bei der Gashöhle, zumal nach Gewittern, hervor. Die gemeine oder graue Eidechse trifft man, manchfaltig in ihrer zum Theile grauen Farbe und ihrer Zeichnung variirend, auf sonnigen Anhöhen an. Ein Exemplar dieser Art mit zweitheiligem Schwanz, eine merkwürdige Monstruosität, das ich im Mai 1831 am Büsseberge einsang, wird gegenwärtig im zoologischen Museo zu Berlin aufbewahret. Von Schlangen sind nur die unschädliche Ringelnatter (*Coluber Natrix*) und die Blindschleiche (*Anguis fragilis*) einheimisch.

§. 110.

An Fischen haben wir einen großen Reichthum. Von solchen, die in der Emmer vorkommen, ist der vornehmste die Forelle. Sowol die gemeine oder Steinforelle (*Salmo fario*), als die Lachsforelle (*S. Trutta*) wird in der Emmer, mit Netz oder Angeln gefangen. Im Aeschenbache, am Fuße des Hermansberges, werfen sie ihre Brut ab. Sie werden auch in Teichen geheget. Die Lachsforelle erreicht bei uns 7 Pfund Schwere. An Güte folgt der Forelle die Aesche (*S. Thymallus*); häufig in der Emmer, wird nicht in die Teiche gesetzt. Der Hecht und

Barsch (*Perca fluviatilis*), der Aal, die Schleie (*Cyprinus Tinca*), das Rothauge, hier Roddau genannt (*Cypr. rutilus*), der Weißfisch, hier auch Emmerkarpfe genannt (*Cypr. Alburnus*), Kühling (*Cypr. Idus*) und Gründling, hier Grimpe genannt (*Cypr. Gobio*), werden häufig in der Emmer gefangen; häufig auch der kostbare, kleine Schmerling (*Cobitis barbatula*). Die Ellrige, bei uns Erlitze oder Maigrese (*Cypr. Phoxinus*) und die kleine Pricke (*Petromyzon Planeri*), die im Mai, in der Emmer, unter Steinen laicht, braucht man meist nur als Köder für Forellen und Barsche. Karpfen und Karauschen sind in der Emmer nicht gar häufig. Auch die Kaulquappe (*Cottus Gobio*) und der Stecherbock (*Gasterosteus aculeatus*) sind in der Emmer, letzter auch im Mühlenbache zu Hause.

In den Erdfällen kommen Hechte bis zu 18 bis 24 Pfunden, Karpfen zu 12 bis 15 Pfund Schwere, auch Schleien, ungemein viele Barsche und Rothaugen vor. Im kleinsten Erdfalle ward, im August 1827, an der Schnur, ein Aal gefangen, der 9 Pfund wog. Der Pottthardsteich ist besonders an Hechten reich. Der Schloßgraben ist sehr reich an Fischen, zumal an Karpfen, deren mehre gegen 30 Jahre alt, gegen 20 Pfund schwer und ungemein groß sind; aber auch an Aalen, Karauschen, Barschen und Schleien.

In Fischteichen hegt man hier noch insbesondere Karpfen, Karauschen, Barsche und Hechte. Von den Karpfen hat man hier vier Spielarten: den gemeinen oder Flußkarpfen, den großschuppigen Karpfen, der ganz, aber mit ungewöhnlich großen Schuppen bedeckt ist (der eigentliche Spiegelskarpfe), den sogenannten Spiegel-

Karpfen, der auf dem Rücken nur ein Paar Reihen großer Schuppen hat, unten aber nackt ist (eigentlicher Lederkarpfe), und den Steinkarpfen, eine Bastardart, die in Teichen entsteht, in welchen Karpfen und Karauschen zusammen laichen.

§. 111.

Auch der Entomolog wird in unserer Gegend vielfältige Gelegenheit finden, seine Kenntnisse, Erfahrungen und Sammlungen zu bereichern. Von Crustenthieren kommt in der Emmer der Flußkrebß (*Astacus fluviatilis*, F.), in allen fließenden Wassern an Wasserpflanzen die Flußgarnele (*Gammarus pulex*, F.), unter Steinen *Armadillo vulgaris* und *pulchellus* vor.

Von seltneren Arten aus der zahlreichen Classe der Insecten fand ich noch kürzlich, an Coleopteren: *Scarabaeus mobilicornis*, *Cerambyx heros* und *cerdo*, *Elater pectinicornis*, *Cantharis biguttata*; todt, in der Gashöhle, fand ich *Silpha atrata*, *Carabus cancellatus*, Illig. Im großen Erdfalle leben mehre Arten Schwimmtäfer. Das Johanniswürmchen (*Lampyrus noctiluca*) kommt häufig vor. Von Schaben ist, leider, seit anderthalb Jahren, *Blatta germanica*, zuerst im Posthause, einheimisch geworden. Auch das Heimchen (*Acheta domestica*) ist einheimisch, und die Maulwurfsgrille, hier Erdkrebs genannt (*Gryllotalpa vulgaris*), kommt, im Herbst, in Gärten und auf Kartoffelfeldern vor. Die Florsfliege (*Hemerobius perla*) in Häusern; die Larven verschiedener Phryganeen, in ihren fremdartigen Hülßen, häufig an Steinen und Wasserpflanzen, im süßen Wasser. Eine Blatt-

laus, deren Leib schwarz, selten roth, deren rothe Farbe der Beine und Fühlhörner sich nach dem Absterben des Insects, erst in eine hellbraune, dann, bei eintretender Fäulniß, in eine hellgrüne verwandelt (*Aphis versicolor*)⁹⁷⁾, fand ich, im Januar 1818, an faulenden Hainbuchenblättern, in der Gashöhle und hielt sie für neu. An zweiflügeligen Insecten und Schmetterlingen giebt's auch hier viele hübsche Arten. *Iulus terrester* und *Polydesmus complanatus*, fand ich beide todt in der Gashöhle. Einen kleinen *Ixodes* fand ich am Schultergelenk der grauen Eidechse. In Teichwassern kommt *Hydrachna cruenta*, Müll., in der Mantelhöhle der Teichmuschel *Limnochares anodontae*, Pfeiff. vor.

Unter den Würmern (*Annulata*) wird der sogenannte deutsche Blutegel (*Sanguisuga officinalis*, Sav.) leider nur sehr sparsam bei uns angetroffen.

§. 112.

Von Weichthieren haben wir, außer den überall in Deutschland gemeinen Arten, an nackten Schnecken: *Arion melanocephalus*, Fér. (wozu *Limax tenellus*, Müll. und *L. flavus*, Nilss. gehören), *Ar. subfuscus*, Fér., *Ar. hortensis*, Fér., *Limax marginatus*, Müll., *L. fuscus*, Müll., *L. aureus*, Gm., die sämmtlich, bei nassem Wetter, auf dem Königsberge u. anzutreffen sind. Von Landschnecken findet sich *Helix arbustorum*, Müll., als Blendling, *H. pygmaea*, Dr. am Königsberge, unter

⁹⁷⁾ *Aphis versicolor*, aptera, corpore nigro, capite antennis pedibusque rufis, tuberculo abdomines rufescente.

abgefallenem Eichenlaube, *H. nitidosa*, Fér. ebendasselbst, unter Steinen, *Bulimus montanus*, Dr. und *B. obscurus*, Dr. in Wäldern. *B. radiatus*, Br. und *Clausilia ventricosa* Dr. (*Cl. tumida*, m., olim) kommen bei uns nicht vor; dagegen, nicht selten, *Balea fragilis*, Gray, *Clausilia similis*, Chrptr und *Cl. plicata*, Dr., beide auch als Blendlinge; am häufigsten *Cl. obtusa*, Pf. und *Cl. parva*, Stud.; Pupa *Menkeana*, Pf., bis jetzt hier noch nicht frisch; *Vertigo pygmaea*, Fér.; *Carychium lineatum*, Fér., selten; *Cyclostoma elegans*, Dr., häufig, doch nur am Büsseberge, gegen Thal über. Von Sumpfschnecken ist bei uns *Ancylus lacustris* selten, *Anc. fluviatilis* gemein; eben so *Planorbis spirorbis*, Müll., aber weder *Pl. corneus* noch *Pl. carinatus* werden bei uns angetroffen. *Pl. albus*, Müll. kommt in Gesellschaft mit *Limnaeus stagnalis*, *Paludina impura* und *Valvata piscinalis* häufig im großen Erdfalle u. vor. Von Süßwassermuscheln wird in unsern Fischteichen *Anodonta cygnea*, zuweilen mit zahnendem Schloßrande (*An. dentiens*, m. olim), im Radfieber Teiche und Wörmkebachs *An. ponderosa*, Pf. angetroffen, in der Emmer *Unio rugatus*, m., *Cyclas calyculata* und *C. cornea*, Lam. (nicht Dr.) im großen Erdfalle, *Pisidium obliquum* und *fontinale* in der Emmer und in Wassergräben.

In unseren stehenden Wässern kommen auch *Armpolyten* vor. Nach Frühjahrsüberschwemmungen habe ich, in dem Auswurfe der Emmer, Bruchstücke der *Spongilla ramosa*, Lam. angetroffen.

Flora von Pyrmont.

§. 113.

Auch mit Florenz Gaben ist das Fürstenthum Pyrmont und die Umgegend sehr reich ausgestattet. Die Vegetation gedeihet darin vortrefflich; davon zeuget schon der üppige Baumwuchs, die schönen Alleen von Linden, Rosskastanien, italienischen Pappeln und Obstbäumen im Thale, die alten und starken Buchen an den Bergen. Aber auch freiwillig bringt der Boden manche Gewächse hervor, die für die geographische Lage desselben als Seltenheit angesehen werden können. Schon Seip⁹⁸⁾ bemerkte dieß, und Ehrhart⁹⁹⁾ und Schrader¹⁰⁰⁾ machten zuerst einige seltene Pflanzen der Flora pyrmontana bemerklich. Der Grund dieses Reichthumes an Gewächsen liegt in der Abwechslung und Mannfaltigkeit des Bodens, da wir Berge und Thal, Wälder und ebene Plätze, trockenes, sumpfiges und torfiges, von mancherlei Quellen, Bächen und einem Flusse getränktes Erdreich haben.

Eigentliche Sandpflanzen, als *Arundo arenaria*, *Carex arenaria* u. a., und eigentliche Torf- und Moorpflanzen, als *Anthericum Ossifragum*, *Andromeda polifolia*, *Myrica Gale* u. a. kommen jedoch nicht bei uns vor. So ist es auch sonderbar, daß an unserm Salzwerke keine von

⁹⁸⁾ Seip Besch. d. Pyrm. Mineralw. S. 40.

⁹⁹⁾ Ehrhart Beitr. zur Naturk. Bd. 5 S. 107.

¹⁰⁰⁾ *Spicilegium florae germanicae*. Auct. Henr. Ad. Schrader. Hannover., 1794. 8.

den eigentlichen salzigen Pflanzen vorkommt, welche sonst anderen Salinen eigenthümlich zu sein pflegen, wie *Salicornia herbacea*, *Poa distans*, *Glaux maritima*, *Chenopodium maritimum*, *Aster Tripolium* u. a., die in der Nähe unserer Salzquellen und Grabirhäuser nicht wachsen; wahrscheinlich weil keine sumpfige, weiche Wiesen dabei befindlich sind, indem der bunte Sandstein zu nahe unter der Oberfläche liegt, vielleicht auch wegen des Gehaltes des Salzwassers an Kohlensäure. Eine Pflanze, die hier als Salzpflanze angesehen werden kann, da sie sich in Menge nahe an den Grabirhäusern aufhält, und sowol dem beständigen Herabträufeln des Salzwassers ausgesetzt ist, als in dem, von diesem Wasser durchdrungenen Boden gut gedeihet, ist *Atriplex patula*, L.; aber auch *Zannichellia palustris*, L. kann hier als Salzpflanze gelten, da sie in stehendem salzigen Wasser, in der Nähe der Soolquelle, üppig gedeihet, blühet und Früchte trägt (15 Nov. 1838), und dichte Rasen bildet.

§. 114.

Einige der seltneren und interessanteren phanerogamischen Pflanzen, die ich in der Umgegend Pyrmonts bisher gelegentlich aufgefunden habe, sind folgende: *Circaea alpina*, L., *C. intermedia*, Ehrh., *Veronica montana*, L., *Scirpus tenuis*, Schreb., *Alopecurus fulvus*, Sm., *Calamagrostis epigeios*, Roth, *Holcus avenaceus*, Scop., *H. mollis* L., *Poa serotina* Ehrh., *Triodia decumbens*, Pal. Beauv., *Festuca bromoides*, L., *F. Myrus*, L., *F. elatior*, Curt., *Fest. loliacea*, Huds. *Lolium perenne ramosum*. *Alchemilla montana*, W., *Physalis Alkekengi* L., die man hier, mit ihren reifen rothen Früchten,

in die Herntefränze bindet; die giftige aber zugleich heilsame *Atropa Belladonna*, L.; ferner *Impatiens Noli tangere*, L., die blauen *Gentiana cruciata*, L., *G. Amarella*, L. und *ciliata*, L.; die schöne *Parnassia palustris*, L., *Polygonum nodosum*, Pers., *Rosa corymbifera* Borkh. (*R. caucasica* Bieberst.), *R. umbellata*, Leers, *Rubus Menkei*, Weihe, *Ranunculus lanuginosus*, L., *R. auricomus*, L., *Betonica stricta*, Ait., *Lathraea squamaria*, L., *Malva moschata*, L., *M. alcea*, L., *Trifolium fragiferum*, L., *Hypericum dubium*, Leers, *H. pulcrum*, L., *Apargia crispa*, W., *Thrinicia hirta*, R., *Hieracium praealtum*, Vill. (*H. florentinum quorund.*), *H. Lachenalii*, Gmel., *H. sylvaticum*, Gouan, mehre *Crepides*, *Inula salicina*, L., *Senecio tenuifolius*, Murr., *Epipactis atrorubens*, Schult., *E. microphylla*, Sw., *Limodorum Epipogium*, Sw., *Cypripedium calceolus*, L., *Carex paniculata*, L. *C. distans*, L., *C. ampullacea*, Good.

§. 115.

Von kryptogamischen Gewächsen kann der Botaniker hier ebenfalls viele seltne und merkwürdige Arten einsammeln. Hier findet sich *Leskea attenuata*, Hedw., *Buxbaumia aphylla*, L., *Anthoceros punctatus*, L., *Riccia glauca*, L., *Parmelia corrugata*, Ach. Der berühmte dänische Naturforscher D. Fr. Müller entdeckte, bei seinem Aufenthalte in Pyrmont, 1777, vier neue Wasserfaden-Arten, die er *Conferva punctalis*, *C. pectinalis* (*Fragilaria pectinalis*, Lyngb.), *C. serpentina* und *C. saccata* nannte ¹⁾. Hier findet sich ferner: *Solenia intestinalis*,

¹⁾ De confervis palustribus oculo nudo invisibilibus; auct.

Ag., in der Emmer, bei Thal; *Sphaeria flavo-virens*, Pers., *Sph. Ceratosperma*, P., *Lycoperdon excipuli-forme*, Scop., *L. hyemale* Bull., der sonderbare *Phallus impudicus*, L., der Fliegenchwamm (*Amanita muscaria*, Pers.); der Hauschwamm (*Merulius destruens*, P.) hat schon mehrmals, am Bauholze einzelner Gebäude, Verwüstungen angerichtet; mehre seltne Blätter-, Ader-, Labyrinth- und Löcherpilze (*Agaricus*, *Merulius*, *Daedalea*, *Boletus*): *Boletus rubeolaris*, Sow., *B. melanopus* Pers., *B. giganteus*, Pers. an alten Linden in der großen Alee, *B. citrinus*, Plan., *Helvella sulcata*, Afzel., *Peziza coccinea*, Jacq.; aber auch viele nützliche und genießbare, die hier im Sommer, fleißig für die Küche eingesammelt und getrocknet werden, z. B. der sogenannte Cham-pignon (*Agaricus Prat. campestris*, L.), der Pfefferchwamm (*Ag. piperatus*, L.), der gelbe Pfifferling, hier auch, wegen der Farbe genannt, Eier- oder Butterchwamm (*Merulius Cantharellus*, P.), *Boletus edulis*, die Morchel (*Morchella esculenta*, P.), der Ziegenbart (*Clavaria flava*, P.), *Clav. pistillaris* Batsch.; Trüffeln (*Tuber cibarium*, Sibth.) habe ich, mit Hülfe eines abgerichteten Hundes, in der Buchenwaldung der Hesselgrund aufgefunden. — *Tylostoma brumale*, P., im Bosket.

§. 116.

Wenn diese einheimischen Gewächse nicht genügen, der wird in den Lustgebüschchen manche Ausbeute für botanisch

O. Fr. Müller. in den: Nov. Act. Acad. Scient. imper. Petropolit. Tom. 3. Petropoli, 1788. 4. S. 89 bis 98.

Studien, an fremden Gewächsen, finden. Auch im Schloßgarten und im Treibhause desselben werden manche exotische Pflanzen, theils ihrer Blüthe, theils ihrer Seltenheit wegen, cultivirt, und man kann davon, mehrentheils, durch den Hofgärtner, Exemplare erhalten. Aber eine reichlichere Ausbeute an exotischen Gewächsen kann der Botaniker in den benachbarten botanischen Gärten zu Schwöbber und Ohr finden, wo man von Florenz Schätzen aus allen Welttheilen versammelt siehet, und diese unter Anweisung der Gartenmeister in Augenschein nehmen kann.

Cap. XXVI.

Geognostische und oryktognostische Beschreibung des Fürstenthumes Pyrmont ²⁾.

§. 117.

Die Gebirgsmasse, welche die Berge und Thäler des Fürstenthumes, in einem Umkreise von einigen Meilen, bilden, gehören sämmtlich den Flözgebirgen und angeschwemmten Erdlagern an.

Die Flözgebirge constituiren ihren hauptsächlichsten Bestandtheil. Sie sind sonder Zweifel durchgängig aus den verschiedenzeitigen Niederschlägen hervorgegangen, welche bei jener großen Revolution der Erdoberfläche, durch lange und wiederholte, mehr oder minder allgemeine Ueberschwemmungen, die bei uns, zum Theile nach dem Norden ihren Rückfluß hatten, Statt gefunden haben. Es

²⁾ Vergl. meinen: Versuch einer näheren geol. geogn. u. oryktogn. Erörterung des Fürstenthums Pyrmont; in: von Leonhard's Zeitschr. f. Mineralogie, 1825 Nr. 7. 8. 9 und 1826 Nr. 5.

fielen, während derselben, aus dem Wasser, aufgelösete oder fortgerissene, mechanisch darin suspendirte Bestandtheile zu Boden, und nahmen eine feste Consistenz an. Diese bildeten, in verschiedenzeitigen Katastrophen, verschiedenartige Niederschläge; die Niederschläge Gebirgslager, und die Gebirgslager constituirten die Flözformationen. Das als Unterlage und Träger der Flözlager dienende Gebirge heißt Urgebirge.

Das Wasser verlief sich, während der Entstehung jener Niederschläge, allmählig, und sank immer tiefer, berührte endlich die hervorragenden festen Massen, auch die letzten Flözgebilde nicht mehr, und beschränkte sich auf die Thäler, endlich nur auf die Betten der Flüsse und Bäche, die es in das Meer zurückführen. Die anfangs noch übermäßige Wasserfluth der reißenden Ströme nahm immer mehr ab, bis die Ströme ganz in ihre jetzigen Ufer zurückgetreten waren. So standen dann die vorher noch überschwemmten Berge und Anhöhen, mit ihren Abhängen und Niederungen, die sich während der wogenden Strömungen und Rückströmungen der überschwemmenden Wasserfluthen gebildet hatten, als festes Land, vollendet da.

Es mögen viele Jahre, ja vielleicht Jahrhunderte, zur Vollbringung dieses großen mechanischen und chemischen Processes und, sogar, zur Vollendung und Erhärtung der einzelnen großen Niederschläge, viele Jahre erforderlich gewesen sein.

Die Entstehung der angeschwemmten Erdlager mag eben so wol weniger langwierig gewesen sein, als die Zeit ihrer Entstehung weniger fern liegt; und doch muß auch selbst diese gewiß sehr weit hinausgeschrieben werden, da man gerade in diesen angeschwemmten Lagern die Knochen

vierfüßiger Thiere antrifft, die seit Jahrtausenden in Europa nicht einheimisch gewesen sein können.

§. 118.

Die Bildung unserer Gebirgsmassen auf nassem Wege ist unbestreitbar. Für den Gang der Entstehung der Erdoberfläche unserer Gegend und ihrer Unebenheiten lassen sich drei Hauptperioden annehmen. In der ersten bildeten sich die verschiedenen, über einander gelagerten Flözformationen; in der zweiten traten, mit Abnahme der großen Wassermasse, die Berge allmählig aus dieser hervor; die Wasserströmung erfüllte noch die Thäler und gab diesen Richtung und Ausdehnung; hie und da blieben noch große Becken mit Meereswasser, und dieses mit seinen eigenthümlichen organischen Geschöpfen erfüllt, zurück, die erst später Abzug fanden und die tertiären Bildungen zurückließen; die dritte beginnt mit Beschränkung der Wasser auf ihre Stromufer, von welchen aus nur noch kleinere Ueberschwemmungen statt hatten, die durch Stagnation Gelegenheit zur Erzeugung und zum Fortgange der Vegetation gaben. In der ersten prädominirt die Kiesel-, dann die Kalkerde; in der zweiten Kalk und Thon; in der dritten die Befruchtung des Bodens, die Metamorphose vegetabilischer Stoffe in Torf- und Dammerde, und endlich der Absatz aus einzelnen mineralischen Quellen, die aus der Tiefe Bestandtheile heraufführen, welche sie bei dem Zutritte der Atmosphäre fallen lassen.

§. 119.

Die Gebirgszüge des Fürstenthumes ziehen sich, der von den Wasserströmungen veranlaßten Thalbildung zufolge,

nach den verschiedenen Richtungen, welche die drei, das Hauptthal einschließenden, Schenkel bilden ³⁾). Vorherrschend ist die Richtung von SW. nach ND., in welcher sie, mit dem Flußgebiete der Emmer, die Weser erreichen, die, nordwärts strömend, bei der Porta westphalica das große von D. nach W. ziehende Gebirgsjoch durchschneidet, das sich, wie ein riesenhafter Damm, vor der nordwestlichen Ebene ausbreitet.

Das Thal selbst erscheint, orographisch betrachtet, beinahe ringsum, gleichsam von einer doppelten Reihe Berge umgeben; die innere Reihe bilden die das Hauptthal selbst begrenzenden Höhen, die auswärts von einem unterbrochenen Kranze oder Gürtel höherer Berge, deren Repräsentant westwärts der Winterberg, südwärts das Schwaltenberger Waldgebirge, ostwärts der Scharpenberg ist, umgeben sind. Der innere Kranz hat eine Höhe von 8 bis 900, der äußere von 11 bis 1300 Fuß über dem Meere.

§. 120.

Ungeachtet so vieler Zeugnisse für den neptunischen Ursprung, hat man doch auch wol früherhin das Pyrmonter Thal und seine Umgegend für vulcanisch angesprochen, und das Thal selbst für den Krater eines erloschenen feuerspeienden Berges, den Kalktuff für die Schlacke, die derselbe ausgeworfen habe, und das, an mehreren Stellen, zumal in der Gashöhle, aus der Erde hervorstehende, kohlensaure Gas, für Schwefeldunst, der aus der tiefen Werkstätte des Vulcans heraufdringe, angesehen; oder auch vermuthet, dieses Thal sei einst durch einen großen Erdsfall, der vielleicht durch

³⁾ Vergl. §. 51.

ein Erdbeben veranlaßt worden sei, entstanden. Ganz besonders gab die Entstehung der Erdfälle Veranlassung, auf vulcanische Spuren zu leiten. De Lüc, der selber mehrmals unsere Gegend durchreiset hat, nahm an, daß sie, mit ihrem Kalk- und Sandsteine, einen ehemaligen Vulcan bedecke, daß unsere Erdfälle eingestürzte Gewölbe eines vulcanischen Ganges sein könnten, und daß, mindestens unsere Mineralquellen, durch einen Vulcan mineralisirt worden seien ⁴⁾. Es ist, in der That, nicht unwahrscheinlich, daß während jener großen Ueberschwemmungen, oder bald nach Ab Laufe derselben, entfernte vulcanische Einwirkungen auf die Gestaltung der gegenwärtigen festen Erdrinde mit Einfluß hatten; ein unmittelbar vulcanischer Ursprung dieser Gegend findet jedoch zuverlässig nicht statt, und Gebilde oder Erscheinungen, welchen man mit Recht vulcanische Abkunft beimessen könnte, finden sich auf der gegenwärtigen Erdoberfläche unserer Umgegend nirgends vor ⁵⁾: keine wirkliche Schlacken oder Laven, kein natürlicher Schwefel, kein wirklicher Schwefeldunst, der aus der Erde hervorstiege, keine warme Dämpfe oder dergleichen Quellen, keine Spuren ehemaliger Erdbrände, nicht einmal Basaltberge, die, uns zunächst, in südlicher Richtung, erst in der Nähe

⁴⁾ Lettres physiques et morales sur l'histoire de la Terre et de l'Homme, adressées à la Reine de la Gr. Bretagne (5 Tomes. à la Haye et à Paris, 1779. gr. 8.) Tom. 5. S. 24 u. f. und S. 354.

⁵⁾ Auch in dem »Schreiben S. Exc. d. Hrn. Grafen v. Hartig an Hrn. Abbé Gruber, über die Pyrmonter Gegend«; in den N. Abhandl. d. Königl. Böhmischen Gesellsch. d. W. Bd. II. (Prag, 1795. 4.) Nr. 17, wird gegen den vulcanischen Charakter dieser Gegend, mit mehreren Gründen, gestritten.

Menke, Pyrmon. 2. Aufl.

von Warburg und Hofgeismar auftreten. Der Heerd des gedachten Vulcans muß demnach sehr fern gelegen haben, und gegenwärtig dürfte ein solcher jedenfalls in keiner Beziehung mehr mit unserer Gegend stehen, da man hier noch niemals wirkliche Erdstöße oder Erderschütterungen wahrgenommen hat.

Die Entstehung unserer Erdfälle ist lediglich der allmählichen Einwirkung unterirdischer Wasserleitungen beizumessen, die, ihren Ursprung von eindringenden Meteorwassern nehmend, sich in den Zerklüftungen der Gebirgsmassen, dem Fallen derselben gemäß, fortbewegen ⁶⁾, und die hie und da große Wasserbehälter bilden, die, wenn die darüber befindliche Decke einstürzt, Erdfälle darstellen. Die drei schon erwähnten Erdfälle am Steinbrink ⁷⁾ sind dergleichen Wasserbehälter und im bunten Thon und Mergelgebirge des bunten Sandsteins befindlich; zwei kleinere am nördlichen Abhange des Tropenholzes, in derselben Gebirgsformation, und noch ein anderer, der, 30 Fuß tief und, unterwärts, eine Höhle von 20 Fuß Länge und 16½ Fuß Breite darstellend, am Hanacken, im Muschelkalksteine befindlich, sich erst im Februar 1828 aufgeschlossen hat, enthalten zwar gegenwärtig kein Wasser, ihre Entstehung kann jedoch ebenfalls nur dergleichen unterirdischen Wasserleitungen beigemessen werden.

§. 121.

Urgebirge tritt hier nicht zu Tage aus, denn kein Berg

⁶⁾ Vergl. über solche, im Quadersandsteine und Kreidegebirge, am westlichen Abhange des Teutoburger Waldes, G. Bischof, in: Schweigger-Seidels N. Jahrb. d. Chemie u. Physik Bd. 8. 1833. Bd. 2 Hft. 5 S. 249 bis 274.

⁷⁾ Vergl. §. 70.

war hier ursprünglich so hoch, daß er jener großen allgemeinen Ueberschwemmung hätte Trost bieten können; aber es finden sich Geschiebe uranfänglicher Gebirge hie und da. Ein Paar große, mehre Centner schwere Granitblöcke liegen noch am Fuße des Kirchberges, in der Dahlsen, sind aber schon zum Theile in die Erde gesunken; andere finden sich am Hagener Berge; kleinere Geschiebe dieses Gesteins am nördlichen Fuße des Bierberges; einige Blöcke sind in Destorf selbst befindlich, u. s. w.

Unsere Granitgeschiebe bestehen aus einem bald grob-, bald feinkörnigen Gemenge von Feldspath, Quarz und Glimmer, und zeigen beim Bruche ein frisches und festes Korn. Der Feldspath darin ist der überwiegende Bestandtheil; er ist fleischfarbig; der Quarz ist schmutzig weiß, zuweilen auch veilschenfarbig; der Glimmer darin ist kleinschuppig, schwarz, in dem feinkörnigen Granite (den Blöcken am Fuße des Kirchberges) hat er Messing = Glanz und Farbe.

Diese Geschiebe sind Zeugen einer gewaltigen Katastrophe, die, mit unserm Thale zugleich, einen großen Theil des flachen und gebirgigen nordwestlichen Deutschlands getroffen haben muß, und die jedenfalls in einen späteren Zeitraum, als den der Bildung der Flözformationen, fallen muß, da die Geschiebe bei uns auf dem Flözgebirge umher zerstreuet sich finden. Sie sind während einer großen Ueberschwemmung, die das schon gebildete feste Land verschlang, wahrscheinlich unter Mitwirkung von Vulkanen, durch welche diese Trümmer losgerissen und aus der Tiefe heraufgeschleudert wurden, durch tobende Meeresfluthen und Strömungen von Nordosten nach Südwesten, vielleicht auch von mäch-

tigen Eiszshollen getrieben, zu uns gelangt, und stammen ohne Zweifel von nordischen Urgebirgen ab, da ihr Granit mit dem nordischen die meiste Uebereinstimmung hat.

§. 122.

Es ist insbesondere das von M. Brongniart so genannte mittlere Flözgebirge, nach M. von Humboldt die dritte Abtheilung der Flözgebilde (die zwischen dem Zechsteine und der Kreide befindlichen Formationen in sich begreifend), welche unsere Gebirgsmassen constituirt. Zu demselben gehören, nach ihrer Altersfolge: der bunte Sandstein mit dem ihm angehörigen bunten Mergelthongebirge, der Muschelkalkstein mit seinen Mergeln, und der Keupersandstein mit seinen Mergeln. Die genannten drei Gebirgsformationen, die von Alberti unter einer Periode vereinigt und in dieser Vereinigung *Trias* genannt hat ⁸⁾, führt Bronn unter dem gemeinschaftlichen Namen des Salzgebirges auf ⁹⁾. Der *Lias* oder *Gryphitenkalk* mit seinen Schiefen und Mergeln, dem *Dolithgebirge* zugehörig, und der *Quadersandstein* und *weiße Kalk*, welche Andere als *Grünsand* und *Kreide* aufführen, werden zwar in den Gränzen des Fürstenthums selbst nicht angetroffen, kommen jedoch in einiger Entfernung ebenfalls vor.

Von tertiären Gebirgslagern bietet sich im

⁸⁾ Beitrag zu einer Monographie des bunten Sandsteins, Muschelkalks und Keupers u. von Friedr. von Alberti. Stuttgart und Tübingen, 1834. 8. S. 324.

⁹⁾ *Lethaea geognostica*, oder Abbildungen u. Besch. der für die Gebirgsform. bezeichnendsten Versteinerungen, von H. G. Bronn. Zweite Aufl. Bd. I. Stuttgart, 1837. 8. S. 130

Bereiche unserer Gränzen keine dar; doch ist ein Lager Molasse in dem benachbarten Fürstenthume Lippe befindlich.

Als aufgeschwemmte Gebirge sind die Geschiebe und auch wol die verschiedenartigen Breccien und Conglomerate, als angeschwemmte Erdlager, Lehm, als angewachsene, Kalktuff und Torf anzusehen.

Die dem vorliegenden Werke beigelegte topographisch-geographische Charte giebt über die Ausbreitung der verschiedenen Gebirgslager näheren Aufschluß.

§. 123.

Den Boden unseres Thales nimmt der, von Werner so genannte, bunte Sandstein, unsere älteste Gebirgsart, der alle übrigen, zunächst aber die Muschelkalksteinberge, aufgesetzt sind, ein. Im Thale selbst, dessen Grund diese Gebirgsart constituirt, ist sie von keinem jüngeren Flößgebirge überlagert, doch meist von angeschwemmten Erdlagern bedeckt und nur in dem nordöstlichen Theile des Hauptthales kommt sie zum Vorscheine; übrigens ist sie, in einem Umkreise von mehreren Stunden, überall von jüngeren Flößgebirgsarten und namentlich von dem Muschelkalksteine überlagert. Sie tritt, zunächst ostwärts, zwischen Gehlen und Kemnade, an der Weser, erst wieder unter denselben hervor, und erstreckt sich von hieraus, südwärts, in großer Ausdehnung ¹⁰⁾.

Seine Mächtigkeit, in unserm Thale, muß beträchtlich sein, da man, bei Gelegenheit von Bohrversuchen, auf unserer

¹⁰⁾ Geognostische Charte vom nordwestlichen Deutschland von Friedr. Hoffmann. Berlin, b. C. Schropp u. C. 1828.

Saline, im Jahre 1820, die 10 bis 12 Fuß hohe Decke aufgeschweimter Erdlager nicht mitgerechnet, 150 Fuß tief in ihn eing bohrt hat, ohne auf ein anderes Gebirgslager zu stoßen; vermuthlich ruhet er jedoch auch bei uns, wie solches bei Stadtberge und Wigenhausen der Fall ist, auf einem Flözkalksteine älterer Formation.

Nach ihrem, in Hinsicht auf Alter, Lagerung und Absonderung, verschiedenartigen Vorkommen, zerfällt der bunte Sandstein in zwei Gruppen: eine untere, die sich massig absondert und einen festen Sandstein darbietet, und eine obere, die, schieferig abge sondert, bald, und größtentheils, Lager eines sandigen Mergels, bald Schichten von mehr oder minder thonigem, selten kalkigem Mergel, Schieferthon, Sandstein oder Sand, darbietet; die obere ist der Sandstein, die untere der bunte Mergelthon der Formation des bunten Sandsteins.

Der Sandstein dieser Formation (Bogesensandstein, nach E. de Beaumont) bricht massig, theils in Quadern, theils in dicken Platten, zeigt überall eine zumal senkrecht stark zerklüftete Gebirgsmasse, und in dieser zuweilen beträchtlich weite Spalten. Er ist an mehreren Stellen des Hauptthales, bei der Gashöhle, am Anger und beim Salzwerke, durch, zum Theile beträchtliche, Steinbrüche aufgeschlossen, wird als Bau- und Pflasterstein benutzt, liefert jedoch selten brauchbare große Platten. Das Gestein hat ein feinkörniges, festes Gefüge, giebt beim Anschlagen Funken, enthält wenig Thon, ist durch Eisen gefärbt ¹¹⁾, mehrentheils einfarbig bräunlich=roth.

¹¹⁾ Den Sandstein dieser Formation vom Solling (N.) und den

Dieser Sandstein führt hie und da kleine, dünne Blättchen eines silberfarbenen, oder stahlgrauen Glimmers, der gegen ein Procent Titan enthält ¹²⁾, bald häufiger, bald sparsamer beigemengt. Er bietet ferner, an fremdartigen Fossilien, in den senkrechten sowol, als in den wagerechten Klüften gemeinen Schwerspath dar, der nur selten in dünnen Tafeln auskrystallisirt, dann hie und da, durch die verworren gehäuften und mit einander verwachsenen, nach allen Richtungen hin schräg aufgerichteten Tafeln, wie gehackt erscheint, und, in dieser Gestalt dem Sandsteine unmittelbar aufsitzt, oder demselben mittels einer dünnen Unterlage derben gemeinen Schwerspaths anhängt, meistens aber derb, in zollthicken, plattenförmigen Ablösungen, in unregelmäßigen Stücken von ungleicher Größe, in welchen sich nur stellenweise einzelne Tafeln, mehr oder weniger vollkommen auskrystallisiren, erscheint. Er ist geradblättrig, undurchsichtig, oder kaum durchscheinend, weiß, selten bläulich mit Glas-

vom linken Weserufer bei Hörter (B.) hat Witting (Beiträge für d. pharm. u. analyt. Chemie Bd. 1 Hft. 3. Schmalkalden, 1823. 8. S. 61 u. f.), den von Winäbeck (C.) hat R. Brandes (Die Mineralquellen u. Schwefelschlammäder zu Meinberg. Lemgo, 1832. 4. S. 76) analysirt; sie fanden in 100 Theilen:

	A.	B.	C.
Kieselerde.....	80	80	92,5
Thonerde.....	6,50	9,25	2,8
Eisenoxyd.....	6,50	5,25	—
Eisenoxyd mit Spuren von Manganoxyd —	—	—	1,8
Kalkerde.....	1	0,75	0,3
Kalk.....	0,28	0,25	0,2
phosphorsauren Kalk.....	—	—	Spuren
Wasser.....	2,10	4,0	2,2

¹²⁾ Fr. Krüger, in: Brandes Archiv d. Apothekerver. Bd. 17. Hft. 1. Lemgo, 1826. 8. S. 68.

glanz, und enthält in 100 Theilen: schwefelsauren Baryts 92,2, schwefelsauren Strontians 8,0, schwefelsauren Kalks 0,5, Wassers 2,4, Eisenoryds mit Spuren von Manganoryd 0,2, eisenhaltiger Kiesel- und Thonerde 0,8 ¹³⁾. Auf dem dünn angeflogenen, unvollkommen krystallisirten Schwerspathe finden sich zuweilen kleine Bergkrystalle aufgewachsen. Dichter Schwarzbraunstein kommt in kleinen Partien, an den Absonderungsflächen des Sandsteins sowol, als des Baryts, vor, erscheint zuweilen nur als ein dünner Anflug, oder häutiger Ueberzug, der nur hin und wieder dicker aufliegt und dann eine kleinnierenförmige und traubige Gestalt annimmt; zuweilen aber sitzt er schlackig am Sandsteine fest, und ist dann wol mit ochrigem Gelbeisenstein überzogen. Selten erscheint der fein- und kleinschuppige Eisenglanz (Eisenglimmer) den Ablösungsflächen dieses Sandsteins dick angeflogen oder aufliegend.

Aus diesem Sandsteine gehen die Ausströmungen des kohlensauren Gases in der Gashöhle, so wie unsere sämtlichen Mineralquellen zu Tage, die einfachen und eisenhaltigen Sauerlinge sowol, als die muriatisch-salinischen Quellen und die Soolquelle.

Von Versteinerungen haben sich, nur einzeln kleine Bruchstücke, weiß calcinirter dünner Röhrenknochen, in diesem Sandsteine vorgefunden.

Das bunte Mergelthongebirge dieser Formation (Schieferletten, Freiesleben; buntes Thon- und Mergelgebirge; Kummer nennen es unsere Steinbrecher) bedeckt

¹³⁾ R. Brandes, in: Brandes u. Krüger Mineralg. zu Pyrmont. S. 14.

hier im Thale überall, einen bis mehre Klafter mächtig, den bunten Sandstein, von dem sich dasselbe schon durch das Zerfallen an der Luft unterscheidet. Im Hauptthale sieht man aus ihm, südost- und nordostwärts, den Fuß der Berge bestehen und dasselbe hie und da noch einen Theil des Abhanges hinaufsteigen. Von der Abendsonne beleuchtet ist hier sein Gebiet, schon aus der Ferne, durch seinen rothen Widerschein, leicht erkenntlich. Es constituirt alle im nördlichen Theile des Thales bemerklichen Erhabenheiten, stellt Hügel, sattelförmige Anhöhen, schmale Rücken und lange Stränge dar und wird nicht selten von Hohlwegen und Schluchten durchschnitten. In ihrem höchsten Standpuncte sieht man diese Gebirgsart am Abhange des Schratbrinks und am südlichen Fuße des Königsberges, wo sie sich gegen 400 Fuß über den Spiegel der Emmer erhebt. Sie stellt sich in verschiedenartigen Lagern dar, bald, und zunächst über dem Sandsteine, als Schieferthon und schieferiger Thonletten, der mit Sandstein wechselt, bald als sandiger Mergelthon, bald, in den obersten Lagern, als kalkiger Mergel.

Der Schieferletten ist dünn- oder dickschieferig, meist leicht zerfallend, mehr oder weniger feinkörnig, meist dunkelbraunroth, aber auch in lichten Farben wechselnd, unterwärts in den Sandstein der unteren Gruppe übergehend. Oberwärts geht er in einen festen, durch gelblich graue, runde, blatternartige, zuweilen ringförmige und geaugete, durchgehende Flecken von der Größe einer Erbse, bis zum Durchmesser mehrer Zolle, bunten sandigen Mergelthon von unebenem Bruche, oder in einen thonigen Sandstein über, der einen zerreiblichen, gelben, dendritisch gefleckten Mergel, entweder in unregelmäßigen, rundzelligen Partien

(wie Thongallen) einschließt, oder diesen geradzellig durchsetzt, in welcher letztern Gestalt er ein im Aeußeren der Rauchwacke ähnliches Gestein darbietet. Er führt einzelne Lager eines weißen losen Sandes, der früher, am südlichen Fuße des Bomberges, wo dieser zwischen einem hellgrauen sandigen Thone gelagert ist, durch Stollenbau gewonnen ward¹⁴⁾. Der Sandstein ist hie und da zerreiblich; selten tritt in ihm der Thon so sehr zurück, daß er einen quarzigen Sandstein und, bei schieferiger Textur, einen Quarzschiefer darstellt, der, von beinahe dichtem Korne und splitterigem Bruche, am Stahle Funken giebt. Der Mergel, bald ein Kalk-, bald ein Thonmergel, selten kalkreich, mehrentheils mit schieferiger Absonderung, bald lettenartig, bald mulmig, meist in zahllosen, dünnen, verschiedenfarbenen Schichten übereinander gelagert, ist, zumal am südlichen Abhange des Königsberges, durch eine beträchtlich große Mergelgrube aufgeschlossen.

Kleine Partien eines lichtgrünen, weichen, flachmuscheligen Mergels, im sandigen Mergelthone, sind durch erdigen Chlorit gefärbt. Der schieferig abgesonderte, graue, feinkörnige Thonmergel enthält auf den Ablösungsflächen, zuweilen kleine und größere, unregelmäßig rhomboëdrische Sandsteinkristalle aufliegend (am Tropenholze); eine Annäherung dazu, elliptische, gefielte Höcker, und wurm- und asterienartige, gehäuft neben einander liegende (zufällige) Absonderungen finden sich auf den Ablösungsflächen des rothen sandigen Schieferletten am Salzwerke.

Auch diese Gebirgsart führt kleinschuppigen Glimmer

¹⁴⁾ mein Versuch 2c., in: von Leonhard's Zeitschr. f. Mineralogie. 1825. Nr. 8 S. 164.

auf den Ablösungsflächen des Mergels und Schieferlettens, nur sparsam gemeinen Kalkspath, schalig oder stängelig abgesondert, dichten Schwarzbraunstein auf den Ablösungsflächen des sandigen Mergelthons, theils in flachen Puncten, theils in ästigen, dendritischen Figuren, Flecken und Stellen, die einen dünnhäutigen Ueberzug bilden, oder sich zu kleinen Körnern und Nieren erheben. Kleinschuppiger Eisenglanz findet sich, theils sparsam eingesprengt, theils nesterartig, in kleinen oder größeren Partien, sowol im sandigen Mergelthone, als im thonigen Sandsteine vor, oder er ist an den Kluftflächen des schieferig abgesonderten rothen sandigen Mergelthons, für sich, rindenartig abgelagert, oder bildet mit grauem Thone und Trümmerstücken des Schwerspath's ein besonderes Gemenge, worin er auch wieder partienweise auftritt.

Von Versteinerungen hatte sich in dem schieferigen rothen Mergel dieser Gruppe bisher nur ein Abdruck bei der Gashöhle vorgefunden, in welchem ich damals eine Fischschwanzflosse zu erkennen glaubte¹⁵⁾; als vor einigen Jahren am Unger, zumal aber am Salzwerke, dicht neben dem Neubrunnenwege einige Hügel abgetragen wurden, fanden sich in dem dortigen bunten sandigen Mergel noch ähnliche Abdrücke, in mehreren größeren Exemplaren, mit Bruchstücken theilweise noch aufliegender flacher Knochen (vom Stirnbeine?), auch das Bruchstück eines (Ober-?) Kiefers mit neun darin befindlichen, cylindrischen, dichten, von einander abstehenden Zähnen, die, ohne in Alveolen zu stehen,

¹⁵⁾ Pyrmont u. s. Umgeb. S. 170, mein Versuch 2c. in: von Leonhard's Zeitschr. a. a. D. S. 166.

sich oberwärts nagelkopfförmig flach ausbreiten, und in eine dünne Platte auszulaufen scheinen, außerdem noch große Bruchstücke vom Schulterblatte, und Röhrenknochen. Diese Abdrücke und Bruchstücke stammen vom *Odontosaurus Voltzii*, einem neuerdings von Herman von Meyer aufgestellten ¹⁶⁾ Sauriergeschlechte, ab.

Noch ist hier eines weißlich hellgrauen, festen kleinschuppig-förmigen Gypses zu gedenken, der am Fuße des Mühlenberges, in dem Kunstgraben der Dringenauer Mühle, unter einer Schicht sandigen Thones, massig, vermuthlich jedoch in einem Lager von nur geringer Mächtigkeit, angetroffen ward. Sein Vorkommen hier, an der niedrigsten Stelle des Hauptthales, in der Nähe der Soolquelle, ist, in mehrfacher Hinsicht interessant. Er mag schon dem Muschelkalk angehören und also dem jüngern Flößgypse beizuzählen sein. Ob mit dem Gypse die Erdfälle in Beziehung zu bringen sein mögen, die, am Steinbrinke und am Tropenholze, dicht neben der Gränze des Muschelkalkes, in den Mergeln des bunten Sandsteins selbst, befindlich sind?

§. 124.

Die sämmtlichen, den Thalgrund unseres Fürstenthumes einschließenden Berge constituit der Muschelkalkstein, in unseren Bergen, mit Ausschlusse des Königsberges, die herrschende Gebirgsformation. An den, dem Thale zugekehrten Bergabhängen sieht man ihn deutlich das bunte Mergelthongebirge überlagern, und bis zu ihren Gipfeln ansteigen. Den Königsberg deckt er nur ganz oben; unterwärts ist ringsumher der bunte Mergelthon sichtbar. Bei

¹⁶⁾ Mémoires de la Soc. d'hist. nat. de Strasbourg. Tom. 2. livr. 3. (1838.) 4t.

den südlichen und westlichen Bergen bildet er schon den Fuß. Auf den Gipfeln der das Hauptthal zunächst einschließenden Berge wird er von keiner jüngeren Gebirgsart bedeckt. Er erhebt sich, am Fußwege über den Bomberg nach Nerzen, bis zu einer Höhe von 1136 Fuß ü. d. M. Am niedrigsten liegt er am östlichen Ausgange des Thales, bei Thal und an der Hasselbreite, wo er senkrecht stark zerklüftet ist und eine schroffe Felsenwand, die sogenannten Klippen, bildet, zu Tage. Er ist an mehreren Stellen, durch große Steinbrüche, aufgeschlossen, da er zum Kalkbrennen, zum Chausseebaue und auch als Baustein benutzt wird. Er bietet bald, in beträchtlichen Lagern, eine massige, bald, in minder mächtigen Lagern, eine schieferige Absonderung dar, hat einen muscheligen Bruch, ist bald dicht, bald spärlich, feltner zerfressen, löcherig, oder zellig, bald einfarbig aschgrau, bläulichgrau, schmutzig grau, oder gelb, je nachdem seinem Hauptbestandtheile, dem kohlen sauren Kalk, fremdartige, als Thon, Eisen, Bitumen dgl. beigemischt sind, bald, durch fremdartige Beimengungen, bunt. Bei reicherm Thongehalte tritt er, in beträchtlichen Lagern, als Mergelkalkstein, oder als Kalkmergel auf.

Die unteren Lager nimmt der Mergelkalkstein ein, der meist eine schieferige Schichtung hat und, in dieser, hier und da wellenförmig [Wellenkalk¹⁷⁾] erscheint; er sondert sich bald dünn-, bald dickschieferig ab, geht in das Massige über, tritt zuweilen in bedeutender Mächtigkeit auf, läßt in einzelnen Schichten Talkgehalt vermuthen, hat mehrtheils ein feines Korn, stellt sich meist in helleren, asch-

¹⁷⁾ von Alberti Monograph. S. 44 u. f.

grauen oder gelben Farben dar. — Der graue erscheint mehrentheils schieferig, zuweilen unvollkommen schieferig abgefondert, bald in festen Platten, bald in vierseitig prismatisch abgefonderte Stücke zerfallend, bis in einen schieferigen Letten übergehend. Auf den unebenen Ablösungsflächen bietet ein wulstiger Kalkstein ¹⁸⁾, in einzelnen Schichten, zuweilen eigenthümliche schlangen-, schlingen-, oder hufeisenförmige zufällige Absonderungen (Daphnoeidolithen) ¹⁹⁾, die nicht selten für Schlangen-, Wurm- oder Corallen- ²⁰⁾ Versteinerungen angesehen worden sind, den Mergelkalksteinplatten aufliegend, dar. Der, sich uneben geradschalig absondernde graue Mergelkalkstein ist auf seinen Ablösungsflächen zuweilen wellenförmig furchig gestreift oder rippig; so am Königsberge, Martje. — Der gelbe Mergelkalkstein ist bald dünn-, bald dickschieferig abgefondert, zeigt eine dichte, zuweilen dem Schuppigen sich nähernde Textur, eine erdige, zuweilen, durch eingesprengte Kalkspathblättchen rauhe Bruchfläche, hängt der Zunge ziemlich stark an, ist von Eisenorodulhydrat gefärbt. Wo er massig auftritt, ist in ihm zuweilen der Kalkspath in kleinen Gangtrümmern und Adern ausgefondert, durchsetzt ihn in mehreren, sich durchkreuzenden Richtungen, und giebt ihm ein zelliges Ansehen. So stellt er, als zelliger Kalkstein, einen Muschelkalkdolomit dar, der sich gewissen Abänderungen der Rauchwacke im Dolomite der Zechsteinformation nähert, wahr-

¹⁸⁾ Uebersicht der jüngeren Flözgebilde im Flußgebiete der Weser u. von J. Fr. E. Hausmann. Göttingen, 1824. 8. S. 194.

¹⁹⁾ mein Versuch u. in: v. Leonhard's Zeitschr. a. a. D. S. 55.

²⁰⁾ Mémoire géologique sur l'Allemagne, par Am. Boué, in dem: Journal de Physique. 1822. Tom. 95 p. 90 u. 91.

scheinlich auch durch Gehalt an kohlensaurer Talkerde. Die Zellen enthalten dann einen zerreiblichen oder mulmigen Mergelkalk, der auch für sich, in größeren, den zelligen Kalkstein begleitenden Massen, auftritt und dann, frisch schön gelb, und gebrannt ziegelroth, als Farbmaterial benutzt wird; so am nördlichen Abhange des Grieserberges.

Außer dem gemeinen Kalkspath, der sich in mehrfachen Formen, schalig und sinterig, darbeut, bietet das graue schieferige Gestein, auf den Ablösungsflächen, nicht selten Montmilch, öfters auch zarte Schwarzbraunstein-Flächendendriten dar.

Der dichte Kalkstein macht an sich die Hauptmasse dieser Formation aus. Er ist meistens deutlich geschichtet, massig, oder dickschieferig abgesondert, im größeren Bruch flachmuschelig, auf den Bruchflächen mehr oder weniger uneben, in das Kleinsplitterige, spröde, ein wenig scharffantig, mehrentheils dunkelrauch- oder bläulichgrau. Sein dichtes Gefüge geht hie und da, durch das Feinkörnige, in das Kleinschuppige und Kleinblättrige über. Er ist wasserreich und daher zum Kalkbrennen nicht recht tauglich. Der hellaschgraue ist mitunter, durch kleine, unregelmäßige, gedrängt stehende, längliche Vertiefungen, die den Spuren des Wurmfraßes ähneln, und das Gestein als Raubstein darstellen, zerfressen: so am Hohestollen; oder durch kleine, unregelmäßige, weniger gedrängt stehende, beinahe prismatische und rechtwinkelige, gerade Löcher durchstoßen: so am Kircherberge und am Hagener Berge.

Dies Gestein ist hie und da von kleinen Adern gemeinen Kalkspaths durchsetzt, oder es schließt solchen, in kleinen Drusenräumen ein; in solchen findet sich, jedoch

selten, auf dem krystallisirten Kalkspathe, grasgrüner faseriger Malachit, in kleinen, frei aufsitzenden Partien gehäufster, durchscheinender, säulenförmiger Krystalle: so am Kirchberge. Der hellgraue schuppige Kalkstein schließt zuweilen zarte, weiße edle Bergkrystalle ein: so am Iberge, Hagener Berge, Kirchberge.

Der späthige Kalkstein, ebenfalls beträchtliche Lager, zuweilen dicht über dem dichten Kalksteine, einnehmend, mehrentheils grau von Farbe, härter und zum Kalkbrennen vorzüglich nutzbar, hat das, ihn charakterisirende, unvollkommen und kleinblättrig-späthige Gefüge, hauptsächlich, oder auch gänzlich, von, theils halbeingewachsenen, Bruchstücken ganz in Kalkspath verwandelter Enkrinitenstängelglieder (Enkriniten-, oder, fälschlich sogenannter, Trochitenkalkstein) und Conchylienpetrefacten, womit er bald nur sparsam, bald so sehr übermengt ist, daß er gänzlich aus solchen Trümmern zu bestehen scheint.

In diesem Kalksteine kommt nicht selten ein durchsichtiger, gelblichweißer, stängeliger Kalkspath, der zuweilen langstängelig, und dann gang- und nesterförmig, oder kurzstängelig, und dann schalig abgesondert vorkommt.

Der bunte Kalkstein ist durch fremde Beimengungen bunt, die bald aus Muschelschalen, bald aus kleinen Adern oder Nestern gemeinen Kalkspathes, oder späthigen Braunkalkes bestehen, welche ihm zuweilen ein mandelsteinartiges Ansehn geben; nicht selten scheint er offenbar zusammenge kittet zu sein aus großen, verschiedenfarbigen, blauen, grauen und bräunlichgrauen, platten Stücken des dichten Kalksteins und Kalkmergels, und hat dann das Ansehn einer Breccie (Breccienkalkstein), ist dann auch manchmal noch durch

häufig klein eingesprengte Partien Braunspathes, kleine Nester ochrigen Gelbeisensteins, oder durch Muschelpetrefacten bunt; oder führt Massen, von einem bis mehr Fuß Mächtigkeit, eines weißen, in das Gelbliche spielenden, mit zimmetbraunen Adern durchsetzten und schattirten rhomboëdrischen, gemeinen Kalkspathes, woran, außer den Spaltungen nach den drei Blätterdurchgängen des primitiven Rhomboëders, auch noch ein seltener, durch zarte Linien angedeuteter diagonalen Blätterdurchgang wahrnehmbar ist: so auf dem Gipfel des nordwestlichen Sommerknopfes.

Die oberen Lager des Muschelskalksteins nehmen, den unteren in mehrfacher Hinsicht ähnelnd, bald mehr Thon, bald mehr Kiesel Erde auf, und bieten eine mehr schieferige Schichtung und Uebergänge in das, den Muschelskalk überlagernde, Keupermergelgebirge dar.

Unser Muschelskalk ist reich an Versteinerungen; aber diese sind nur selten in guten Exemplaren herauszuarbeiten. Am häufigsten finden sie sich im späthigen und bunten Kalksteine. Folgende fand ich bisher darin auf: verschiedene Bruchstücke von Röhrenknochen und Rippen, wahrscheinlich von einem großen Reptile abstammend: am Bierberge; den Zahn eines Nothosaurus Mnstr.: am Büsseberge; einen pfriemenförmigen Fischzahn: bei Frenke; *Ceratites nodosus*, Haan, zuweilen gruppenweise gehäuft: so besitze ich vom Mühlenberge eine 1½ Zoll dicke und 10 Zoll im Länge- und Breitedurchmesser haltende Kalksteinplatte, auf der man 17 Exemplare eingewachsen zählt; *Rissoa antiqua*, m., (kleiner kegelförmiger Cyklostomit); *Turbinites dubius*, Mnstr., *Turritella obsoleta*, Ziet., *Phasianella turbilina*, m. (*Helicites*

Wenke, Pyrmont. 2. Aufl.

turbilinus, Schl.); Phasianella gregaria, m. (Buccinites gregarius, Schl.); Euomphalus minutus, m. (kleiner Planorbit): vom Kirchberge; Terebratula communis, Bosc.; Pecten laevigatus, Bronn; P. discites, Bronn; P. inaequestriatus, Mustr.; Plagiostoma striatum, Voltz; Pl. lineatum, Voltz; Avicula socialis, Bronn; Mytilus eduliformis, Bronn; Myophoria vulgaris, Bronn; M. curvirostris, Bronn (Venerites costatus); Venus nuda, Gldf. (Venerites subsulcatus)²¹⁾; Mya elongata, Gldf.; Dentalites laevis, Schl.; Cidarites grandaevus, Gldf., nur ein Stachel, am Helwege; Enocrinus liliiformis, Lam., mit geschlossener und halbgeöffneter Krone, meist jedoch nur als Stängelglieder.

§. 125.

Eine Kalk- oder vielmehr Mergelbreccie, die der Nagelstube ähnlich sieht, ist gleichsam ein Conglomerat der bisher angeführten Steinarten, und also allerdings späteren Ursprungs. Es besteht dieselbe bald aus großen, groben und kleinen, kantigen Stücken des rothen bunten Mergelthones und den verschiedenen Abänderungen des dichten und späthigen Muschelschaleins, die durch ein erhärtetes schmutzig graues Thoncament locker gebunden sind, zuweilen auch noch, in kleinen Gangtrümmern, Kalkspath enthalten, bald ist sie weniger zusammengesetzt, und besteht dann nur aus groben, plattensförmigen, weniger kantigen Stücken des Muschelschaleins.

²¹⁾ Die in Parenthesen, ohne Angabe der Auctorität, beigegeführten Namen sind die von mir, in meinem angef. Versuche 2c. gebrauchten.

steins, die durch ein hartes Mergelcament fester verbunden sind. Sie findet sich, in großen, mehre Centner schweren Blöcken, als loses Geschiebe, im Hohlwege am nördlichen Fuße des Mühlenberges, am Fuße des Schratbrinks, nördlich über Lövdenhausen, und am Abhange der inneren Wand des großen Erdfalles, nahe am Wasserspiegel: an sämtlichen Stellen auf dem Gebiete des bunten Mergelthons, unfern der Gränze des Muschelkalksteins.

Bei welcher Gelegenheit dieß Gemenge zusammengefügt sein mag, läßt sich nicht genau bestimmen; ohne Zweifel jedoch in einer der späteren (§. 120.) Ueberschwemmungskatastrophen.

§. 126.

Auf den Gipfeln und Rücken der, das Thal einschließenden, Berge verschwindet der Muschelkalkstein unter einer jüngeren Gebirgsformation, dem Keuper, der überall von der Thalwand nach außen abfällt, jenseits derselben aber in bedeutender Mächtigkeit auftritt und Gebirgsjoche bildet, die sich durch Berge, geebnete Rücken, kantige Gipfel und flache Abhänge auszeichnen. Diese bilden, in ähnlichen Entfernungen vom Hauptthale, um dasselbe, wie schon erwähnt ²²⁾, gleichsam einen zweiten, höheren Kranz. Im Thale selbst, oder an den dem Thale zugekehrten Bergabhängen bietet sich der Keuper nirgends dar. Zunächst bei uns erscheint er auf den Gipfeln der, unser Thal im S. u. D. einschließenden, Berge.

Die unteren Lager geben mehrfältig noch den allmählichen Uebergang des Muschelkalkes in den Keuper zu erkennen;

²²⁾ Vergl. §. 122.

doch sind beide auch nicht selten streng gesondert. Die obersten Lager des Muschelfalkes gehen, durch Mergel und einen gebänderten, kalkhaltigen Schieferthon, in den Keuper über; auf diesen folgt ein, bald schieferiger, bald mulmiger Letten, der mit dünnen Schichten eines grauen, Pflanzenabdrücke führenden thonigen Sandsteins wechsellagert und wol noch einige Bänke eines dichten Kieselmergels, theils von Quarzfels, eingelagert führt; über diesen erheben sich mächtige Bänke des bunten Mergels, und diesen bedeckt der graue Sandstein in größerer Mächtigkeit, auf dem, auf den Gipfeln der höchsten Berge, der quarzige Sandstein, in großen, losen Blöcken, umherliegt.

Die Mergel der untersten Abtheilung sind mulmig, bräunlichgrau, kalkreich; sie führen nicht selten 1 bis 4 Zoll große Mergelnieren (Mergelnüsse), die bald derb sind, bald hohl: die derben haben einen Kern von gemeinem Braunspath, der wiederum kleine Parteen weißen gemeinen Kalkspaths und einzelne edle Bergkrystalle einschließt; die hohlen bieten unregelmäßige Höhlungen dar, deren äußerste Wand aus einer Lage gemeinen Kalkspaths zu bestehen pflegt; inwendig sind diese mit milchweißem Kalkspathe ausgekleidet und enthalten überdem meistens noch einzelne kleine, edle Bergkrystalle, theils in den Kalkspath, theils in den Mergel, bald ein-, bald aufgewachsen, bald nur lose. Durch Verwitterung des Mergels, der als Düngemittel benutzt wird, fallen die Bergkrystalle heraus und werden dann, lose, auf den Aeckern, angetroffen: so hauptsächlich an dem, nach ihnen sogenannten Krystallenberge, dem nordwestlichen Abhange des Bierberges.

Diese Mergel haben bei uns nur eine geringe Mäch-

tigkeit; jenseits der westlichen Gränze unseres Fürstenthums treten sie indeß, als ein dichter, grünlich oder hellaschgrauer Mergelthon, der flachmuschelige Bruchflächen zeigt und überaus reich ist an Wasserkieskrystallen, die er, als Cubus, Dodekaeder und Pentagonalbodekaeder, welche sich zu verschiedenen polyedrischen Gestalten, auch zu der schönen Zwillingsverwachsung zu Kreuzkrystallen, die Weiß Zwillinge des eisernen Kreuzes genannt hat (diese zumal am Nettlein, im lippe'schen Ante Brake), oder zu Nieren und Knollen zusammengruppiren, mit sich führt, so wie an edlen Bergkrystallen, lippe'sche Diamanten genannt, die auch, rauchgrau, als Scepterkrystalle erscheinen, und meistens von einem grobkörnigen Gemenge von Quarz und Kalkspath begleitet sind, in sehr bedeutender Mächtigkeit auf²³⁾. Dagegen begleitet unsern unteren grauen Mergel ein Gestein, das den Kalkstein in dem Keuper gleichsam noch einmal zu wiederholen scheint, da es, eben so im Gefüge, als im Gehalte und in der Farbe, mit dem dichten Muschelkalksteine, dem äußeren Ansehen nach, große Aehnlichkeit hat; es ist dieß der Kieselmergel, worin die Kalkerde noch vorherrschend ist, dieser etwas Talkerde sich hinzugesellt²⁴⁾, Thon und Kieselerde aber auch schon erheblich sind, so daß er nur schwach mit Säuren brauset, hart und spröde ist und am Stahle Funken giebt. Er tritt massig auf, hat einen groß- und flachmuscheligen Bruch, ist zuweilen von kleinen Kalkspathadern durchsetzt; seine großen Absonderungsflächen sind mehrentheils

²³⁾ mein Versuch zc. in: von Leonhard's Zeitschr. f. Mineralogie, 1826. Nr. 5. S. 407 u. f.

²⁴⁾ Hr. Apotheker Potop fand 2 Procent Talkerde im Kieselmergel auf.

mit einer Rinde bräunlich gelben, eisenschüssigen Thons umgeben. Der gelbe eisenschüssige Thon kommt auch für sich in theils armsdicken Adern oder Gängen in dem braunen oder schwarzen, hie und da in einen schieferigen Thonletten übergehenden mulmigen Mergel dieser unteren Lager vor. Auch gemeiner Schwerspath, Bergkry-
stalle und, selten, schuppig-strahliger Eisenglanz kommen in diesem Letten vor.

Durch Zunahme an Kiesel-erde geht der Mergel in einen schmutzig hellgrauen thonigen Sandstein über, der, dick-schieferig, schichtenweise auftritt, Glimmerblättchen beigemengt, Eisenoryd, häufig kleineingesprengt, enthält, und nicht selten ochrigen Gelbeisenstein, Rothel, gemeinen rothen Thoneisenstein und dichten Rotheisenstein, in einzelnen, größeren oder kleineren, knolligen Nieren, bald eingewachsen, bald lose einschließt, seltner Eisenkies, noch seltener faserigen Malachit führt. Mit diesem Sandsteine kommen, im Letten, Bruchstücke petreficirten Holzes vor, theils beträchtliche Segmente von Baumstämmen, die in eine rabenschwarze, feinkörnige Kieselmasse (Holzstein), wie auf dem Unger bei Lüntorf (vorzüglich aber bei Linderhose und Delentrup), andere die in gelben Thoneisenstein, wie bei Radsiek, umgewandelt sind. Einzelne Schichten dieses hellaschgrauen Sandsteins gehen, wie am Canzlerteiche, in einen feinkörnigen quarzigen Sandstein über, und selbst in Quarzfels, wie am Krähenbrink; andere schließen zuweilen kohlige Pflanzentrümmer ein, theils in unkenntlichen Figuren und Bruchstücken von Stängeln, die ihre Abkunft von einer Equisetacee hinreichend zu erkennen geben, theils in größeren Partien einer schwarzen

und braunen, lockeren, faferigen Pflanzenkohle; so zumal bei Lintorf.

Nimmt dieser Sandstein tiefere Farben an, eine dünn-schieferige Schichtung, mit dem Uebergange in sandigen Mergelschiefer und schieferigen Thonletten, und schließen diese Gesteinsarten, abwechselnd, dünne Lagen einer dichten schwarzen Kohle ein, so nennt man diese Lettenkohle ²⁵⁾ und faßt die Lager, welche solche führen, unter dem Namen Gruppe der Lettenkohle ²⁶⁾ oder Kohlenletten ²⁷⁾ zusammen. Im benachbarten Fürstenthume Paderborn, bei Neuenherse, bei Borgentreich ²⁸⁾, und auch sonst hie und da ²⁹⁾, hat diese Gruppe Hoffnung auf bauwürdige Kohlenflöße veranlaßt. Stifft glaubte, im benachbarten Fürstenthum Corvey, Uebergänge des schwarzen thonigen Sandsteins und Schieferthons dieser Gruppe in Brandschiefer annehmen und, sogar, diese Gebirgsart dem (älteren) Steinkohlengebirge beizählen zu dürfen ³⁰⁾; es ist jedoch eben so unzweifelhaft, daß die bezeichnete Gruppe der Formation des Keu-

²⁵⁾ Versuch einer Gesch. d. Steinkohlen, 2c. gekr. Preisschr. von J. C. W. Voigt. Weimar, 1802. 8. S. 77.

²⁶⁾ von Alberti Monogr. S. 112.

²⁷⁾ Lehrbuch d. Geognosie und Geologie von A. C. von Leonhard. Mit Abb. Stuttgart, 1835. 8. S. 373.

²⁸⁾ Ueber die geogn. Verhältnisse des linken Weserufers bis zum Teutoburger Walde, von Frdr. Hoffmann; in: Annalen der Physik fortges. von Poggenдорff. Bd. 79. St. 1. J. 1825 St. 1 S. 18.

²⁹⁾ Hausmann Uebers. d. j. Flözgeb. im Flußgeb. der Weser, S. 264 §. 124.

³⁰⁾ Mineral. geogr. Skizze des Fürstenth. Corvey, vom Hrn. Bergsecr. Stifft; in: Leonhard's Taschenb. f. d. ges. Mineralogie. Zweiter Jahrg. 1808 S. 92, 96 u. 100.

pers angehört, als, daß ihre Kohle bisher überall nur von gerinder Mächtigkeit befunden worden ist. Auch in unserer Nähe sind mehrmals Schürfsversuche auf Kohlen angestellt worden; so, im J. 1808, in der Langengrund, einer von Thal nach Eichenborn hin sich erstreckenden Gebirgsschlucht, wo man, in dem dort zu Tage anstehenden schwarzen Letten, Bruchstücke einer glänzenden Schwarzkohle und bituminöses Holz aufgefunden hatte ³¹⁾; so hatte man auch schon, etwa 1766, hinter Lügde, südöstlich vom Hermansberge, dem großen und kleinen Cannebusche gegenüber, am westlichen Fuße des Schierenberges, einen Versuchgrubenbau 53 Fuß tief hinabgebaut, und im J. 1836 einen neuen Schacht, jenem ostwärts gegenüber, am südlichen Abhange des Humberges, eingeschlagen und den Erdbohrer, bis 66 Fuß Tiefe hinabgeführt ³²⁾, ohne jedoch eine baumwürdige Kohle aufzufinden.

Der bräunlich rothe Sandstein bietet nicht selten, in Drusenhöhlungen, die mit losem, mulmigen Eisenerz ausgefüllt sind, kleine edle Bergkrysalle, lose oder eingewachsen, dar.

Der bunte Mergel der Keuperformation ist ebenfalls von verschiedenartiger Beschaffenheit und Mächtigkeit seiner Lager. Er ist ein Thonmergel, der eine schieferige Absonderung zeigt und einen flachmuscheligen Bruch hat. In den

³¹⁾ Krüger, in den Pyrmonter Blättern, zum Nutzen u. Vergn. 1808. 4. Nr. 39 S. 244.

³²⁾ Vergl. meine: Berichte über das angebliche Vorkommen von Steinkohlen etc. bei Lügde; in: Westphäl. Provinzial-Blätter. Bd. 2 Hft. 3. Minden, 1836. 8. S. 96 u. f. (leider durch viele Druckfehler entstellt).

verschiedenen Schichten mächtiger Lager zeigt er einen mannichfachen Farbenwechsel, ist bald, und meistens, roth, bald grau, bald blaugrau, bald gelblich grau, bald grün: so erscheint er beim Ganzlerteiche, auf den Welseder Söhlen, Amelgagen gegenüber, und hinter Barntrup; einfarbig roth nimmt er manchmal beträchtliche Strecken ein: so am Schierenberge und bei Sabbenhausen. Er führt, als charakteristisches Merkmal dieser Mergel, nicht selten, in nierenförmig abgesonderten, losen Stücken, die aus einem krystallinisch körnigen Kalksteine bestehen, Drusenhöhlungen, die mit kleinen Kalkspathkrystallen ausgekleidet sind.

Der Sandstein der oberen Lager ist meist einfarbig grau, dickschieferig abgesondert, oder massig, und regelmäßig rechtwinkelig zerklüftet. Er steht in bedeutender Mächtigkeit am Scharpenberge, Schwalenberge, Röterberge und bei Alverbissen zu Tage. Als quarziger Sandstein wird er in einzelnen, großen, kantigen, losen Blöcken, auf den Gipfeln der höchsten Keuperberge, zerstreut umherliegend, angetroffen.

Nur höchst sparsam trifft man in unserm Keuper Versteinerungen an und nur äußerst selten Exemplare, die eine nähere Bestimmung zuließen: Bruchstücke von Knochen, vermuthlich eines größern Reptils, bei Nadsiek und Lüntorf; Schuppen von *Gyrolepis Alberti*, Agass., am Schierenberge und bei Falkenhagen; ein kleiner runder, stumpf zugespitzter Fischzahn und *Pecten laevigatus*, beide diesseits Brienhausen; Abdrücke von *Mya musculoides*, Gldf.; von Pflanzen: *Clathropteris meniscoides*, Brngn., ?*Equisetites*, Sternb., beide auf thonigem Sandsteine, *Equisetites columnaris*, Sternb.,

im schwarzen kohligen Thonletten vom Anger bei Büntorf; am öftersten noch Equisetaceen, unter welchen, außer *Calamites arenaceus*, Brngn., Bronn, der hier, neben den charakteristischen feinen, auch noch gröbere, rippenähnliche, unregelmäßige Reifen zu erkennen giebt, zugleich mit *Equisetites columnaris*, Sternb., *Pterophyllum Jaegeri*, Brngn. und anderen Pflanzenversteinerungen im hellgrauen thonigen Sandsteine, am Hurl, oberhalb Istrup, unweit Blomberg, vorkommt.

§. 127.

Von den jüngeren Flözformationen tritt zwar im Bereiche unserer Gränzen keine auf; doch ist ein Lager des Lias oder Gryphitenkalkes, in der Nähe, so interessant, daß es nicht unerwähnt bleiben darf. Es ist drei Stunden südwärts von Pyrmont, zwischen Falkenhagen und Hummerßen, im lippeschen Amte Schwalenberg, befindlich, und erstreckt sich von hieraus, ostwärts, den Silberbach entlang, bis nach Polle hin, westwärts, bis über Nischenau und Biesterfeld hinaus, so daß man es, in der angegebenen Richtung, anderthalb Stunden lang ununterbrochen verfolgen kann. Es nimmt hier den Boden einer Mulde ein, die der nördliche Fuß des Rötterberges mit dem südlichen Fuße des Klosterberges, im Keuper, der zu beiden Seiten wieder über den Lias hervortritt, bildet. Seine Mächtigkeit wird kaum einige Klafter betragen.

Es sind nur die unteren Glieder dieser Formation, die hier auftreten, der Liasalk und der Liaschiefer; beide haben mehrentheils eine dunkelrabenschwarze Farbe, die ihrem Gehalte an Kohle beizumessen ist, und sind mehr oder weniger bituminös. Der Liasalk tritt in Bänken auf, die eine

horizontale Schichtung haben, eine massige oder dickschieferige (Belemniten-schichten) Absonderung und ein Gestein darbieten, das dicht und feinkörnig ist, und einen flachmuscheligen Bruch zeigt. Ueber diesem erscheint der Liasschiefer, dickschieferig oder dünnschieferig (Posidonien-schiefer) abgesondert, als Mergelschiefer, oder schieferiger Betten, der bald härter ist, bald weich und feinerdig und, wie Zeichenschiefer, einen schwarzen Strich gebend.

Der Liasschiefer schließt häufig nuß- bis kopfgroße Kugeln und Nieren von verhärtetem Thon oder Mergel ein, die, bräunlichgrau und schwärzlich, bald dicht sind, bald feinschuppig, sich dann auswärts schalig absondern und, mit Aufnahme von kohlensaurem Eisenorydul, in thonigen Sphärosiderit übergehen, der inwendig zuweilen eine säulenförmige Absonderung zeigt und Stinkspath einschließt. Weniger häufig schließt er kieselige Knollen ein, die schwarz, schwer zersprengbar sind, am Stahle Feuer geben, und einen speisgelben, dichten Schwefelkies reichlich klein eingesprenkt enthalten. Im Schiefer kommt der Schwefelkies, in grob- oder feinknolligen Partien, mit versteckt faseriger und stängeliger Textur, in verschiedenen Farben taubenhalbig angelaufen, selten nierenförmig mit dichter Textur, vor. Kalkspath kommt in unserm Liasschiefer theils in Adern, theils in Gangtrümmern, besonders aber, auf den Ablösungsflächen des schwarzen Mergels, in zoll-dicken Platten abgesondert, vor, in welchen er, theils silber- oder rauchgrau, bald als dünnstängeliger Kalkspath, bald als Faserkalk, mit zum Theile gebogen faseriger Textur und einerseits in das Blättrige, anderseits in das Dichte übergehend, auftritt.

Der Lias führt in dem oben näher bezeichneten Lager folgende Versteinerungen: Bruchstücke von Knochen; *Ammonites Turneri*, Sow., *Murchisonae*, Sow., *radians*, Schl., *Amaltheus*, Mntf., *costatus*, Schl., *capricornu*, Schl., *fimbriatus*, Sow., *communis*, Sow., Bronn, Davoei, Sow., Bechei, Sow.; *Belemnites giganteus*, Schl., nur als *Uveolentern*, *B. digitalis*, F. Big., *tripartitus*, Schl., *acuarius*, Schl., *clavatus*, Schl.; *Turbo quadricinctus*, Ziet., *cyclostoma*, Benz, Ziet.; *Terebratula triplicata*, Phill., *?biplicata*, Sow., *Gryphaea arcuata*, Lam.; *Pecten aequivalvis*, Sow., Gldf., *acuterradiatus*, Mnstr., Gldf., *velatus*, Gldf., *textilis* (*dextilis*, Mnstr., Gldf.), *subalatus* (*subulatus*, Gldf.); *Inoceramus pernoides*, Gldf., *substriatus*, Mnstr., Gldf., *nobilis*, Gldf., nr. 6. *Posidonia Bronni*, Gldf.; *Cucullaea Münsteri*, Ziet.; *Arca aemula*, Phill., Ziet., *Nucula*, mehre kleine Arten; *Modiola minima*, Sow., *Hillana*, Sow., *elongata*, Dnkr & Koch; *Unio liasinus*, Ziet., *Mya literata*, Sow., *Pholadomya ambigua*, Sow., *decorata*, Ziet.; *Cidarites*, ohne Stacheln; *Pentacrinites*, Stängelglieder; Pflanzenstängel, petrescirtes Holz.

Außer dieser untersten Abtheilung der Juraformation, tritt von den oberen oder jüngeren, den vorzugsweise sogenannten Dolithen, diesseits der Weser, in weiter Umgegend, keine auf.

§. 128.

Dagegen erhebt sich, in südwestlicher Richtung von hier, am östlichen Fuße des Teutoburger Waldgebirges, der Quadersandstein oder Grünsand, ein, durch sehr wenig Thon mehrentheils nicht gar fest gebundener, schmutzig

gelblichweißer Sandstein, aus welchem die Ertersteine, eine Reihe merkwürdiger, durch senkrechte, massige Zerklüftung säulenförmig abgesonderter Felsen, starre Zeugen gewaltiger Naturumwälzungen, die hier die Erdoberfläche einst erfahren, hervorragen ³³⁾. Erschließt hier keine Versteinerungen ein.

Ueber den Quadersandstein steigt, indem dieser in einen sandigen Kalkmergel übergeht, der Kreidekalkstein, weiße Kalkstein ³⁴⁾, in der Umgegend lippescher Waldkalk genannt, ein hellaschgrauer oder weißer, dichter Kalkstein, von flachmuscheligen Bruche, die Egge und das Teutoburger Waldgebirge hinan, breitet sich von hieraus süd- und nordwärts in beträchtlicher Ausdehnung aus, constituirt den westlichen Abhang des Teutoburger Waldgebirges und fällt, senkrecht und, mit dem Falle der Schichten parallel, schräg = wagerecht vielfach zerklüftet, meist nur um 10°, westwärts gegen die westphälische Niederung ab ³⁵⁾. Dieß Gestein führt hie und da Feuersteinknollen, auch wol Schwefelfiesnieren eingeschlossen und ist reich an Versteinerungen: Fischwirbel von *Lamma acuminata*, Agss. (*Patellites antiquus*, Schl., *Coeloptychium acaule*, Gldf.), *Ammonites varians*, Sow., *rotomagensis*, Defr.; *Terebratula semiglobosa*, Sow., *Inoceramus Cuvieri*, Sow., *Lamarcki*, Sow., *annulatus*, Gldf.; *Spatangus gibbus*,

³³⁾ Vergl. meine Schrift: Lage, Ursprung, Namen, Beschreibung u. der Ertersteine, S. 7 u. f.

³⁴⁾ Hausmann Uebers. d. j. Flözgeb. S. 410.

³⁵⁾ Ueber die merkw. Quellen = Verhältnisse des westl. Abhanges des Teutoburger Waldes, v. Gustav Bischof; in: Schweiger = Seidel N. Jahrb. d. Chem. u. Physik. Bd. 8. 1833. Bd. 2 Hft. 5. S. 249 bis 274.

Gldf., finden sich darin, bei Schlangen, Lichtenau u. a. D. vor.

§. 129.

In einer Entfernung von fünf Stunden westwärts von Pyrmont, etwa $\frac{3}{4}$ Stunden südöstlich von Lemgo, bei Friedrichsfelde, unweit Wendlinghausen, im lippeschen Amte Brake, am linken Ufer der Bega, an dem nördlichen Abhange einer Anhöhe, ist, etwa 100 Fuß über dem Spiegel der Bega, ein Mergellager, hier die Mergelkuhle genannt, befindlich, das ein tertiaires Meerwassergebilde darbeut, mit den, zwischen Dsnabrück und Cassel vorhandenen, ähnlichen Gebirgslagern einen gleichzeitigen Ursprung zu haben scheint ³⁶⁾, und, mit diesen gemeinschaftlich, unter der Bezeichnung des hessisch-westphälischen Beckens begriffen werden kann.

Diese Gebirgsart gehört in die obere Abtheilung der zweiten oder eigentlichen Molassengruppe, zur dritten oder oberen Tertiairformation, zu den pliocenen Bildungen *Eyell's* ³⁷⁾, und ist also jünger als der Pariser Grobkalk, und selbst als der Wiener Tegel. Das Lager ist nur einige hundert Schritte lang, und etwa drei Klafter mächtig. Es besteht aus einem schmutzig bräunlichgelben, mit vielen kleinen, abgerundeten, glänzenden, dunkelgrünen, beinahe schwarzen Körnern übermengten, sandigen, mehr oder weniger zerreiblichen, feinkörnigen Mergel, der hie und da

³⁶⁾ Bemerkungen über einige tertiäre Meerwasser-Gebilde im nordwestl. Deutschl. vom Grafen G. zu Münster; in: v. Leonhard u. Bronn N. Jahrb. f. Mineral. Geognos. zc. 1835. Hft. 4. S. 421 u. f.

³⁷⁾ Bronn *Lethaea geognostica* zc. Bd. 2. S. 787.

mit Bitumen imprägnirt ist, zuweilen weingelbe Kalkspathkrystalle einschließt, und überaus reich an Versteinerungen ist, diese jedoch nur selten in guten, näher bestimmbarern Exemplaren darbeut. Folgende boten sich mir darin bisher dar: Gaumenzähne eines Fisches; *Bulla ovulata*, Lam., *semistriata*, Desh.; ?*Turritella asperula*, Brngn.; *Natica* —. ?*Trichotropis*, Brod. Sow.; *Dentalium incurvum*, Ren., Bronn; *Pecten Hoffmanni*, Gldf., *elongatus*, Lam., Gldf., *semistriatus*, Mnstr., Münsteri, Gldf.; *Pectunculus polyodonta*, Bronn, cor, Lam.; *Nucula laevigata*, Sow.; *Cardium planatum*, Brocch.; *Cyprina aequalis*, Bronn, *islandicoides*, Lam.; *Cytherea erycinoides*, Lam.; *Venus Brongniarti*, Payr.; *Corbula* —; *Panopaea inflata*, Gldf., *anatina*, Gldf. (beide nur als Kern); *Balanus* ?*crassus*, Sow.; *Clypeaster Kleinii*, Gldf.; *Lunulites radiatus*, Lam.; *Eschara* ?*crustulenta*, Gldf.

Dieser tertiäre Mergel ruhet, wahrscheinlich unmittelbar, auf einem weichen, hellaschgrauen Töpferthon (plastischem Thone), der hier, etwas östlicher, zu Tage stehet und gegraben wird, und in welchem sich, in einzelnen Stücken, eine, auf dem Querbruche wachstümlich-fettglänzende, schwärzlich braune, in das Pechschwarze sich hinziehende, hie und da zu Querablösungen geneigte Braunkohle findet.

Auf der entgegengesetzten Seite, am rechten Ufer der Bega, ist, nordwärts dem Mergellager gegenüber, der Keupersandstein durch einen Steinbruch aufgeschlossen; hier liegt, zwischen dem Krüge zum Ringe und Humfeld, ein loser, feiner, weißer Sand zu Tage, in dessen Nähe Geschiebe von Granit, Gneus, Hornstein u., in Menge angetroffen werden.

Zwischen dem Ringe und dem Dorfe Lütte quillt eine Schwefelquelle zu Tage.

§. 130.

Wir kehren in unser Hauptthal zurück. Hier finden wir, auf den obersten Thonlagern des bunten Sandsteins, hie und da Torf anstehen. Dieser ist mehrentheils von erdiger, zerreiblicher oder mulmiger Beschaffenheit (Torferde), hie und da aber auch compact, mehr oder weniger mit zarten Wurzelasern, Moosen und Conserven gemengt, dunkelbraun oder schwarz und von einem nicht geringen Antheile mulmigen Schwefeleisens (Schwefel- oder Wasserkies; daher Kiestorf), aus dem sich, an der Luft, durch den Zutritt des Sauerstoffs der Atmosphäre und des Wassers, welcher die Säuerung des Schwefels zu Stande bringt, Eisenvitriol hervorkrystallisirt, dessen Eisen aber hernach, entsäuert, wieder niedersfällt³⁸⁾, durchdrungen. Er enthält, der Analyse zufolge³⁹⁾, in 100 Theilen: eigenthümlicher Torfsubstanz und Torffaser 48,958, krystallisirten schwefelsauren Eisenoryduls 0,513, krystallisirten schwefelsauren Kalks 0,565, überbasischen schwefelsauren Eisenoryds 0,189, Spuren von Phosphorsäure und phosphorsauren Kalkes, freier Schwefelsäure 0,053, Eisenoryds mit phosphorsaurem Kalk 0,116, Spuren harzähnlichen und wachsähnlichen Stoffes, Wassers 49,606. Er hat ganz den Geruch des Eissener Badeschlammes, und könnte zu Schlamm- oder Moorbädern benutzt

³⁸⁾ Vergl. Das Mineralbad zu Gleichen v. Dr. J. F. John. Berlin, 1821. 8. S. 73.

³⁹⁾ Brandes u. Krüger Mineralq. zu Pyrmont S. 53.

werden. Früherhin machte er, in nicht unbeträchtlicher Erstreckung, am Fuße des Bomberges, nördlich und westlich von der Hauptallee und dem eisenhaltigen Trinkbrunnen, und auf dem Bruche, zwischen Holzhausen und der Hambornmühle, wo er bald auf einem fetten Thone, bald auf kalkreichem Mergel ruhet, das obere Erdlager aus, das aber nunmehr größtentheils, durch Cultur urbar gemacht und in Ackerland umgewandelt worden ist. An mehreren Stellen ist er über eine Klafter mächtig: so zu beiden Seiten der Klosterallee, ostwärts vom Aeskulaplatze, und westwärts zwischen dem Schießhause und der Quäkerkirche, an welchen Stellen ihn auch, im J. 1815 und 1822, der Amtm. Siemens hat stechen lassen. Der weitere Torfssich in der Umgegend der Mineralquellen, selbst in einer Entfernung von 500 bis 600 Schritten, ist indeß nicht gestattet worden, da sich das Verhältniß des Torfes zu diesen Quellen nicht berechnen läßt. Er ist übrigens, als Brennmaterial, nicht vortheilhaft, weil er zu unrein ist; den mehrsten Brennstoff hält die untere Schicht, die zuweilen beträchtliche Stücke vermoderten Holzes führt ⁴⁰⁾).

Ganz in der Nähe unserer Eisensäuerlinge, auf dem Brunnenplatze selbst, liegt der Torf nicht frei zu Tage;

⁴⁰⁾ Ein beträchtliches Moor Rasentorf, das, ganz vegetabilisch, aus Wurzelfasern, dünnen, dürren Holzästen und verwitterten Laubmoosen, namentlich, in den oberen Lagen, aus Sphagnum mit wenigem Polytrichum besteht, findet sich, in unserer Nachbarschaft, zunächst im Rippeschen, zwei Stunden von Pyrmont ab, auf der Anhöhe zwischen der Elbrinker Glashütte und Schwalenberg. Der Torf ist haarbraun, in den obersten Schichten weiß, gelb, locker, lose, aber deßhalb auch so leicht, daß er ebenfalls zum Brennen nicht vortheilhaft ist.

Menke, Pyrmont. 2. Aufl.

er ist hier von Thon- und Lehm Boden bedeckt. Im October 1833, da dem Trinkbrunnen eine neue Abzugsröhre gegeben ward, war der Boden des Brunnenplatzes, von dem Trinkbrunnen an, in südwestlicher Richtung, durch einen, drei Fuß tiefen, Graben aufgeschloffen und gab dann, durch diesen, die Lagerungsverhältnisse der verschiedenen Schichten zu erkennen. Der Durchschnitt zeigte mehrfachen Wechsel und ungleichmäßige Mächtigkeit der Schichten. Fünf Schritte vom Ausflusse ab, bestand der Boden des Grabens aus einem dunkelbraunschwarzen, compacten Torfe, der mit horizontal liegenden dünnen Schilf- und anderen Blättern, Pflanzenstängeln, Aesten und Wurzelfasern durchzogen war. Mit dem Stöcke vermochte man noch zwei Fuß tiefer in den Torfboden abwärts hinein zu dringen. Ueber dem Torfe lag eine 3 bis 10 Zoll starke Schicht eines fetten, eisenschüffigen, braungelben Thones. Ueber diesem war der, aus Grant, Lehm und Erde bestehende Boden wahrscheinlich künstlich aufgetragen. Vierzig Schritte weiter in diesem Graben war der Torf nur 4 bis 5 Zoll mächtig; unter ihm kam eine Schicht eines, mit vielen Pflanzenstängeln durchzogenen, bläulich grauen, sandigen Thones zu Tage; über ihm stand hie und da ein, theils löcheriger, mürber, sehr eisenschüffiger, rostgelber Kalktuff an, dessen Löcher bald mit Wad, bald mit Eisenorydhydrat ausgekleidet waren.

Der unter dem Thone liegende Torf bietet, an einigen Stellen, kleine Parteen erdigen Eisen blau's (Blaueisenerde, phosphorsaures Eisen), namentlich selbst in der Nähe des Brodelbrunnens, neben dem, westwärts vom Schlosse liegenden, Fischteiche und zumal in der niederen Wiese, unweit des Neubrunnens, dar.

An einigen Stellen bietet die Torferde, wo sie mit Dammerde gemengt ist, eine mehre Fuß dicke Lage einer schwarzen Erde dar, die durch Reichhaltigkeit an verwitterten Land- und Sumpfschneckengehäusen, zumal vom *Helix nitens* und *Paludina impura*, kalkhaltig ist und, namentlich nordwärts von der Bassinallee, als Gartenland benutzt wird.

§. 131.

Ueber dem Dorfe dehnt sich, nord-, west- und südwärts von der Hauptquelle, der Kalktuff, hier Dufstein genannt, aus. Er erstreckt sich unter der ganzen Fläche der großen Allee und des heiligen Angers bis zur Schloßstraße hin. Dieser, hie und da mit etwas Thon, oder Eisenoryd gemischte, kohlensaure Kalk tritt bald in Massen, bald in dünnen Schichten, bald bröckelig und erdig auf, ist bald dicht und verb, bald locker und unregelmäßig löcherig, gelblich oder graulich weiß, zuweilen blaulich, rostfarben, oder schwärzlich. In der untersten Schicht ist der Kalktuff mehrertheils erdig; über diesem bricht er in lockeren, durchlöcher-ten, aus einem unregelmäßigen, röhrenförmigen, durcheinandergehenden Gefüge zusammengesetzten Massen, in welchen die Formen zerstörter oder incrustirter Pflanzentheile, Blätter, Halme, Wurzeln, manchmal noch erkenntlich sind. Die obersten Lagen brechen in mehr oder weniger dicken Platten, die eine sinterartige Structur, auf ihrer unteren Fläche ein tropfsteinartiges Ansehen darbieten. Die Löcher sind zuweilen mit zerreiblichem ochrigen Wad ausgekleidet. Der erdige und löcherige Kalktuff schließt nicht selten Incrustate von Land- und Süßwasserconchylien ein, namentlich *Helix*

nemoralis, hortensis, pulchella, rotundata, fruticum, hispida, Achatina lubrica, Clausilia similis, Pupa frumentum, muscorum, Carychium minimum, Planorbis marginatus, albus, spirorbis, Limnaeus minutus, Paludina impura, Valvata cristata, öfters auch Baumblätter, der Erle, Sahlweide u. a. Nordwärts von der Hauptquelle, neben der Klosterallee, ist, vor einer Reihe von Sähen, einmal, unter dem Kalktuff, ein von einem Rhinoceros abstammender Röhrenknochen aufgefunden worden. — Es ist höchst wahrscheinlich, daß dieser Süsswasserkalk von den Steinquellen, die ehemals an den höchsten der gedachten Stellen, an welchen gegenwärtig der Kalktuff anstehet, zu Tage gingen ⁴¹⁾, abgesetzt worden ist.

§. 132.

An mehreren Stellen des Thales, zumal am Fuße der Berge, werden insbesondere die Mergel des bunten Sandsteins, von einem schmutzig grauen oder bräunlichen Lehm- oder Leimenboden bedeckt, der, ein unreiner, mit Sand und Kalktheilen innig gemengter Thon, aus der Zerstörung und Auflösung älterer Gebirgsarten hervorgegangen ist. Er macht manchmal beträchtliche, mehrere Ellen mächtige Erdlager aus: so am Braucampswege, am neuen Wege, zwischen der Bruch- und Delmühle und das Emmerufer größtentheils entlang. Er ist bald locker, bald dichter und schwerer. Wo der Thon in ihm zunimmt, was meist in der Tiefe der Fall ist, wird er gestochen, geformt und zu Backsteinen benutzt, die getrocknet, roh (ungebrannt) als ein, freilich sehr mittelmäßi-

⁴¹⁾ Seip Besch. d. Pyrm. Mineralw. S. 110.

geß, Baumaterial benutzt werden. In dem lockeren Lehm, zumal wo dieser auf Mergel ruhet, finden sich nicht selten einzelne, lose, abgerundete Geschiebe älterer Gebirgsformationen, selbst von Granit und Gneus, häufiger aber eines feinkörnigen, quarzigen Sandsteines (aus dem Keuper) in ihm vor.

Häufig trifft man auch einen Mergelgrus an, von dem man nicht bestimmt angeben kann, ob er noch dem zerfallenen bunten Thon- und Mergelgebirge angehört, oder einen späteren Ursprung hat. Er ist besonders in den Hohlwegen sichtbar, die von den Steinbrüchen hinter dem Braucamp auf den südöstlichen Fuß des Bomberges zuführen. Wahrscheinlich ist er größtentheils nur ein zerfallener Letten des bunten Thon- und Mergelgebirges.

Die Dammerde bedeckt den größten Theil des fruchtbaren Bodens, und verbirgt also dem Auge die unter ihr befindlichen Erdlager; genau lassen sich diese daher, nach ihrer Abwechslung, nicht überall bestimmen. Zuweilen ist die Lage der Dammerde sehr dick, und erschweret so die Erforschung der unter ihr liegenden Erdart; zuweilen möchte es, wegen der Gesundbrunnen, gefährlich und nicht rathsam sein, tief in die Erde einzudringen, besonders in der Nähe derselben. Ueber das Wesentlichere wird die obige Darstellung, in Verbindung mit der angehängten Charte, den erforderlichen Aufschluß verleihen.

Cap. XXVII.

Uebersicht der Pyrmonter Mineralquellen und ihrer Bestandtheile.

§. 133.

In dem vorigen Capitel ist von der geognostischen und oryktognostischen Beschaffenheit des Bodens um so ausführlicher die Rede gewesen, als die Kenntniß davon, bei der so folgereichen Untersuchung über den Ursprung und die Werkstätte der Mineralquellen, als das wichtigste Kriterium angesehen werden und nur allein richtig leiten kann.

Es ist merkwürdig, daß so viele und verschiedenartige Mineralquellen auf einem so kleinen Flächenraume zu Tage gehen; sie beschränken sich auf den nördlichen Theil des Hauptthales, und in beträchtlicher Entfernung von ihnen, kommt weiter keine Mineralquelle von Bedeutung zum Vorscheine.

In Neupyrmont selbst, und zumal bis zu einer Entfernung von 600 Schritten von der Hauptquelle, ist beinahe alles, in ökonomischen Gebrauch kommende Quellwasser mehr oder weniger mit mineralischen Bestandtheilen, zumal mit Kohlensäure, imprägnirt. Die meisten unserer als Süßwasserquellen benutzten Brunnen würden, in Gegenden, wo überhaupt Mangel an Mineralquellen ist, schon für gute Mineralwasser gelten. Ganz geschmackloses, reines Süßwasser trifft man hier kaum an. Wir haben mehre, öffentlichen oder Privatgebäuden angehörende, als nicht mineralisch geltende Brunnen; aber einen geringen mineralischen Antheil haben beinahe alle unsere Quellen, selbst die, welche täglich in ökonomischem Gebrauche sind. Den Fremden, die Pyr-

mont besuchen, pflegt dieß meistens sehr bald aufzufallen; ihnen schmeckt all unser gewöhnliches Trinkwasser angenehm oder unangenehm säuerlich pikant; wogegen man, an dieses gewöhnt, das Trinkwasser anderer Gegenden mehrentheils unschmackhaft finden wird; selbst Pferde aus entfernten Gegenden pflegen sich anfangs zu weigern, von unserm gewöhnlichen Süßwasser zu saufen. Bei starkem und anhaltendem Regen ist alle unser Brunnenwasser, nur nicht das der Mineralquellen, trübe, und giebt einen Gehalt an Kohlensäure, schon durch den Geschmack, deutlich zu erkennen.

§. 134.

Die bemerkenswertheften unserer Mineralquellen sind folgende: 1) der Säuerling; 2) der eisenhaltige Trinkbrunnen; 3) der Brodelbrunnen; 4) der niedere Badebrunnen; 6) der Augenbrunnen; 7) der Trampelsche Eisensäuerling; 8) der Neubrunnen; 10) der Kochsalzhaltige Badebrunnen; 11) der ehemalige Kochsalzhaltige Badebrunnen; 12) die Soolquelle.

In dieser Aufzählung sind unsere Mineralquellen in einer ihrer chemischen Verwandtschaft angemessenen Reihenfolge aufgeführt worden.

Die chemische Analyse unserer Mineralquellen hat zuerst Seip ⁴²⁾ unternommen; die von ihm gewonnenen Resultate zeugen zwar von großer Einsicht, Sorgfalt und Genauigkeit ⁴³⁾, waren jedoch, dem dermaligen kindlichen Zeitalter

⁴²⁾ Seip Beschr. Vierte Abthl. S. 160 u. f.

⁴³⁾ U. Wetter Theoretisch-praktisches Handb. der Heilquellenlehre.

der Chemie gemäß, unvollkommen. Später, nachdem die chemische Analyse bedeutend herangewachsen war, unternahm Weftrumb, mit eben so viel Umsicht als Kunstfertigkeit, die Analyse der mehrsten unserer Quellen; Trampel fügte diesen die Untersuchung einiger der bis dahin weniger in Gebrauch gekommenen Mineralquellen hinzu; Struve machte auf einige bis dahin bei den Untersuchungen der Hauptquelle übersehene Bestandtheile aufmerksam; Brandes und Krüger unterwarfen die sieben vornehmsten Pyrmonter Mineralquellen einer neuen näheren Prüfung, und Struve theilte dann auch das Resultat seiner näheren Untersuchung der Hauptquellen mit ⁴⁴⁾.

§. 135.

Der Sauerling ⁴⁵⁾, oder Bergsäuerling ⁴⁶⁾, ist krySTALLHELL, quillt stark, sprudelt aber wenig, hat eine immer gleiche Temperatur von + 9 Gr. Reaum. (= + 52,2 Fahrh.), und eine eigenthümliche Schwere, die sich zu der des destillirten Wassers verhält wie 1,001 zu 1,000. Er enthält in einem Pfunde von 16 Unzen:

(2 Thle. Berlin, 1838. 8.) Thl. 1 S. 60 bis 65, hat Seip's zeitgemäßes Verdienst um die chemische Prüfung unserer Mineralquellen und den Werth seiner physikalischen Untersuchungen wohl auseinander gesetzt und hervorgehoben.

⁴⁴⁾ Die anzuführenden Schriften werden unter den betreffenden Mineralquellen näher angegeben werden.

⁴⁵⁾ vergl. §. 72.

⁴⁶⁾ Seip Besch. d. Pyrm. Mineralw. S. 115.

nach	Westrum ⁴⁷⁾	Brandes und Krüger ⁴⁸⁾	
		wasserhalt.	wasserleer.
schwefelsauren Natrums.....	0,20	0,3782	0,1676
schwefelsaurer Magnesia.....	1,36	0,6030	0,3486
schwefelsauren Kalkes.....	0,76	0,3156	0,2500
Ehlnatriums.....	0,52	0,0118	0,0118
Ehlmagnesiums.....	0,32	0,1262	0,0652
kohlensauren Natrums.....	—	0,3062	0,2736
kohlensaurer Magnesia.....	0,56	0,1684	0,1032
kohlensauren Kalkes.....	1,86	1,8110	1,8110
Harzstoffes.....	0,12	0,0080	0,0080
zusammen, feste Bestandtheile:.	5,7	3,7284	3,0372 Gr.

Kohlensäure, nach Westrum 1,03, nach Brandes und Krüger 0,83 Volum.

§. 136.

Der eisenhaltige Trinkbrunnen ⁴⁹⁾, der heilige Brunnen (fons sacer), die Hauptquelle, diejenige nämlich, welche das vorzugsweise sogenannte Pyrmonter Wasser, auch Pyrmonter eisenhaltiges Wasser, Pyrmonter Stahlwasser, Pyrmonter Stahlbrunnen genannt, liefert, und der, wie seinen Bädern, Pyrmonter seinen alten Ruhm verdankt, im Brunnenhause befindlich, in einem runden, beinahe drei Fuß im Durchmesser haltenden, hölzernen Behälter gefaßt (er mag seit

⁴⁷⁾ Westrums Physikal. chem. Besch. d. Mineralq. zu Pyrmonter (vergl. S. 116, Anm. 32) S. 172.

⁴⁸⁾ Brandes u. Krüger Neue physic. chem. Besch. d. Mineralq. zu Pyrmonter S. 314.

⁴⁹⁾ Vergl. S. 87.

100 Jahren nicht neu gefaßt sein), hat eine $3\frac{1}{2}$ Fuß hohe Wassersäule, seine Abzugsröhre an der Nordostseite des Brunnenplatzes. Die Quelle ist sehr ergiebig ⁵⁰⁾, sprudelt mitelmäßig stark, am lebhaftesten im südwestlichen Vierteltheile ihres Behälters, wo ihr, durch kurze Unterbrechungen periodisches Aufsprudeln bemerklich ist; sie perlt und zischt; über ihrem Wasserspiegel schwebt stets eine, mehr oder minder starke Schicht kohlensauren Gases. Ihr Wasser ist krystallhell und klar, etwas bintenhaft schmeckend, und setzt, an dem Behälter und, beim Abflusse, in der Rinne, einen braungelben Niederschlag ab.

Der Brunnen hat, wiederholten eigenen Untersuchungen zufolge, eine Temperatur von 11 Gr. Reaum. (= 56,7 Gr. Fahrenh.). Das Verhältniß seiner Schwere zu der des destillirten Wassers ist wie 1,004 zu 1,000. Das Wasser dieser Quelle ist im J. 1776, in Upsala, von Bergmann ⁵¹⁾, in oder vor 1781 von Higgins ⁵²⁾, im J. 1782 von Be-

⁵⁰⁾ Das ausgeleerte Becken füllt sich, nach Westrumb (a. a. D. S. 24) binnen 16, nach Brandes und Krüger (a. a. D. S. 192) in 42 Minuten wieder an. Aus den alljährlich, im Frühjahr, vorgenommenen Reinigungen des Beckens ergab sich, daß 1835 am 28 März das Becken in 50, 1836 am 28 März gleichfalls in 50, 1837 am 2 April in 48, 1838 am 27 März in 51 Minuten sich wieder anfüllte; 1839 am 30 März geschah dieß, nach vorausgegangenen regnigen Tagen, bei östlichem Winde und + 2 Gr. R. Lufttemperatur, in 66 Minuten.

⁵¹⁾ Torb. Bergman Opuscula physica et chemica. vol. I. (Holmiae et Upsal., 1779. 8.) S. 202.

⁵²⁾ Ziber. Cavallo Abhandl. über die Natur und Eigenschaften der Luft. U. d. Engl. (v. J. S. Fr. Gehler). Dessau und Leipzig, 1783. 8. S. 716.

rolbingen ⁵³⁾, in den Jahren 1783 und 1788 von Westrumb ⁵⁴⁾ untersucht worden; Fourcroy soll dasselbe ebenfalls untersucht haben ⁵⁵⁾; mir ist jedoch unbekannt geblieben, wann dieß geschehen und wo seine Analyse mitgetheilt sein mag; auch Klaproth soll dasselbe einer chemischen Analyse unterworfen, die Resultate derselben aber öffentlich nicht bekannt gemacht haben. Struve deutete, im J. 1824, einige Bestandtheile an, die bis dahin in diesem Mineralwasser waren übersehen worden ⁵⁶⁾; Brandes und Krüger beendigten im J. 1825 die ihnen aufgetragene genauere Analyse ⁵⁷⁾, und Struve machte im J. 1826 das Resultat seiner näheren Prüfung öffentlich bekannt ⁵⁸⁾.

⁵³⁾ Physikalisch-chemische Besch. des Gesundbr. zu Driburg (v. Beroldingen). Hildesheim, 1783. 8. S. 299.

⁵⁴⁾ Westrumb Physikal. chem. Besch. 2c. S. 31 bis 120.

⁵⁵⁾ Essai sur les Eaux minérales naturelles et artificielles; par E. J. B. Bouillon-Lagrange. à Paris, 1811. 8. S. 330.

⁵⁶⁾ Ueber die Nachbildung der natürlichen Heilquellen von Fr. W. Struve. Hft. 1. Dresden, 1824. 8. S. 29.

⁵⁷⁾ Brandes u. Krüger Neue physic. chem. Besch. 2c. S. 191 bis 278.

⁵⁸⁾ Ueber die Nachbildung der natürlichen Heilquellen von Fr. W. Struve. Hft. 2. Dresden u. Leipzig, 1826. 8. S. 108.

In einem Pfunde von 16 Unzen sind enthalten :

nach	Westrumb,	Brandes u. Krüger		Strube:
		wasserh.	wasserl.	wasserleer.
schwefelsauren Natrums ..	2,89	3,5181	1,5586	2,1456
schwefelsaurer Magnesia ..	5,47	5,5005	3,1628	2,6975
schwefelsauren Kalkes	8,68	7,6148	6,0320	7,2213
schwefelsauren Strontians	—	0,0217	0,0217	0,0206
schwefelsauren Baryts	—	0,0015	0,0015	—
schwefelsauren Lithiums...	—	0,0030	0,0030	0,0089
schwefelsauren Kalis	—	—	—	0,0419
Ehlornatriums	1,22	0,4046	0,4046	—
Ehlormagnesiums	1,34	0,8274	0,4276	1,1266
kohlensauren Natrums ...	—	4,5102	4,0235	—
kohlensaurer Magnesia ...	3,39	0,3150	0,1933	0,3236
kohlensauren Kalkes	3,4875	5,8733	5,8733	5,9882
kohlensauren Eisenoryduls.	1,055 ⁵⁹⁾	0,7389	0,7389	0,4901
kohlens. Manganoryduls..	—	0,0200	0,0200	0,0485
hydrothionsauren Natrums	—	0,0657	0,0657	—
phosphorsauren Kalkes...	—	Spuren	Spuren	—
phosphorsaurer Thonerde..	—	—	—	0,0147
phosphorsauren Kalis	—	0,1012	0,1012	—
Kieselerde	—	0,0954	0,0954	0,4969
Harzstoffes	0,09	0,1133	0,1133	—
zusammen, feste Bestandthl.	27,6225	29,7246	22,8364	20,6244 Gr.

Kohlensäure, nach Westrumb, 1,875, nach Brandes und Krüger 1,685,
Hydrothionsäure, nach letzteren 0,0314 Volum.

⁵⁹⁾ In Just. Arnemann Prakt. Arzneimittellehre. Fünfte Aufl. verb. von L. A. Kraus. Göttingen, 1811. 8. S. 120, wird einem Pfunde dieses Wassers nur $\frac{1}{18}$ Gr. kohlensauren Eisens zu-

§. 137.

Der Brodelbrunnen ⁶⁰⁾ (fons bulliens), der große Badebrunnen ⁶¹⁾, auch wol der neue Badebrunnen ⁶²⁾ genannt, liegt 46 Fuß südostwärts vom eisenhaltigen Trinkbrunnen ab, ist im J. 1727 mit eichenen Bohlen, in einem 12 Fuß im Durchschnitte haltenden Achteck neu eingefast, hat eine 3 Fuß hohe Wassersäule, quillt stark, sprudelt mit großem Geräusche, wie kochendes Wasser in einer Braupfanne, setzt auf den Boden einen gelben Niederschlag von Eisenorydhydrat ab, von dem der starke Sprudel stets Theilchen in die Höhe führt, die dem an sich klaren Brunnen eine gelbliche Trübung verleihen. Seine Temperatur ist die des Trinkbrunnens, oder + 11 Gr. Reaum.; seine Schwere verhält sich zu der des destillirten Wassers, wie 1,0042 zu 1,0000. Er enthält in einem Pfunde von 16 Unzen:

geschrieben; in einem Handbuche sehen wir diesen Irrthum ungern. Die System. Besch. aller Gesundbr. u. Bäder 2c. von einigen Aerzten und Chemisten herausg. Bd. 1. Zweite Aufl. Jena u. Leipz. 1801. 8. S. 148, so wie C. A. Hoffmann's System. Uebers. u. Darst. der Resultate von 242 chem. Uebers. miner. Wasser 2c. Berlin 1815. 8. S. 183, und, daraus, die Tabellarische Uebers. der Mineralwässer Deutschl. von F. Kretschmar. Dessau, 1817. 8. S. 28, enthalten ebenfalls einen und den andern Irrthum in der Aufzählung, der nach obigen Angaben zu berichtigen sein dürfte.

⁶⁰⁾ Vergl. §. 87. S. 141.

⁶¹⁾ Seip Besch. S. 120.

⁶²⁾ Westrumb Physikal. chem. Besch. S. 121 bis 135.

nach	Westrumb,	Brandes und Krüger	
		wasserhalt.	wasserleer.
schwefelsauren Natrums	3,7	—	—
schwefelsaurer Magnesia	6,1	5,5360	3,1582
schwefelsauren Kalkes	9,75	6,0760	4,8000
schwefelsauren Strontians	—	Spuren	Spuren
schwefelsauren Baryts	—	Spuren	Spuren
schwefelsauren Lithiums	—	Spuren	Spuren
Ehlnatriums	1,75	—	—
Ehlmagnesiums	1,5	1,4834	0,7784
kohlensauren Natrums	—	4,7866	4,2614
kohlensaurer Magnesia	1,25	0,2460	0,1500
kohlensauren Kalkes	6,8	4,5280	4,5280
kohlensauren Eisenoxyduls	0,9	0,5822	0,5822
kohlensauren Manganoxyduls ..	—	Spuren	Spuren
phosphorsauren Kalkes	—	Spuren	Spuren
phosphorsauren Kalis	—	Spuren	Spuren
Kiesel Erde	0,3	0,2500	0,2500
Harzstoffes	0,1	0,1400	0,1400
zusammen, feste Bestandtheile..	32,15	23,6282	18,6482 Gr.
Kohlensäure, nach Westrumb 1,40625, nach Br. u. Kr. 1,4706, Hydrothionsäure, nach letzteren, 0,015 Volum.			

Er wird durch einen eignen Röhrenstrang in das Badehaus geleitet, und nur zum kalten Badewasser benutzt.

§. 138.

Der alte Badebrunnen, auch niedere Badebrunnen ⁶³⁾ genannt, schon seit hundert Jahren im Gebrauche, war seit etwa 1800 mit starken hölzernen Bohlen

⁶³⁾ Seip Besch. S. 125 §. 36. — Vergl. §. 87.

bedeckt; bis dahin hatte er offen gelegen, und das über seinem Wasserspiegel befindliche Gas war als offenes Gasbad benutzt; seit 1833 ist er zu diesem Behufe wieder hergestellt und ein Paar Bänke sind dicht über seinem Wasserspiegel angebracht worden. Er faßt, in einem zehn Fuß im Durchmesser haltenden, mit Bohlen eingefasten, freisunden, durch Querbalken gestützten Behälter, der, vom rothen Mergelboden auf, bis an den Rand der Einfassung, $14\frac{1}{2}$ Fuß Höhe hat, und nordwärts gegen den Augenbrunnen hin, durch einen 7 Fuß langen unterirdischen Gang erweitert war, mehre (5 bis 6) Quellen in sich, die einzeln nicht sehr ergiebig sind, und wenig, meistens nur periodisch, nach kleinen Zwischenräumen von $\frac{1}{2}$ bis 3 Minuten, sprudeln. Der Boden des Behälters war, im September 1833, mit einer 4 Fuß dicken Lage ausgeschlemmten, weichen, schmutzig grauen Thones (Mineralschlamm) bedeckt. Die Wassersäule, die früher nur 4 Fuß hoch gewesen, hatte zur eben genannten Zeit eine Höhe von $8\frac{1}{2}$ Fuß. Der Wasserspiegel zeigte hie und da schillernde Häutchen. Das Wasser selbst ist etwas trübe, schmeckt zusammenziehend, hat eine Temperatur von 11 Gr. Reaum., und eine specifische Schwere, die sich wie 1,003 zu 1,000 verhält. Nach Westrumb ⁶⁴⁾ enthält ein Pfund von 16 Unzen:

schwefelsaurer Magnesia.....	6,1
schwefelsauren Kalkes.....	6,5
Ehloratriums.....	0,8
Ehlormagnesiums.....	2,2
kohlensaurer Magnesia.....	1,9

⁶⁴⁾ Westrumb Physikal. chem. Besch. S. 136 bis 148.

Kohlensauren Kalkes.....	3,1
Kohlensauren Eisenoryduls	0,55
Thonerde.....	0,9
Kieselerde.....	0,25
Harzstoffes	0,15
zusammen, feste Bestandtheile:	22,45 Gr.
Kohlensäure	0,685 Volum.

Auch dieses Wasser ist bisher, zum Badewasser, im Badehause benutzt worden.

§. 139.

Der neue Badebrunnen, südostwärts, nahe bei dem eben genannten Brunnen gelegen, schon etwa 1806 gefaßt, ist im Jahre 1817, da, wegen einer allmählig entstandenen Senkung auf dem Brunnenplatze, der Boden aufgerissen werden mußte, in einem fünfeckigen Behälter, mit starken Bohlen, neu eingefast und innerhalb durch Querbalken gestützt worden; liegt gleichfalls verdeckt. Die Quelle sprudelt in dem Nordwestwinkel dieses Behälters (Sept. 1833) stärker, als die des alten Badebrunnens. Das Wasser ist etwas heller, klarer. Die Wassersäule hat mit der des vorigen gleiche Höhe, sinkt bald, wenn dieser ausgeschöpft wird, scheint also in natürlichem Zusammenhange damit zu stehen, und ist dieserhalb damals, durch eine Abzugsröhre, die Wassersäule beider Brunnen in Verbindung gesetzt worden. Diese Abzugsröhre ward im Sept. 1833 durch Thon (Mineralschlamm) völlig zugeschlammmt und verstopft gefunden; das Wasser muß also entweder, durch die Scheidewand, zu dem alten Badebrunnen eingedrungen und mit diesem abgeflossen sein, oder aber verborgene Auswege gehabt haben, und unbenutzt verloren gegangen sein.

§. 140.

Der westliche Badebrunnen, westwärts, sechs Fuß vom alten Badebrunnen gelegen, ist, da 1816 ein neuer Canal gelegt wurde, aufgenommen, in einem viereckigen Behälter, mit starken Bohlen, bis auf den Torfboden neu eingefast, und seit dem mit zum Badewasser benutzt worden, zu welchem er seinen Abfluß hat. Bis dahin war diese Quelle, obgleich nicht unbeachtet, denn sie scheint, da sich Scherben neben ihr gefunden, früher schon einmal mit im Gebrauche gewesen zu sein, doch unbenutzt geblieben. An den Wänden ihres Behälters findet sich Eisenorydhydrat abgesetzt. Sie sprudelt im nordwestlichen Winkel des Behälters lebhafter hervor und ist sehr ergiebig. Die Höhe ihrer Wassersäule ist selbstständig; sie läßt nur wenig und langsam nach, wenn der alte Badebrunnen ausgeschöpft wird.

§. 141.

Der Augenbrunnen ⁶⁵⁾, in einer ausgemauerten, achteckigen Vertiefung sichtbar, ist 1755 entdeckt worden, lag dann offen zu Tage, in einem viereckigen, 2½ Fuß im Durchmesser haltenden, Behälter aus starken Bohlen, gefast, mit einem achteckigen, sandsteinernen Kranze umringt, ward im Herbst 1817 mit einem Klappendeckel bedeckt, im Frühjahr 1824 mit einer Pumpe versehen, dann noch, im Frühjahr 1833, mit einem schalenförmigen, steinernen Becken, zur Aufnahme des gepumpten Wassers, ausgestattet. Das

⁶⁵⁾ Vergl. §. 87.

Menze, Vermont. 2. Aufl.

Wasser desselben war immer etwas trübe, was durch wiederholte Versuche, die Höhe der Wassersäule zu verringern, nicht abzustellen gelang, und verrieth dadurch Stagnation, was die völlige Abnahme seiner Wassersäule, die bis Sept. 1833, 3 Fuß 9 Zoll betrug, und das gänzliche Verschwinden seiner Quelle selbst, auf dem Boden des Brunnenbehälters, bei Ausschöpfung des westlichen Badebrunnens (27 Sept. 1833), mit dem er also im Zusammenhange stehen muß, zu bestätigen schien. Es fand sich aber, daß sich über dem Boden des Behälters eine an 2 Fuß hohe Lage Schlamm abgesetzt hatte; als diese (28 Sept.) entfernt war, kam die Quelle wieder zum Vorschein, sprudelte lebhaft heraus, lieferte ein beinahe klares Wasser, dessen Säule (bis zum 30 Sept.), da die Abzugsröhre verstopft war, selbst bis einen Zoll über diese hinaus aufgestiegen war. Als man, an demselben Tage, den alten und neuen Badebrunnen auszapfen anfang, sank die Wassersäule alsbald wieder, bis unter die Abzugsröhre hinab. Er hat eine Temperatur von $+ 9,5$ Gr. Reaum. und eine eigenthümliche Schwere von 1,0023 zu 1,0000. Er enthält in einem Pfunde von 16 Unzen:

nach	Westrumb ⁶⁶⁾ .	Brandes und Krüger ⁶⁷⁾	
		wasserhalt.	wasserleer.
schwefelsauren Natrums	1,1	1,7110	0,7580
schwefelsaurer Magnesia	5,5	4,5662	2,6262
schwefelsauren Kalkes	6,15	4,1052	3,2356
schwefelsauren Strontians	—	Spuren	Spuren
schwefelsauren Baryts	—	Spuren	Spuren
schwefelsauren Lithiums	—	Spuren	Spuren
Ehlnatriums	0,55	0,4420	0,4420
Ehlmagnesiums	1,8	0,4502	0,2326
Kohlensauren Natrums	—	0,8476	0,7566
Kohlensaurer Magnesia	1,1	0,2522	0,1548
Kohlensauren Kalkes	3,3	3,8150	3,8150
Kohlensauren Eisenorydul.	0,4	0,1308	0,1308
Kohlensauren Manganorydul. .	—	Spuren	Spuren
phosphorsauren Kalkes	—	Spuren	Spuren
phosphorsauren Kalis	—	Spuren	Spuren
Kieselersde	—	0,1000	0,1000
Harzstoffes	0,1	0,0400	0,0400
zusammen, feste Bestandtheile:	20	16,4602	12,2916 Gr.

Kohlensäure, nach Westrumb 0,844, nach Br. u. Kr. 1,385 Volum.

Ein Gehalt an Hydrothiansäure, der sich zuweilen durch Geruch und Geschmack zu erkennen giebt, darf wol nur der Zersetzung von schwefelsauren Salzen, durch zufällig in den Brunnen gerathene organische Substanzen, beigemessen werden.

§. 142.

Der Trampelsche Eisensäuerling, oder das Trampelsche Stahlwasser, entspringt in dem, in

⁶⁶⁾ Westrumb Physik. chem. Besch. S. 149 bis 160.

⁶⁷⁾ Brandes u. Krüger Neue physic. chem. Besch. S. 301 bis 306.

nordöstlicher Richtung, hinter dem ehemals Seip'schen, später Trampel'schen, jetzt, seit 1817, Schröter'schen Wohngebäude befindlichen, am Fuße des Bomberges gelegenen, sanft ansteigenden Garten, in diesem in einem viereckig ausgemauerten, oben offenen Raume, in den, von Südwest her, drei Stufen hinabführen.

Er besteht eigentlich aus zwei verschiedenen Quellen, einem Eisensäuerlinge und einer Süßwasserquelle, die erst im Febr. 1820 unterschieden, und dann gesondert worden sind. Der Eisensäuerling, eine, ohne Zweifel aus größerer Tiefe hervorstiegende, Stoßquelle, die damals nur 22 Pfund Wasser in einer Minute gab, und deren Wasserfäule nur bis zu einer Höhe von, anderthalb Fuß anstieg, ward derzeit mit einem, drei Fuß ins Gevierte haltenden Behälter aus eichenen Bohlen eingefast. Die wilde oder Süßwasserquelle, eine, nordwestlich, neben jener hervorquillende, flache oder Streichquelle, die aber in jeder Minute 80 Pfund Wasser lieferte, erhielt ihren Abfluß westwärts, außerhalb jenem Behälter.

Beide Quellen, die bis dahin nebeneinander entsprungen, und unabgesondert zusammengeflossen waren, dann, 1820, von einander geschieden, später aber, von ihrem gegenwärtigen Besitzer, wieder mit einander in Verbindung gesetzt worden, indem dieser die Süßwasserquelle in den Behälter des Eisensäuerlings leitete, hatten ihren gemeinschaftlichen Abzug durch eine Röhrenleitung, durch welche das Wasser bis zu dem, dicht hinter dem Schröter'schen Wohnhause befindlichen Pfeifenpfosten gelangte, aus welchem es sich in einen länglich viereckigen Wasserstein ergoß. Der vormalige Besitzer, Geh. Rath Trampel, hatte mit diesem Wasser eine

kleine, mit vier Badewannen ausgestattete, Privatbadeanstalt, die er in einem Ausbaue seines Wohnhauses unterhielt, die aber der jetzige Besitzer hat eingehen lassen, gespeiset. Das Wasser gelangte zu derselben durch seinen natürlichen Fall, wenn der Abfluß aus dem Pfeifenposten abgestellt ward, was mittels eines Krahnes geschehen konnte. Ueber den Quellen war, von jeher, stets eine, mehr oder minder beträchtliche Schicht kohlensauren Gases befindlich, in welcher schon öfters kleine und größere Vögel (Nachtigallen, Enten) ihren Tod gefunden haben.

Die im Behälter selbst befindliche Quelle sprudelt gegenwärtig (26 März 1839), unter lebhafter Gasentwicklung empor. Von Nordwesten her quillt unter dem Mauerwerke hervor und fließt, an dieser Seite, seit einer späteren Aufräumung (s. unten) reichlicher, in den Behälter, die oben erwähnte Süßwasserquelle, ein klares, frisches Wasser, das sich, dem Geschmacke nach, wie ein von mineralischen Bestandtheilen freies, reines Trinkwasser verhält. Die Wassersäule hat im Behälter eine Höhe von 7 Zoll, eine Temperatur von + 8,7 Gr. Reaum.; das Wasser ist krystallhell und klar, setzt auf den Boden und an den Wänden des Behälters einen bräunlich-gelben Niederschlag ab; seine Bestandtheile sind, nach Trampels ⁶⁸⁾ Angabe, in einem Pfunde zu 16 Unzen:

⁶⁸⁾ Untersuchung des Stahl-Wassers, welches in dem Baumschofe des Geh. Rath's Trampel quillt; in J. E. Trampel's Schrift: Wie muß der Kranke nach dem Brunnen reisen, wenn er Nutzen davon haben will? Hannover, 1806. 8. S. 105 bis 119.

schwefelsauren Natrums.....	0,86
schwefelsaurer Magnesia	3,8
schwefelsauren Kalkes.....	3,84
Ehlnatriums	0,62
Ehlmagnesiums	0,61
kohlensaurer Magnesia.....	0,6
kohlensauren Kalkes.....	2,07
kohlensauren Eisenoryduls.....	0,2
Thonerde.....	1,16
Harzstoffes	0,04
zusammen, feste Bestandtheile: ..	13,8 Gr.
Kohlensäure	2,0625 Volum.

In dieser Analyse ist vermuthlich der gemeinschaftliche Zusammenfluß der gedachten Quelle benutzt, und der Gehalt des Wassers an kohlensaurem Gase wahrscheinlich viel zu hoch angegeben worden.

Am 11 Mai 1839, nachdem einige Tage zuvor, das von außen in den Behälter eindringende Wasser abgeleitet, im nächsten Umfange aufgeräumt, und der Behälter selbst ausgeschöpft worden war, ergab sich, daß der Behälter selbst wirklich nur den Eisensäuerling enthält, der an mehreren Stellen, zumal an der nördlichen Wand des Behälters, etwas ostwärts, hervorsprudelt. Die Untersuchung auf Eisen, mit Eisenblaukali, gab dieß sogleich durch eine grünlich blaue Färbung der Flüssigkeit zu erkennen (die Haupttrinkquelle ward dagegen durch dasselbe Reagens schön hellveilschenblau gefärbt). Die Ergiebigkeit der Quelle betrug, nachdem ihr eine Wassersäule von nur 9 Zoll Höhe gelassen war, einer vorgenommenen Messung zufolge, gegen 20 bis 22 Pfund in der Minute.

Durch die Aufräumung im äußeren Raume ringsum

den Behälter war der Stagnation eines Wassers abgeholfen, das dann aus dem nordöstlichen Winkel des äußeren Raumes lebhaft hervorsprudelte, und das sich nun als ein reiner Sauerling zu erkennen gab, der, da der §. 134 näher erörterte Sauerling in derselben Richtung befindlich ist, mit diesem wohl in irgend einer Beziehung zu stehen scheinen dürfte.

Der im Schröder'schen Garten befindliche ausgemauerte Raum schließt demnach drei verschiedenartige Quellen ein: einen Eisensäuerling, einen einfachen Sauerling und eine Süßwasserquelle.

§. 143.

Der Neubrunnen ist bei Gelegenheit der Auffuchung einer stärkeren Soolquelle, durch Bohrversuche, in der niederen Wiese, im J. 1732 entdeckt worden ⁶⁹⁾, und hier gegenwärtig, in einem eigenen Brunnenhause befindlich ⁷⁰⁾. Vorher lag er ganz offen zu Tage, war mit einem 7 Fuß tiefen, unten 3 Fuß 6 Zoll, oben 3 Fuß 8 Zoll im Durchmesser haltenden, eichenen Fasse, dessen Rand 1 Fuß hoch über dem Erdboden hervorragte, eingefast, und dieser Behälter war auswärts, in der Entfernung etwa von 2 Fuß, rund umher mit einer, etwa 2 Fuß hohen, der Uberschwemmung ausgesetzten, achteckigen Mauer, die also einen Hofraum um den Behälter der Quelle einschloß, umgeben. Der Quelle war, durch eine Röhrenleitung, die im J. 1817 wieder in Stand gesetzt ward, Abzug in den nördlich gelegenen alten Steinbruch gegeben, wobei aber auf eine Wassersäule von 6 Fuß 2 Zoll Höhe gerechnet war, die sie wol kaum erreichen mochte. Im September 1822 betrug die Höhe

⁶⁹⁾ Seip Besch. S. 100.

⁷⁰⁾ Vergl. §. 96.

hrer Wassersäule 6 Fuß. Einem, sodann, auf meine Veranlassung, vom verst. Oberdeichgräfe Dammert geleiteten Nivellement zufolge, lag ihr Wasserspiegel $4\frac{1}{8}$ Zoll höher als der Spiegel der Emmer in der nächsten Entfernung, und 6 Fuß höher als der Emmer Spiegel unmittelbar an der Abfallseite des Stauwehres in der Nähe des Salzbrunnenhauses. Sie lieferte damals, bei einer Wassersäule von 3 Fuß Höhe, in 1 Stunde und 3 Minuten, 60 Kubikfuß Wasser. Im Jahre 1826 ist diese Quelle $1\frac{1}{2}$ Fuß tiefer gefaßt, ihr Abfluß $3\frac{1}{2}$ Fuß niedriger gelegt, und nach dem Salzbrunnenhause hin geleitet worden. Sie hat jetzt eine Wassersäule von 4 Fuß Höhe, eine Temperatur von 9,3 Gr. R. Ihr Wasser enthält, in einem Pfunde

von 16 Unzen, nach	Westrumb ⁷¹⁾	Brandes und Krüger ⁷²⁾	
		wasserhalt.	wasserleer.
schwefelsauren Natrums	—	7,3456	3,2497
schwefelsaurer Magnesia	3,3636	3,4744	1,9964
schwefelsauren Strontians	—	Spuren	Spuren
schwefelsauren Baryts	—	Spuren	Spuren
schwefelsauren Lithiums	—	0,0301	0,0301
schwefelsauren Eisens	0,8181	—	—
Ehlnatriums	7,6363	4,3857	4,3857
Ehlmagnesiums	4,5454	0,9716	0,5024
kohlensauren Natrums	—	2,6230	2,3413
kohlensaurer Magnesia	2,3636	0,9647	0,5902
kohlensauren Kalkes	7,8181	7,8638	7,8638
kohlensauren Eisenoryduls	0,8181	0,7599	0,7599
kohlensauren Manganoryduls	—	Spuren	Spuren
phosphorsauren Kalkes	—	0,0192	0,0150
phosphorsauren Thonerde	—	0,1260	0,1000
phosphorsauren Kalis	—	Spuren	Spuren
Kieselers	0,2727	0,2000	0,2000
Stoffes	0,5454	0,2200	0,2200
zusammen, feste Bestandtheile ..	28,1813	25,9900	22,2545 Gr.
Kohlensäure nach Westrumb 1,231, nach Br. u. Kr. 1,547 Volum.			

⁷¹⁾ Westrumb Kleine physikal. chem. Abh. Bd. I. St. 2. S. 177 bis 186.

⁷²⁾ Brandes und Krüger Neue physik. chem. Besch. S. 339 bis 348.

Der Kochsalzhaltige Trinkbrunnen, die muriatisch=salinische Trinkquelle, ist im Salzbrunnenhause⁷³⁾, an der östlichen Wand desselben, nunmehr, seit 1795, mit einem hölzernen Kübel, in einem, 4 Fuß ins Gevierte haltenden, Behälter, links vom Pumpenwerke (mittels dessen das überflüssige Salzwasser und das etwa eindringende wilde Wasser aus dem Salzbrunnenhause fortgeschafft wird), vom Grunde aus, eingefast⁷⁴⁾. Diese Quelle hat ursprünglich der Salzinspector Jung entdeckt, weil er sie aber für die Gewinnung des Kochsalzes zu arm fand⁷⁵⁾, hernach liegen lassen. Trampel, der eigentlich durch diese Quelle zur Auffuchung einer neuen an dieser Stelle bestimmt wurde, ließ sie zwar, neben den anderen, von ihm zum medicinischen Gebrauche eingerichteten, Kochsalzquellen (vielleicht mit anderen, unbedeutenderen, benachbarten Quellen

⁷³⁾ Vergl. §. 96. S. 158.

⁷⁴⁾ Das Pumpenwerk und die jetzige Trinkquelle waren ehemals in einem 8 Fuß langen, 4 Fuß breiten Kasten zusammengefast; dieser ist nachher in zwei Behälter eingetheilt worden, wovon der eine die Pumpe, der andere die jetzige Trinkquelle enthält. Das Pumpenwerk liegt gegenwärtig in der Mitte zwischen dem Trink- und Badebrunnen, in einem besonderen Behälter. Wahrscheinlich traten, ehe die Trinkquelle ihre Einfassung erhielt, wilde Wässer mit in den großen gemeinschaftlichen Kasten.

⁷⁵⁾ Er soll nämlich in 25 Pfunden 841,666, also in einem Pfunde nur 33,586 Gran feste Bestandtheile angetroffen haben. J. E. Trampel (Beschreibung von dem neuentdeckten salzhaltigen Mineralquellen zu Pyrmont, und von den Heilkräften derselben. Berlin, 1794. 8.) S. 81. Nicht vielleicht etwa so viel, allein an salzsaurem Natrum? oder war die Quelle damals von Tagewässern verdünnt.

zugleich ⁷⁶⁾) einfassen ⁷⁷⁾), benutzte sie aber nicht, sondern ließ ein Pumpenwerk darin anlegen, zur Fortschaffung der überflüssigen Wässer. Als aber das Salzbrunnenhaus, dem man, wegen der nahen Emmer, eine starke Grundmauer geben mußte, erbauet war, verschwand die von Trampel zum Baden bestimmte Quelle (seine Mineral-Salzquelle Nr. 2), theils vielleicht durch den Druck der Mauer, theils auch wol durch die scharfziehende Pumpe. Es ist desfalls hernach die, gegenwärtig links von der Pumpe zu Tage ausgehende, Quelle, von welcher hier die Rede ist, als ein reineres und wirksameres Wasser, zur Trinkquelle, und die ehemalige Trampelsche Trinkquelle zur Badequelle bestimmt worden, und als solche in Gebrauch gekommen. Die Quelle des jezigen kochsalzhaltigen Trinkbrunnens liegt tiefer, als die übrigen Quellen; ihr Wasser ist ganz hell und klar, die Temperatur desselben + 10 Gr. Reaum ⁷⁸⁾), seine eigenthümliche Schwere, im

⁷⁶⁾ Die chemische Analyse würde sonst mehr feste Bestandtheile geliefert haben; Trampel giebt in der zu §. 56. seiner Beschr. gehörigen Tabelle, für ein Pfund von 16 Unzen, an:

schwefelsauren Natrums	1,1666
schwefelsaurer Magnesia	0,42
schwefelsauren Kalkes	3,92
Chlornatriums	20,58
Chlormagnesiums	1,42
Kohlensaurer Magnesia	1,58
Kohlensauren Kalkes	3,3333
kohlensauren Eisenoxyduls	0,08
Thonerde	4,1666
Harzstoffes	0,0466

zusammen, feste Bestandtheile . . 36,7131 Gr.

Kohlensäure 1,75 Volum.

⁷⁷⁾ Trampel a. a. D. S. 84.

⁷⁸⁾ Jos. Wächter Abhandlung über den Gebr. der vorz. Bäder und Trinkwässer. Wien, 1817. 8. sagt, S. 106, die Quelle sei

Verhältnisse zu der des destillirten Wassers, wie 1,0115 zu 1,000; es enthält in einem Pfunde zu 16 Unzen:

nach	Wes- strumb 79).	Brandes und Krüger 80)	
		wasserhalt.	wasserleer.
schwefelsauren Natrums	17,0	12,246	5,413
schwefelsauren Kalkes	6,96	5,516	4,358
schwefelsauren Strontians	—	Spuren	Spuren
schwefelsauren Lithiums	—	0,087	0,087
schwefelsauren Kalis	—	Spuren	Spuren
Ehlornatrums	70,44	65,498	65,498
Ehlormagnesiums	3,24	12,076	6,280
Ehlorcalciums	2,84	—	—
Kohlensauren Natrums	—	6,236	5,267
Kohlensaurer Magnesia	5,92	—	—
Kohlensauren Kalkes	3,64	6,920	6,920
Kohlensauren Eisenoryduls	—	0,065	0,065
Kohlensauren Manganoryduls ..	—	Spuren	Spuren
phosphorsauren Natrums	—	Spuren	Spuren
phosphorsauren Kalkes	—	Spuren	Spuren
phosphorsaure Thonerde	—	Spuren	Spuren
Thonerde	0,76	—	—
Harzstoffes	0,2	0,100	0,100
Extractivstoffes	0,72	—	—
zusammen, feste Bestandtheile..	111,72	113,746	94,188 Gr.
Kohlensäure, nach Westrumb	1,475, nach Br. u. Kr.	1,000	Vol.

sehr heiß, ihre Temperatur sei 530 Gr. Fahrenh. Wunder-
liche Irrthümer!

79) Von der neuen muriatisch-salinischen Mineralquelle zu Pyrmont, nebst einer chemischen Prüfung ihres Mineralwassers. Von Joh. Friedr. Westrumb (auch in dessen: Kleine physikalisch-chemische Abhandlungen Bd. 5. Hft. 2; oder: Chemische Abhandlungen Bd. 3. Hft. 1.) Hannover, 1797. 8.

80) Brandes und Krüger Neue physic. chem. Besch. 2c. S. 338.

Krüger hat diese, so wie unsere übrigen Kochsalzhaltigen Quellen, späterhin, auch auf Bromgehalt untersucht, und solches ebenfalls darin aufgefunden.

§. 145.

Der Kochsalzhaltige Badebrunnen, die muria-
tisch=salinische Badequelle, ehemals Trampel's Mi-
neral=Salzquelle Nr. 1 ⁸¹⁾, ist im Jahre 1793 von
Trampel entdeckt worden, und ward von diesem zum Trink-
brunnen bestimmt. Er ist neben den anderen Kochsalzhaltigen
Quellen in dem Südwestwinkel des Salzbrunnenhauses, mit
einem Kasten von vierzölligen Bohlen, der 7 Fuß und 8 Zoll
lang und eben so breit ist, eingefast worden, und wird ge-
genwärtig nur zu den Bädern gebraucht. Das Wasser dieser
Quelle ist zuerst von Piepenbring ⁸²⁾, nachher auch von dem
Entdecker untersucht worden. Dasselbe ist krystallhell und
klar, hat eine Temperatur von 10 Gr. Reaum. ⁸³⁾; seine
specifische Schwere verhält sich, nach Trampel ⁸⁴⁾, der das-
selbe zu zwei verschiedenen Malen untersucht hat, wie 1,0133

⁸¹⁾ Trampel in der angef. Beschr., die sich hauptsächlich mit dieser Quelle beschäftigt, S. 28 u. 83.

⁸²⁾ G. Heinr. Piepenbring Physicalisch=chemische Nachricht von dem sogen. neuen Mineral=Salz=Wasser auf der Saline bey Pyrmont. Leipzig, 1793. 8; auch 1794. 8.

⁸³⁾ So fand ich die Temperatur, dieser sowol, als der Kochsalz=haltigen Trinkquelle, am 29 Sept. 1839, Morgens 8 Uhr, bei + 11 Gr. Reaum. Luft=, und 11,4 Gr. R. Emmer=Temperatur. Trampel sagt (a. a. D. S. 17), sie steige von 20³/₄ auf 32³/₄ Gr. Fahrh. hinauf; da jene gleich ist — 5 Gr., letztere + 0,3 Gr. Reaum., so muß die Trampelsche Angabe nothwendig in einem starken Irrthume beruhen.

⁸⁴⁾ Trampel a. a. D. S. 29, 66, 88 u. Tabelle.

zu 1,0000; es enthält, diesem zufolge, in einem Pfunde zu 16 Unzen:

	nach der ersten Untersuchung.	nach der zweiten Untersuchung.
schwefelsauren Natrums	7,26	7,32
schwefelsaurer Magnesia	—	0,7733
schwefelsauren Kalkes	6,78	6,9
Ehlnatriums	63,38	60,1
Ehlmagnesiums	8,7	9,4261
Ehlorcalciums	0,04	0,0666
Kohlensaurer Magnesia	0,8	0,3
Kohlensauren Kalkes	6,0	7,21
Kohlensauren Eisenoryduls	—	0,032
Thonerde	2,45	3,2533
Harzstoffes	0,04	0,05
zusammen, feste Bestandtheile ..	95,45	95,4313 Gr.
Kohlensäure 2,5 Volum.		

§. 146.

Der ehemalige, Kochsalzhaltige Badebrunnen, Trampel's Mineral-Salzquelle Nr. 2, von späteren Schriftstellern ⁸⁵⁾ als des Salzbrunnens Nebenquelle aufgeführt, hat sich, wie gesagt, seit Erbauung des Salzbrunnenshauses, in welchem derselbe, zwischen den beiden vorherbenannten Quellen, in einem 6 Fuß langen, 5 Fuß breiten Kasten eingefaßt war, versteht. Der Kasten, in welchem sie ehemals quoll, ist aber noch, bedeckt, an Ort und Stelle vorhanden, und es ist, durch eine Röhre, eine Quelle mit beinahe süßem Wasser ⁸⁶⁾, die ebenfalls im Salzbrunnen-

⁸⁵⁾ Hoffmann System. Uebers. S. 186 u. A.

⁸⁶⁾ Dieses Wasser enthält, nach Trampel's Untersuchung, die Graf

haufe, nordwärts in demselben, unter dem Steinpflaster entspringt, hineingeleitet.

Nach Trampel's Untersuchung ⁸⁷⁾ enthielt die jetzt verschwundene, muriatisch-salinische Quelle, in einem Pfunde zu 16 Unzen

schwefelsauren Natrums	6,06
schwefelsaurer Magnesia	0,52
schwefelsauren Kalkes	3,73
Ehlornatriums	53,24
Ehlormagnesiums	11,35
Kohlensaurer Magnesia	0,3
Kohlensauren Kalkes	6,48
Thonerde	0,95
Harzstoffes	0,08
zusammen, feste Bestandtheile ..	82,71 Gr.
Kohlensäure	1,437 Vol.

§. 147.

Die Soolquelle ⁸⁸⁾, Kochsalzquelle, Salzsoole, die im Jahre 1732 entdeckt worden ist und, auf dem, in

Hartig, in der N. Abhandl. d. Königl. Böhm. Gesellsch. d. W. Bd. 3. Nr. 17 mittheilt, keine Kohlensäure, an festen Bestandtheilen aber in einem Pfunde zu 16 Unzen:

schwefelsauren Natrums	0,56
schwefelsauren Kalkes	0,72
Ehlornatriums	7,8
Ehlormagnesiums	0,88
Kohlensaurer Magnesia	0,51
Kohlensauren Kalkes	3,96
Thonerde	0,07
zusammen, feste Bestandtheile ..	14,5 Gr.

⁸⁷⁾ Trampel Besch. von den neuentdeckten salzhalt. Mineralq., S. 29 Nr. 2 u. die Tabelle zu §. 56.

⁸⁸⁾ Vergl. S. 157.

demselben Jahre angelegten, Salzwerke ⁸⁹⁾, für die Gewinnung des verkäuflichen Kochsalzes sowol, als zum Behufe der Salzäder benutzt wird, geht aus einem 15 Fuß langen, 9 Fuß breiten, 30 Fuß tiefen Soolenschacht, in welchem das Bohrloch noch eine Tiefe von 60 Fuß hat, zu Tage. Sie hat eine Temperatur von 8,75 Gr. Reaum., und enthält in einem Pfunde zu 16 Unzen:

nach	Trampel ⁹⁰⁾	Brandes und Krüger ⁹¹⁾	
		wasserhalt.	wasserleer.
schwefelsauren Natrums	9,43	5,2921	2,3401
schwefelsaurer Magnesia	2,9	2,3340	1,3310
schwefelsauren Kalkes	16,67	14,5815	11,5674
schwefelsauren Strontians	—	0,0145	0,0145
schwefelsauren Baryts	—	0,00099	0,00099
schwefelsauren Lithiums	—	Spuren	Spuren
Ehloratriums	89,91	61,6882	61,6882
Ehlormagnesiums	6,52	6,9280	3,5800
kohlensauren Natrums	—	1,4986	1,3365
kohlensaurer Magnesia	2,66	0,4698	0,2879
kohlensauren Kalkes	2,42	2,7100	2,7100
kohlensauren Eisenorydul	0,13	0,0803	0,0803
phosphorsauren Kalkes	—	0,0750	0,0750
phosphorsauren Kalis	—	0,0220	0,0220
phosphorsaurer Thonerde	—	0,1249	0,1249
Thonerde	1,44	—	—
Harzstoffes	0,08	0,0100	0,0100
zusammen, feste Bestandtheile ..		132,16	95,82989
Kohlensäure nach Trampel 0,437, nach Br. u. Kr. 0,666 Volum.			85,16879 Gr.
Hydrothionsäure, nach letzteren, Spuren.			

⁸⁹⁾ Seip Besch. d. Pyrm. Mineralw. S. 40 u. 98.

⁹⁰⁾ Trampels Besch. von den neuentdeckt. salzh. Mineralq.; die zu S. 6 gehörige Tabelle. — Einer früheren Analyse, deren Resultat ein Neffe unseres Geh. R. Trampel, J. W. C. Trampel, in seinem Beitrage zur Verbesserung der Salzwerke, Hft. 1 (Göttingen, 1793. 8.) S. 50 u. Hft. 2 (Ebendaf. 1794) S. 49 mittheilt, gedenke ich nur der literarischen Vollständigkeit halber.

⁹¹⁾ Brandes u. Krüger Neue physic. Chem. Besch. S. 317 bis 334.

Westrumb hatte unsere Salzfoole schon im Jahre 1787 untersucht ⁹²⁾ und damals in einem Pfunde derselben folgende Bestandtheile aufgeführt:

schwefelsauren Natrums.....	3,0
schwefelsauren Kalkes	13,3125
Ehlnatriums	111,75
Ehlmagnesiums	10,0
kohlensauren Kalkes	4,0
Eisens	0,0625
zusammen, feste Bestandtheile....	142,125 Gr.

Einer späteren Behauptung Westrumb's zufolge ⁹³⁾, hat unsere Salzfoole in 25 Pfunden Wasser 2235 Gran Kochsalz mehr, als die muriatisch-salinische Trinkquelle; da nun diese, nach Westrumb's Angabe, in 25 Pfunden, 1761 Gran Kochsalz enthält, so beträgt dieß, + 2235 = 3996 Gran auf 25 Pfund; demnach würde die Coolquelle in einem Civilpfunde 159,84 Gran, oder 2 Drachmen, 29,84 Gran Kochsalz enthalten.

§. 148.

Außer den oben aufgeführten Mineralquellen, die hier, als Grund- oder Stofsquellen, aus der Tiefe zu Tage gehen, finden sich aber auch noch andere Mineralquellen in den Gränzen des Fürstenthums, die theils mit jenen in Gemeinschaft zu stehen scheinen, theils ganz unabhängig von jenen, aber von geringer Bedeutung sind.

⁹²⁾ Westrumb Chemische Untersuchung einiger Salzfohlen, in dessen: Kleine physik. chem. Abhandlungen. Bd. 4. Hft. 1 (der Chemisch. Abhandlungen Bd. 1. 1793.). S. 283 u. f.

⁹³⁾ Westrumb Von den neuen mur. sal. Mineralq. zu Pyrmont. S. 68.

Des auf dem Schröterschen Hofe hervorquillenden einfachen Sauerlings ist bereits oben ⁹⁴⁾ Erwähnung geschehen.

Auch eisenhaltige Sauerlinge, die mit unseren gebräuchlichen Eisensauerlingen Aehnlichkeit haben, sind bei uns, hie und da zum Vorscheine gekommen; man beachtet sie aber nicht, da sie theils minder kräftig sind, als diese, theils eine ungünstigere Lage haben, und also, bei der hinreichenden Wassermenge, welche diese vorzüglicheren Quellen liefern, überflüssig sind. In der Nähe des Brunnenplatzes quellen, an mehren, theils verbauten, Stellen, zumal südwärts vom Brodelbrunnen, arme Eisensauerlinge dürftig hervor. So quillt auch an der Ostseite des Schlosses, im Bette des Schloßgrabens selbst, ein Sauerling, der mit dem eisenhaltigen Trinkbrunnen Aehnlichkeit haben soll. Bei dem Ausschlämmen der Grast, im October 1830, haben die Arbeiter viel daraus geschöpft und das Wasser gern getrunken. Auf dem Hofe des Schmidt Ringe in Eddenhausen hat man ebenfalls einen, wie man sagt, unseren Eisenquellen ähnlichen Brunnen, weil man damals besorgte, daß er der Ergiebigkeit der Hauptquelle Eintrag thun möchte, unter Fürst Georg, etwa 1810, verstampft. Eben so soll es mit einer zwischen den hannoverschen Dörfern Welsede und Gellersen entspringenden Quelle geschehen sein.

Westlich und nordwestlich von der eisenhaltigen Trinkquelle sieht man nicht selten, auf torfigem Boden, Wasser rinnen, das eine, dem Anscheine nach, dem Bodensatz unserer eisenhaltigen Mineralquellen ähnliche Erde absetzt.

⁹⁴⁾ Vergl. S. 142. C. 247.

Menke, Pyrmont. 2. Aufl.

Dies darf nicht von eisenhaltigen Sauerlingen, noch weniger von Nebenadern unserer Eisensäuerlinge abgeleitet werden; es ist vielmehr nur ein, aus dem Torfe entspringendes, seichtes, eisenhaltiges Quellwasser, das, während es aus dem Torfboden hervorquillt und darüber hinfließt, den Eisenvitriol, welchen dieser enthält⁹⁵⁾, auflöst, das, bei der Zersetzung desselben sich bildende, Eisenorydhydrat mit sich reißt und aber auch sehr bald wieder fallen läßt. So lange noch der Eisenvitriol darin enthalten ist, könnte man solches Wasser den vitriolischen Eisenwässern beizählen; allein da diese Auflösung nur ganz zufällig und nur an der Oberfläche der Erde Statt findet, und diese Wässer nicht aus permanenten, lebendigen Quellen entspringen, können sie als Mineralwässer nicht gelten.

Eine muriatisch = salinische Quelle, die aber weder an Wasser, noch an Salzgehalte sehr ergiebig ist, quillt ostwärts vom Salzbrunnenhause, zwischen diesem und Bödenhausen, in Schäfermeiers Campe (Wiese), dicht am linken Ufer der Emmer; und auch westwärts vom Salzbrunnenhause geben sich, in der Nähe desselben, dicht am Emmerufer, mehre Stellen zu erkennen, an welchen kochsalzhaltiges Wasser hervorquillt.

Die ehemaligen, sogenannten Steinquellen⁹⁶⁾ (aquae tofaceae), eine Art incrustirender Quellen, die noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts, überall da bemerklich waren, wo jetzt Kalktuff anstehet, haben, wie schon erwähnt, aller

⁹⁵⁾ Vergl. S. 130. S. 224.

⁹⁶⁾ Geip Besch. d. Pyrm. Mineralw. S. 110. Ehrhart Beitr. zur Naturf. Bd. 5 S. 111.

Wahrscheinlichkeit nach, unsern Kalktuff ⁹⁷⁾ abgesetzt; es sind deren gegenwärtig keine mehr vorhanden, indem sich nämlich ihre Ausgänge, durch die fortwährende Ablagerung des Kalktuffes, allmählig gänzlich verstopft haben.

Cap. XXVIII.

Eigenschaften unserer Mineralquellen, und chemisches Verhältniß derselben zu einander, zu fremden und künstlichen Mineralwässern.

§. 149.

Den sämtlichen oben genauer bestimmten Mineralquellen ist, als gemeinsamer chemischer Charakter, ein Gehalt an Kohlensäure eigen, der ihr Volumen theils übertrifft, theils, mit Ausnahme der Soolquelle, demselben doch sehr nahe kommt. Dieser Eigenschaft zufolge kann man, da schon zehn Kubitzoll Kohlensäure auf ein Pfund Wasser hinreichen, demselben den Charakter eines Sauerlings zu verleihen ⁹⁸⁾, mit vollem Rechte, sämtliche den Sauerlingen (Sauerbrunnen, aquae acidulae) beizählen. Bei näherer Unterscheidung zerfallen sie, nach der qualitativen und quantitativen Verschiedenheit ihrer Gehalte an festen Bestandtheilen, in drei Classen.

In die erste dieser drei Classen gehört, von unseren Mineralwässern, allein der Sauerling. Ihr bezeichnender Charakter ist ein beträchtlicher Gehalt an Kohlensäure, neben

⁹⁷⁾ Vergl. §. 131.

⁹⁸⁾ Deutschlands Mineralquellen. Von Dr. G. H. Richter. Berlin, 1828. 8. S. 63.

sehr wenigen alkalisch-erdigen Bestandtheilen und gar keinem Eisen. Ihr Gehalt an Kohlensäure, gegen den an festen Bestandtheilen, ist so überwiegend, daß man die Wässer dieser Classe beinahe noch einfache Sauerlinge nennen könnte; nach Better's gräcisirender Nomenclatur heißen sie Anthrakofrenen⁹⁹⁾. Seinem festen Gehalte gemäß, ward unser Sauerling früher den alkalisch-erdigen Wässern zugezählet¹⁰⁰⁾, wofür jedoch sein Gehalt an alkalischen Erden (Magnesia, Kalk), im Verhältnisse zur Kohlensäure, gar zu gering ist. Kretschmar*) zählt ihn zu den Bitterwässern, wofür er jedoch an dem Hauptbestandtheile derselben, der schwefelsauren Magnesia (Bittersalz), im Vergleiche zu den übrigen von ihm den Bitterwässern beigezählten Mineralwässern, deren das geringste, das Seidlitz'er, noch 104 Gran Bittersalz in einem Pfunde enthält, gar zu arm ist. Osann zählt ihn seiner Abtheilung der erdigen Sauerlinge bei¹⁾.

Unserm Sauerlinge zunächst verwandt ist das Sauerwasser zu Deinach oder Teinach, auf dem Schwarzwalde, in Württemberg; dasselbe enthält gegen 0,666 schwefelsauren und 2,5 kohlensauren Natrums in 16 Unzen, und gegen 1 Vol. Kohlensäure²⁾. Verwandt ist ihm ferner der Sauerbrunnen zu Dbermendig, im preussischen Großherzogthume Niederrhein, u. s. w.

⁹⁹⁾ Better Handb. der Heilquellenlehre 2c. Thl. 1. S. 131.

¹⁰⁰⁾ System. Besch. aller Gesundbr. u. Bäder. Bd. 1. S. 140 u. 147. Hoffmann System. Uebers. S. 182.

*) Kretschmar Tabellar. Uebersicht 2c. S. 4 u. 21.

¹⁾ Osann Physik. med. Darst. der bek. Heilq. Thl. 1. S. 270 u. 309.

²⁾ Uebersicht der im Königr. Württemberg u. in den angr. Gegenden befindl. Mineralwasser 2c. von G. C. E. Sigwart. Stuttgart, 1836. 8. S. 9.

Das Selterser Wasser, nach Osann ein alkalisch-muriatischer Sauerling, mit welchem unser Sauerling, hier, von Unkundigen, verglichen zu werden pflegt, unterscheidet sich von demselben wesentlich durch seinen größeren Gehalt an Neutralsalzen, namentlich an Chlornatrium und an kohlensaurem Natrium.

§. 150.

Die zweite Classe bilden, von unseren Mineralwässern, der eisenhaltige Trinkbrunnen, der Brodelbrunnen, der alte, der neue und der westliche Badebrunnen, der Augenbrunnen, der Trampelsche Eisensäuerling und der Neubrunnen. Ihr gemeinschaftlicher bezeichnender Charakter ist ein nicht unbeachtlicher Gehalt an kohlensaurem Eisenoxydul, neben einem ansehnlichen Gehalte an Kohlensäure. Diesen Bestandtheilen zufolge kann man die dieser Classe zugehörigen Mineralwässer Eisensäuerlinge oder eisenhaltige Sauerlinge (*aquae acidulae martiales*), und, da sie an festen Bestandtheilen auch noch vorzugsweise schwefelsaure Alkalien (Natrium) und schwefelsaure alkalische Erden (Magnesia und Kalk), so wie kohlensaure Alkalien und dergleichen alkalische Erden (Kalk) enthalten, erdig salinische Eisensäuerlinge³⁾ nennen. Andere benennen die Mineralwässer der Classe, zu welcher diese unsere Eisenwässer gehören, salinische eisenhaltige Wässer⁴⁾, salinische Stahlwässer⁵⁾, salinische

³⁾ Die Heilkräfte des Pyrmonter Stahlwassers, des versendeten, wie des an der Quelle getrunkenen, dargest. von R. Th. Menke. Pyrmonter, 1835. 8. S. 9.

⁴⁾ System. Besch. aller Gesundbr. u. Bäder. Bd. 1. S. 670.

⁵⁾ Hoffmann System. Uebers. S. 183.

oder neutralsalzige Eisenwässer ⁶⁾), eisenhaltige Wässer mit vorwaltenden schwefel- und salzsauren Salzen ⁷⁾); Dfann zählt sie den erdig-salinischen Eisenwässern bei ⁸⁾ und Better seinen Chalybokrenen ⁹⁾); an diesen Benennungen ist nur auszusagen, daß sie nicht zugleich ihren Gehalt an Kohlen-säure andeuten, und also das a potiori fit denominatio darin unbeachtet geblieben ist.

Unser Neubrunnen, dem man früherhin Aehnlichkeit mit dem Selterser Wasser beimaß ¹⁰⁾), und in dem Westrumb schwefelsaures Eisen aufgefunden zu haben vermeinte, wonach er ein vitriolischer Eisensäuerling sein würde, gehört, der neuesten Analyse zufolge ¹¹⁾), durchaus den erdig-salinischen Eisensäuerlingen an.

§. 151.

Von fremden Eisensäuerlingen ist, unter den benachbarten, die Trinkquelle zu Driburg, unweit Paderborn, in der preussischen Provinz Westphalen, unserem eisenhaltigen Trinkbrunnen unstreitig zunächst verwandt. Die Driburger Trinkquelle enthält, Du Menil's chemischer Analyse zufolge ¹²⁾), in einem Pfunde zu 16 Unzen des Wassers, an festen Be-

⁶⁾ Kretschmar Tabellar. Uebers. S. 6.

⁷⁾ Wächter Abhandl. üb. den Gebr. der vorz. Bäder 2c. S. 111.

⁸⁾ Dfann Physik. med. Darst. der bek. Heilg. Thl. 1. S. 277.

⁹⁾ Better Handb. der Heilquellenlehre 2c. Thl. 1. S. 131. Thl. 2. S. 449.

¹⁰⁾ D. Bened. Muhl. Med. physic. u. Chem. Untersuchung des Pyrmontischen Neu-Brunnens, der mit dem Selter-Brunnen fast gleich kommt. Hannover, 1764. 8.

¹¹⁾ Vergl. §. 143.

¹²⁾ Chemische Forschungen im Gebiete der anorganischen Natur von A. Du Menil. Hannover, 1825. 8. S. 244.

standtheilen, in wasserfreiem Zustande ¹³⁾, 26,50, die Pyrmonter, nach Brandes und Krüger, 22,84 Gr.; in diesen hat Driburg 0,512, Pyrmont 0,739 Gr. kohlenfauren Eisenoryduls; an Kohlensäure hat Driburg 41,65, Pyrmont 44,52 Kubitzoll in einem Pfunde. Driburg enthält demnach mehr feste, namentlich alkalisch-erdige Bestandtheile, aber weniger Eisen und weniger Kohlensäure, als Pyrmont. — Westrumb, der früher sowol das Driburger ¹⁴⁾, als das Pyrmonter Wasser untersucht und die Bestandtheile derselben mit einander verglichen ¹⁵⁾, hatte in einem Pfunde zu 16 Unzen, an festen Bestandtheilen, in wasserhaltigem Zustande, im Driburger 35,24 ¹⁶⁾, im Pyrmonter 27,62 Gr.,

¹³⁾ Der wasserfreie (anhydrische) Zustand, in welchem Du Rönit die angegebenen festen Bestandtheile des Driburger Wassers aufgeführt hat, ist weder von Osann (a. a. D. Thl. 2. S. 448), noch von Better (a. a. D. Thl. 2. S. 457), noch auch von J. Fr. Simon (Die Heilquellen Europa's, mit vorzügl. Berücksichtigung ihrer chem. Zusammensetzung. Berlin, 1839. gr. 8. S. 64) in besondere Erwägung gezogen worden; da dieß nicht geschehen, darf man die festen Bestandtheile Pyrmont's nicht im wasserhaltigen Zustande mit jenen vergleichen; aus solcher Zusammenstellung geht ein Minus für Driburg hervor, das nur in dem eben angeregten ungleichmäßigen Zustande der berechneten, wasserfreien, oder wasserhaltigen, Salze beruhet.

¹⁴⁾ Westrumb Kleine physik. chem. Abhandlungen Bd. 2. Hft. 2. 1788. S. 13 bis 65.

¹⁵⁾ Westrumb Physik. chem. Besch. Tabelle C. zu S. 181.

¹⁶⁾ Westrumb (Kl. phys. chem. Abh. Bd. 2. Hft. 2. S. 63) hat, in der Aufzählung der festen Bestandtheile, in 100 Pfunden 10 Gr. zu viel summiert, daher, für ein Pfund, statt $35\frac{24}{100}$, $35\frac{17}{50}$, außerdem auch noch den Selenit (schwefelsauren Kalk), statt zu $10\frac{17}{20}$, auf $10\frac{17}{25}$ Gr. angegeben. Diese Schreib- oder Druckfehler sind von da in L. W. Ficker's Schrift (Ueber die

in diesen, an kohlensaurem Eisenorydul, im Driburger 1,33, im Pyrmonter 1,055 Gr., an Kohlensäure in jenem 28, in diesem 30 Kubitzoll aufgefunden. Da die Westrumb'schen Analysen auch in Hufeland's, einst vielgelesener Schrift über Deutschlands Heilquellen, den darin mitgetheilten Angaben der Gehalte zu Grunde liegen, ist es auffallend, wie in derselben einige wesentliche Irrthümer in dieser Beziehung, sich, ohne berichtigt zu werden, durch drei Ausgaben hindurch fortpflanzen konnten ¹⁷⁾. Es ist übrigens immerhin wünschenswerth, daß, durch eine neue, vergleichende, gleichzeitig, nach einem und demselben Verfahren, von einem und demselben Chemiker angestellte, Analyse das nähere quantitative und qualitative Verhältniß der Bestandtheile dieser beiden Mineralwässer noch einmal näher bestimmt werden möge ¹⁸⁾.

Die Trinkquelle zu Godelheim, unweit Hörter, an der

Wirkungen der eisenh. Mineralq., insbesondere der Driburger zc. Münster, 1828. 8. S. 77) übergegangen; in letzter ist auch noch, statt kohlensauren Aluminiumoxydes, kohlensauren Kalkes zu lesen; aus Ficker's Schrift sind diese Irrthümer auch in Osann's Darst. (a. a. D.) unbemerkt eingekehrt.

- ¹⁷⁾ Praktische Uebersicht der vorzüglichsten Heilquellen Deutschlands nach eignen Erfahrungen von Chr. W. Hufeland. Berlin, 1815. 8. In der zu S. 306 gehörigen Tabelle ist die Kohlensäure für Pyrmont zu 30, für Driburg zu $24\frac{2}{3}$ Kubitzoll angegeben; in der zweiten (1820) und dritten (1831) vermehrten Auflage ist, in der Tabelle, der Kohlensäuregehalt, nach Westrumb, berichtigt, in einer neu hinzugefügten Tabelle aber, dieser bei Pyrmont auf 40, bei Driburg auf 28 Kubitzoll angegeben worden; dennoch heißt es im Texte der ersten, wie der letzten Ausgabe, Driburg enthalte mehr an kohlensaurem Gase, als Pyrmont.

- ¹⁸⁾ K. Th. Brück, in: Casper's Wochenschr. für d. ges. Heilk. 1839. Nr. 18. S. 283 u. f.

Weser, enthält, nach F. K. Himly ¹⁹⁾, in einem Pfunde zu 16 Unzen, 37,16 Kubitzoll Kohlensäure, an festen Bestandtheilen 36,970, in diesen an einfachem kohlensauren Eisenorydul 0,834 ²⁰⁾, an Chlornatrium 18,996 Gr. und wird, in Rücksicht auf letzteres, schon den eisenhaltigen Kochsalzquellen beigezählt ²¹⁾; sie konnte wol schon für einen erdig-salinischen Eisensäuerling gelten, enthält jedoch kein schwefelsaures Natrum, dafür aber an schwefelsaurer Magnesia 2,199 Gr. — Die Trinkquelle zu Hofgeismar, im Diemel-districte des Churfürstenthums Hessen, enthält, nach Wurzer's neuester Analyse ²²⁾, in derselben Menge, 16,620 Kubitzoll Kohlensäure, an festen Bestandtheilen, in wasserleerem Zustande, 18,402, darunter an kohlensaurem Eisenorydul 0,3005, schwefelsaurem Natrum 2,250, Chlornatrium 8,1961. Durch ihren beträchtlichen Gehalt an letzterm, bei verhältnißmäßig geringerem an Eisen, bildet sie einen Uebergang von den erdig-salinischen Eisensäuerlingen zu den eisenhaltigen Kochsalzsäuerlingen. — Im benachbarten Meinberg, im Fürstenthume Lippe, stehen, als erdig-salinische Eisensäuerlinge, die alte Trinkquelle, der Neubrunnen und die Mineralquelle im Stern mit den unserigen in einiger Verwandtschaft. In Hinsicht auf ihren Gehalt an Kohlensäure steht, Brandes's Analyse zufolge ²³⁾, nur die erstere diesen nahe; sie

¹⁹⁾ K. Himly Nachricht von dem Godelheimer Mineralbrunnen. Göttingen, 1836. 4. 4 Seiten.

²⁰⁾ Better Handb. d. Heilquellenlehre. Thl. 2. S. 458.

²¹⁾ Osann Physik. med. Darst. der bek. Heilq. Thl. 1. S. 303.

²²⁾ Die Mineralquellen zu Hofgeismar u. physik. u. chem. untersucht von Ferd. Wurzer. Marburg, 1825. 8. S. 46.

²³⁾ Brandes Die Mineralq. u. Schwefelschlamm-bäder zu Meinberg. S. 274 bis 311.

enthält deren 1,312 Vol.; die beiden anderen stehen ihr, in dieser Hinsicht, ferner. An festen Bestandtheilen, deren die Trinkquelle 5,2667, die Quelle im Stern 23,3621 enthält, und namentlich an Eisen, dessen die Trinkquelle 0,06, der Neubrunnen 0,1005 enthalten, sind sämtliche Meinberger Eisensäuerlinge weniger reichhaltig, als die unserigen.

Von entfernteren erdig = salinischen Eisensäuerlingen kommen die Trinkquelle zu Liebenstein, im Herzogthume Meiningen, und die zu Bocklet und Brückenau, in Baiern, mit den unserigen am meisten überein.

§. 152.

Es ist schon vielfach versucht worden, das Pyrmonter Wasser, so wie andere Mineralwässer, durch die Kunst nachzuahmen. Diese Kunst der chemischen Nachbildung oder Synthese stützt sich auf die Ergebnisse der chemischen Analyse. Demgemäß setzte man das Pyrmonter Wasser Anfangs nach Angabe der Bergman'schen Analyse zusammen²⁴⁾; später mußte dieß nach Angabe der Westrumb'schen Analyse geschehen. In der neuesten Zeit hat Struve, der die Auf-

²⁴⁾ Description of a Glass Apparatus for making Mineral Waters like those of Pyrmont, Spa, Seltzer etc. By J. H. de Magellan. The second Edition. London, 1779. 8. S. 15 u. 18. Derselben Third Edition, revised etc. London, 1783. 8. S. 25. Duchanoy Versuch über die Kenntniß der miner. Wässer u. die Kunst sie zc. nachzubereiten (a. d. Fr. v. D. Gallisch). Leipzig, 1783. 8. S. 150. Anweisung auf eine wohlfeile Art künstl. Mineralwasser nachzumachen. Berlin, 1791. 8. S. 23. Codex medicamentarius sive Pharmacopoea gallica etc. editus a Facultate medica parisiensi anno 1818 (recus. Lipsiae, 1819. 8.) S. 274.

gabe, natürliche Mineralwässer zu mischen oder künstlich nachzubilden, in der That, mit eben so geistreichem eifrigen Bemühen, als glücklichem Erfolge zu lösen gesucht und in besonderen Trinkanstalten, die in mehren großen Städten Eingang gefunden haben, seine künstlichen Mineralwässer zugänglich gemacht hat, auch das Pyrmonter Wasser, eigener Analyse des natürlichen gemäß ²⁵⁾, nachgebildet.

Es ist einleuchtend, daß bei solcher Nachbildung eben so sehr die Genauigkeit und Richtigkeit der Analyse, als die Kunstfertigkeit, mit welcher die Nachbildung ausgeführt wird, in Anschlag zu bringen ist. So lange noch in beiden Beziehungen Mängel nothwendig Statt finden müssen — denn die Chemie macht noch täglich neue Fortschritte, und bei dem Geschäfte der Anfertigung können so gar leicht zufällige Abweichungen und geringfügige Irrungen Statt haben —, kann und darf man die künstlichen Mineralwässer den natürlichen nicht gleichstellen ²⁶⁾. Die Kunst ist, wie das Verdienst, das diese bis zu ihrer gegenwärtigen Höhe auszubilden vermochte, immer hoch zu achten, sie darf aber nicht der Natur gleichgestellt werden. Durch künstliche Mineralwässer, diese als pharmakodynamische Heilmittel betrachtet, können ohne Zweifel Wirkungen geleistet werden, denen ganz

²⁵⁾ Vergl. S. 136. S. 235.

²⁶⁾ »Es ist mir die große Freude geworden, nach und nach das Urtheil vieler der vorzüglichsten Aerzte sich darüber vereinigen zu sehen, daß meine künstlichen Mineralwässer in keiner Beziehung den natürlichen nachstehen.« Struve Ueber die Nachbildung der nat. Heilg. Hft. 2. S. 3. In seiner Antikritik in Rust's krit. Repertor. f. d. ges. Heilk. Bd. 1. Hft. 1, sagt derselbe, daß sein künstliches Mineralwasser mit dem natürlichen »chemisch identisch« sei.

ähnlich, welche natürliche Mineralwässer zu leisten im Stande sind; diese Wirkungen sind aber nicht das eigentliche wahre und gewiß nicht das alleinige Kriterium, nach welchem, bei einer ganz vorurtheilsfreien Prüfung, die Gleichartigkeit auf verschiedenartige Weise hervorgebrachter Heilmittel beurtheilt werden darf. Selbst, wenn sinnlich wahrnehmbare Unterschiede nicht Statt fänden, die doch an dem versendeten künstlichen Pyrmonter Wasser aus der Struveschen Anstalt in Dresden, wirklich bemerkt worden sind ²⁷⁾, würden die unaufhörlichen Fortschritte der Chemie, der analytischen, wie der synthetischen, stets ein unwiderlegliches Argument gegen die Unfehlbarkeit dieser Wissenschaft selbst, in der doch die Kunst beruhet, abgeben.

§. 153.

Die dritte der genannten Classen begreift, von unsern Mineralwässern, die Kochsalzhaltigen Trink- und Badebrunnen und die Soolquelle in sich. Der gemeinschaftliche bezeichnende Charakter dieser Classe von Mineralwässern ist ihr beträchtlicher Gehalt an Chlornatrium (salzsaurem Natrium, Kochsalz). Außerdem enthalten sie, an festen Bestand-

²⁷⁾ Bemerkungen über einige versendete Struvesche Mineralwasser, vom Med. = u. Reg. = Rath Dr. Wegler, in: Hufeland u. Osann Journ. d. pract. Heilk. Bd. 65. 1827. St. 9. S. 111 bis 123, und desselben Anzeige der Struveschen Schrift 2c. in: Salzab. med. chir. Ztg. 1828. Bd. 2. Mai. Nr. 38. S. 193 u. f. Gegen jene Bemerkungen bemerkt Struve, in: Hufeland u. Osann Journ. d. pr. Heilk. Bd. 68. 1829. April. S. 82 bis 101, daß der von Wegler gerügte Gehalt an Schwefelwasserstoffgas einer Zersetzung der schwefelsauren Salze mittels einer zufällig in jene Flasche gerathenen vegetabilischen Substanz zuzuschreiben sei.

theilen, schwefelsaures Natrium, Chlormagnesium, kohlensaures Natrium und kohlensauen und schwefelsauren Kalk; an kohlensaurem Eisenorydul nicht bis zu 0,1 Gr.; an Kohlensäure eine Menge, die ihr Volumen noch übertrifft, wovon jedoch die Soolquelle, da sie nur gegen 0,67 enthält, eine Ausnahme macht. Man könnte sie demnach, da ihr Eisengehalt kaum mit in Anschlag zu bringen sein dürfte, Kochsalzsäuerlinge nennen; Wächter führt sie unter seinen muriatisch=kohlensauen Wässern auf ²⁸⁾; gewöhnlich begreift man sie unter dem Namen der muriatisch=salinischen Wässer ²⁹⁾; Kretschmar zählt sie der Classe der salinischen, in dieser der Gattung der muriatischen Wässer ³⁰⁾, Osann den Kochsalzwässern und, unter diesen den Soolquellen ³¹⁾ bei; Better nennt sie Halikrenen ³²⁾.

Von fremden Kochsalzsäuerlingen hat das benachbarte sogenannte Meinberger Mineralsalzwater, im Lippeschen Amte Schieder, einige Verwandtschaft mit unserer kochsalzhaltigen Trinkquelle, ist jedoch, Brandes's Analyse zufolge ³³⁾, eben so wol an festen Bestandtheilen, deren sie in einem Pfunde 78 Gr., worunter an schwefelsaurem Natrium 11,0129, Chlornatrium 40,9511, Chlormagnesium 6,3123 Gr., als zumal an Kohlensäure, deren sie nur 0,3725 Vol. enthält, ärmer als die unserige, und führt kein kohlensaures Natrium.

²⁸⁾ Wächter Abhandl. üb. den Gebr. d. vorz. Bäder 2c. S. 106.

²⁹⁾ Bestrumb Von der neuen mur. sal. Mineralq. 2c. System. Besch. aller Gesundbr. u. Bäder. 2c. Bd. 1. S. 199.

³⁰⁾ Kretschmar Tabellar. Uebersicht 2c. S. 4 u. 21.

³¹⁾ Osann Physik. med. Darst. der bef. Heilq. Thl. 1. S. 262 u. 301.

³²⁾ Better Handb. der Heilquellenlehre Thl. 1. S. 130. Thl. 2. S. 449.

³³⁾ Brandes Die Mineralq. u. Schlamm. zu Meinberg. S. 344.

Noch größere Uebereinkunft mit unserm Kochsalzhaltigen Trinkbrunnen haben, nach ihrem Gehalte an festen sowol, als flüchtigen Bestandtheilen, der Rakocz und der Pandur zu Kissingen, in Baiern. Kastner's Analyse zufolge ³⁴⁾, enthält der Rakocz, in einem Pfunde, 26,85, der Pandur 28,85, unser pyrmonter Kochsalzhaltige Trinkbrunnen 26,19 Kubitzoll Kohlensäure; an festen Bestandtheilen enthält der Rakocz 85,74, der Pandur 76,02, der unserige 108,7 Gr.; in diesen, an schwefelsaurem Natrum, der Rakocz 2,00, der Pandur 1,75, der unserige 12,24; an Chlornatrium der Rakocz 62,05, der Pandur 57,00, der unserige 65,49; an Chlormagnesium der Rakocz 6,85, der Pandur 5,85, der unserige 12,07; an kohlensaurem Eisenorydul der Rakocz 0,68, der Pandur 5,85, der unserige 0,065; sie enthalten sämmtlich auch Spuren von kohlensaurem Manganorydul. Aber ungeachtet dieser großen Aehnlichkeit, auf die schon Wegler aufmerksam gemacht hat ³⁵⁾, könnte doch der größere Eisengehalt der Kissingener Brunnen berechtigen, diesen, im Systeme eine andere Stelle anzuweisen, und Osann zählt sie daher den eisenhaltigen Kochsalzquellen bei ³⁶⁾.

Nicht unerwähnt darf hier die Aehnlichkeit dieser Kochsalzhaltigen Mineralwässer mit dem Seewasser, insbesondere mit dem der Ostsee bleiben. Das Wasser derselben enthält in einem Pfunde, bei Doberan 129,50 Gr. feste Bestandtheile, in diesen 87,60 Chlornatrium, 37 Chlormagnesium; bei Travemünde 127,88 Gr. feste Bestandtheile, in diesen

³⁴⁾ Simon Die Heilquellen Europa's 2c. S. 122, 123.

³⁵⁾ Besch. der Gesundbr. u. Bäder Wipfelb, Kissingen, Voßlet u. Brückena u. 2c. Von J. C. Wegler. Mainz, 1821. 8. S. 62.

³⁶⁾ Osann Physik. med. Darst. der bef. Heilq. Thl. 1. S. 302.

72,0 Chlornatrium, 36,0 Chlormagnesium, 14,88 schwefelsaures Natrum; bei Kiel 132,4 Gr. feste Bestandtheile, in diesen 92,0 Chlornatrium, 30,0 Chlormagnesium, 6,0 schwefelsaure Kalkerde³⁷⁾). Das Ostseewasser ist demnach reicher an Salzen, namentlich an Chlornatrium, enthält dagegen nirgend über 2 Kubitzoll Kohlensäure. Das Wasser der Nordsee hat einen noch größern Salzgehalt, gegen 260 Gr. feste Bestandtheile, aber keine Kohlensäure.

Hufeland verglich unsern Kochsalzhaltigen Trinkbrunnen dem Selterser und Biliner Wasser³⁸⁾; aber diese beiden Mineralwässer unterscheiden sich wesentlich durch ihren Reichthum an kohlensaurem Natrum.

Cap. XXIX.

Nähere chemische Betrachtung der einzelnen Bestandtheile unserer Mineralquellen.

§. 154.

Aus der Uebersicht der Bestandtheile unserer Mineralquellen ergibt sich, daß einige derselben allen, andere nur einzelnen derselben gemein sind. Die Bestandtheile verleihen sowol den Mineralquellen überhaupt, durch die vorherrschende Menge, in welcher sich einzelne derselben in ihnen vorfinden, ihren eigenthümlichen allgemeineren Charakter, als den einzelnen Quellen, durch die relativen Verhältnisse der verschiedenartigen Bestandtheile unter einander, oder ihrer Verbindung mit anderen, weniger wesentlichen, Bestandtheilen, ihre

³⁷⁾ Vergl. Damm a. a. D. Thl. 2. S. 838 u. f.

³⁸⁾ Hufeland Prakt. Uebers. d. vorz. Heilq. Deutschl. Dritte Aufl. S. 73.

besonderen Unterscheidungsmerkmale. Ihre verschiedenartigen einzelnen näheren Bestandtheile verdienen daher, auch für sich, eine aufmerksame chemische und physikalische Beachtung.

Dies gilt vorzugsweise von der Kohlensäure (Kohlensäure, fixe Luft, Luftsäure, der Brunnengeist), die, bei uns, nicht nur Bestandtheil aller oben aufgeführten Mineralwässer ist, sondern außerdem auch noch, in gasförmiger Gestalt, als kohlensaures Gas, über den meisten unserer Sauerlinge vorkommt, und sich, als solches, auch in unserer Gashöhle, in bedeutender Menge, frei entwickelt. Diese flüchtige Säure, die erst in neuester Zeit, seit 1832, durch Thilorier, in schneeartig fester Gestalt dargestellt worden ist, da man sie bis dahin nur, durch eine, bei 40 Atmosphären Druck und 0 Grad Temperatur bewirkte Compression des kohlensauren Gases, zu einem leichtfließenden Liquidum hatte bringen können, ist am längsten und meisten in elastisch flüssiger Gestalt, als kohlensaures Gas, bekannt. Sie ist, als solches, farblos, unsichtbar, vollkommen durchsichtig, hat keinen Geruch, bringt aber eine prickelnde Empfindung in den Geruchsnerven hervor, besitzt einen säuerlich stechenden Geschmack, und ertheilt blauen Pflanzensarben eine, durch Verflüchtigung der Kohlensäure vorübergehende, Röthung. Sie ist specifisch, etwa 1,5 mal, schwerer, als die gemeine atmosphärische Luft, zu deren Bestandtheilen sie indeß gehört; sie macht auch einen Bestandtheil des Kalksteins, der Kreide und anderer Mineralien aus. Von den meisten anderen Säuren wird sie aus ihren Verbindungen getrieben; sie entweicht dann gasförmig, unter Entwicklung einer Menge von Luftblasen, die, in einer Flüssigkeit sich entwickelnd, Aufbrausen bewirken. Sie bildet sich auch durch

Verbrennung der Kohle, bei vollkommenem Zutritte von Sauerstoff, besteht aus 27,65 Kohle und 72,35 Sauerstoff. Selbst der Verbrennung unfähig, gestattet sie auch nicht, daß der Verbrennungsproceß irgend eines brennbaren Körpers in dem mit ihr angefüllten Raume vor sich gehe, oder der außerhalb schon begonnene in demselben fortbestehe. Sie wird auch, beim Athmen der Thiere, aus dem Blute, zumal dem venösen, durch die Lungen ausgeschieden³⁹⁾, ist nicht athembar, tödtet vielmehr Thiere, die sie athmen, doch nicht durch Erstickung, sondern durch narkotische Vergiftung; es kann indeß die gemeine Luft ihrer noch 0,05 Vol. enthalten, ohne schädlich zu werden; bei mehr als 0,15 Vol. wirkt sie schon tödlich.

In unserer Gashöhle⁴⁰⁾ steigt das kohlen saure Gas unmittelbar aus dem Erdboden hervor⁴¹⁾. Es nimmt in derselben die unterste Luft- oder Dunstschicht ein, die bald einen Stand von nur einem Fuß Höhe hat, bald die ganze Grotte erfüllt und eine Höhe von 15 Fuß erreicht. Die Veränderlichkeit ihres Höhestandes ist abhängig von meteorischen Einflüssen, dem Drucke, der Temperatur, der Feuchtigkeit, den Strömungen, der Electricität der Luft, und selbst vom Einflusse der Himmelskörper⁴²⁾. Der Gehalt der Dunstschicht an kohlen saurem Gase ist nicht immer, und auch in der

³⁹⁾ Handbuch der Physiologie des Menschen von Joh. Müller. Bd. 1. Dritte verb. Aufl. Coblenz, 1838. 8. S. 334.

⁴⁰⁾ Bergl. S. 113. §. 71.

⁴¹⁾ J. Ph. Seip Relatio de caverna vaporifera sulphurea in lapidina pyrmontana etc. in den: Miscellan. berolinens. ad increm. scient. Contin. 4. s. Tom. 5. Hal. Magdeb. 1737. 4. N. IV. S. 102 bis 105.

⁴²⁾ Bergl. S. 114.

Menke, Pyrmont. 2. Aufl.

Dunstschicht selbst nicht überall von gleichmäßiger Stärke. Bei einer Höhe der Dunstschicht von 13 Fuß enthielt diese, in der Tiefe der Dunstfäule 0,84, bei einer Höhe der Dunstschicht von 3 Fuß nur 0,37 Vol. Kohlensäure ⁴³⁾. Die charakteristischen Eigenschaften der Kohlensäure geben sich aber auch noch in dieser Verbindung in der Gashöhle zu erkennen. Sobald man sich, mit offenem Munde oder der Nase bis in die kohlen saure Dunstschicht hinabneigt, nimmt man, durch den Geruch und Geschmack, die Empfindungen wahr, welche gährendes Bier, oder Champagner (durch dasselbe Gas) auf diese Sinne hervorbringen. Seifenblasen, die man von oben in die Gashöhle fallen läßt, bleiben unmittelbar über der Dunstschicht schweben; der Dampf des in der atmosphärischen Luft angezündeten Schießpulvers bleibt wie ein kleiner Wolkenhimmel über der Dunstschicht ruhen. Die Flamme eines außerhalb der Gashöhle angezündeten Bündels Stroh, wenn solches, hoch auflodernd, in die Dunstschicht hinabsenkt wird, erstickt in dieser augenblicklich. Auch das thierische Leben erlischt darin. Mehrmals haben leider auch schon Menschen, aus Lebensüberdruß, ihren Tod in der Gashöhle gesucht und gefunden ⁴⁴⁾. An einem Hunde, einem Raben, oder einem Frosche, den der Aufseher in der Gashöhle bis zur Betäubung und zum

⁴³⁾ Brandes u. Krüger Neue physik. chem. Besch. 2c. S. 162.

⁴⁴⁾ Casper, in f. Wochenschrift f. d. ges. Heilk. 1838. Nr. 38. S. 624, erzählt, es haben seit 1811 schon elf Selbstmorde darin stattgefunden. Diese Angabe ist unrichtig. Seit dem genannten Jahre, und mit Einschlusse desselben, fanden nur drei Personen, ein Apothekergehilfe, ein Wundarztgehilfe und ein Handwerksbursche in unserer Gashöhle ihren Tod.

Scheintode hinsinken läßt, pflegt dieser die tödtliche Einwirkung des Gases auf die Thiere zu versinnlichen. Es tritt sofort Beklemmung des Athems ein, mit Betäubung und Unfähigkeit sich fortzubewegen; Zuckungen in den Gliedern folgen; hierauf Scheintod, der allmählig in wirklichen Tod übergeht⁴⁵⁾. Man trifft nicht selten in und vor der Gashöhle Thiere an, Hasen, Vögel (*Motacilla erithacus*), auch öfters Thiere niederer Stufe, Insekten, zumal Käfer, Netzflügler⁴⁶⁾, auch Myriapoden (*Iulus* und *Scolopendra*), die hier zufällig ihren Tod fanden; andere, wie die in der Fauna beschriebene Blattlausart und besonders häufig die Gartenschnecke (*Helix hortensis*), habe ich mehrmals lebend und, dem Anscheine nach, munter und un gefährdet in dieser Dunstschicht angetroffen.

Ueber den Mineralquellen schwebend findet sich, bei uns, eine ähnliche kohlen saure Dunstschicht, insbesondere über der eisenhaltigen Trinkquelle, dem Brodelbrunnen und dem Neubrunnen. Unsere Mineralquellen entbinden sämmtlich, in größerer oder geringerer Menge, freie Kohlensäure. Das Aufwallen und Ausbrausen der Mineralquellen überhaupt, ist meistens der Entwicklung ihres Gehaltes an freier

⁴⁵⁾ Nach den, unter von Graefe's Leitung, im August 1831, in der Gashöhle angestellten Versuchen und darüber von Steinmeg aufgezeichneten Beobachtungen (in v. Graefe's u. v. Walther's Journ. f. Chir. u. Augenheilk. Bd. 20. Hft. 1. 1833. S. 52 bis 75), starb ein Hund innerhalb 2 Stunden, 52 Minuten, eine Katze innerhalb 15 Min., 10 Sec., eine Taube innerhalb 2½ Min., ein Huhn innerhalb 2¾ Min.

⁴⁶⁾ Am 4 Mai 1825 fand ich auf der obersten Stufe der Gashöhle 30 Exemplare der *Phryganea flava*, meist todt; einige erholten sich langsam wieder, aber nicht vollkommen.

Kohlensäure beizumessen ⁴⁷⁾. Die über unseren Mineralquellen schwebende Dunstschicht bietet der sinnlichen Wahrnehmung dieselben Eigenschaften dar, als die in der Gashöhle befindliche. Ihr Höhestand ist, durch meteorische Einflüsse, ebenfalls dem Wechsel unterworfen, und daher bald geringer, bald beträchtlicher. Ueber den überbaueten Eisensäuerlingen (dem Trinkbrunnen und Neubrunnen) häuft sich, wenn die Thüren des Brunnenhauses eine Zeitlang geschlossen waren, diese Dunstschicht zuweilen so sehr an, daß man derselben dann nicht ohne Gefahr nahen darf. So fielen am 1 Januar 1830, gegen Abend, nach einander, ein Paar Menschen, die außerhalb dem Brunnenhause, am Abflusse der Trinkquelle, Brunnen hatten schöpfen wollen, betäubt nieder und kamen erst in der freien Luft wieder zu sich. Wir hatten hohen Barometerstand, Frostwetter, Westwind; die Erde war mit Schnee bedeckt. Ob dieser die Exhalationen der freien Kohlensäure im Umfange der Quelle behindern und der Frost sie in dem wärmeren Wasser der Mineralquelle condensiren mochte? Es hatte beinahe seit Martini Frostwetter angebauert. Am 24 Januar desselben Jahres fand derselbe Fall, bei einem Kinde, statt. — Ueber dem Brodelbrunnen war die Gasausströmung von jeher sehr bemerklich; als derselbe noch unbedeckt offen lag ⁴⁸⁾, konnte man, bei stillem Wetter, das über dem Wasserspiegel schwebende Gas mit dem Hute abschöpfen. Seit diese Dunstschicht als Gasbad benutzt wird, ist, zu diesem Zwecke,

⁴⁷⁾ *Trois mémoires sur les eaux minérales*; par M. Longchamp. Paris, 1835. 8. S. 18.

⁴⁸⁾ Vergl. S. 141.

über die Quelle ein großer, viereckiger hölzerner Trichter gestürzt worden, der oben in ein kurzes Rohr ausgeht. Diesem Rohre entströmen, nach einer, im Februar 1834, von Krüger, im Gasbade vorgenommenen, mittels eines Ballons angestellten Messung, innerhalb einer Minute $2\frac{1}{3}$, und also innerhalb einer Stunde 140 rheinl. Kubikfuß Gas. Dasselbe mit dem Humboldt'schen Anthrakometer auf seinen Kohlensäuregehalt untersucht, enthielt, unmittelbar aus dem Rohre strömend, 97,6, bei einem Stande des Gases von 4 Zoll-über dem Boden, 72,5, beim Stande des Gases von 2 Fuß, 51,3, beim Stande desselben von $2\frac{1}{2}$ Fuß, 43,4, beim Stande des Gases von 3 Fuß 5 Zoll, bei welcher Höhe das Licht erlosch, 15,0 Vol. Kohlensäure. Auf seinen Gehalt an Feuchtigkeit geprüft, gaben Versuche mit Chlorcalcium zu erkennen, daß 100 Kubikzoll dieses Gases 29,41 Gran Feuchtigkeit enthielten. Die Temperatur des freigewordenen Gases wird durch die dasselbe umgebende Atmosphäre modificirt; ursprünglich ist sie die der Quelle, durch welche das Gas streicht. Ueber dem Trampelschen Eisensäuerlinge schwebt ebenfalls, bei heiterm, stillem Wetter, eine kohlensaure Dunstschicht, und Trampel ließ diese, in seinem Garten befindliche Quelle, durch einen leichten Ueberbau bedecken, weil mehrmals Nachtigallen in der Dunstschicht umgekommen waren ⁴⁹⁾). Auch über der Soolquelle ist eine kohlensaure Dunstschicht bemerklich.

In den Mineralwässern selbst ist ebenfalls eine zum Theile ansehnliche Menge Kohlensäure enthalten, und zwar sowol freie, als an Basen gebundene. Die freie

⁴⁹⁾ Vergl. S. 245.

Kohlensäure ist theils ungebundene, diejenige nämlich, welche die Wassersäule der Quelle, vom Boden bis zum Spiegel derselben hinauf, durchströmt und sich im Wasser gleichsam nur im Zustande der Suspension befindet, und die von der über dem Wasserspiegel ruhenden Schicht Kohlensäuregas in dem Wasser mehr zurückgehalten wird ⁵⁰⁾; theils gebundene, diejenige nämlich, die von dem Wasser aufgesogen, in demselben aufgelöst enthalten, und dann als Bestandtheil des Mineralwassers anzusehen ist. Das Volumen der in unseren Mineralwässern aufgelöseten freien Kohlensäure übertrifft in einigen derselben das des Wassers; in den übrigen kommt es diesem doch nahe. Das mit gebundener freier Kohlensäure imprägnirte, zum Theile gesättigte Wasser verleiht den Mineralquellen den säuerlichen Geschmack, von welchem diese den Namen Sauerbrunnen führen. Die an Basen gebundene Kohlensäure unserer Mineralwässer ist, durch Vereinigungsverwandtschaft, mit Alkalien, alkalischen Erden und Metallen verbunden.

§. 155.

Von freien Säuren ist außerdem nur noch die Hydrothionsäure (Schwefelwasserstoffgas), ebenfalls eine flüchtige Säure und von höchst geringer Mächtigkeit, da sie von allen anderen Säuren entbunden wird, aber aus der Reihe der Wasserstoffsäuren, und nur in der eisenhaltigen Trinkquelle und dem Brodelbrunnen, aber auch in diesen nur in der höchst geringen Menge von 0,0314 und 0,015 Vol.

⁵⁰⁾ Die Mineralquellen zu Roisdorf etc. von Dr. Gust. Bischof. Bonn, 1826. 8. S. 39.

vorhanden; nur Spuren derselben sind in der Soolquelle aufgefunden worden. Sie kommt, ebenfalls nur in der gedachten Trinkquelle, auch noch in Verbindung mit Natrium vor. Zu den wesentlichen Bestandtheilen unserer Mineralquellen gehört sie eben so wenig, als die sogenannte Kieselerde oder Kieselsäure, die zwar, wie die Kohlensäure, eine Sauerstoffsäure, aber ein permanenter, schwerlöslicher Stoff ist, von dem in unserer Trinkquelle Westrumb keine Spur entdeckte, Brandes und Krüger in 16 Unzen 0,0954, Struve in derselben Menge beinahe 0,5 Gran aufgefunden haben.

§. 156.

Die übrigen in unseren Mineralwässern vorhandenen salzigen Bestandtheile sind Salze, Verbindungen der Säuren mit Basen. Von den vorhandenen Basen sind, vorzugsweise sogenannte, Alkalien oder leicht lösliche Alkalien, Natrium, Kali, Lithium; schwerlösliche Alkalien oder alkalische Erden, Kalk, Magnesia (Talk, Bittererde), Baryt, Strontian; eine unlösliche Base, die Thonerde, an Säure nicht, oder doch nur an Phosphorsäure gebunden; und metallische Basen oder, nach älterm engerm Begriffe, Metalle, Eisen und Mangan.

Schwefelsaures Natrium (Glauber Salz) kommt in den mehren unserer Mineralquellen, am beträchtlichsten im Kochsalzhaltigen Trinkbrunnen, in diesem zu 12,246, im Kochsalzhaltigen Badebrunnen und im Neubrunnen, in diesem zu 7,345 Gran in 16 Unzen, im Brodelbrunnen und alten Badebrunnen kommt es gar nicht vor. Chlornatrium (salzsaures Natrium, Kochsalz) ist in den mehren unserer Mineralquellen vorhanden, im eisenhaltigen Trinkbrunnen

nur in sehr geringer Menge; in den Kochsalzfäuerlingen überwiegt es an Menge alle übrigen festen Bestandtheile. Die Gegenwart des kohlensauren Natrums (Natroncarbonat, Sodasalz, Mineralalkali), zumal im Brodelbrunnen und im eisenhaltigen Trinkbrunnen, glauben Brandes und Krüger nachgewiesen zu haben ⁵¹⁾; Vetter will solche nicht gelten lassen, da das Beisammensein von Gyps und kohlensaurem Natrum gegen die chemische Wahlverwandtschaft streitet, was Weftrumb und Struve, die dieses Salz den Bestandtheilen unserer Mineralquellen nicht beizählen, wohl berücksichtigt haben ⁵²⁾. Hydrothionsaures Natrum wird der Trinkquelle, zu 0,0657 Gr. auf 16 Unzen, zugeschrieben. Spuren phosphorsauren Natrums fanden sich im kochsalzhaltigen Trinkbrunnen. — Die Kali- und Lithiumsalze spielen in unseren Mineralquellen eine unbedeutende Rolle. Nur Struve fand in 16 Unzen der eisenhaltigen Trinkquelle 0,0419 Gr. schwefelsauren Kalis; im kochsalzhaltigen Trinkbrunnen fanden Brandes und Krüger Spuren dieses Salzes auf. Phosphorsauren Kalis schreiben letztere der eisenhaltigen Trinkquelle 0,1012, der Soolquelle 0,0220 Gr. zu; im Brodelbrunnen, Augenbrunnen und Neubrunnen fanden sie nur Spuren dieses Salzes auf. — Schwefelsaures Lithium findet sich in höchst geringen Mengen in den mehrsten unserer Eisensäuerlinge; der kochsalzhaltige Trinkbrunnen enthält dessen am meisten, aber doch auch nur 0,087 Gr. in 16 Unzen. Schwefelsaurer Kalk (Gyps, Selenit) gehört un-

⁵¹⁾ Brandes u. Krüger Neue physic. chem. Besch. 2c. S. 261. u f.

⁵²⁾ Vetter Handb. d. Heilquellenlehre Thl. 2. S. 449.

feren sämmtlichen Mineralquellen als Bestandtheil an; die Soolquelle besitzt dessen am meisten: 14,5 Gr. in 16 Unzen; nur im Neubrunnen hat die Analyse ihn nicht ausfindig gemacht. Chlorkalcium (salzsaurer Kalk), das Westrumb unter den Bestandtheilen des Kochsalzhaltigen Trinkbrunnens aufführt, giebt die neuere Analyse in keiner unserer Mineralquellen an. Kohlenfauren Kalk führen unsere sämmtlichen Quellen, am reichlichsten der Neubrunnen, der dessen 7,8638 Gr. in 16 Unzen enthält. Von phosphorsaurem Kalke sind Spuren in den Eisensäuerlingen und in dem Kochsalzhaltigen Trinkbrunnen, im Neubrunnen sind 0,0192, in der Soolquelle 0,0750 Gr. in 16 Unzen aufgefunden worden. — Schwefelsaure Magnesia (Bittersalz) fehlt nur in dem Kochsalzhaltigen Trinkbrunnen; der eisenhaltige Trinkbrunnen, der die größte Menge dieses Salzes enthält, hat dessen doch, nach Westrumb, Brandes und Krüger, nur 5,5, nach Struve nur 2,7 Gr. Chlormagnesium (salzsaurer Kalk) kommt in unseren sämmtlichen Mineralquellen vor; in den Eisensäuerlingen beläuft sich die Menge desselben auf etwa 1,5 Gr.; die Kochsalzsäuerlinge enthalten dessen größere Mengen; die größte enthält der Kochsalzhaltige Trinkbrunnen, dem Brandes und Krüger 12,07 Gr. in 16 Unzen zuschreiben. Kohlenfaure Magnesia ist unseren sämmtlichen Quellen gemein; Westrumb maß ihnen größere Mengen derselben bei, Brandes und Krüger geringere; jenem zufolge enthält die größte Menge, 5,92 Gr., der Kochsalzhaltige Trinkbrunnen, dem sie nach letzteren gänzlich fehlt. — Schwefelsauren Strontian enthält, nach Brandes und Krüger, wie nach Struve, der eisenhaltige Trinkbrunnen 0,0211, die Soolquelle 0,0145 Gr.

in 16 Unzen; die übrigen Quellen enthalten dessen, jenen zufolge, nur Spuren. — Noch geringer ist der Gehalt unserer Quellen an schwefelsaurem Baryt, dessen, in derselben Menge der Trinkquelle, Brandes und Krüger 0,0015 Gr. auffanden, Struve keine Spur entdeckte.

Thonerde (Alaunerde, Aluminiumoxyd) maß, als reine Thonerde, Trampel dem Trampel'schen Eisensäuerlinge, wie den Kochsalzsäuerlingen, von 1 bis 6 Gr. in 16 Unzen, bei, Westrumb nur dem alten Badebrunnen und dem kochsalzhaltigen Badebrunnen zu 0,8 Gr. in derselben Menge. Phosphorsaure Thonerde schreibt nur Struve dem eisenhaltigen Trinkbrunnen 0,0147, Brandes und Krüger schreiben solcher 0,1260 dem Neubrunnen, 0,1249 Gr. der Soolquelle, nur Spuren derselben dem kochsalzhaltigen Trinkbrunnen zu.

Als Eisensalz ist nur kohlensaures Eisenoxydul in unseren Eisensäuerlingen vorhanden; keiner derselben enthält dessen, der neuern Analyse zufolge, bis zu einem Gran, der kochsalzhaltige Trinkbrunnen und die Soolquelle nur bis zu 0,08 Gr. in 16 Unzen. Man nannte das Eisen der Mineralquellen ehemals, vielleicht nur der Kürze, vielleicht aber auch des Wohllautes wegen, oder um die Kraft des veredelten Eisens darin anzudeuten, Stahl, und daher die Mineralwässer, die solches enthielten, Stahlwässer; diese Benennung, obgleich chemisch unstatthaft (Stahl ist eine Verbindung des Eisens mit der Kohle, die weniger Kohle als das Roheisen enthält), hat doch, aus den genannten Rücksichten, auch in wissenschaftliche Werke Eingang gefunden. — Kohlenfauren Manganoxydul enthält die eisenhaltige Trinkquelle, nach Brandes und Krüger,

nur 0,0200, nach Struve 0,0485 Gr., der Brodelbrunnen, Augenbrunnen, Neubrunnen und Kochsalzhaltige Trinkbrunnen, nach jenen, nur Spuren in 16 Unzen.

Von Brom fand Krüger in unseren Kochsalzsäuerlingen Spuren auf, ohne indeß bis jetzt seine Verbindungen in denselben ermittelt zu haben.

Derjenige organische Bestandtheil, den Westrumb als Harzstoff, Brandes und Krüger als Harz oder harzige Materie aufführen, den Andere harzigen Extractivstoff nennen, und der fast in allen unseren Mineralquellen angetroffen wird, ist in der Mehrzahl unserer Eisensäuerlinge kaum bis zu 0,12, im Neubrunnen von Brandes und Krüger zu 0,22 Gr. angegeben. Westrumb unterscheidet davon den (schleimigen) Extractivstoff, dessen er, im Neubrunnen, in Verbindung mit Harz, 0,54, und, im Kochsalzhaltigen Trinkbrunnen, neben 0,2 Harzstoff, für sich, 0,72 Gr. in 16 Unzen aufführt.

Cap. XXX.

Nähere chemische und physikalische Betrachtungen
unserer Mineralquellen.

§. 157.

Worin beruhen aber die mehrfachen Verschiedenheiten in den Resultaten der chemischen Analyse? die Angaben verschiedenartiger Verhältnisse in den qualitativen und quantitativen Bestandtheilen in einem und demselben Wasser? die Abweichungen in den Mengen der einzelnen, wie der sämtlichen Bestandtheile? und wie kommen, in demselben,

hie und da, Bestandtheile beisammen vor, die sonst, nach den bekannten Gesetzen der chemischen Wahlverwandtschaft, nicht neben einander bestehen können? Sollten in natürlichen Mineralwässern wirklich Verbindungen ungestört coëxistiren können, die gegen die Gesetze der chemischen Wahlverwandtschaft streiten? Liegt diesen Abweichungen im Befunde und von der Norm der Wissenschaft die Unvollkommenheit der Kunst und des Wissens zu Grunde? Haben die Fortschritte der analytischen Chemie Theil daran? Oder sind die in den Mineralquellen enthaltenen Bestandtheile nicht beständig gleichartig? ihre Mengen nicht beständig gleichmäßig? Sollten die Mischungsverhältnisse der Bestandtheile der Mineralwässer wirklich einem Wechsel unterworfen sein?

Solche und ähnliche Fragen und Zweifel müssen sich dem unbefangenen Naturforscher, bei Vergleichung der verschiedenartigen Resultate der Analyse, nothwendig aufdrängen. Sie beschäftigten auch mich schon bei Bearbeitung der ersten Ausgabe der vorliegenden Schrift. Damals schien mir die positive Wissenschaft keinen Ausweg zu einer befriedigenden Lösung derselben darzubieten, und ich trat daher der Ansicht derjenigen Naturforscher bei, die ein den Mineralquellen eigenthümliches Leben statuiren, das, den bisher in der anorganischen Chemie erfahrungsmäßig aufgefundenen Gesetzen nicht unterworfen, eigene Mischungsverhältnisse gestattete, betrachtete, mit ihnen, die Mineralquellen als Mischungen, die unveränderlich gleichmäßig erzeugt, gleichsam als organische Flüssigkeiten der Erde entströmten, und nahm selber ein Agens an, das, aus einem hyperphysischen Zeugungsproceß hervorgegangen und nur der höheren Physik

offenbar, sich der sinnlichen Wahrnehmung durch kein Reagens kund thue, und statuirte ein dynamisches Vereinigungsmittel und unwägbare Stoffe, welche die heterogenen Verbindungen und Mischungsverhältnisse gestatteten und unterhielten ⁵³). Diese naturphilosophischen Ansichten sind seitdem, gegen eine die empirische Wahrheit suchende und nur die mathematische Gewißheit vollkommen anerkennende Skepsis, immer mehr zurückgetreten. Die nicht bloß negierende, nur der Einseitigkeit des Wissens entgegenstrebende Skepsis gewährt der Speculation, allerdings auch in den physikalischen Wissenschaften, wohl Andeutungen, Fingerzeige, Analogieen, aber keine Lehrsätze, die nicht auf dem ruhigen und sichern Wege getreuer Naturbeobachtung und Erfahrung erworben wären; dieser aber bleibt immer offen, wie die unendliche Natur, und so ist immer Aussicht vorhanden, das vor der Hand noch Unbegreifliche in gewissen physikalischen und chemischen Erscheinungen, mit der Zeit noch, durch erfahrungsmäßig aufgefundene Naturgesetze, erklärt zu sehen. — In den folgenden Nachweisungen werden die in den Resultaten der chemischen Analysen stattfindenden Abweichungen und Widersprüche zum Theile ihre naturgemäße Erklärung finden.

§. 158.

Die Schwierigkeit der Analyse setzt große Genauigkeit in dem Verfahren voraus. Es ist, überhaupt, bei statthabenden Verschiedenheiten in den Resultaten der chemischen Analyse der Mineralwässer, gewiß manchmal die

⁵³) Pyrmont u. f. Umgeb. Erste Aufl. §. 156. S. 214 u. f.

größere oder geringere Kunstfertigkeit des Analytikers zu berücksichtigen. Die quantitative Untersuchung insbesondere ist großen Schwierigkeiten unterworfen. Es kommt sehr darauf an, ob zweckmäßig in der Erforschung und richtig in der Bestimmung der chemischen Proportionen und der Anwendung der Geseze, nach welchen die verschiedenen Stoffe sich vorzugsweise verbinden, verfahren worden ist. Die Analyse stellt gewiß nicht selten Salze aus Mineralwässern dar, die in denselben nicht als solche enthalten sind. Vielleicht kann durch die Analyse höchstens die Menge der Basen und Säuren genau angegeben, nicht aber mit Gewißheit bestimmt werden, in welchen Verbindungen diese in dem Wasser unter einander standen ⁵⁴⁾).

Die Verschiedenartigkeit der angewendeten analytischen Methode hat auch zuweilen Einfluß auf das Resultat der Analyse. Nicht selten mögen Substanzen, die als Bestandtheile betrachtet werden, mehr das Werk der Analyse, zumal der gewaltsameren Zerlegungsmittel, des Feuers, der Auflösungsmittel, der Reagentien, aber auch der atmosphärischen Luft und des Lichts, und somit mehr Producte, als Educte sein. So erhielt Seip aus den festen Bestandtheilen des eisenhaltigen Trinkbrunnens, durch Sublimation, Schwefel ⁵⁵⁾; Westrumb wies nach, daß solcher kein eigentlicher Bestandtheil des Wassers, sondern Product des analytischen Verfahrens sei, indem, bei der Glühhiße der Sublimation, der gummiharzige Stoff des Mineral-

⁵⁴⁾ Ferd. Wurzer Physik. chem. Besch. d. Schwefelquellen zu Rendorf. Cassel u. Marb., 1815. S. 6. 3 u. f. Struve ueber die Nachbildung der natürl. Heilquellen. Hft. 2. S. 86.

⁵⁵⁾ Seip Besch. S. 211.

wassers eine Kohle bilde, wodurch Schwefelsäure zersezt und der Schwefel frei werde ⁵⁶⁾).

Die Rücksicht auf chemische Wahlverwandtschaft darf nicht unbeachtet bleiben. Wollte man zugeben, daß in Mineralwässern das Beisammensein von Bestandtheilen unbedingt statthaben könne, welche den Gesetzen der chemischen Wahlverwandtschaft zufolge, nicht in solcher Verbindung neben einander bestehen können, würde man die Grundstüßen der Chemie außer Acht lassen. Analysen, in welchen solche zusammengestellt sind, entbehren der hinlänglichen Zuverlässigkeit. Es ward schon in der ersten Auflage dieser Schrift bemerkt gemacht, daß, nach Westrumb, im eisenhaltigen Trinkbrunnen schwefelsaure Magnesia und Chlornatrium zugleich vorhanden sein sollten, die sich doch zersetzen und Glaubersalz und Chlormagnesium bilden mußten; Brandes und Krüger haben jene, gegen die chemische Wahlverwandtschaft streitende Mischung beibehalten; Struve dagegen hat, diese berücksichtigend, das Chlornatrium anders berechnet und nicht mit aufgeführt. So führen, in derselben Quelle, Brandes und Krüger, neben Gyps und Chlormagnesium, kohlensaures Natrum auf, dessen Gegenwart Struve, neben jenen Salzen, den Verwandtschaftsgesetzen zufolge, nicht gestattet. Im Neubrunnen haben Westrumb, wie Brandes und Krüger, schwefelsaure Magnesia und Chlornatrium neben einander bestehen lassen, die sich doch zersetzen und Glaubersalz und Chlormagnesium bilden mußten. Im

⁵⁶⁾ Westrumb über den Schwefel einiger Mineralquellen, in f. kl. physik. chem. Abhandlungen Bd. 1. Hft. 1 (Leipzig, 1785). S. 117 u. f.

Kochsalzhaltigen Trinkbrunnen führt Westrumb, neben Glaubersalz, Chlorcalcium auf, welche sich zu Kochsalz und Gyps, Brandes und Krüger Chlormagnesium neben kohlensaurem Natrium, die sich zu Kochsalz und Magnesia vereinigen mißten. — Wenn der Zustand einer sehr verdünnten Auflösung, die verschiedenen Grade der Temperatur und der Zutritt anderer Bestandtheile mehrfache Modificationen in den Verbindungen und eine bedingte Coëxistenz unverträglicher Salze zuläßt, so behalten darum nicht minder die Gesetze der Verwandtschaft ihre Gültigkeit.

Die Fortschritte der Chemie geben selbst nicht selten Veranlassung zu Abänderungen in den relativen, wie absoluten Mengen der Bestandtheile, indem, durch Auffindung empfindlicherer Reagentien und Entdeckung neuer Stoffe, neue Bestandtheile in den Mineralwässern aufgefunden werden. So entdeckte, in Folge der Fortschritte, welche, seit Westrumb's Analyse, die analytische Chemie gemacht hatte, in unserm eisenhaltigen Trinkbrunnen, Struve schwefelsauren Strontian, phosphorsauren Kalk, Mangan und (schwefelsaures) Kali; Brandes und Krüger fügten diesen noch schwefelsauren Baryt, kohlensaures und hydrothionsaures Natrium und phosphorsaures Kali, diesen Struve, bald darauf, noch phosphorsaure Thonerde hinzu. — So fügte Wurzer den Bestandtheilen der von ihm im Jahre 1815 untersuchten Trinkquelle zu Hofgeismar, einer, zehn Jahre darauf, von ihm wiederholten Untersuchung derselben zufolge, als Früchte der Fortschritte der analytischen Chemie, salzsaures Kali, Mangan und basisch phosphorsaure Thonerde hinzu ⁵⁷⁾.

⁵⁷⁾ Die Mineralquellen zu Hofgeismar in Kurhessen, im Jahre

§. 159.

Abgesehen von allen im Obigen angeführten äußeren Umständen, welche Abweichungen in den Resultaten der Analysen veranlassen können, findet aber, vergleichenden Untersuchungen und Beobachtungen zufolge, bei vielen, höchst wahrscheinlich bei allen Mineralquellen, wirklich auch eine Unbeständigkeit in den Mengen der Bestandtheile der Mineralwässer statt, indem sowol die relative Menge ihrer Bestandtheile überhaupt zum Wasser, als selbst die qualitativen Verhältnisse der verschiedenartigen Bestandtheile öfteren, ja vielleicht täglichen ⁵⁸⁾ Veränderungen unterliegen.

Das Verhältniß der Menge der Bestandtheile zur Wassermenge ist nicht unwandelbar dasselbe. Aus einem Pfunde zu 16 Unzen unseres eisenhaltigen Trinkbrunnens erhielt Andr. von Keil, in oder vor dem Jahre 1688, also vor 150 Jahren, etwa 27,2 (20 $\frac{1}{2}$ Gr. wasserleerer Bestandtheile ⁵⁹⁾), Seip, wiederholten Untersuchungen bis zum Jahre 1717 zufolge, und bis zum Jahre 1750, etwa 28,7 (22 Gr. wasserleerer Bestandtheile ⁶⁰⁾), Bergman, im

1825, physik. u. chem. untersucht von Dr. Ferd. Wurzer. Marburg, 1825. 8. S. 55.

⁵⁸⁾ So behauptet schon in seiner Anleitung zur Analyse eines Mineralwassers, Bestrumb, in f. kl. physik. chem. Abhandlungen Bd. 1. Hft. 2. 1785. S. 130, und, bei Gelegenheit seiner Analyse des Driburger Mineralwassers, ebendas. Bd. 2. Hft. 1. S. 65.

⁵⁹⁾ Andr. Cunaei Besch. Des Pyrmontischen Sauerbrunnens. Lemgo, 1697. 8.; zweite Seite der Aufschrift. Andr. von Keil Oxydrographia etc. Hannover, 1710. 8., zweite Seite der Aufschrift und S. 2 des Textes.

⁶⁰⁾ Seip Besch. Erste Ausg. 1717. S. 68. Vierte Aufl. 1750. S. 131. Menke, Pyrmont. 2. Aufl.

Jahre 1776, 27,26, Krah, 1780, 23,52, Higgins, etwa 1781, 26, ein Ungenannter, in dem eben genannten Jahre, 25, von Berolbingen, 1782, 11,41, Westrumb, in dem trocknen Sommer 1783, 29,5, derselbe Chemiker, 1788, 27,62, Brandes und Krüger, 1822, nach einem Mittel aus drei Analysen, 29,72, Struve, 20,62 Gran fester Bestandtheile ⁶¹⁾, woraus sich also eine Differenz von 18 Gran in einem Pfunde zu erkennen giebt. Selbst in einem und demselben Jahre findet darin ein Unterschied statt: So fand Piepenbring, im Jahre 1787, den Gehalt in 16 Unzen des eisenhaltigen Trinkbrunnens an festen Bestandtheilen, zwischen 22 und 30 Gr. schwanken, je nachdem die Witterung regenig oder trocken war ⁶²⁾. Westrumb erhielt aus derselben Menge desselben Wassers, im Jahre 1788, im März 28,34, im Juni 27,45, im Julius 27,36, im August 27,36 Gr. feste Bestandtheile; Brandes und Krüger sogar, aus derselben Menge, im Jahre 1822, im Mai 33,3, im Juni 28,2, im Julius 27,6 Gr. feste Bestandtheile, was schon eine Differenz von 6,3 Gr. ergibt. — So gab auch das Roisdorfer Mineralwasser, in 10000 Theilen, 1824, im August geschöpft, 35,468, im September 36,351, 1825 im August 36,890, im November 34,0972 Thl. feste Bestandtheile ⁶³⁾. G. Bischof vermuthet, daß diese Veränderungen vorzugsweise von der Jahreszeit abhängen möchten ⁶⁴⁾.

⁶¹⁾ Vergl. S. 136. S. 234 u. f.

⁶²⁾ Piepenbring in L. Crell's Chemischen Annalen, 1788. St. 1. S. 71 bis 73.

⁶³⁾ G. Bischof die Roisdorfer Mineralquellen zc. S. 47.

⁶⁴⁾ Die vulkanischen Mineralquellen Deutschlands u. Frankreichs zc. von G. Bischof. Bonn, 1826. 8. S. 337.

Die qualitativen Bestandtheile sind ebenfalls nicht zu allen Zeiten gleichmäßig dieselben. Bald ist der eine, bald der andere Bestandtheil vor den übrigen vorherrschend. Weftrumb fand im eisenhaltigen Trinkbrunnen hauptsächlich die Mengen des Glauber- und Bittersalzes, weniger die des Kalkes und der Magnesia, am wenigsten die des Eisens, des Kochsalzes, des Chlormagnesiums und des Gypses dem Wechsel unterworfen. Seiner Untersuchung zufolge enthielt derselbe, im Jahre 1788, an Glaubersalz, im März 4,88, im Junius 1,48, im Julius 0,76, im August 4,44, an Bittersalz im März 4,0, im Junius 6,60, im Julius 7,56, im August 3,72, an kohlensaurem Eisen im März 1,14, im Junius 1,08, im Julius 1,04, im August 0,96 Gr. in 16 Unzen ⁶⁵⁾. Ähnliche Abweichungen in den relativen Mengen der qualitativen Bestandtheile bieten sich auch in den von Brandes und Krüger zu verschiedenen Zeiten angestellten Analysen der Trinkquelle dar ⁶⁶⁾. — So fand auch Struve in 16 Unzen des Emser Wassers, an wasserfreiem schwefelsauren Natrum einmal 0,23, zu einer andern Zeit 0,42, an Chlornatrium einmal 5,06, zu einer andern Zeit 7,67, an kohlensaurem Natrum einmal 13,26, zu einer andern Zeit 10,75 Gr. ⁶⁷⁾. So fand auch, in 16 Unzen Marienbader Kreuzbrunnen, an schwefelsaurem Natrum Reuß 23,677, Ziegler 27,205, Steinmann 38,116, Bremm 14,760, Kirchstein 46,713, an Chlornatrium

⁶⁵⁾ Weftrumb Physik. chem. Besch. S. 117. u. Tabelle A.

⁶⁶⁾ Brandes u. Krüger Neue physik. chem. Besch. S. 254, Tabelle Nr. II.

⁶⁷⁾ Struve Ueber die Nachbildung der natürl. Heilquellen. Hft. I. S. 16.

R. 8,993, Z. 14,053, St. 13,564, Br. 3,220, R. 14,847, an kohlensaurem Natrium R. 10,629, Z. 14,928, St. 7,261, Br. 5,480, R. 7,920 Gr. ⁶⁸⁾).

Sogar können einzelne Bestandtheile in einem Mineralwasser einmal vorhanden sein, zu einer andern Zeit demselben fehlen. So fanden Brandes und Krüger das hydrothionsaure Natrium wohl im Junius und Julius, nicht aber im Mai im eisenhaltigen Trinkbrunnen vor. — Nach Bischof mußte das Pyrmonter Wasser, da Westrumb's Versuche bestimmt darthun, daß damals noch kein kohlensaures Natrium darin enthalten war, solches, wenn dessen gegenwärtig wirklich constant darin vorhanden sein sollte, erst seitdem unter seine Bestandtheile aufgenommen haben ⁶⁹⁾).

Auch in Hinsicht auf die absolute Wassermenge ist die Ergiebigkeit der Mineralquellen nicht unwandelbar dieselbe; denn diese ist bald größer, bald geringer. Vom eisenhaltigen Trinkbrunnen ist bereits oben mitgetheilt worden, daß sein ausgeleertes Becken sich, nach Westrumb innerhalb 16, nach Brandes und Krüger innerhalb 42, späteren Beobachtungen zufolge innerhalb 50 bis 66 Minuten wieder anfüllte ⁷⁰⁾). Derselbe lieferte, Seip's, in den Jahren 1712 und 1716 angestellten Messungen zufolge, 120 ⁷¹⁾), nach den vom Br. Cass. Voigt vorgenommenen Wägungen, im Jahre 1775 am 6 Febr. 25,906, am 14 Febr. 24,187, am 15 Febr. 25, am 18 Apr. 25, am 28 Apr. 29,375, im Jahre 1776 am 28 Mai 24,075, am 30 Mai 26,5, im Jahre

⁶⁸⁾ Wetter Handb. d. Heilquellenlehre. Thl. 1. S. 274, Anm.

⁶⁹⁾ Bischof Die vulkan. Mineralquellen u. S. 184, Anm.

⁷⁰⁾ Vergl. S. 234. Anm. 50.

⁷¹⁾ Seip Besch. S. 120 u. 131.

1777 am 6 Febr. 26,049, am 26 Febr. 33,437, im Jahre 1808 am 12 Mai 24,25, nach Brandes und Krüger 22 Pfund Mineralwasser, innerhalb einer Minute. — Die Mineralquellen zu Hofgeismar nahmen im Sommer 1818 auf einmal so sehr an Ergiebigkeit zu, daß die Abflußröhren nicht vermögend waren, den Ueberschuß abzuleiten. Dieser ungewöhnliche Zufluß hielt nur 24 Stunden an⁷²⁾.

Die Temperatur der Mineralquellen unterliegt ebenfalls einem geringen Schwanken. Obgleich eine jede Mineralquelle von einem bestimmten Grade der Temperatur, im Durchschnitte, nicht beträchtlich abweicht, so ist dieser jedoch nicht immer gleichmäßig derselbe. Die Temperatur des eisenhaltigen Trinkbrunnens fanden Brandes und Krüger + 10, Westrumb + 10,7, ich, wiederholten Beobachtungen zufolge, zuletzt noch am 11 Sept. 1839, bei + 20 Gr. Lufttemperatur und Südwinde, + 11 Gr. R. Dem Brodelbrunnen giebt Westrumb + 10,7, Brandes und Krüger geben ihm + 10, ich fand dieselbe am 31 März 1839, bei + 2 Gr. Lufttemperatur und Ostwinde + 10, am 11 Sept. desselben Jahres, bei + 20 Gr. Lufttemperatur und Südwinde, + 11 Gr. R. Den alten Badebrunnen fand Westrumb + 11,6, ich fand ihn, am 11 Sept. 1839, + 11 Gr. R. Den Sauerling fanden Brandes und Krüger + 8,3, ich fand ihn am 12 Sept. 1839, bei + 20 Gr. Lufttemperatur und Südwestwinde, + 8,8, Westrumb fand ihn + 9,3 Gr. R.

§. 160.

Ungeachtet aller solcher Abweichungen bietet dennoch jede einzelne der oben aufgeführten Mineralquellen ihre be-

⁷²⁾ Wurzer Die Mineralquellen zu Hofgeismar u. Vorwort S. XII.

sonderen chemischen und physikalischen Unterscheidungsmerkmale und, in diesen, ihren eigenthümlichen Charakter dar. Ist dieser auch, wie sich aus den eben mitgetheilten Nachweisungen ergibt, nicht stets gleichartig, so sind doch theils die Modificationen, welchen derselbe unterliegt, im Durchschnitte nur geringfügig, theils scheinen die angeregten Verhältnisse sich in einem gewissen Zeitraume, vielleicht in einem etwa jährlichen Cyklus, gleichsam durch Oscillation, immer ziemlich wieder auszugleichen. In der That geht, aus obigen Nachweisungen ebenfalls das merkwürdige Ergebniss hervor, daß namentlich unser eisenhaltiger Trinkbrunnen, der am öftersten untersucht worden und daher, in den gedachten Beziehungen, am richtigsten zu beurtheilen ist, während eines Zeitraumes von etwa 150 Jahren, in seinen Bestandtheilen einen constanten Durchschnittsgehalt behauptet hat. Man kann daher gewiß mit Recht annehmen, daß der specifische Charakter der Mineralquellen selbstständig bleibe, wenn auch der individuelle theilweise in diesem untergehen sollte.

Vergleichen Abweichungen, die von den mannfachsten Umständen abhängig sind, unterliegen übrigens nicht bloß Mineralwässer, sondern ebenfalls die organischen, zumal thierischen Flüssigkeiten, z. B. Milch, Blut u. a. m., ohne daß man diesen deshalb ihren specifischen chemischen und physiologischen Charakter absprechen möchte. Die Selbstständigkeit und Verschiedenheit der einzelnen Mineralquellen wird auch noch im Folgenden weiter begründet werden.

Vertikales Verhältniß, Ursprung und Werkstätte unserer Mineralquellen.

§. 161.

Wenn unsere Mineralquellen ihrem Gehalte gemäß in drei verschiedene Classen zerfallen ⁷³⁾, so bilden sie jedoch, nach der verschiedenen Vertikalität der Lage, in welcher sie entspringen, nur zwei Gruppen, die durch einen etwa 2000 Schritte betragenden Zwischenraum von einander entfernt sind. Die eine derselben liegt im nördlichen, höhern Theile des Hauptthales, am südlichen, sanft abhängigen Fuße des Bomberges, in der Neustadt Pyrmont selbst, auf dem sogenannten Brunnenplaze und in der Nähe desselben: sie schließt die Mehrzahl der Eisensäuerlinge und den Säuerling ein; die andere liegt im östlichen, niedrigsten Schooße des Hauptthales, am äußersten südlichen Fuße des Königsberges, wo dieser an den äußersten nördlichen Saum des Mühlenberges gränzt, im Thalgrunde selbst, auf dem Salzwerke und in der Nähe desselben, nahe am linken Ufer der Emmer: sie schließt die Kochsalzsäuerlinge und den Neubrunnen ein.

Die Entfernung der einen Quelle von der andern in derselben Gruppe ist zum Theile unbedeutend. In der ersten dieser Gruppen liegen der eisenhaltige Trinkbrunnen, der Brodelbrunnen, der Augenbrunnen, der alte, der neue und der westliche Badebrunnen sich einander in einem Umfange von 130 Schritten nahe. Die

⁷³⁾ Vergl. S. 259. §. 149.

Entfernung aus der Mitte des Trinkbrunnens bis in die Mitte des, südsüdostwärts von diesem gelegenen, Brodelbrunnens beträgt 54 Fuß. Jener ist nordwärts, beinahe in der Mitte und obenan, dieser ist auf dem östlichen, die übrigen der eben genannten Mineralquellen sind auf dem westlichen Brunnenplatze befindlich. Dem Trinkbrunnen liegt der Augenbrunnen in einer Entfernung von 116, der alte Badebrunnen 112 Fuß weit westwärts gegenüber; von letzterm beträgt die Entfernung des neuen und des westlichen Badebrunnens nur einige Fuß. Der Trampelsche Eisensäuerling liegt ostwärts 1024, der Säuerling nordostwärts etwa 2000 Fuß vom Trinkbrunnen ab. — In der zweiten Gruppe liegen der kochsalzhaltige Trink- und Badebrunnen nur 10 Fuß weit von einander ab; die Soolquelle liegt ostwärts 198 Fuß vom kochsalzhaltigen Trinkbrunnen, der Neubrunnen 1696 Fuß weit westwärts von diesem ab, und, im östlichen Winkel des Neubrunnenhauses, 13 Fuß von dem Neubrunnen ab, in einem länglich viereckigen Behälter, noch eine andere, diesem verwandte, Mineralquelle.

§. 162.

Unsere sämtlichen Mineralquellen haben gegen eine gegebene Horizontallinie, in Hinsicht auf ihre Wasserspiegel, verschiedene Höhen. Auf dem Brunnenplatze hat der Brodelbrunnen das höchste, der neue Badebrunnen das niedrigste Niveau. Der Wasserspiegel des Brodelbrunnens liegt, einem, im Jahre 1833, vom Bauinspector Dalwig vorgenommenen Nivellement zufolge, 5 Fuß 4,75 Zoll, der Wasserspiegel der Trinkquelle 3 F. 4 Z., der Wasserspiegel des westlichen Badebrunnens 10,25 Z., der des Augenbrun-

nens 1,75 und der des alten Badebrunnens 0,75 $\mathcal{Z}$. höher, als der Wasserspiegel des neuen Badebrunnens. Der Wasserspiegel des Trampel'schen Eisensäuerlings liegt 20, der des Säuerlings 48 $\mathcal{F}$. höher, als der Spiegel unserer eisenhaltigen Trinkquelle. — Der Wasserspiegel des Neubrunnens liegt 3 $\mathcal{F}$. 1,25 $\mathcal{Z}$. unter dem Emmer Spiegel, 72 $\mathcal{F}$. unter dem Spiegel der eisenhaltigen Trinkquelle.

Der Spiegel der Soolquelle ist 8,75 $\mathcal{F}$. niedriger, als der Spiegel der Emmer; der Spiegel der sogenannten neuen Bohrquelle, die, jetzt verschüttet, zwischen der Soolquelle und etwa der Mitte des gegenwärtigen, sogenannten Emmergräbirhauses befindlich war, lag 3,75 $\mathcal{F}$. niedriger, als der Emmer Spiegel ⁷⁴⁾).

Der Emmer Spiegel hat, Hoffmanns, auf vergleichende barometrische Beobachtungen beruhenden, Berechnung zufolge, bei der Saline 260, der Spiegel der eisenhaltigen Trinkquelle 328 $\mathcal{F}$. Meereshöhe, und also liegt dieser gegen 70 $\mathcal{F}$. über der Grundfläche des Hauptthales ⁷⁵⁾).

§. 163.

Obgleich das Flußbett der Emmer unseren Mineralquellen eine natürliche Begränzung darzubieten scheint, indem sie sämmtlich auf dem linken Ufer dieses Flusses, diesem mehr oder weniger nahe, entspringen, auch der verwandte, zwischen Noltehof und Wöbbel gelegene, sogenannte Meinberger Rochsalzsäuerling, am linken Emmerufer zu Tage geht, und, in der That, am rechten Ufer dieses Flusses bis-

⁷⁴⁾ Gurge Wegweiser von Pyrmont zc. S. 40 u. f.

⁷⁵⁾ Hoffmann Uebers. d. erogr. u. geogn. Verh. vom nordwestl. Deutschl. S. 190.

her noch keine Mineralquelle entdeckt worden ist, so darf dieß doch aber nur dem Zufalle beigemessen werden, da das Flußbett in keiner näheren Beziehung zu den Mineralquellen stehen kann. In der Nähe des Salzbrunnenhauses sind wirklich auch im Flußbette der Emmer selbst kleine Kochsalzsäuerlingsquellen befindlich.

Selbst Gebirgszüge, und diese als Wasserscheiden angesehen, können nicht als natürliche Gränzen der Mineralquellen gelten. Das Teutoburger Waldgebirge constituirte einen Theil der Wasserscheide zwischen dem Stromgebiete der Weser und des Rheins, und doch liegt seinem östlichen Abhange gegenüber Pyrmont mit seinen Eisensäuerlingen, während der verwandte Eisensäuerling zu Driburg am Fuße seines westlichen Abhanges liegt.

Nur durch eine richtige geognostische Bestimmung der Gebirgsformation, aus welcher die Mineralquellen zu Tage gehen, können ihr Ursprung, wie das Gebiet ihrer Geburtsstätte wissenschaftlich näher angedeutet werden.

Von unseren sämtlichen Mineralquellen ist nur gewiß, daß sie aus der Formation des bunten Sandsteins entspringen; denn der Boden unsers Thales besteht aus buntem Sandsteine; diese Gebirgsart steht überall in der Nähe unserer Mineralquellen, des Säuerlings sowol, als sämtlicher Eisensäuerlinge und der Kochsalzsäuerlinge, noch über dem Niveau derselben an, und kommt auch überall in ihrer Nähe, unter den angeschwemmten Erdlagern zum Vorschein; und so ist der bunte Sandstein wenigstens unzweifelhaft das Muttergebirge, aus welchem unsere Mineralquellen zu Tage

treten ⁷⁶⁾). Es ist demnach wahrscheinlich, daß diese Gebirgsformation auch Theil an der Bildung derselben habe ⁷⁷⁾).

Die Werkstätte, aus welcher unsere Mineralquellen hervorgehen, liegt im Innern der Erdrinde. Daß sie aus beträchtlicher Tiefe heraufsteigen, giebt schon ihre höhere Temperatur, + 8 bis + 11 Gr. R., zu erkennen. Ob aber diese Werkstätte sich noch bis unter die Formation des bunten Sandsteins hinab erstreckt, vielleicht bis in das ältere Gebiet des Zechsteins mit seinem Dolomite, oder des Uebergangskalkes und seines Dolomits, oder gar des Urgebirges? und ob sie sich nicht durch mehr Formationen hindurch erstreckt? ob sie nicht auch, von weither, durch Adern und Gänge, aus jüngeren Flözformationen Wasser und Bestandtheile zugeführt erhält? oder ob beides stattfindet? diese Fragen mit Bestimmtheit zu beantworten, liegt außer dem Bereiche der Möglichkeit. Gewiß hat der Heerd dieser Werkstätte auch eine weite Ausdehnung, die nicht, mit Seip ⁷⁸⁾), auf den Umfang des Bomberges, oder, mit Mar-

⁷⁶⁾ Vergl. S. 200, und meinen Versuch etc., in v. Leonhard's Zeitschr. f. Mineralogie. 1825. Nr. 8. S. 158. u. f.

⁷⁷⁾ J. Fr. L. Hausmann (Geologische Bemerkungen über das Vorkommen der norddeutschen Mineralquellen überhaupt und der Driburger insbesondere, in: W. A. Fickers Driburger Taschenbuch auf d. J. 1816. Paderborn, 8. S. 87 u. 104.) schreibt sie dem bunten Thon- und Mergelgebirge, welches unter dem Muschelkalk liegt und den bunten Sandstein zur Grundlage hat, zu. Chr. Reiserstein (in f. Teutschland geognostisch-geologisch dargestellt etc. Bd. 2. Hft. 3. Weimar, 1823. 8. S. 507) muthmaßet, daß sie aus der Muschelkalkformation, wo diese mit dem unterliegenden Sandsteine gränzt, ihren Ursprung nehmen.

⁷⁸⁾ Seip Beschr. d. Pyrm. Mineralw. S. 103.

card ⁷⁹⁾ und Westrumb ⁸⁰⁾, auf den Umfang des Königs-
berges beschränkt werden darf. Es ist kaum zu bezweifeln,
daß derselbe nicht mit dem der benachbarten verwandten
Mineralquellen zu Meinberg, Driburg, Godelheim, Hofgeis-
mar u. a., die aus derselben Gebirgsformation zu Tage tre-
ten und ähnliche Bestandtheile führen, einige Gemeinschaft
haben sollte.

§. 164.

In der Tiefe geschieht auch die Imprägnation der
Quellen mit mineralischen Bestandtheilen. Es kommen bei
Erklärung derselben mehrfache Rücksichten in Betracht.

Meiner frühern Ansicht über die lebendige Mischung
der Mineralquellen gemäß, nahm ich damals auch einen, im
Innern der Erde statthabenden, in einem chemischen
Processe des elektrischen Galvanismus beruhenden,
Zeugungsact an, durch welchen die Mineralquellen imprä-
gnirt wurden, und betrachtete dabei, mit Steffens ⁸¹⁾, die
verschiedenartigen, über einander liegenden Föhlager als
Platten einer galvanischen Säule, die, wenn auch intensiv
nur schlechte Leiter, durch Größe der Flächen und der darin
dargebotenen vielfachen Berührungspuncte, eine stete galva-
nische Spannung, die durch das durchfließende Wasser noch
erhöhet würde, unterhielten. Diese Ansicht ist Bedingungen
gewichen, die mehr Wahrscheinlichkeit darbieten.

⁷⁹⁾ Marcard Besch. von Pyrmont Bd. 1. S. 214.

⁸⁰⁾ Westrumb Physik. chem. Besch. S. 29.

⁸¹⁾ Geognostisch = geologische Aufsätze, als Vorbereitung zu einer
innern Naturgeschichte der Erde, von Henr. Steffens. Ham-
burg, 1810. 8. S. 313 u. f.

Eine vulcanische Mineralisation unserer Mineralquellen nahm J. A. de Luc an. Obgleich dieser Geolog, bei eigener Nachforschung an Ort und Stelle, keine vulcanische Spuren in unserer Umgegend zu entdecken vermochte ⁸²⁾, konnte er sich doch, zumal nachdem er in der Nähe von Hofgeismar Basaltberge und Basalttuff wahrgenommen hatte, von der Ansicht nicht lossagen, daß nicht, wie unweit Trier, in der vulcanischen Eifel, auch zu Pyrmont die Mineralquellen durch einen erloschenen Vulcan mineralisirt sein sollten ⁸³⁾. G. Bischof, der das Verhältniß noch thätiger, wie erloschener Vulcane zu den Mineralquellen trefflich entwickelt hat, bringt unsere Mineralquellen, hauptsächlich in Rücksicht auf ihren Gehalt an Kohlensäure und an kohlensaurem Natrum, welchen Bestandtheilen zuerst Berzelius ⁸⁴⁾ eine Beziehung auf vulcanischen Ursprung zuschrieb, in die Reihe der vulcanischen Mineralquellen, solcher nämlich, deren Gehalt an den genannten Stoffen theils von vulcanischen Gesteinsmassen, die, wie schon Klaproth nachgewiesen ⁸⁵⁾, zum Theile reich an Natrum seien, theils von einer noch statthabenden, bedingten vulcanischen Thätigkeit abzuleiten sei, und führt sie, dem

⁸²⁾ de Luc *Lettres phys. et mor.* (vergl. S. 193. Anm.) Tom. 5. S. 26.

⁸³⁾ Ebendas. S. 354.

⁸⁴⁾ Untersuchungen der Mineralw. von Karlsbad, Töplitz u. Rönigswart von J. Berzelius. N. d. Schwed. von G. Rose, mit Erläuterungen von Gilbert, in dessen *Annalen d. Physik.* Bd. 74. Leipz., 1823. S. 113 u. 276 u. f.

⁸⁵⁾ Chemische Untersuchung des Klingssteins, von M. S. Klaproth; in f. Beiträge zur chem. Kenntniß der Mineralkörper. Bd. 3 Berlin u. Posen, 1802. 8. S. 243 u. f.

gemäß, in seiner dritten Gruppe, welche die, kohlen-saures Natrium führenden Mineralquellen in den vulcanischen Zügen des Habichtswaldes, des Meißners, des Vogelsgebirges und der Rhön enthält, auf ⁸⁶⁾). Unläugbar hat die Ansicht, daß ein erloschener Vulcan mit Theil an der Bildung unserer Mineralquellen habe, durch die von Bischof zusammengestellten Beobachtungen ein größeres Gewicht erhalten, und es dürfte eine Entfernung von 5 bis 6 ⁸⁷⁾), oder gar nur von 3 bis 4 Meilen ⁸⁸⁾ von hier, als in welcher die nächsten auf der Oberfläche der Erde vorhandenen Ueberreste früherer vulcanischer Thätigkeit angetroffen werden, nicht eben im Widerspruche mit derselben stehen. Die geologisch und geognostisch eigenthümliche Construction unseres Thales selbst, das Hoffmann als das großartigste Beispiel eines Ring- oder Erhebungsthales, trefflich dargestellt hat ⁸⁹⁾), und dessen Umgegend giebt schon einige weitere Andeutungen, welche auf die,

⁸⁶⁾ G. Bischof Die vulkan. Mineralq. 2c. S. 160. 181 u. f.

⁸⁷⁾ Vergl. S. 193. Hoffmann (Ueber die geogn. Verhältnisse des linken Weferuferes 2c. [vergl. S. 215. Anm. 28]. a. a. D. S. 36) fand die nördlichste basaltische Vorragung an der Stuckenwarte bei Borgeentreich.

⁸⁸⁾ Eines Basaltdurchbruches im Muschelkalksteine bei Sandebek, einem Dorfe, das an der nordwestlichen Gränze des preussischen Kreises Hörter, ostwärts von Lippspringe und südwärts von Meinberg liegt, gedenkt nur beiläufig R. Brandes in f. u. Wackenroder's Archiv d. Pharmacie. 1839. Jun. S. 247.

⁸⁹⁾ Ueber Erhebungsthäler u. deren Zusammenhang mit dem Ursprunge der Sauerquellen; von Fr. Hoffmann, in: Poggen-dorff's Annalen d. Physik u. Chemie. Bd. 17. St. 1. 1829. Nr. 9. S. 151 bis 159 (a. dessen Uebers. d. orogr. u. geogn. Verh. vom nordwestl. Deutschl. S. 550 u. f. besonders abgedruckt); mit zwei Profilzeichnungen aus dessen geogn. Atlas vom nordwestl. Deutschland Taf. III. Nr. VI.

bei Bildung desselben stattgehabte Mitwirkung eines Vulcans schließen lassen: so die stumpfe Kegelform des isolirten, im Hauptthale selbst befindlichen Königsberges und des nahen Röterberges; die zwiefache Reihe von Höhenzügen, die das Thal ringförmig einschließen; die gegen das Innere des Thals steil abfallenden Bergwände, auf deren Scheitelfläche die jüngeren Formationen, Muschelkalk und Keuper, sich, vom Mittelpuncte abwärts, nach allen Richtungen sanft neigen; die Kesselförmige Gestalt des Thalgrundes; in diesem selbst die beträchtliche Erhebung des bunten Sandsteins, da nämlich die Emmer, sowol bei ihrem Eintritte in das Hauptthal, wie bei ihrem Austritte aus dem östlichen Nebenthale, über den jüngern Muschelkalkstein, der sich an beiden Puncten in steilen Felsenwänden erhebt, hinfließt, während innerhalb dieser beiden Stellen, bei ihrem Austritte aus dem Hauptthale, zu beiden Seiten ihres Ufers der bunte Sandstein bis zu den Abhängen der Berge, am Mühlenberge bis zu 522 F. über dem Spiegel der Emmer, hinansteigt; die gestörten Lagerungsverhältnisse an den Gränzen der bunten Sandstein- und Muschelkalkformation, namentlich bei der Saline, bei Eßenthausen und den Erdfällen, und das Vorkommen des breccienartigen Conglomerats gerade an diesen Stellen. Sollten alle diese Erscheinungen nicht durch eine gewaltsame Explosion zu erklären sein, die hier einst, vielleicht während einer der großen Ueberschwemmungen, den Sandstein gehoben und die damals deckenden jüngeren Gebirgslager zerstört haben könnte? Vielleicht entlud sich der damals noch thätige Vulcan seiner Gasanhäufung, und eröffnete hier, an seiner Gränze, die

Gänge, die dem Gase ferner den Ausgang verschaffen sollten und solchen auch jetzt noch gestatten.

Sollten aber in allen diesen Erscheinungen wirklich Spuren einer frühern vulcanischen Thätigkeit sich beurkunden, so dürften die im Innern der Erdrinde noch vorhandenen Merkmale des erloschenen Heerdes, die angehäuften vulcanischen Massen und die noch fortbestehende Hitze, doch jedenfalls an der äußersten nördlichen Gränze jenes großen vulcanischen Heerdes befindlich sein, dem die Entstehung der in südlicher Richtung von hier vorhandenen basaltischen Vorragungen und Gebirgszüge unbestreitbar zuzuschreiben ist. Es dürfte überall noch lange unerforscht bleiben, ob der statuirte vulcanische Heerd selbst sich bis in die Formation des bunten Sandsteins hinein erstreckt, oder tiefer liege, vielleicht gar im Urgebirge, und nur durch Gänge und Züge, die durch das Uebergangsgebirge, oder, sollte dieses fehlen, durch die älteren Flözgebilde, Kohlensäureströme führten, mit dem bunten Sandsteine in Verbindung stehe, und ob überhaupt der bunte Sandstein, an seiner äußersten Gränze, noch Theil habe an der vom vulcanischen Heerde selbst ausgehenden Hitze. Die Gewißheit darüber würde über die muthmaßliche Ableitung des einen und andern Bestandtheiles unserer Mineralquellen interessante Aufschlüsse geben.

Unsere Mineralquellen könnten aus der Nähe des Heerdes eines erloschenen Vulcans, den oben angegebenen Nachweisungen zufolge, hauptsächlich ihren Reichthum an Kohlensäure haben, vielleicht auch ihr Natrum und wol auch ihre Temperatur, die sie aus der Tiefe, wo die Wärme vulcanischen Ursprungs sein mag, mit heraufbringen. Der ge-

ringe Wärmegrab unserer Mineralquellen giebt zu erkennen, daß diese ihre Wärme entweder nicht unmittelbar von einem heißen vulcanischen Herde empfangen, oder, daß sie derselben, im Aufsteigen bis zur Oberfläche der Erde, zum Theile wieder verlustig gehen.

Wie es sich aber auch immer mit dem Antheile eines vulcanischen Einflusses auf die Imprägnation unserer Mineralquellen verhalten mag, einen Hauptantheil hat daran sicherlich ein mechanischer und chemischer Auflösungsproceß. Das unterirdische Wasser löset von den Gebirgslagern, mit welchen dasselbe in Berührung kommt, Bestandtheile auf, und nimmt diese in sich auf, indem die aufgelöseten Stoffe sich, ihrer Verwandtschaft gemäß, unter einander ausgleichen, verbinden und mit dem Wasser vereinigen. Diese älteste, schon von Aristoteles seinen Vorgängern zugeschriebene ⁹⁰⁾, von Plinius ⁹¹⁾ wiederholte, Ansicht (Auflösungstheorie) erklärt einfach und naturgemäß den Ursprung der festen Bestandtheile, sowol der gemeinen Quellen, als der Mineralquellen. Struve hat, durch Versuche, dargethan, daß selbst durch Auslaugungen von Gebirgsarten aus der Nähe von Mineralquellen, mittels kohlensauren Wassers, diesem ein beträchtlicher Theil der Stoffe zu eigen gemacht werden könne, welche die betreffenden Mineralwässer, als feste Bestandtheile, führen ⁹²⁾.

⁹⁰⁾ Aristotelis de sensu et sensili lib. c. 4 und Meteorolog. libr. 2. c. 3.

⁹¹⁾ Plinii Hist. nat. libr. 31. c. 4. sect. 29.

⁹²⁾ Struve Ueber die Nachbildung der natürl. Heilq. Hft. 2. S. 21. u. f.

Menke, Pyrmont. 2. Aufl.

Als wasserführende Quellen haben die Mineralquellen mit anderen gemeinen Wasserquellen ohne Zweifel dieselbe Entstehungsart. Sie bilden sich nach denselben hydraulischen Gesetzen, im Schooße der Erde, erhalten ihr Wasser, als atmosphärisches oder Meteorwasser, aus dem Dunsfkreise der Erde, vom Regen, Schnee, Nebel. Die Berge insbesondere ziehen die Feuchtigkeiten des Dunsfkreises an⁹³⁾; ihre Mitternachtseite und der Schatten der Wälder verhindert ihre Verdunstung und begünstigt ihr Eindringen in die Erde⁹⁴⁾. Die Meteorwasser sinken, als sogenannte Seihewasser, durch die oberen, lockeren Erdschichten, bis auf das härtere Gestein hinab, in welchem dieses, auf dem Fallen der Gebirgslager, oder durch Spalten und Klüfte, bis auf den Heerd der Quellen gelangt, von wo aus das Wasser dann, durch hydrostatischen Druck, als Quellwasser, wieder bis zur Oberfläche der Erde gelangt.

Mineralquellen sind solche Wasserquellen, die immer eine gewisse Menge, dem reinen Wasser an sich fremdartiger, in einer vollkommenen Auflösung befindlicher, innig mit ihrem Wasser verbundener mineralischen Bestandtheile mit sich führen. Diese Bestandtheile nehmen sie gewiß zum Theile schon unterwegs, auf ihrem Laufe bis zu ihrem Quellenheerde, in sich auf, und so geschieht schon auf dem Wege dahin theilweise ihre Imprägnation.

Es ist unberechenbar, wie weit die Wege sich ausdehnen,

⁹³⁾ Aristotelis Meteorolog. libr. I. c. 3 und 13, und de mundo lib. c. 4.

⁹⁴⁾ Vitruvii de Architectura libr. 8. c. 1.

welche die Meteorwasser, die unsere Mineralquellen speisen, bis zu dem tiefer gelegenen Herde derselben, zu durchlaufen haben. Sie durchrinnen zuverlässig nicht nur verschiedenartige Gebirgslager, sondern auch verschiedene Gebirgsformationen. Nicht nur die Formation des bunten Sandsteins, sondern auch die des, diesen überlagernden, Muschelkalksteins und selbst die angeschwemmten Erdlager, die das Flözgebirge decken, sind die großen Colatoria, durch welche das Meteorwasser seinen Weg nimmt, um bis zum Herde dieser Quellen zu gelangen. Die genannten beiden Flözgebirgsformationen gestatten, durch häufige Zerklüftungen ihrer Gesteinslager, einen leichten Durchgang der Meteorwasser in die Tiefe, in welcher sie sich mit ihrem, von vulcanischen Processen abstammenden Antheile mischen, und so, als Mineralquellen, zu Tage steigen.

§. 166.

Als Sauerlinge sind unsere Mineralquellen mit Kohlensäure imprägnirt. Daß diese Kohlensäure in der Tiefe der Erdrinde ihren Ursprung habe und dort in großer Menge ausgeschieden werde, kann keinem Zweifel unterliegen. Der Analogie zufolge dürfte sie einem vulcanischen Herde entsteigen. Sie entwickelt sich höchst wahrscheinlich durch Ausscheidung aus ihren Verbindungen, mag diese auf trockenem Wege, durch Glühhitze, aus Kalk und Dolomit, oder auf nassem Wege, durch Säuren, aus den eben genannten Gesteinsarten, geschehen. Die mächtigen Lager des Muschelkalkes, sollten sie so weit hinabreichen, oder des Zechsteins, oder aber des Uebergangskalkes würden zur Ausscheidung einer unermesslichen Menge Kohlensäure ein reichliches Ma-

teriale darbieten. Daß die Ausscheidung durch Glühhitze geschehe, würde, wegen der geringen Temperatur unserer Mineralquellen kaum glaublich sein, wollte man nicht annehmen, daß die Canäle, welche die Kohlensäureströme leiten, vom Herde des Vulcans bis zur Gränze, über diese hinaus und bis zum Herde unserer Mineralquellen hin, meilenlang fein und sich unterweges beträchtlich abkühlen könnten. Die austreibenden Säuren könnten wol nur Schwefelsäure und Salzsäure sein. Daß diese beiden Säuren in und bei noch thätigen Vulcanen vorkommen, und daraus die Bildung schwefel- und salzsaurer Salze hervorgehen könne, hat Bischof ⁹⁵⁾ nachgewiesen. Hausmann leitet die Kohlensäure von einer fortwährenden Entbindung kohlensauren Gases aus dem kohlensauren Eisenorydul ab, mit welchem die Mergel des bunten Sandsteins angefüllt sein sollen ⁹⁶⁾, welches Vorkommen jedoch noch der Bestätigung zu bedürfen scheint ⁹⁷⁾.

Wenn der Ursprung der freien Kohlensäure aus dem Obigen erklärlich ist, so unterliegt die Absorption derselben durch das mit ihr zusammentreffende unterirdische Wasser keiner weiteren Schwierigkeit. Das kohlensaure Wasser fördert die Auflösung der kohlensauren Alkalien, namentlich des Kalkes und der Magnesia, und diese mögen aus dem Kalksteine und dem Dolomite aufgenommen werden. Das kohlensaure Natrum würden die vulcanischen Gesteinsmassen,

⁹⁵⁾ Bischof Die vulkan. Mineralq. 2c. S. 271, 310 u. f.

⁹⁶⁾ Hausmann Uebers. d. j. Flözgebilde im Flußgeb. d. Weser S. 67 und 69.

⁹⁷⁾ Hoffmann Uebers. der orogr. u. geogn. Verhältn. vom nordwestl. Deutschl. S. 556.

durch Efflorescenz an den Wänden ihrer Klüfte, geben. Schwefelsaurer Baryt und Strontian kommen local in den meisten Flözgebirgslagern, auch im bunten Sandsteine, vor. Das Vorkommen der Kieselsäure und der Thonerde, in den genannten Formationen, ist so ausgebreitet, daß es einer besondern Ableitung dieser Stoffe für unsere Mineralquellen nicht bedarf.

Die Imprägnation unsers vorzugsweise sogenannten Säuerlings dürfte im Obigen genügend erklärt sein. Die höhere Lage zugleich mit der niedrigeren Temperatur desselben, und die verhältnißmäßig geringe Menge an Kohlensäure, wie zumal an festen Bestandtheilen und sein gänzlicher Mangel an kohlensaurem Natrium geben zu erkennen, daß der Ursprung des Säuerlings nicht aus derselben Tiefe abzuleiten sei, aus welcher die Eisensäuerlinge hervorkommen.

§. 167.

Obwol unsere Eisensäuerlinge, höchst wahrscheinlich, in einiger Tiefe, mit jenem Säuerlinge in Verbindung stehen, so zeichnen sie doch die früher angegebenen Unterscheidungsmerkmale und außerdem ihr Gehalt an kohlensaurem Eisen und Manganorydul wesentlich aus. Da sie von allen unsrer Mineralquellen die höchste Temperatur haben und die größte Menge Kohlensäure, so sind sie auch, den obigen Andeutungen zufolge, mit dem vulcanischen Herde am meisten in Beziehung zu bringen. Die Temperatur dieser Quellen ist mit derjenigen, welche den Mineralquellen, die in unbestreitbar vulcanischen Gegenden entspringen, eigen ist, ganz übereinstimmend. Im vulcanischen Zuge der Eifel hat die Quelle bei Gerolstein $+ 9$, die bei Roisdorf $+ 9,5$, des

Taunus und Westerwaldes die zu Schwalbach + 8, Fachingen + 8, Geilnau + 8,5, Selters + 14 Gr. R. Diese treten aus dem Uebergangsgebirge zu Tage; dagegen, wie die unserigen, aus buntem Sandsteine, auch die benachbarten Mineralquellen zu Meinberg, die + 6 bis 10, zu Driburg, die + 8 bis 10, zu Godelheim, die + 8, zu Hofgeismar, die + 12 Gr. R. haben, die also, auch ihrer Temperatur nach, auf Verwandtschaft mit unseren Mineralquellen schließen lassen.

Das kohlensaure Eisenorydul unserer Mineralquellen ist Hausmann geneigt, unmittelbar aus dem Mergel des bunten Sandsteins, der solches enthalten soll, abzuleiten ⁹⁸⁾; bestätigt sich dieß, so liegt die Herkunft desselben nahe; sonst würde dasselbe, wenn eine Einwirkung der Hitze dabei stattfindet wird, auch vom Eisenoryde, das der bunte Sandstein in seiner Mischung enthält, und auch als reines Eisenoryd (Eisenglanz) führt, abzuleiten sein, da dieses, durch Hitze reducirt, unter Einwirkung feuchter Luft leicht oxydirt, wobei dasselbe Anfangs kohlensaures Eisenorydul und dann, als solches, vom kohlensauren Wasser aufgelöst und fortgeführt wird. — Aehnliche Zersetzen mag das im bunten Sandsteine vorkommende Manganorydhydrat (Schwarzbraunstein) erfahren und so das im Mineralwasser aufgelösete kohlensaure Manganorydul abgeben.

J. Fennner hat die Hypothese aufgestellt, daß eisenhaltige Mineralwässer überall nur da entstehen könnten, wo mächtige Torflager sind, und daß sie nur dem Torfe und, in diesem,

⁹⁸⁾ Hausmann Ueberf. d. j. Flözgeb. im Flußgeb. d. Weser. S. 67 u. 69.

der sauren Gährung, ihren Mineralgehalt zu danken haben; die Kohlensäure entwickle sich als Product, Salze, Alkalien und Metalloryde als Educte dieser Gährung⁹⁹⁾; eine Hypothese, deren hier, da sie schon an sich unhaltbar, nur historisch Erwähnung geschieht. Unsere Quellen treten aus dem Flözgebirge hervor; der Torf, der allerdings auch sie umlagert, könnte ihnen höchstens, durch Seihewasser, ihren Gehalt an phosphorsaurem Kalk, an Harzstoff und Schwefelwasserstoffgas verleihen; und diese dürften in der That davon abstammen.

Unsere verschiedenen Eisensäuerlinge stehen, ohne Zweifel, eben sowol in Hinsicht auf ihre Geburtsstätte, als auf ihren chemischen Charakter, in innigem Zusammenhange mit einander. Ihre Bestandtheile haben einerlei Ursprung. Ihrem gemeinschaftlichen Heerde entstiegen, verbreiten sie sich, in größerer oder geringerer Tiefe, in mehre Adern, die nach den verschiedenen Gebirgsschichten, welche sie durchlaufen, bald mehr Wasser, Wärme und Bestandtheile mit herausbringen, bald davon mehr oder weniger einbüßen. Ihrem localen Vorkommen nach, entspringen sie, hier, aus zwei Hauptadern oder Stämmen, deren die eine die auf dem Brunnenplatze befindlichen Quellen, die andere den Neubrunnen und dessen Nebenquelle speiset. Da jede der, so nahe bei einander zu Tage gehenden Quellen, welche diese beiden Gruppen bilden, in Hinsicht auf Temperatur, Bestandtheile, Wassermenge und Niveau, wenn auch zum Theile nur geringfügige Abweichungen darbietet, so muß jede derselben

⁹⁹⁾ Freimüthige Briefe über Schwalbach, dessen Quellen und Umgebungen 2c. von Dr. Justus Fenner. Frankf. a. M., 1807. 8. S. 35 u. f.

ihren besondern Canal haben, und diese Canäle können, wenigstens nahe am Ausflusse der Quellen, nicht mit einander communiciren; daß sie aber in größerer Tiefe unter einander in Verbindung stehen, zeigt die Abhängigkeit des Höhestandes der einen Quelle von der andern, ein Verhältniß, das selbst noch zwischen dem Trink- und Brodelbrunnen, die sonst viel Selbstständigkeit zu erkennen geben, Statt findet; wird nämlich einer dieser Brunnen leer geschöpft, so sinkt alsbald auch das Niveau des andern. So sank noch vor einigen Jahren, als, im Mai, eines Abends, der Brodelbrunnen, zur Reinigung desselben, ausgeschöpft war, auch die Trinkquelle sehr beträchtlich, und hatte mit ihrem Niveau die Abflußröhre noch nicht wieder erreicht, als der Brodelbrunnen längst wieder bis zum Abflusse zugenommen hatte; es währte dann noch sechs Stunden bis auch der Trinkbrunnen wieder bis zum Abflusse herangewachsen war.

Der Neubrunnen beziehet aus dem Mutterboden der Kochsalzsäuerlinge, welchen er benachbart ist, schon mehr Kochsalz als einer der auf dem Brunnenplatze befindlichen Eisensäuerlinge enthält, führt jedoch, der Analyse zufolge, keinen Gyps. Derselbe zeigte, am 25 August 1839, bei $+ 14$ Gr. Lufttemperatur, $+ 9,3$, während die Nebenquelle $+ 9,6$ Gr. R. zeigte.

§. 168.

Die Abkunft der Kochsalzsäuerlinge dürfte am wenigsten schwierig zu erklären sein. Wenn sie, als Säuerlinge, diejenigen Bestandtheile, deren Ableitung bereits im Obigen erläutert worden ist, auf dieselbe Weise zugeführt erhalten, so bleibt nur noch ihr reicher Gehalt an Kochsalz

zu erörtern. Es kann aber, nachdem, während der letzten Decennien, in so vielen Gegenden, in der Nähe von Salzquellen, Steinsalzlager aufgeschlossen worden sind, kaum noch einem Zweifel unterliegen, daß nicht auch unsere Kochsalzfäuerlinge von einem Steinsalzlager abzuleiten wären.

Unsere Salzquellen treten unmittelbar aus der Formation des bunten Sandsteins zu Tage. Das Bohrloch der Soolquelle ist, den 30 Fuß tiefen Soolenschacht nicht mitgerechnet, 60 Fuß, das der neuen Bohrquelle ¹⁰⁰⁾ 96, ein, 20 Schritte nördlicher, zwischen dieser und dem Salzbadehause, an der nördlichen Ecke des gegenwärtigen Emmergradirhauses gelegenes, Bohrloch war 162 Fuß ¹⁾ in den bunten Sandstein abgeteuft worden. Obgleich nun aus allen diesen bisher noch kein concretes Steinsalz heraufgeführt worden ist, so kann doch der Kochsalzgehalt unserer Kochsalzfäuerlinge nur einem, muthmaßlich in der Tiefe vorhandenen, Steinsalzlager zugeschrieben werden. Der Analogie zufolge wird das Steinsalz hier, wie an andern Orten unter ähnlichen geognostischen Verhältnissen, in Begleitung von Gyps vorkommen; und solcher ist wirklich, vor nicht langer Zeit,

¹⁰⁰⁾ Vergl. S. 161. Es ist noch zweifelhaft, ob das Wasser dieser sogenannten Bohrquelle wirklich Soole, oder nicht etwa bloß ein von den Leckwerken zusammengelaufenes Wasser war.

¹⁾ Dieses ist dasselbe Bohrloch, dessen Tiefe ich, S. 198, nur zu 150 F. angegeben habe. Aus meinem Tagebuche ersähe ich jedoch später, daß dieses Bohrloch schon Anfangs Mai's 1821, bis zu 162 F. Tiefe getrieben war; es brach dann das eiserne Stangenwerk, 50 F. hoch über dem Meißelbohrer, darin ab, und blieb stecken, ohne daß, bis dahin, eine Soole gewonnen war. Es ist übrigens sowol dieses Bohrloch, als das der sogenannten neuen Bohrquelle, schon seit mehreren Jahren verschüttet.

in der Nähe unserer Soolquelle, zuerst nur lose, in einigen Stücken, als Gerölle, aufgefunden ²⁾, seitdem aber auch schon, durch einen Bohrversuch, der im September 1839, der Soolquelle südwärts gegenüber, am rechten Ufer des Mühlengrabens, 6 F. von diesem ab, angestellt und, vom Bohrloche an, das $3\frac{1}{2}$ F. über dem Emmerpiegel mündete, $62\frac{1}{2}$ F. in die Tiefe getrieben wurde, heraufgeführt worden. Der Gyps kam hier zuerst in einer Tiefe von 13 F. unter der Oberfläche vor, wo er als hellaschgrauer schuppig-körniger Gyps, $3\frac{1}{2}$ F. mächtig anstand, über ihm eine 2 F., unter ihm eine $23\frac{1}{2}$ F. starke Schicht eines perlgrauen Thons; unter diesem gelber Thon, 1 F.; unter diesem perlgrauer Thon mit Gyps, 9 F.; darunter gelber sandiger Thon, gelber sandiger Mergel, braungelber und grauer thoniger Sandstein und sandiger Mergelthon, 4 F. 3 F.; unter diesem, bis auf den Grund des Bohrlochs, mit Thon und Mergeln, die unzweifelhaft dem bunten Mergelthongebirge des bunten Sandsteins angehören ³⁾, abwechselnde, $\frac{1}{2}$ — 1 — 2 F. starke Schichten hellgrauen und rothbunten, meist schuppig-körnigen, zuweilen weißen faserigen, selten dichten Gypses ⁴⁾.

²⁾ Vergl. S. 204.

³⁾ Ein Gypsstock in den Mergel des bunten Sandsteins eingelagert, findet sich, in unserer Nähe, am Siltbecker Berge, am Sollinge, in der Nähe von Holzminnen, dem rechten Weserufer gegenüber.

⁴⁾ Aehnlich ist das Profil des Gypsbruches bei Lemels, am rechten Moselufer; vergl. Geognostische Umriss der Rheinländer etc. mit besonderer Rücksicht auf das Vorkommen des Steinsalzes etc. durch C. v. Deynhausen, F. v. Dechen, F. v. La Roche. (2 Thle. Essen, 1825. 8.) Thl. 2. S. 57.

Der hier anstehende Gyps, nach seinem geognostischen Vorkommen, zu Werner's jüngerem Gypse gehörig, und allerdings auch an anderen Orten zuweilen Steinsalzschnüre (zu Tgel, bei Trier) und Salzquellen ⁵⁾ führend, könnte wol die Geburtsstätte unserer Rochsalzfäuerlinge sein, und dieß hat alle Wahrscheinlichkeit für sich; möglich wäre es jedoch auch, daß diese unmittelbar unter dem bunten Sandsteine, oder über dem Zechsteine hervorkämen; in letzterm Falle würden sie im ersten Flösgypse (Schlottengypse) ihren Ursprung haben, den, in der Regel, Dolomit (Rauchwacke) zu begleiten pflegt ⁶⁾.

⁵⁾ Hausmann Uebers. d. j. Flösggeb. im Flußg. d. Weser. S. 169.

⁶⁾ Handbuch der Geognosie von H. L. De La Beche, bearb. von H. v. Dechen. Berlin, 1832. 8. S. 439 u. 577.

